

COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE

Annexe : fiches espèces 2021



ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2021

Auteurs : Caroline Moussy, Gwenaél Quaintenne, Clémence Gaudard.

Relecture : Laurent Couzi, Jérémy Dupuy.

Coordination nationale : LPO pour le compte de Wetlands International

Contact : wetlands-france@lpo.fr

Financier : Ministère de la Transition écologique, Direction de l'eau et de la biodiversité


Citation recommandée : Moussy, C., Quaintenne, G. & Gaudard, C. (2021) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2021 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et solidaire. 28 pp. & annexes 101 pp., Rochefort.

Contributeurs : Les observateurs de terrain, bénévoles pour la plupart, constituent les piliers du réseau Wetlands International. Nous remercions particulièrement pour leur investissement, souvent de longue date, l'ensemble des participants et les coordinateurs locaux issus de ces structures : ACDPM Baie de Seine – Pays de Caux, ADENA-Bagnas, ALEPE, ANVL, AOM Saône-et-Loire, APOE Hegenheim, ARO Midi-Pyrénées, ASCO, Ass. des Naturalistes de la Gohelle, Ass. Amis Marais du Vigueirat, Ass. Amis du musée de Gray, Ass. Amis de la Réserve de Séné, Ass. Amis du Val d'Allier, Ass. Anse de Penfoulic, Ass. Les Gazouillis du Plateau, Ass. Hirondelle, ANA - CEN Ariège, Ass. Naturaliste d'Ouessant, Ass. Nature du Nogentais, Ass. Nature Nord-Isère Lo Parvi, Ass. Prop Marais Balançon, Ass. de Protection du Val du Drugeon, Ass. Rocha, Ass. Rosquerno, Ass. Sauvaginiers de la côte d'Opale, Aude Nature, AVEN du Grand Voyeux, Bonnelles Bulion Nature, Bretagne Vivante SEPNEB, BVO Finistère-Nord, BVO Finistère-Sud, Bretagne Vivante SEPNEB (BVO Ile-et-Vilaine), BVO Morbihan, CC Pays d'Iroise, CD Dordogne, CD Nord, CD Bouches-du-Rhône, CEN Champagne-Ardenne, CEN Languedoc-Roussillon, CEL Ile aux Moines, CEN Lorraine, CEN PACA, CEN Corse, CEN Allier, Ctre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel, Ctre d'Etude du Milieu d'Ouessant, Ctre d'Etude de Rambouillet et sa Forêt, CD Calvados, CG Essonne, CD Bouche du Rhône, CD Gironde, CD Landes, CD Ile-et-Vilaine, CD Morbihan, CD Nord, CG Seine-et-Marne, CHARENTE NATURE, CO Gard, CDC Île de Noirmoutier, CDC Océan Marais de Monts, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, CPIE Chaîne des terrils, CPIE du Pays de Soulaing, CPIE Littoral Basque, CPIE Meuse, CPIE Sèvre et Bocage, CPN, CPN des Landes (Saint-Nazaire), CPN les Mulots Chevelus (Saint-Nazaire), Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, Com. d'agglo du Saint-Quentinois, CREN Poitou-Charentes, EDEN 62, EPT du Bassin Saône & Doubs, Espaces Naturel Lille-Métropole, Eure-et-Loir Nature, F.O.S.O.R., FDC 02, FDC 13, FDC 22, FDC 24, FDC 29, FDC 30, FDC 33, FDC 34, FDC 35, FDC 40, FDC 44, FDC 56, FDC 85, Fondation Vérots, Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane, GEO Côtes d'Armor, GO des Deux-Sèvres, GO Gersois, GO Normand, GO Roussillon, GO Béarn, GOELAND, GON-Nord-Pas-de-Calais, G. Naturalistes de l'Avesnois, G. Naturaliste de Loire-Atlantique, G. Naturaliste Universitaire de Franche-Comté, Indre Nature, Loir-et-Cher Nature, Loiret Nature Environnement, Lorraine Association Nature, LPO Ain, LPO Aisne, LPO Alsace, LPO Anjou, LPO DT Aquitaine, LPO Ardèche, LPO Aude, LPO Auvergne, LPO Champagne-Ardenne, LPO DT Poitou-Charentes, LPO Cher, LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes, LPO coordination Grand-Est, LPO Côte-d'Or & Saône-et-Loire, LPO Drôme, LPO Finistère, LPO Franche-Comté, LPO Haute-Savoie, LPO Hérault, LPO Ile-de-France, LPO Ile-et-Vilaine, LPO Isère, LPO DT Limousin, LPO Loire, LPO Loire-Atlantique, LPO Lot, LPO Meurthe et Moselle, LPO Meuse, LPO Moselle, LPO Nièvre, LPO Normandie, LPO PACA, LPO Pas-de-Calais, LPO Rhône, LPO Sarthe, LPO Savoie, LPO Tarn, LPO Touraine, LPO Vendée, LPO Yonne, Maison de la Mer/Tregunc, Maison des Dunes 29N, Marais aux Oiseaux, Mayenne Nature Environnement, Mairie de La Teste de Buch, Mairie d'Andornos-les-Bains, Nature 18, Nature en Occitanie, NaturEssonne, OBIOS, OFB 13, OAG KARLSRUHE, OFB 14, OFB 17, OFB 18, OFB 22, OFB 24, OFB 34, OFB 35, OFB 47, OFB 29, OFB 33, OFB 37, OFB 41, OFB 44, OFB 45, OFB 49, OFB 51, OFB 53, OFB 54, OFB 56, OFB 67, OFB 68, OFB 79, OFB 85, OFB RNCFS Lac du Der, OFB/Unité Avifaune Migratrice, ONF, Picardie Nature, Parc Ornithologique/Réserve de Villars-les-Dombes, Parc Ornitho du Pont de Grau, PN des Ecrins, PNM d'Iroise, PN Port-Cros, PNR Avesnois, PNR Armorique, PNR Boucles de la Seine normande, PNR de la Brenne, PNR de Brière, PNR Camargue, PNR des Caps et Marais d'Opale, PNR de la Forêt d'Orient, PNR de Lorraine, PNR Golfe du Morbihan, PNR Landes de Gascogne, PNR Marais du Cotentin et du Bessin, PNR du Perche, PNR de la Narbonnaise (Med), PNR Scarpe-Escaut, Regrpt des Naturalistes Ardennais, Réserves Naturelles de France / Observatoire Patrimoine Naturel Littoral, RC Etang de Biguglia, RCFS Estuaire de Loire, RNCFS Arjuzanx, RNCFS Golfe du Morbihan, RNN Archipel des Glénan, RNN Baie de L'Aiguillon, RNN Beauguillot, RNN de la Casse de la Belle Henriette, RNN Marais de Bruges / SEPANSO, RNN Chérine, RNN Courant d'Huchet, RNN des Sept-Iles, RNN des Marais de Moëze-Oléron, RNN des Marais de Müllembourg, RNN de l'étang de Cousseau / SEPANSO, RNN du Banc d'Arguin / SEPANSO, RNN Marais et dunes d'Hourtin / ONF, RNN du Marais d'Orx, RNN du Marais d'Yves, RNN Estuaire Seine-Maison de l'Estuaire, RNN Etang noir, RNN Prés salés d'Arès et Lège Cap Ferret / ONCFS, RNN François le Bail, RNN Ile du Girard, RNN du Lac de Remoray, RNN Lilleau des Niges, RNN Marais de Séné, RNN Marais du Vigueirat, RNN Mer d'Iroise, RNN Saint-Denis-du-Payré, RNN Saint-Quentin-en-Yvelines, RNN du Val d'Allier, RNR La Vacherie, RNR du marais de Sougéal, RNR polder de Sébastopol, RNR de Sainte-Lucie, Réserve Ornitho du Teich, Sce des Espaces Verts et Nature de l'Eurométropole de Strasbourg, SEPANLOG, SEPANSO, Synd. Intercom. de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse Loire Nord, SNPN RNN de Camargue, SNPN RNN de Grand-Lieu, Station Ornithologique des Marais de Sacy, Sté. de Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, Sté d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Sologne Nature Environnement, Station Biologique de la Tour du Valat, Synd. De l'Orge, Synd. Mixte Baie de Somme-Gd Littoral Picard, Synd. Mixte Camargue Gardoise, Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche, Synd. Mixte des Marais de Sacy, Synd. Mixte Ria d'Etel, Université Bretagne Sud & Ursine Nature.

Illustration première de couverture : Huïtrier pie *Haematopus ostralegus* © Régis Perdriat

Ce travail est notamment rendu possible grâce aux partenaires du réseau Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'une charte commune.

Ces annexes complètent la synthèse «COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE - Résultats 2021 ». Elles présentent les données chiffrées des dénombrements d'oiseaux d'eau de la mi-janvier en France réalisés dans le cadre du comptage « Wetlands International ». Les résultats spécifiques des dénombrements de 90 espèces, allochtones comprises, sont présentés par « fiche-espèce » pour les groupes suivants : Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Sont également rapportés : les dénombrements d'autres espèces plus rares et/ou localisées ; les sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6). Les conditions des dénombrements de la mi-janvier 2021 sont présentées dans le document principal de la synthèse. Pour rappel, en 2021, la couverture du comptage était de 486 sites suivis (soit 92% des entités de comptages dénombrées).



Description des « fiches-espèces »

1/Encart espèces - Sont rapportés : • les noms vernaculaires français, anglais et nom latin des espèces selon le référentiel taxonomique TaxRef v14 (Gargominy *et al.* 2021) ; • les statuts, (1) de conservation de la liste rouge des espèces menacées de disparition en Europe (BirdLife International 2021 ; LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique ; NA : non applicable) et (2) de protection selon l'appartenance des espèces aux annexes de la directive Oiseaux 2009/147/CE (Annexe I : espèces sensibles protégées dans l'ensemble de l'UE pour lesquelles les états membres doivent prendre des mesures de conservation spéciale concernant leur habitat ; Annexe II : II/A espèces pouvant être chassées dans l'ensemble de l'UE ou II/B dans les territoires des pays membres cités dont la France (FR) ; Annexe III : III/A espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits ou III/B peuvent être autorisés selon la législation en vigueur) ; • la ou les principales populations ou sous espèces couvertes par le comptage, leurs tailles, tendances, et seuils RAMSAR 1% selon les dernières estimations du CSR8 (Nagy & Langendoen 2021) ou à défaut du WPE5 (Wetlands International 2012).

2/Totaux nationaux 5 ans - Sont rapportés pour les cinq dernières années : • le nombre total d'individus dénombrés ; • le nombre de sites où l'espèce est dénombrée ; • quand calculés, les indices de tendance TRIM prenant pour base 100 l'année 2014 (cf. Tendance).

3/Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans - les « effectifs nationaux moyens comptés » (ENMC) sont les sommes des effectifs moyens observés sur chacun des sites pour chaque série d'années de 5 ans. Le seuil d'importance nationale pour l'espèce en France (1%) est rapporté sous le tableau. Celui-ci est calculé sur la base de l'ENMC des 5 dernières années. Ce seuil est arrondi au plus proche voisin (i.e. 1 pour un seuil <10 ind. ; 5 pour un seuil compris entre 11 et 100 ind. ; 10 pour un seuil compris entre 101 et 1000 ind. ; 100 pour un seuil > 1000 ind.).

4/Tendance/historique de la mi-janvier - Tendance mi-janvier • Les dénombrements des espèces bénéficiant, à priori, d'une couverture et d'un suivi temporel satisfaisants, selon le protocole spécifique et le réseau de sites du comptage des oiseaux d'eau, font l'objet d'une analyse de tendance. Les résultats de ces analyses sont rapportés par un graphique représentant l'évolution temporelle des indices annuels d'abondance (base 100 = 2014) de chaque espèce à la mi-janvier depuis le début des suivis. A droite du graphique, sont également rapportées, les catégories et magnitudes de tendance calculées selon les périodes propres au rapportage au titre de l'article 12 de la Directive Oiseaux : sur le long terme, depuis 1980 pour les anatidés et limicoles ou 1993 pour les autres groupes ; et sur le court terme, ces 12 dernières années. Pour chaque espèce, les données manquantes des sites ont été complétées selon un modèle de Poisson (modèle log-linéaire ou poissonnien) au moyen du package dédié rtrim 2.1.1 (Trends & Indices for Monitoring data ; Pannekoek & van Strien 2001). Brièvement, TRIM produit des indices annuels et leurs incertitudes (ES). Le modèle poissonnien utilisé permet de prendre en compte

la corrélation multiple des données entre elles (l'effectif recensé une année particulière n'est pas indépendant de celui de l'année précédente), ainsi que la surdispersion des données de comptage. Les indices produits par TRIM ont ensuite été lissés au moyen du logiciel Trendspotter en se fondant sur une méthode d'analyse structurale de séries temporelles au moyen du filtre de Kalman (Soldaat *et al.* 2007) pour fournir les courbes de tendance et leurs intervalles de confiance à 95 % présentés sur chaque graphique. Les résultats des analyses de tendance générés par TRIM sont classés ici selon 6 catégories, de fort déclin à forte augmentation, selon la pente globale multiplicative de la régression et sa significativité selon son intervalle de confiance à 99% ou, à défaut, à 95% (tendance $p < 0.05^*$; la classification de tendance est alors suivie de « * ») :

- **Forte augmentation** - augmentation significative de plus de 5% par an (5% correspondant à un doublement des effectifs en 15 ans) ;
- **Augmentation modérée** - augmentation significative, mais non significativement supérieure à 5% par an ;
- **Stable** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin et la tendance est significativement inférieure à 5% par an ;
- **Incertain** - pas de tendance significative à l'augmentation ou au déclin mais aucune significativité d'une tendance inférieure à 5% par an ;
- **Déclin modéré** - déclin significatif, mais non significativement supérieur à 5% par an ;
- **Déclin sévère** - déclin significatif de plus de 5% par an (5% correspondant à une diminution de moitié des effectifs en 15 ans).

A noter que les « Autres sites », reliés au département, et qui regardent plusieurs entités de comptage (dont la couverture de suivi n'est pas connue et suspectée non constante au cours du temps) ont été exclus de l'analyse. A noter également, que les tendances sont calculées ici sur le postulat d'une couverture constante des comptages au cours du temps à l'intérieur des entités de comptages, ce qui ne correspond potentiellement pas à la réalité, en particulier pour les plus grands sites. Les magnitudes de changement sont rapportées sous les classifications de tendance en % moyen de changement par an (p.a.) avec son erreur standard ($\pm$ ES).

Historique mi-janvier • Pour les espèces dont le protocole et/ou le réseau de site du comptage de la mi-janvier ne sont pas adaptés, les courbes de tendance sont remplacées par un histogramme rapportant les effectifs bruts dénombrés de l'espèce depuis le début des suivis coordonnés des groupes. Les espèces peu abondantes, peu dispersées ou récemment apparues ne font également pas l'objet d'analyse de tendance.

5/Distribution 2021 - Sont rapportés : à gauche, la liste des 10 premiers sites d'accueil de l'espèce, leurs importances internationale (nom du site suivi de « * ») et nationale (nom du site suivi de « ** ») ; le décompte des sites dépassant les critères international et national ; une carte illustrant la distribution des effectifs de l'espèce dénombrés en 2020 sur le réseau des sites (centroïdes des sites ; les données des « Autres Sites » sont rattachées aux centroïdes des départements).

Autres espèces & sites d'importance internationale en 2021


Autres espèces p. 98 - Les effectifs dénombrés en 2021 des autres espèces d'oiseaux d'eau, espèces rares (<50 ind.) ou hyper-localisées (<2 sites) sont rapportés dans un tableau, selon leur ordre systématique.

Sites identifiés d'importance internationale (critères Ramsar 5 & 6) p. 99-100


Deux tableaux listent les sites atteignant en 2021 les critères de « site d'importance internationale » selon (1) le critère 5 de la convention de Ramsar, car ils accueillent 20 000 oiseaux d'eau ou plus, et (2) le critère 6 de la convention de Ramsar, car ils abritent plus de 1% des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce d'oiseau d'eau.

Références

- BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52.
 Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 Gargominy, O., Tercerie, S., Régner, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2020) TAXREF v14, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. Rapport UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN). 63 pp.
 Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEWA/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
 Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
 Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. Journal of Ornithology, 148, 351-357.
 Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <http://wpe.wetlands.org/>.



These appendices from the annual report entitled “Mid-January waterbird census in France - 2021 Results” present the detailed results for 90 species (“species sheet”) including allochthonous ones, belonging to the following groups: Anseriformes, Gaviiformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Gruiformes, Charadriiformes. Numbers of rare species and a list of sites of international importance (Ramsar Criteria 5 & 6) are also reported at the end. The weather context during the mid-January 2021 census is presented in the main report. As a reminder, 486 sites were monitored in 2021 which represents 92% of counted enumerated entities.



“Species sheet” description

1/Species inset - This section reports: • French, English and Latin names of the species according to the taxonomic reference system TaxRef v14 (Gargominy et al. 2021); • the conservation and protection statuses of species regarding respectively (i) the red list of endangered species in Europe (BirdLife International 2021; LC: Least Concern, NT: Near Threatened, VU: Vulnerable, EN: Endangered, CR: Critically endangered; NA: not applicable) and (ii) the European Birds Directive 2009/147/EC (Annex I: Protected throughout the EU and special conservation measures for their habitat; II: II/A may be hunted throughout the EU or II/B in the territories of mentioned member states, including France when annotated '(FR)'; III: III/A sale, transport, holding for sale and offer for sale are prohibited or III/B may be permitted according to current laws); • Subspecies/Populations with sizes, trends and international 1% thresholds according to the last estimates of CSR8 (Nagy & Langendoen 2021), or, by default, WPE5 (Wetlands International 2012).

2/Inset - National totals 2016/20 - This section reports: • Total number of counted individuals • number of sites where the species has been recorded • when appropriate, the TRIM estimates of yearly indices of abundance $\pm$ ES (base year 100 in 2014).

3/Inset - Cumulative national average numbers counted over 5 year periods (Effectif nationaux moyens cumulés sur 5 ans – ENMC) corresponding for each species to the sum of the site counts averaged over a 5 year periods. The 1% threshold for wetlands of national importance mentioned below the table is calculated on the basis of the ENMC for the last 5 years (1% thresholds have been rounded to the nearest: 1 for a threshold <10 ind., 5 for threshold between 11 and 100 ind., 10 for a threshold between 101 and 1000 ind.; 100 for a threshold > 1000 ind.).

4/Graph - Annual indices & trends - This section reports: • national trends are given for species that are suitably monitored within the Wetlands protocol and over our network of sites. The graph shows mid-January abundance index over years (100 in 2014). Time series start according to the beginning of species monitoring (respectively Anatidae, since 1967; Shorebirds since 1978; others since 1993). On the right, long term (respectively since 1980 for Anatidae and shorebirds and since 1993 for other species) and short-term (over the last 12 years) trend directions and magnitudes (in % of change per annum p.a.) are given. National species indices are computed using package rtrim 2.1.1 which allows for missing counts in the time series and yields unbiased yearly indices and standard errors using Loglinear Poisson regression taking or not into account overdispersion and serial correlation

(Pannekoek & van Strien 2001). TRIM indexes are then smoothed using Trendspotter (see Soldaat *et al.* 2007) providing smoothed trends and 95% confidence intervals presented in the graph. National trends are classified into 6 categories, according to the global regression slope value and its 5% significance level ($p < 0.05^*$):

- **Strong increase** - increase significantly more than 5% per year (5% would mean a doubling in abundance within 15 years).
- **Moderate increase** - significant increase, but not significantly more than 5% per year.
- **Stable** - no significant increase or decline, and most probable trends are less than 5% per year.
- **Uncertain** - no significant increase or decline, and unlikely trends are less than 5% per year.
- **Moderate decline** - significant decline, but not significantly more than 5% per year.
- **Steep decline** - decline significantly more than 5% per year (5% would mean a halving in abundance within 15 years).

5/Species' distribution in mid-January 2021 - The table on the right gives the 10 sites hosting the greatest aggregation of the given species. * and ** indicate sites of national and international importance respectively. The number of sites of national and international importance is also given. The map on the right shows the distribution of numbers during the 2021 mid-January census.

Rare species and sites of international importance

Rare species p.98

This table gives the national totals of species considered as rare considered as rare (<50 ind.) or very localized (i.e. present on two sites or fewer).

List of sites identified as internationally important (Ramsar criteria 5 & 6) p.99-100


Table lists the sites meeting (in 2021) the criteria of 'international importance': (1) criterion 5 of the Ramsar

Convention: site hosting 20,000 or more waterbirds; and (2) criterion 6 of the Ramsar Convention: site hosting more than 1% of individuals in a population of a species or subspecies of waterbird.



Références

BirdLife International (2021) European Red List of Birds, pp52. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. (2020) TAXREF v14, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. Rapport UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN). 63 pp.
Nagy, S. & Langendoen, T. (2021) Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area Eighth Edition. Doc. AEWA/MOP 8.19, pp. 64. African Eurasian Waterbirds Agreement, Budapest, Hungary.
Pannekoek, J. & van Strien, A.J. (2001) TRIM 3.0 for Windows (Trends & Indices for Monitoring data). Statistics Netherlands, Voorburg.
Soldaat, L., Visser, H., van Roomen, M. & van Strien, A. (2007) Smoothing and trend detection in waterbird monitoring data using structural time-series analysis and the Kalman filter. Journal of Ornithology, 148, 351-357.
Wetlands International (2012) Waterbird Population Estimates Fifth edition. Wetlands International. <http://wpe.wetlands.org/>.



Cygne tuberculé - *Cygnus olor*

Mute Swan

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO Cont. & C Europe

Taille : 260 000-300 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 25 936 individus dénombrés sur 321 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	21 686	22 127	22 720	24 826	25 936
Nb sites	300	317	317	331	321
Indices	113±6	116±6	117±6	130±7	138±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	8 157	12 785	17 158	21 233	23 790

*Seuil National 1% 2017-2021 : 240 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+8.0% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+2.8% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	4 286
Cours du Rhin (67/68)**	1 705
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 009
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	943
Étangs de la Woëvre**	933
Estuaire Seine**	797
Haut Rhône (01/73/74)**	775
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	713
Alsace hors-Rhin (67/68)**	568
Vallée de la Seine**	417

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 19

Cygnus olor

Mi-janvier 2021



Cygne de Bewick - *Cygnus columbianus*

Tundra Swan

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : bewickii, O Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 21 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 220 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 409 individus dénombrés sur 10 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	436	284	413	364	409
Nb sites	9	6	9	6	10
Indices	110±23	72±17	106±22	91±20	98±21

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	81	120	295	433	381

*Seuil National 1% 2017-2021 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+6.0% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.5% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	141
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	120
Camargue**	84
Étangs de Moselle**	20
Étangs Argonne**	19
Estuaire Seine**	10
RNR des étangs de Belval-en-Argonne**	6
Étangs de la Woëvre**	4
Littoral du Pas-de-Calais**	4
Vallée de l'Escaut	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 9

Cygnus columbianus

Mi-janvier 2021



Cygne chanteur - *Cygnus cygnus*

Whooper Swan

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe continentale

Taille : 138 500 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 90 individus dénombrés sur 12 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	235	83	117	107	90
Nb sites	10	8	10	12	12
Indices	249±73	89±32	125±42	115±39	97±34

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	28	62	96	130	124

*Seuil National 1% 2017-2021 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+7.5% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.4% p.a. ±ES1.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	26
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	24
Dombes - Vallée de l'Ain**	19
Étangs de Moselle**	6
Estuaire Seine**	4
Vallée de la Meuse**	3
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	2
Sites du Florentinois**	2
Baie de Goulven & anse de Kernic**	1
Flandre Intérieure, région de Lille**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Cygnus cygnus

Mi-janvier 2021



Oie des moissons - *Anser fabalis*

Bean Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : rossicus, Ouest & C Sibérie/NE & SO Europe

Taille : 600 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 5 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 2 359 individus dénombrés sur 9 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 686	1 132	2 341	1 107	2 359
Nb sites	7	5	5	4	9
Indices	92±29	62±22	128±37	60±21	129±37

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	2 758	3 167	2 863	1 774	1 723

*Seuil National 1% 2017-2021 : 15 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Déclin modéré

-1.8% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-5.3% p.a. ±ES1.8%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 454
Cours du Rhin (67/68)**	816
Vallée de la Moselle**	75
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	6
Étangs de Moselle	3
Rade de Lorient	2
Dombes - Vallée de l'Ain	1
Vallée de l'Oise et Plan d'eau du Laonnois	1
Littoral Picard	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 3

Anser fabalis

Mi-janvier 2021



Oie rieuse - *Anser albifrons*

Greater White-fronted Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : albifrons, NO Sibérie & NE Europe/NO Europe

Taille : 1 000 000-1 200 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 921 individus dénombrés sur 20 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	565	273	568	441	921
Nb sites	22	14	18	14	20
Indices	150±46	73±27	150±46	115±37	241±68

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	211	274	604	514	551

*Seuil National 1% 2017-2021 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+4.3% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.8% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Étangs de Moselle**	371
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	361
Baie des Veys**	88
Littoral Picard**	49
Marais de Germont**	14
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	5
Étangs de la région de Vaux	5
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay	5
Dombes - Vallée de l'Ain	3
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 5

Anser albifrons

Mi-janvier 2021



Oie cendrée - *Anser anser*

Greylag Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : anser, NO Europe/SO Europe

Taille : 710 000-780 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 15 787 individus dénombrés sur 93 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	17 750	14 170	13 977	15 434	15 787
Nb sites	89	96	74	91	93
Indices	112±12	88±10	90±10	102±11	104±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	8 293	13 722	18 571	19 028	16 007

*Seuil National 1% 2017-2021 : 160 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+8.9% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-4.0% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2021

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	2 613
Camargue**	1 895
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 832
Étangs de Moselle**	1 699
Loire Aval**	1 095
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	978
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	794
Cours du Rhin (67/68)**	540
Étangs de la Woëvre**	469
RNR des étangs de Belval-en-Argonne **	395

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Anser anser

Mi-janvier 2021



Bernache nonnette - *Branta leucopsis*

Barnacle Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Russie/Allemagne & Pays-Bas

Taille : 1 400 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 127 individus dénombrés sur 16 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 254	380	865	88	127
Nb sites	20	30	18	20	16
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	17	48	563	582	549

*Seuil National 1% 2017-2021 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie des Veys**	99
Vallée du Loir Amont**	6
Autres sites - 91 (Essonne)	3
Vallée de l'Huisne	2
Baie de Guisseny	2
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	2
Val d'Allier : aval de Pont du Château	2
Étangs St Hubert, St Quentin, Saclay, Noës	2
Marais poitevin étendu	2
Dombes - Vallée de l'Ain	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 2

Branta leucopsis

Mi-janvier 2021



Bernache cravant - *Branta bernicla*

Brent Goose (Dark-bellied)

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : bernicla, O Sibérie/O Europe

Taille : 211 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 100 714 individus dénombrés sur 67 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	112 219	90 585	128 954	93 331	100 714
Nb sites	56	59	58	70	67
Indices	131±12	106±11	150±14	108±11	116±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	92 774	112 317	111 732	103 281	105 339

*Seuil National 1% 2017-2021 : 1100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.7% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Golfe du Morbihan*	12 860
Ile de Ré*	11 607
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	9 926
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	6 638
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	6 058
Baie du Mont-Saint-Michel*	5 793
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	5 453
Bassin d'Arcachon*	4 548
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol*	3 748
Baie de Quiberon*	3 575

Nb sites d'importance internationale* : 13

Nb sites d'importance nationale** : 20

Branta bernicla

Mi-janvier 2021



Bernache à ventre pâle - *Branta bernicla hrota*

Light-bellied Brent Goose

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : hrota, Canada & Groenland/Irlande

Taille : 37 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 1 401 individus dénombrés sur 7 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 255	1 124	825	1 162	1 401
Nb sites	6	8	6	18	7
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	0	109	1 070	1 372	1 152

*Seuil National 1% 2017-2021 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Ouest du Cotentin*	1 375
Mer blanche à Pointe de Mousterlin**	14
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	4
Littoral des Abers	4
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol	2
Baie de Morlaix & Penzé	1
Baie de Goulven & anse de Kernic	1

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 2

Branta bernicla hrota

Mi-janvier 2021



Tadorne de Belon - *Tadorna tadorna*

Common Shelduck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) NO Europe (b) Mer noire & Méditerranée

Taille : (a) 310 000 ind.
(b) 280 000-290 000 ind.

Tendance : (a) STA
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 500 ind.
(b) 2 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 52 699 individus dénombrés sur 163 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	59 234	56 594	60 733	60 501	52 699
Nb sites	144	165	170	173	163
Indices	117±6	111±6	118±7	116±7	99±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	53 495	50 437	63 631	54 772	58 232

*Seuil National 1% 2017-2021 : 580 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+2.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-1.8% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	10 178
Camargue*	4 257
Baie du Mont-Saint-Michel*	3 098
Golfe du Morbihan*	3 086
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	3 078
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	2 857
Ile de Ré**	2 458
Littoral Picard**	2 428
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 849
Loire Aval**	1 409

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 18

Tadorna tadorna

Mi-janvier 2021



Canard siffleur - *Mareca penelope*

Eurasian Wigeon

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) O Sibérie & NE/NO Europe (b) O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 1 300 000-1 600 000 ind. Tendance : (a) STA
(b) 420 000-540 000 ind. (b) STA?

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 000 ind.
(b) 4 400 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 43 890 individus dénombrés sur 206 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	49 273	42 644	38 327	46 675	43 890
Nb sites	212	198	208	206	206
Indices	91±9	79±8	71±8	87±9	81±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	41 249	47 626	54 707	43 632	44 361

*Seuil National 1% 2017-2021 : 440 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Stable

-0.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-2.6% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	8 033
Loire Aval**	2 808
Marais poitevin étendu**	2 543
Étangs de la Woëvre**	2 408
Lac de Grand-Lieu**	2 395
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	2 113
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 955
Golfe du Morbihan**	1 530
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	1 487
Dombes - Vallée de l'Ain**	1 280

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 19

Mareca penelope

Mi-janvier 2021



Canard chipeau - *Mareca strepera*

Gadwall

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) strepera, NO Europe (b) strepera, NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 140 000 ind.
(b) 130 000-230 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.
(b) 1 900 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 32 367 individus dénombrés sur 235 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	36 556	25 663	33 215	34 495	32 367
Nb sites	243	230	244	238	235
Indices	120±7	84±5	110±7	114±7	107±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	18 074	23 041	36 031	35 328	32 697

*Seuil National 1% 2017-2021 : 330 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+2.8% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.7% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	9 235
Cours du Rhin (67/68)*	3 533
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	3 092
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	2 025
Étangs de la Woëvre*	1 889
Lac de Grand-Lieu*	1 779
Etangs de Brenne**	1 018
Dombes - Vallée de l'Ain**	561
Loire-Foréz**	389
Haut Rhône (01/73/74)**	348

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 13

Mareca strepera

Mi-janvier 2021



Sarcelle d'hiver - *Anas crecca*

Common Teal

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) crecca, NO Europe (b) crecca, O Sibérie & NE Europe/Mer noire & Méd.

Taille : (a) 670 000 ind.
(b) 1 000 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 000 ind.
(b) 10 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 156 474 individus dénombrés sur 310 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	133 363	119 586	126 399	123 887	156 474
Nb sites	314	316	312	313	310
Indices	118±8	107±8	111±8	109±8	136±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	108 321	108 468	121 714	131 628	134 108

*Seuil National 1% 2017-2021 : 1300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.3% p.a. ±ES0.5%


• Distribution 2021

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	37 802
Camargue*	26 335
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	8 163
Loire Aval*	7 205
Iles de l'estuaire (Gironde)*	6 873
Dombes - Vallée de l'Ain*	5 980
Lac de Grand-Lieu**	4 290
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	3 303
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	2 965
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2 740

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 19

Anas crecca
Mi-janvier 2021



Canard colvert - *Anas platyrhynchos*

Mallard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A

Population(s) : (a) platyrhynchos, NO Europe (b) platyrhynchos, N Europe/O Méd.

Taille : (a) 4 500 000-7 100 000 ind.
(b) 1 000 000-1 400 000 ind.

Seuil RAMSAR1% : (a) 53 000 ind.
(b) 14 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 251 842 individus dénombrés sur 457 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	290 013	241 856	273 157	220 454	251 842
Nb sites	431	447	451	461	457
Indices	111±6	91±6	101±6	83±5	95±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	218 324	276 906	302 236	282 198	264 966

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2600 ind.

• Tendence/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Stable

+0.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-2.9% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	26 278
Dombes - Vallée de l'Ain*	16 437
Loire Aval**	7 604
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	7 525
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	6 582
Alsace hors-Rhin (67/68)**	5 720
Lac de Grand-Lieu**	5 575
Cours du Rhin (67/68)**	4 574
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	4 523
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	3 676

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 16

Anas platyrhynchos

Mi-janvier 2021



Canard pilet - *Anas acuta*

Northern pintail

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 74 000 ind.
(b) 450 000-750 000 ind.

Tendance : (a) STA/AUG
(b) DEC?

Seuil RAMSAR1% : (a) 600 ind.
(b) 5 800 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 17 958 individus dénombrés sur 108 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	10 116	13 982	11 342	16 030	17 958
Nb sites	111	106	102	111	108
Indices	67±8	92±10	74±8	101±10	111±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	17 619	17 226	12 626	14 290	13 894

*Seuil National 1% 2017-2021 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Stable

+0.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.7% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	2 638
Camargue**	1 818
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	1 799
Lac de Grand-Lieu*	1 106
Iles de l'estuaire (Gironde)*	1 086
Littoral Picard*	948
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	910
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx*	853
Golfe du Morbihan*	852
Dombes - Vallée de l'Ain*	751

Nb sites d'importance internationale* : 10

Nb sites d'importance nationale** : 21

Anas acuta

Mi-janvier 2021



Canard souchet - *Spatula clypeata*

Northern Shoveler

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO & C Europe (hiv.) (b) O Sibérie NE & E Europe/S Europe & O Afrique

Taille : (a) 70 000-80 000 ind.
(b) 450 000-600 000 ind.

Tendance : (a) AUG
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 650 ind.
(b) 5 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 48 022 individus dénombrés sur 205 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	36 502	40 878	35 295	41 682	48 022
Nb sites	202	199	195	205	205
Indices	83±6	93±7	80±6	94±7	106±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	26 344	32 848	28 884	41 374	41 166

*Seuil National 1% 2017-2021 : 410 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+2.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+4.6% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu*	8 818
Camargue*	7 183
Loire Aval*	2 987
Les Marais du Cotentin et du Bessin*	2 740
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	2 398
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	1 450
Sud Loire*	1 192
Baie du Mont-Saint-Michel*	1 182
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	1 176
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 153

Nb sites d'importance internationale* : 17

Nb sites d'importance nationale** : 23

Spatula clypeata

Mi-janvier 2021



Nette rousse - *Netta rufina*

Red-crested Pochard

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : SO & C Europe/O Méditerranée

Taille : 50 000-60 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 550 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 5 703 individus dénombrés sur 60 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	6 232	6 135	7 120	7 545	5 703
Nb sites	46	53	52	64	60
Indices	156±18	154±18	178±21	182±21	142±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	2 549	4 039	5 566	5 237	6 543

*Seuil National 1% 2017-2021 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.9% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

+1.2% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Bourget*	1 893
Camargue*	1 682
Barrage de Cadarache**	521
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	508
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	170
Sites du Sénonais**	122
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	105
Yonne aval**	95
Étangs de la Woëvre**	77
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	73

Nb sites d'importance internationale* : 2

Nb sites d'importance nationale** : 11

Netta rufina

Mi-janvier 2021



Fuligule milouin - *Aythya ferina*

Common Pochard

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NE Europe/NO Europe (b) C & NE Europe/Mer noire & Méditerranée

Taille : (a) 150 000 ind.
(b) 530 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 6 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 57 719 individus dénombrés sur 259 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	52 532	53 575	54 027	63 814	57 719
Nb sites	246	266	264	261	259
Indices	79±10	78±10	81±10	95±11	88±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	85 345	82 962	83 290	71 957	57 914

*Seuil National 1% 2017-2021 : 580 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Déclin modéré

-0.8% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-4.4% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon*	7 354
Étang de Biguglia**	5 218
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	4 127
Lac du Bourget*	2 983
Cours du Rhin (67/68)*	2 807
Lac de Grand-Lieu*	2 611
Complexe de l'étang de Berre**	2 268
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	1 980
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	1 864
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 608

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 17

Aythya ferina

Mi-janvier 2021



Fuligule nyroca - *Aythya nyroca*

Ferruginous Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : E Europe/E Méditerranée & Afrique Sahel

Taille : 24 000-61 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 42 individus dénombrés sur 21 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	65	40	61	50	42
Nb sites	24	11	19	20	21
Indices	134±42	71±26	141±44	118±38	82±29

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	10	20	34	46	47

*Seuil National 1% 2017-2021 : 0 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+5.4% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2010-2021

Incertain/Fluctuant

-1.1% p.a. ±ES1.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Bourget**	16
Lac de Marcenay**	4
Autres sites - 26 (Drôme)**	3
Crau : autres sites**	2
Dombes - Vallée de l'Ain**	1
Vallée de l'Aisne en amont de Soissons**	1
Autres sites - 04 (Alpes de Haute-Provence)**	1
Complexe de l'étang de Berre**	1
Réservoir de Grosbois**	1
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Aythya nyroca

Mi-janvier 2021



Fuligule morillon - *Aythya fuligula*

Tufted Duck

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) NO Europe (hiv.) (b) C Europe, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 800 000-1 000 000 ind.
(b) 400 000-500 000 ind.

Tendance : (a) DEC?
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 8 900 ind.
(b) 4 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 31 802 individus dénombrés sur 247 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	34 026	33 197	27 323	33 259	31 802
Nb sites	243	236	234	225	247
Indices	82±8	81±8	66±7	81±8	77±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	50 981	45 288	41 356	40 342	32 620

*Seuil National 1% 2017-2021 : 330 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Déclin modéré

-2.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-3.8% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)*	9 707
Étang de Biguglia**	1 800
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	1 483
Lac du Bourget**	1 371
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	1 194
Alsace hors-Rhin (67/68)**	1 059
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	997
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	715
Vallée de la Seine**	621
Haut Rhône (01/73/74)**	533

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 14

Aythya fuligula

Mi-janvier 2021



Fuligule milouinan - *Aythya marila*

Greater Scaup

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : marila, N Europe/O Europe

Taille : 240 000-280 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 32 individus dénombrés sur 11 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	250	58	44	29	32
Nb sites	35	11	10	12	11
Indices	119±50	26±18	18±14	14±13	15±13

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	1 867	1 397	577	167	81

*Seuil National 1% 2017-2021 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Fort déclin

-9.2% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Fort déclin

-24.2% p.a. ±ES3.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie des Veys**	11
Baie de Vilaine**	10
Lac de Grand-Lieu**	2
Sud Loire**	2
Étangs de la Woëvre**	1
Cours du Rhin (67/68)**	1
Lac du Bourget**	1
Vallée de la Seine**	1
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	1
Littoral Picard**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 11

Aythya marila

Mi-janvier 2021



Eider à duvet - *Somateria mollissima*

Common Eider

Statuts : Liste rouge : EN (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : mollissima, Baltic, Danemark & Pays-Bas

Taille : 560 000-920 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 7 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 265 individus dénombrés sur 18 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	287	124	479	137	265
Nb sites	27	15	22	24	18
Indices	92±41	39±23	154±61	38±23	85±39

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	2 380	1 610	1 037	317	254

*Seuil National 1% 2017-2021 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Fort déclin

-6.4% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Fort déclin

-11.4% p.a. ±ES2.8%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Ouest du Cotentin**	101
Baie des Veys**	66
La côte de nacre**	31
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	14
La côte du Bessin**	13
Etangs de Thau et de Bagnas**	8
Etangs Montpellierains (34+30)**	7
Littoral du Pas-de-Calais**	5
Le Littoral Seino-Marin**	4
Camargue**	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 11

Somateria mollissima

Mi-janvier 2021



Harelde boréale - *Clangula hyemalis*

Long-tailed Duck

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) O Sibérie/N Europe (repr.) (b) Islande & Groenland

Taille : (a) 1 600 000 ind.
(b) 36 000-99 000 ind.

Tendance : (a) STA?
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 16 000 ind.
(b) 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 14 individus dénombrés sur 8 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	54	11	5	20	14
Nb sites	18	8	5	15	8
Indices	325±133	69±39	31±23	106±53	88±46

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	6	3	9	5	14

*Seuil National 1% 2017-2021 : 0 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Stable

-1.3% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2010-2021

Incertain/Fluctuant

+3.3% p.a. ±ES4.2%


• Distribution 2021

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral des Abers**	3
Littoral vendéen**	3
Vallée de l'Oise et Plan d'eau du Laonnois**	2
Baie de Quiberon**	2
Baie d'Orne**	1
Archipel de Molène**	1
Côte Nord du Cotentin**	1
Rivière d'Etel**	1

Nb sites d'importance internationale* :
Nb sites d'importance nationale** : 8

Clangula hyemalis

Mi-janvier 2021



Macreuse noire - *Melanitta nigra*

Common Scoter

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : O Sibérie & N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 687 000-815 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 7 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 21 713 individus dénombrés sur 36 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	23 509	17 468	24 360	20 673	21 713
Nb sites	30	32	35	40	36
Indices	75±16	56±13	76±16	64±14	68±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	28 990	28 309	22 323	26 092	21 597

*Seuil National 1% 2017-2021 : 220 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Déclin modéré

-0.9% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Incertain/Fluctuant

-2.0% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	6 681
Pointe Espagnole**	2 550
Baie du Mont-Saint-Michel**	2 351
Littoral vendéen**	2 150
Plage d'Ecaut à Berck**	1 896
Littoral Augeron**	1 139
Baie de Douarnenez**	985
Côte Ouest du Cotentin**	696
Baie d'Audierne**	580
Baie de Quiberon**	469

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Melanitta nigra

Mi-janvier 2021



Macreuse brune - *Melanitta fusca*

Velvet Scoter

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : O Siberia & N Europe/NO Europe

Taille : 220 000-410 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 4 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 132 individus dénombrés sur 23 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	707	262	336	508	132
Nb sites	34	20	24	22	23
Indices	281±135	101±59	131±72	202±102	53±37

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	1 120	257	624	228	388

*Seuil National 1% 2017-2021 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Fort déclin

-6.4% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2010-2021

Incertain/Fluctuant

-2.7% p.a. ±ES3.3%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	36
Littoral Augeron**	25
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	8
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	6
Littoral Picard**	6
Plans d'eau de l'Ailette et de Monampteuil**	5
Baie de la Fresnaye, St-Jacut de la Mer**	5
Étangs de la Woëvre**	5
Bassin d'Arcachon**	4
Baie de Quiberon**	4

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Melanitta fusca

Mi-janvier 2021



Garrot à oeil d'or - *Bucephala clangula*

Common Goldeneye

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : clangula, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 750 000-1 500 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 11 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 869 individus dénombrés sur 38 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 765	1 258	996	1 127	869
Nb sites	50	38	46	48	38
Indices	99±10	70±8	56±7	63±7	49±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	2 812	2 389	2 169	1 778	1 192

*Seuil National 1% 2017-2021 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Déclin modéré

-1.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Fort déclin

-7.4% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	477
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	96
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	67
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	48
Étangs de la Woëvre**	40
Littoral Picard**	25
Alsace hors-Rhin (67/68)**	21
Lac du Bourget**	15
Vallée de l'Ain**	10
Dombes - Vallée de l'Ain	7

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 9

Bucephala clangula

Mi-janvier 2021



Harle piette - *Mergellus albellus*

Smew

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)

Taille : 28 000-41 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 133 individus dénombrés sur 9 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	287	153	141	129	133
Nb sites	20	19	14	14	9
Indices	167±34	86±21	81±20	73±18	77±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	675	278	192	217	166

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Déclin modéré

-0.7% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-7.1% p.a. ±ES1.2%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	64
Cours du Rhin (67/68)**	23
Étangs de la Woëvre**	21
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	7
Alsace hors-Rhin (67/68)**	5
Littoral Picard**	5
Vallée de la Meuse**	4
Vallée de l'Aisne en amont de Soissons**	3
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 8

Mergellus albellus

Mi-janvier 2021



Harle huppé - *Mergus serrator*

Red-breasted Merganser

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : NO & C Europe (hiv.)

Taille : 100 000-160 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 860 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 2 673 individus dénombrés sur 49 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	2 888	2 730	2 753	2 326	2 673
Nb sites	53	56	57	55	49
Indices	94±12	88±11	89±11	76±10	86±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	4 472	3 987	3 632	3 343	2 679

*Seuil National 1% 2017-2021 : 25 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Déclin modéré

-0.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-3.9% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	845
Golfe du Morbihan**	574
Rade de Brest**	245
La côte de nacre**	200
Baie des Veys**	62
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	54
Baie de Morlaix & Penzé**	48
La côte est du Cotentin**	45
La côte du Bessin**	44
Baie de Quiberon**	43

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Mergus serrator

Mi-janvier 2021



Harle bièvre - *Mergus merganser*

Goosander

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : merganser, NO & C Europe (hiv.)

Taille : 170 000-260 000 ind.

Tendance : STA/AUG?

Seuil RAMSAR1% : 2 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 2 911 individus dénombrés sur 52 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	3 823	3 495	3 536	3 435	2 911
Nb sites	43	58	56	60	52
Indices	155±19	139±18	141±18	137±17	116±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	2 280	1 354	1 772	2 561	3 434

*Seuil National 1% 2017-2021 : 35 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+2.9% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+5.3% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	848
Doubs Moyen**	631
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	169
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	159
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	138
Bas-Doubs**	129
Haut Rhône (01/73/74)**	117
Alsace hors-Rhin (67/68)**	93
Vallée de la Moselle**	71
Autres sites - 39 (Jura)**	69

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Mergus merganser

Mi-janvier 2021



Plongeon catmarin - *Gavia stellata*

Red-throated Diver

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : NO Europe (hiv.)

Taille : 210 000-340 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 2 773 individus dénombrés sur 39 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	2 227	5 011	4 677	2 030	2 773
Nb sites	31	26	39	38	39
Indices	134±17	300±33	279±31	119±16	158±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	160	533	1 643	1 587	3 347

*Seuil National 1% 2017-2021 : 35 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Forte augmentation

+13.6% p.a. ±ES0.9%

• Court terme 2010-2021

Forte augmentation

+8.9% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	1 126
Plage d'Ecaut à Berck**	766
Littoral Augeron**	226
Archipel de Houat-Hoëdic**	127
Le Littoral Seino-Marin**	95
La côte de nacre**	76
Littoral vendéen**	63
La côte est du Cotentin**	43
Plage de Calais à Oye**	37
Baie du Mont-Saint-Michel	28

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 9

Gavia stellata

Mi-janvier 2021



Plongeon arctique - *Gavia arctica*

Black-throated Diver

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : arctica, N Europe & O Siberia/Europe

Taille : 390 000-590 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 185 individus dénombrés sur 23 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	199	271	264	265	185
Nb sites	25	33	32	27	23
Indices	92±19	128±24	128±24	126±24	85±18

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	211	158	225	228	232

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Stable

+1.3% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Rade de Brest**	50
Baie de Douarnenez**	27
La côte est du Cotentin**	22
Côte Nord du Cotentin**	20
Le Littoral Seino-Marin**	17
Presqu'île de Crozon**	13
Côte du Goëlo**	11
La côte du Bessin**	6
Autres sites - 04 (Alpes de Haute-Provence)**	2
Etangs Leucatois (11+66)**	2

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Gavia arctica

Mi-janvier 2021



Plongeon imbrin - *Gavia immer*

Great Northern Diver

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Europe (hiv.)

Taille : 8 600-11 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 50 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 314 individus dénombrés sur 49 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	178	340	200	353	314
Nb sites	37	47	40	62	49
Indices	116±17	215±28	97±15	160±22	136±19

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	113	64	158	209	279

*Seuil National 1% 2017-2021 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Augmentation modérée

+3.7% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+3.3% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Houat-Hoëdic*	93
Baie d'Audierne**	35
Rade de Brest**	17
Ile de Ré**	16
Baie de Morlaix & Penzé**	16
Baie de Douarnenez**	13
Bassin d'Arcachon**	10
Lacs de Cazaux et de Sanguinet**	10
Baie de Quiberon**	10
Lac de Carcans-Hourtin**	7

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 22

Gavia immer

Mi-janvier 2021



Grand Cormoran - *Phalacrocorax carbo*

Great Cormorant

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) carbo, NO Europe (b) sinensis, N & C Europe

Taille : (a) 86 000-110 000 ind.
(b) 610 000-740 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) AUG

Seuil RAMSAR1% : (a) 1 200 ind.
(b) 6 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 75 697 individus dénombrés sur 430 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	69 135	67 585	89 786	74 181	75 697
Nb sites	397	397	442	450	430
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	53 588	57 477	56 956	65 550	78 270

*Seuil National 1% 2017-2021 : 780 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2021

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	5 433
Les Etangs d'Hardelot**	2 500
Estuaire Seine**	2 136
Littoral du Pas-de-Calais**	1 915
Littoral Dunkerquois**	1 705
Artois ouest**	1 682
Littoral Picard**	1 611
Etangs du Narbonnais**	1 568
Étang de Diana**	1 366
Cours du Rhin (67/68)**	1 329

Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 22

Phalacrocorax carbo

Mi-janvier 2021



Cormoran huppé - *Phalacrocorax aristotelis*

European Shag

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) aristotelis (b) desmarestii

Taille : (a) 199 000-205 000 ind.
(b) 30 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 2 000 ind.
(b) 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 3 562 individus dénombrés sur 47 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 522	2 394	3 262	2 983	3 562
Nb sites	32	33	44	47	47
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	1 173	588	1 738	1 749	2 847

*Seuil National 1% 2017-2021 : 30 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Molène**	1 031
Autres sites - 29 (Finistère)**	345
Archipel des Glénan**	253
Côte Nord du Cotentin**	217
Réserve Naturelle des sept-îles**	172
Rade de Brest**	126
La côte est du Cotentin**	100
île d'Ouessant**	97
Littoral Plouescat-Roscoff**	97
Presqu'île de Crozon**	95

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 25

Phalacrocorax aristotelis

Mi-janvier 2021



Bihoreau gris - *Nycticorax nycticorax*

Black-crowned Night-heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : nycticorax, O Europe NO Afrique (repr.)

Taille : 47 000-57 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 480 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 476 individus dénombrés sur 27 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	465	436	564	402	476
Nb sites	18	21	22	23	27
Indices	378±109	371±108	520±146	312±92	397±115

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	49	113	118	191	471

*Seuil National 1% 2017-2021 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Incertain/Fluctuant

+24.4% p.a. ±ES27.4%

• Court terme 2010-2021

Forte augmentation

+20.4% p.a. ±ES2.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs de Brenne**	149
Les Grissotières**	42
Plan d'eau d'Ecluzelles**	42
Loire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à Sully-sur-Loire**	40
Sud Loire**	30
Bassin d'Arcachon**	23
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	23
Autres sites - 40 (Landes)**	21
Dombes - Vallée de l'Ain**	18
Loire : Langeais à Tours**	16

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 14

Nycticorax nycticorax

Mi-janvier 2021



Héron garde-boeufs - *Bubulcus ibis*

Cattle Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ibis, SO Europe

Taille : 190 000-230 000 ind.

Tendance : AUG/STA?

Seuil RAMSAR1% : 2 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 14 462 individus dénombrés sur 130 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	7 919	12 897	9 635	22 396	14 462
Nb sites	109	97	106	119	130
Indices	115±21	241±39	186±32	368±57	274±44

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	3 553	3 762	5 375	10 798	13 698

*Seuil National 1% 2017-2021 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Forte augmentation

+7.1% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2010-2021

Forte augmentation

+17.3% p.a. ±ES1.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)**	923
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	858
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	822
Autres sites - 40 (Landes)**	803
Côte Ouest du Cotentin**	754
Centre Morbihan**	700
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	624
Bas Rhône-Basse Isère**	590
Rade de Brest**	559
Estuaire Seine**	535

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 26

Bubulcus ibis

Mi-janvier 2021



Aigrette garzette - *Egretta garzetta*

Little Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : garzetta, O Europe NO Afrique

Taille : 95 000-105 000 ind.

Tendance : AUG?

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 8 695 individus dénombrés sur 255 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	8 500	8 197	11 166	11 468	8 695
Nb sites	233	241	244	254	255
Indices	90±6	87±6	119±8	123±8	93±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	9 059	9 155	7 437	10 158	9 787

*Seuil National 1% 2017-2021 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Augmentation modérée

+0.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+1.7% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	1 278
Ile de Ré**	567
Marais Breton**	415
Camargue**	372
Sud Loire**	351
Autres sites - 40 (Landes)**	315
Côte Ouest du Cotentin**	234
Littoral du Pas-de-Calais**	181
Etangs Montpelliérains (34+30)**	167
Estuaire Seine**	165

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 19

Egretta garzetta

Mi-janvier 2021



Grande Aigrette - *Ardea alba*

Great Egret

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : alba, O, C & SE Europe/Mer noire & Méditerranée

Taille : 120 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 780 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 8 284 individus dénombrés sur 334 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	8 298	8 790	10 701	8 665	8 284
Nb sites	305	312	327	340	334
Indices	103±6	109±6	134±7	108±6	109±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	804	2 142	4 231	7 963	9 325

*Seuil National 1% 2017-2021 : 95 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Forte augmentation

+16.7% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+5.7% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	545
Camargue**	453
Lac de Grand-Lieu**	350
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	255
Etangs de Brenne**	246
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	244
Étangs de Moselle**	177
Cours du Rhin (67/68)**	176
Loire-Foréz**	165
Étangs de la Woèvre**	158

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Ardea alba

Mi-janvier 2021



Héron cendré - *Ardea cinerea*

Grey Heron

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : cinerea, N & O Europe

Taille : 320 000-380 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 5 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 10 973 individus dénombrés sur 428 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	11 575	11 705	13 012	12 710	10 973
Nb sites	408	415	439	431	428
Indices	112±6	112±6	128±7	123±6	110±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	8 515	9 658	9 252	11 271	12 446

*Seuil National 1% 2017-2021 : 120 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Augmentation modérée

+1.5% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+2.4% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Dombes - Vallée de l'Ain**	671
Camargue**	323
Autres sites - 40 (Landes)**	274
Cours du Rhin (67/68)**	245
Alsace hors-Rhin (67/68)**	231
Lac de Grand-Lieu**	230
Marais Breton**	216
Loire-Foréz**	215
Etangs du Narbonnais**	194
Doubs Moyen**	194

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Ardea cinerea

Mi-janvier 2021



Cigogne blanche - *Ciconia ciconia*

White Stork

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : ciconia, O Europe & NO Afrique/Afrique subsaharienne

Taille : 170 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 600 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 2 019 individus dénombrés sur 54 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 150	1 540	2 161	1 490	2 019
Nb sites	37	61	51	53	54
Indices	158±28	167±30	217±37	161±29	245±41

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	138	439	549	904	1 676

*Seuil National 1% 2017-2021 : 15 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Forte augmentation

+11.9% p.a. ±ES1.2%

• Court terme 2010-2021

Forte augmentation

+9.1% p.a. ±ES1.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs du Narbonnais**	467
Autres sites - 01 (Ain)**	303
Le Pays d'Auge**	252
Autres sites - 40 (Landes)**	246
Etangs de Thau et de Bagnas**	151
Camargue**	127
Dombes - Vallée de l'Ain**	93
Loire Aval**	55
Marais poitevin étendu**	38
Marais de Bordeaux**	35

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Ciconia ciconia

Mi-janvier 2021



Ibis falcinelle - *Plegadis falcinellus*

Glossy Ibis

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée/O Afrique

Taille : 73 000-150 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 3 282 individus dénombrés sur 15 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	147	1 549	1 219	2 502	3 282
Nb sites	6	14	10	10	15
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	0	2	16	296	1 833

*Seuil National 1% 2017-2021 : 20 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	2 857
Réserve de Chasse Marais de Mérignac**	120
Sud Loire**	113
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	68
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx**	53
Etangs de Thau et de Bagnas**	46
Etangs Montpelliérains (34+30)	11
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre	6
Bassin d'Arcachon	2
Étang de Biguglia	1

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 6

Plegadis falcinellus

Mi-janvier 2021



Spatule blanche - *Platalea leucorodia*

Eurasian Spoonbill

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : leucorodia, O Europe/O Méditerranée & O Afrique

Taille : 19 000-24 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 160 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 1 631 individus dénombrés sur 44 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 335	1 476	1 507	2 102	1 631
Nb sites	42	46	47	50	44
Indices	148±15	164±17	165±17	228±22	162±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	145	329	506	1 017	1 616

*Seuil National 1% 2017-2021 : 15 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Forte augmentation

+13.6% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2010-2021

Forte augmentation

+10.8% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré*	188
Camargue*	175
Golfe du Morbihan*	165
Marais Breton**	139
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	108
Rivière d'Étel**	101
Baie du Mont-Saint-Michel**	92
Autres sites - 40 (Landes)**	87
Iles de l'estuaire (Gironde)**	70
Rivière de Pont l'Abbé**	65

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 23

Platalea leucorodia

Mi-janvier 2021



Flamant rose - *Phoenicopterus roseus*

Greater Flamingo

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Méditerranée

Taille : 340 000-370 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 49 119 individus dénombrés sur 19 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	38 190	44 231	39 390	52 284	49 119
Nb sites	14	16	17	16	19
Indices	101±10	117±11	102±10	137±12	127±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	29 745	35 379	42 736	40 152	44 985

*Seuil National 1% 2017-2021 : 450 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Augmentation modérée

+2.2% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+4.1% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	29 981
Etangs Montpelliérains (34+30)*	7 543
Etangs du Narbonnais*	4 047
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 210
Complexe de l'étang de Berre**	1 129
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	1 110
Étangs littoraux Gard Ouest**	1 010
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	753
Etangs Leucatois (11+66)**	575
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	512

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 11

Phoenicopterus roseus

Mi-janvier 2021



Grèbe castagneux - *Tachybaptus ruficollis*

Little Grebe

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : ruficollis, Europe & NO Afrique

Taille : 270 000-510 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 4 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 9 360 individus dénombrés sur 321 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	10 562	8 025	9 903	8 138	9 360
Nb sites	300	301	317	315	321
Indices	126±7	96±6	116±7	103±6	115±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	6 620	7 060	8 709	9 787	9 767

*Seuil National 1% 2017-2021 : 100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Augmentation modérée

+2.6% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.3% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Artois est**	600
Vallée de l'Escaut**	492
Haut Rhône (01/73/74)**	306
Étang de Biguglia**	273
Golfe du Morbihan**	256
Lac de Grand-Lieu**	250
Loire de Tavers à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin**	222
Petits marais côtiers vendéens**	173
Vallée de l'Ain**	156
Vallée de la Garonne : Comminges et Volvestre**	149

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 20

Tachybaptus ruficollis

Mi-janvier 2021



Grèbe huppé - *Podiceps cristatus*

Great Crested Grebe

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : cristatus, NO & O Europe

Taille : 500 000-690 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 6 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 30 379 individus dénombrés sur 370 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	33 993	33 329	37 121	31 093	30 379
Nb sites	342	396	384	401	370
Indices	73±4	68±4	79±4	65±4	65±4

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	31 373	33 836	46 142	40 880	34 108

*Seuil National 1% 2017-2021 : 340 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Stable

+0.0% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-2.8% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Augeron**	3 249
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	2 516
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	1 180
Le Littoral Seino-Marin**	1 104
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	960
Cours du Rhin (67/68)**	949
Camargue**	916
Etangs Montpelliérains (34+30)**	754
La côte de nacre**	739
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	727

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Podiceps cristatus

Mi-janvier 2021



Grèbe jougris - *Podiceps grisegena*

Red-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : (a) grisegena, NO Europe (hiv.) (b) grisegena, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 21 000-33 000 ind.
(b) 25 000-54 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 500 ind.
(6) 660 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 13 individus dénombrés sur 11 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	9	33	25	6	13
Nb sites	9	8	20	4	11
Indices	160±137	640±462	445±331	122±111	222±180

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	66	17	21	5	10

*Seuil National 1% 2017-2021 : 0 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Déclin modéré

-6.5% p.a. ±ES0.8%

• Court terme 2010-2021

Incertain/Fluctuant

+1.2% p.a. ±ES3.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	3
Baie de Douarnenez**	1
Étang de Lacanau**	1
Etangs de Brenne**	1
La côte est du Cotentin**	1
Étangs d'Argonne**	1
Retenue de Villeneuve de la Raho**	1
Val de Saône (70/90)**	1
Autres sites - 71 (Saône-et-Loire)**	1
Haut Rhône (01/73/74)**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 11

Podiceps grisegena

Mi-janvier 2021



Grèbe esclavon - *Podiceps auritus*

Slavonian Grebe

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : auritus, NE Europe ("small-billed")

Taille : 22 000-31 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 190 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 181 individus dénombrés sur 36 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	306	238	248	176	181
Nb sites	40	41	35	28	36
Indices	58±11	45±10	47±10	33±8	34±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	388	397	393	343	221

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Déclin modéré

-1.1% p.a. ±ES0.4%

• Court terme 2010-2021

Fort déclin

-8.5% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Rade de Brest**	42
Mer blanche à Pointe de Mousterlin**	12
Côte Nord du Cotentin**	11
Bassin d'Arcachon**	10
Ile de Ré**	9
Baie de Morlaix & Penzé**	9
Rade de Lorient**	9
Littoral Dunkerquois**	9
Baie de Goulven & anse de Kernic**	8
La côte est du Cotentin**	5

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 24

Podiceps auritus

Mi-janvier 2021



Grèbe à cou noir – *Podiceps nigricollis*

Black-necked Grebe

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : nigricollis, Europe/S & O Europe & N Afrique

Taille : 110 000-170 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 1 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 6 173 individus dénombrés sur 74 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	7 983	8 394	7 246	7 909	6 173
Nb sites	76	104	83	82	74
Indices	92±8	97±8	83±7	91±8	70±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	13 190	12 011	11 312	9 629	7 585

*Seuil National 1% 2017-2021 : 75 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Déclin modéré

-1.9% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-4.2% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	951
Complexe de l'étang de Berre**	916
Bassin du Léman (Lac Léman + Rhône + Plans d'eau annexes)**	839
Etangs de Thau et de Bagnas**	805
Etangs Montpelliérains (34+30)**	395
Rade de Brest**	358
Golfe du Morbihan**	329
Bassin d'Arcachon**	188
Baie de Quiberon**	181
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	124

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 13

Podiceps nigricollis

Mi-janvier 2021



Rôle d'eau - *Rallus aquaticus*

Water Rail

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : aquaticus, Europe & N Afrique

Taille : 450 000-1 000 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 6 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 511 individus dénombrés sur 122 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	338	612	439	453	511
Nb sites	103	111	107	119	122
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	306	363	455	473	462

*Seuil National 1% 2017-2021 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Ouest du Cotentin**	58
Alsace hors-Rhin (67/68)**	53
Camargue**	23
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx**	20
Etangs du Narbonnais**	19
Archipel de Houat-Hoëdic**	16
Complexe de l'étang de Berre**	13
Bassin d'Arcachon**	13
Etangs Montpellierains (34+30)**	12
Basse vallée d'Authie et marais arrière-littoraux**	11

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 26

Rallus aquaticus

Mi-janvier 2021



Gallinule poule-d'eau - *Gallinula chloropus*

Eurasian Moorhen

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : chloropus, Europe & N Afrique

Taille : 2 600 000-3 900 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 37 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 9 974 individus dénombrés sur 315 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	13 019	9 616	12 256	10 768	9 974
Nb sites	285	287	306	314	315
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	8 583	10 954	14 651	12 504	11 608

*Seuil National 1% 2017-2021 : 120 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Vallée de l'Escaut**	685
Audomarois**	428
Région de Lens et de Béthune**	303
Alsace hors-Rhin (67/68)**	263
Loire de Tavers à Saint-Privé-Saint-Mesmin**	249
Artois est**	248
Le Pays de Caux**	246
Flandre Intérieure, région de Lille**	208
Vallée de la Somme en amont de Péronne**	194
Marais Breton**	193

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Gallinula chloropus

Mi-janvier 2021



Foulque macroule - *Fulica atra*

Common Coot

Statuts : Liste rouge : NT (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) : (a) atra, NO Europe (hiv.) (b) atra, Mer noire & Méditerranée (hiv.)

Taille : (a) 1 200 000-1 900 000 ind.
(b) 1 700 000-2 800 000 ind.

Tendance : (a) DEC/STA
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 15 500 ind.
(b) 25 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 233 986 individus dénombrés sur 386 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	268 094	228 630	260 014	229 546	233 986
Nb sites	380	393	391	397	386
Indices	108±7	92±6	103±7	92±6	95±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	216 718	244 765	268 793	277 873	250 672

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2500 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.2% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-1.9% p.a. ±ES0.5%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	30 731
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	12 603
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	10 419
Étang de Biguglia**	8 771
Lac de Grand-Lieu**	7 600
Etangs de Thau et de Bagnas**	7 081
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	6 689
Vallée de la Seine**	5 329
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	4 908
Complexe de l'étang de Berre**	4 768

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 17

Fulica atra

Mi-janvier 2021



Grue cendrée - *Grus grus*

Common Crane

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : grus, NO Europe/Pén. ibérique & Maroc

Taille : 350 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 115 724 individus dénombrés sur 36 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	109 117	73 458	136 858	109 114	115 724
Nb sites	29	34	32	39	36
Indices	175±16	118±12	183±18	140±14	131±13

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	26 484	28 861	58 212	84 065	111 490

*Seuil National 1% 2017-2021 : 1100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1993-2021

Forte augmentation

+10.1% p.a. ±ES0.9%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+4.5% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue*	22 303
Réserve Nationale d'Arjuzanx*	13 888
Autres sites - 33 (Gironde)*	12 390
Autres sites - 40 (Landes)*	11 490
Autres sites - 18 (Cher)*	11 323
Lac de Carcans-Hourtin*	8 285
Lac du Der-Chantecoq (51/52)*	6 148
Reserve Naturelle Nationale du Val d'Allier*	4 861
Rivière Loire à la Charité-sur-Loire*	4 697
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx*	3 900

Nb sites d'importance internationale* : 10

Nb sites d'importance nationale** : 17

Grus grus

Mi-janvier 2021



Avocette élégante - *Recurvirostra avosetta*

Pied Avocet

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Europe & NO Afrique (repr.)

Taille : 100 000-110 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 940 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 22 851 individus dénombrés sur 34 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	20 557	20 052	20 246	24 489	22 851
Nb sites	32	34	33	32	34
Indices	92±11	89±11	89±11	109±13	100±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	16 537	20 979	20 346	23 340	21 652

*Seuil National 1% 2017-2021 : 220 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.2% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.4% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	8 194
Camargue*	2 693
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	2 644
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	1 346
Loire Aval*	1 290
Bassin d'Arcachon*	1 130
Baie de Vilaine*	1 107
Golfe du Morbihan*	1 061
Ile de Ré*	1 010
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	551

Nb sites d'importance internationale* : 9

Nb sites d'importance nationale** : 13

Recurvirostra avosetta

Mi-janvier 2021



Huîtrier pie - *Haematopus ostralegus*

Eurasian Oystercatcher

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : ostralegus, Europe/S & O Europe & NO Afrique

Taille : 750 000-970 000 ind.

Tendance : STA/DEC

Seuil RAMSAR1% : 8 200 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 44 860 individus dénombrés sur 71 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	42 395	43 266	41 101	43 808	44 860
Nb sites	64	67	69	71	71
Indices	102±16	103±16	97±16	103±17	106±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	69 658	52 238	45 939	46 580	43 231

*Seuil National 1% 2017-2021 : 430 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Stable

-0.1% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

-1.3% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	7 052
Littoral Picard**	6 160
Baie des Veys**	4 500
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	2 890
Estuaire Seine**	2 345
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	2 311
Côte Ouest du Cotentin**	1 949
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	1 419
Littoral du Pas-de-Calais**	1 349
Baie d'Orne**	1 220

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Haematopus ostralegus

Mi-janvier 2021



Pluvier argenté - *Pluvialis squatarola*

Grey Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : squatarola, O Sibérie & Canada/O Europe & O Afrique

Taille : 200 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 32 691 individus dénombrés sur 80 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	35 294	30 380	32 147	35 771	32 691
Nb sites	75	74	76	73	80
Indices	92±10	78±9	83±9	92±10	83±9

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	36 372	27 184	29 820	32 987	33 384

*Seuil National 1% 2017-2021 : 330 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.3% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon*	4 170
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	3 358
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	3 332
Baie du Mont-Saint-Michel*	2 495
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	2 050
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	1 870
Ile de Ré**	1 750
Baie des Veys**	1 304
Côte Ouest du Cotentin**	965
Camargue**	887

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 20

Pluvialis squatarola

Mi-janvier 2021



Pluvier doré - *Pluvialis apricaria*

European Golden Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR) III/B

Population(s) : altifrons, N Europe/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 200 000-2 100 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 9 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 40 472 individus dénombrés sur 73 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	43 592	48 198	41 322	56 347	40 472
Nb sites	78	66	64	63	73
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	29 218	37 268	28 465	39 276	52 348

*Seuil National 1% 2017-2021 : 520 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Goulven & anse de Kernic**	9 000
Autres sites - 27 (Eure)**	6 788
Baie des Veys**	3 335
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	3 000
Rivière de Pont l'Abbé**	1 701
Marais Breton**	1 200
Baie de Vilaine**	1 146
Rade de Lorient**	1 120
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 019
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	874

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Pluvialis apricaria

Mi-janvier 2021



Grand Gravelot - *Charadrius hiaticula*

Ringed Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : hiaticula, N Europe/Europe & N Afrique

Taille : 50 000-68 000 ind.

Tendance : AUG/STA

Seuil RAMSAR1% : 540 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 12 702 individus dénombrés sur 78 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	14 460	17 659	12 673	14 199	12 702
Nb sites	69	76	77	76	78
Indices	99±13	119±15	81±12	91±13	79±11

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	12 879	14 358	14 393	13 662	14 489

*Seuil National 1% 2017-2021 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+2.2% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Stable

-1.1% p.a. ±ES1.0%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	2 167
Bassin d'Arcachon*	863
Ile de Ré*	583
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	490
Golfe du Morbihan**	427
Baie de Goulven & anse de Kernic**	401
Littoral des Abers**	395
Baie de Quiberon**	371
Archipel de Molène**	343
Littoral Plouescat-Roscoff**	332

Nb sites d'importance internationale* : 3

Nb sites d'importance nationale** : 27

Charadrius hiaticula

Mi-janvier 2021



Vanneau huppé - *Vanellus vanellus*

Northern Lapwing

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Europe, O Asie/Europe, N Afrique & SO Asie

Taille : 6 300 000-9 500 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 72 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 161 250 individus dénombrés sur 193 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	195 963	270 349	182 866	268 257	161 250
Nb sites	192	180	210	216	193
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	289 811	248 504	246 168	234 297	228 353

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2300 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	15 919
Baie du Mont-Saint-Michel**	9 607
Marais Breton**	6 806
Le Pays d'Auge**	6 700
Loire Amont**	6 600
Sud Loire**	5 437
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	5 260
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	5 038
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	4 804
Petits marais côtiers vendéens**	4 373

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Vanellus vanellus

Mi-janvier 2021



Gravelot à collier interrompu - *Charadrius*

Kentish Plover

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : alexandrinus, O Europe & O Méditerranée/O Afrique

Taille : 40 000-65 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 660 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 533 individus dénombrés sur 34 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	490	446	362	696	533
Nb sites	26	21	26	26	34
Indices	234±70	204±62	161±51	318±91	251±74

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	203	372	453	313	506

*Seuil National 1% 2017-2021 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+4.5% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2010-2021

Incertain/Fluctuant

+2.7% p.a. ±ES1.5%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	177
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	61
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	50
Etangs du Narbonnais**	32
Basse plaine de l'Aude (34+11)**	25
Littoral vendéen**	20
Etangs Leucatois (11+66)**	19
Côte Ouest du Cotentin**	17
Baie de Goulven & anse de Kernic**	15
Rade de Lorient**	15

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 20

Charadrius alexandrinus

Mi-janvier 2021



Courlis corlieu - *Numenius phaeopus*

Whimbrel

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : phaeopus, N Europe/O Afrique

Taille : 240 000-390 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 65 individus dénombrés sur 16 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	47	61	49	99	65
Nb sites	16	18	18	24	16
Indices	108±58	153±76	119±62	236±109	161±79

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	48	16	22	47	66

*Seuil National 1% 2017-2021 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+9.8% p.a. ±ES3.6%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+8.0% p.a. ±ES3.1%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Morlaix & Penzé**	16
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	14
île d'Ouessant**	7
Ile de Ré**	5
Bassin d'Arcachon**	5
Rivière de Pont l'Abbé**	4
Baie de la Forêt/Concarneau**	3
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2
Iles Chausey**	2
Baie d'Audierne**	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 16

Numenius phaeopus

Mi-janvier 2021



Courlis cendré - *Numenius arquata*

Eurasian Curlew

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : arquata, Europe/Europe, N & O Afrique

Taille : 610 000-830 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 7 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 26 666 individus dénombrés sur 93 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	29 185	25 110	27 673	30 021	26 666
Nb sites	106	101	109	101	93
Indices	84±7	72±6	79±6	85±7	76±6

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	23 160	19 470	32 721	34 459	27 772

*Seuil National 1% 2017-2021 : 280 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.3% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-4.8% p.a. ±ES0.4%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie du Mont-Saint-Michel**	2 809
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	2 089
Baie des Veys**	1 997
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 979
Bassin d'Arcachon**	1 949
Ile de Ré**	1 333
Loire Aval**	1 197
Estuaire Seine**	962
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	887
Littoral Picard**	795

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 22

Numenius arquata

Mi-janvier 2021



Barge à queue noire - *Limosa limosa*

Black-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : NT (Europe)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : Iceland/O Europe

Taille : 143 000-204 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 100 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 30 717 individus dénombrés sur 38 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	29 192	27 389	35 837	41 052	30 717
Nb sites	35	29	37	27	38
Indices	106±11	100±11	130±13	149±15	111±12

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	9 208	15 573	23 201	27 046	32 844

*Seuil National 1% 2017-2021 : 330 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+5.7% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+2.2% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic*	8 179
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	6 161
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	4 659
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	3 175
Ile de Ré*	2 574
Golfe du Morbihan*	1 956
Bassin d'Arcachon**	928
Baie du Mont-Saint-Michel**	743
Loire Aval**	399
Marais Breton**	372

Nb sites d'importance internationale* : 6

Nb sites d'importance nationale** : 10

Limosa limosa

Mi-janvier 2021



Barge rousse - *Limosa lapponica*

Bar-tailed Godwit

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : lapponica, N Europe/O Europe

Taille : 150 000-180 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 500 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 8 253 individus dénombrés sur 40 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	10 634	6 678	7 276	7 126	8 253
Nb sites	40	29	33	36	40
Indices	117±16	73±11	80±12	78±12	90±13

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	7 380	8 279	8 891	9 996	7 997

*Seuil National 1% 2017-2021 : 80 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.0% p.a. ±ES0.2%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-5.1% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	2 720
Ile de Ré**	1 113
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	1 097
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	636
Baie du Mont-Saint-Michel**	461
Baie de Goulven & anse de Kernic**	330
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	285
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	280
Côte Ouest du Cotentin**	243
Baie des Veys**	240

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 14

Limosa lapponica

Mi-janvier 2021



Tournepierrre à collier - *Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : interpres, NE Canada & Groenland/O Europe & NO Afrique

Taille : 200 000-260 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 1 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 30 739 individus dénombrés sur 87 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	26 844	22 092	21 704	30 059	30 739
Nb sites	74	80	80	83	87
Indices	90±9	70±8	66±7	97±10	97±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	9 130	16 500	22 620	27 623	26 585

*Seuil National 1% 2017-2021 : 270 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+7.5% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.0% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Bassin d'Arcachon*	8 571
Ile de Ré*	3 000
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron*	2 044
Littoral vendéen*	1 703
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	1 465
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	1 110
Archipel de Molène**	684
La côte est du Cotentin**	654
Sud Loire**	606
Archipel des Glénan**	554

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 23

Arenaria interpres

Mi-janvier 2021



Bécasseau maubèche - *Calidris canutus*

Red Knot

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : islandica, NE Canada & Groenland/O Europe

Taille : 310 000-360 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 5 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 56 539 individus dénombrés sur 35 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	32 850	34 797	37 224	48 951	56 539
Nb sites	29	27	29	32	35
Indices	72±12	76±12	81±13	107±16	123±17

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	28 182	37 325	40 335	42 346	42 070

*Seuil National 1% 2017-2021 : 420 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+3.0% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.5% p.a. ±ES1.1%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	18 557
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	8 834
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	8 717
Baie du Mont-Saint-Michel*	7 268
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves*	6 000
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	2 697
Ile de Ré**	1 470
Baie de Quiberon**	720
Marais Nord Medoc	393
Baie de Lannion - St-Efflam	331

Nb sites d'importance internationale* : 5

Nb sites d'importance nationale** : 8

Calidris canutus

Mi-janvier 2021



Combattant varié - *Calidris pugnax*

Ruff

Statuts : Liste rouge : NT (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe & O Sibérie/O Afrique

Taille : 2 900 000-6 200 000 ind. Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 22000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 227 individus dénombrés sur 15 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	549	472	448	411	227
Nb sites	23	17	21	16	15
Indices	140±46	120±41	112±39	107±37	32±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	199	358	222	385	426

*Seuil National 1% 2017-2021 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Stable

+0.7% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Incertain/Fluctuant

-0.7% p.a. ±ES2.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Petits marais côtiers vendéens**	101
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	35
Baie des Veys**	28
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	13
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	12
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	12
Baie de Goulven & anse de Kernic**	8
Dombes - Vallée de l'Ain**	7
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	4
Loire Aval	3

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 9

Calidris pugnax

Mi-janvier 2021



Bécasseau sanderling - *Calidris alba*

Sanderling

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : alba, Europe est atlantique, O & S Afrique (hiv.)

Taille : 200 000 ind.

Tendance : AUG

Seuil RAMSAR1% : 2 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 27 129 individus dénombrés sur 75 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	29 639	24 781	20 835	30 414	27 129
Nb sites	58	70	65	66	75
Indices	99±11	80±10	60±8	93±11	82±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	11 301	18 995	24 485	31 373	26 873

*Seuil National 1% 2017-2021 : 270 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+9.0% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.7% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Côte Ouest du Cotentin**	1 599
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux**	1 542
Ile de Ré**	1 419
Baie de Quiberon**	1 392
Littoral vendéen**	1 355
Baie du Mont-Saint-Michel**	1 346
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	1 112
Pays Bigouden Sud**	966
Littoral des Abers**	927
Baie de Goulven & anse de Kernic**	889

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 32

Calidris alba

Mi-janvier 2021



Bécasseau variable - *Calidris alpina*

Dunlin

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : alpina, NE Europe & NO Sibérie/O Europe & NO Afrique

Taille : 1 300 000-1 400 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 318 235 individus dénombrés sur 102 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	332 481	266 990	289 683	328 967	318 235
Nb sites	90	97	101	90	102
Indices	107±8	85±7	89±8	103±8	98±8

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	325 231	334 158	307 520	296 377	308 794

*Seuil National 1% 2017-2021 : 3100 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+0.4% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.8% p.a. ±ES0.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)*	46 136
Bassin d'Arcachon*	39 141
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay*	26 750
Baie du Mont-Saint-Michel*	22 578
Camargue*	19 470
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier*	18 006
Golfe du Morbihan*	14 427
Ile de Ré**	12 101
Loire Aval**	11 167
Baie de Morlaix & Penzé**	10 951

Nb sites d'importance internationale* : 7

Nb sites d'importance nationale** : 19

Calidris alpina

Mi-janvier 2021



Bécasseau violet - *Calidris maritima*

Purple Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe & O Sibérie (repr.)

Taille : 58 000-110 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 710 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 1 341 individus dénombrés sur 34 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	905	894	818	736	1 341
Nb sites	28	30	24	31	34
Indices	59±11	55±11	51±10	43±9	75±13

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	539	652	1 121	1 198	955

*Seuil National 1% 2017-2021 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+4.7% p.a. ±ES1.0%

• Court terme 2010-2021

Déclin modéré

-3.3% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Archipel de Molène**	322
Île de Sein**	280
Littoral vendéen**	123
Archipel des Glénan**	110
Pays Bigouden Sud**	59
Côte Nord du Cotentin**	51
Archipel de Houat-Hoëdic**	45
Baie de Quiberon**	39
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier**	38
Mer blanche à Pointe de Moustierlin**	24

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 22

Calidris maritima

Mi-janvier 2021



Bécasseau minute - *Calidris minuta*

Little Stint

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 270 000-360 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 000 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 1 189 individus dénombrés sur 12 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	1 636	1 036	1 025	688	1 189
Nb sites	15	13	14	14	12
Indices	54±9	34±7	34±7	22±5	39±7

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	1 103	1 862	2 259	1 439	1 114

*Seuil National 1% 2017-2021 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+4.6% p.a. ±ES0.7%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.6% p.a. ±ES1.6%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	553
Etangs du Narbonnais**	470
Salins des Pesquiers, Estagnets et Vieux Salins**	107
Ile de Ré**	12
Baie du Mont-Saint-Michel**	10
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	8
Petits marais côtiers vendéens	8
Bassin d'Arcachon	6
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	6
Iles de l'estuaire (Gironde)	4

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 5

Calidris minuta

Mi-janvier 2021



Chevalier guignette - *Actitis hypoleucos*

Common Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : O & C Europe/O Afrique

Taille : 1 100 000-1 700 000 ind.

Tendance : STA/DEC?

Seuil RAMSAR1% : 12 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 580 individus dénombrés sur 117 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	531	457	484	654	580
Nb sites	109	103	107	115	117
Indices	124±16	104±14	100±13	151±18	130±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	198	294	308	438	547

*Seuil National 1% 2017-2021 : 5 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+6.6% p.a. ±ES0.3%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+5.1% p.a. ±ES0.8%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Complexe de l'étang de Berre**	38
Baie de la Fresnaye, St-Jacut de la Mer**	35
Baie de Morlaix & Penzé**	28
Rade de Brest**	23
Etangs Montpelliérains (34+30)**	21
Aven-Belon**	20
Rivière d'Etel**	20
Petits marais côtiers vendéens**	17
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	16
Cours du Rhin (67/68)**	15

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 30

Actitis hypoleucos

Mi-janvier 2021



Chevalier culblanc - *Tringa ochropus*

Green Sandpiper

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : N Europe/S & O Europe, O Afrique

Taille : 1 800 000-2 800 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 24 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 747 individus dénombrés sur 137 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	704	757	808	680	747
Nb sites	142	124	143	129	137
Indices	128±15	133±15	153±17	123±14	138±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	181	322	423	646	756

*Seuil National 1% 2017-2021 : 8 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+9.9% p.a. ±ES0.6%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+4.2% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	60
Marais Breton**	50
Camargue**	42
Petits marais côtiers vendéens**	37
Dombes - Vallée de l'Ain**	27
Ile de Ré**	23
Etangs de Brenne**	18
Loire-Foréz**	17
Autres sites - 37 (Indre-et-Loire)**	16
Baie de Vilaine**	15

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 26

Tringa ochropus

Mi-janvier 2021



Chevalier arlequin - *Tringa erythropus*

Spotted Redshank

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/S Europe, N & O Afrique

Taille : 57 000-120 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 1 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 310 individus dénombrés sur 30 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	528	463	333	402	310
Nb sites	28	25	28	23	30
Indices	126±23	111±21	79±16	96±19	73±15

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	312	227	354	407	407

*Seuil National 1% 2017-2021 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+6.2% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Stable

+0.8% p.a. ±ES1.3%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré**	82
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	38
Golfe du Morbihan**	37
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	23
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	17
Marais Breton**	14
Baie de Goulven & anse de Kernic**	13
Baie d'Orne**	12
Bassin d'Arcachon**	10
Rivière d'Etel**	10

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 15

Tringa erythropus

Mi-janvier 2021



Chevalier aboyeur – *Tringa nebularia*

Common Greenshank

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : N Europe/SO Europe, NO & O Afrique

Taille : 230 000-360 000 ind.

Tendance : STA/AUG

Seuil RAMSAR1% : 3 300 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 622 individus dénombrés sur 47 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	570	548	589	695	622
Nb sites	43	41	46	44	47
Indices	112±16	107±15	111±16	132±18	117±16

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	157	200	343	518	603

*Seuil National 1% 2017-2021 : 6 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Forte augmentation

+9.1% p.a. ±ES0.5%

• Court terme 2010-2021

Augmentation modérée

+3.4% p.a. ±ES0.9%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré**	63
Rivière d'Etel**	60
Rade de Brest**	44
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	40
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	37
Littoral des Abers**	30
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	30
Golfe du Morbihan**	30
Marais Breton**	22
Rade de Lorient**	21

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 28

Tringa nebularia

Mi-janvier 2021



Chevalier gambette - *Tringa totanus*

Common Redshank

Statuts : Liste rouge : VU (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B (FR)

Population(s) : totanus, N Europe (repr.)

Taille : 160 000-240 000 ind.

Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 1 800 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 6 468 individus dénombrés sur 66 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	6 443	5 679	5 740	6 883	6 468
Nb sites	53	61	62	60	66
Indices	98±11	85±10	84±9	103±11	96±10

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	5 348	5 714	5 986	6 144	6 275

*Seuil National 1% 2017-2021 : 65 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme 1980-2021

Augmentation modérée

+1.6% p.a. ±ES0.1%

• Court terme 2010-2021

Stable

-0.5% p.a. ±ES0.7%

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Ile de Ré**	718
Baie de Morlaix & Penzé**	529
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)**	499
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	363
Estuaires de Trioux, Jaudy et Anse de Paimpol**	352
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay**	304
Bassin d'Arcachon**	302
Camargue**	246
Littoral Picard**	223
Rade de Brest**	208

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 27

Tringa totanus

Mi-janvier 2021



Bécassine des marais - *Gallinago gallinago*

Common Snipe

Statuts :

Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : II/A III/B

Population(s) :

Taille : 7 000 000-10 000 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 100 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 4 872 individus dénombrés sur 189 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	3 884	4 255	3 740	4 756	4 872
Nb sites	181	162	162	175	189
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	4 019	3 858	5 205	4 691	4 441

*Seuil National 1% 2017-2021 : 45 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	317
Marais de Fouras et de Voutron**	255
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	254
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	230
Baie de Morlaix & Penzé**	219
Camargue**	193
Autres sites - 50 (Manche)**	184
Iles de l'estuaire (Gironde)**	140
Loire Aval**	121
Autres sites - 65 (Hautes-Pyrénées)**	111

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 29

Gallinago gallinago

Mi-janvier 2021



Sterne caugek - *Thalasseus sandvicensis*

Sandwich tern

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : sandvicensis, O Europe/O Afrique

Taille : 170 000-200 000 ind.

Tendance : STA?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 1 083 individus dénombrés sur 58 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	840	1 003	1 011	1 601	1 083
Nb sites	51	58	55	54	58
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	332	574	737	872	1 112

*Seuil National 1% 2017-2021 : 10 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	121
Littoral Augeron**	104
Etang de Canet (ou de St Nazaire)**	85
Littoral des Alpes-Maritimes**	57
Ile de Ré**	55
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	53
Pays Bigouden Sud**	48
Littoral vendéen**	42
Étang de Biguglia**	38
Etangs Leucatois (11+66)**	36

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 27

Thalasseus sandvicensis

Mi-janvier 2021



Mouette tridactyle - *Rissa tridactyla*

Black-legged Kittiwake

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) EN (UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : tridactyla, arctique du NE Canada à la Nouvelle-Zemble/N Atlantique

Taille : 6 100 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 66 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 2 753 individus dénombrés sur 27 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	432	150	564	661	2 753
Nb sites	15	18	21	19	27
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	107	119	365	651	926

*Seuil National 1% 2017-2021 : 9 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral vendéen**	1 004
Le Littoral Seino-Marin**	748
Etangs du Douaisis & Lac des Argales**	290
La côte du Bessin**	180
Littoral Picard**	142
Vallée de l'Escaut**	100
Presqu'île de Crozon**	65
Archipel de Houat-Hoëdic**	55
Archipel des Glénan**	51
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	30

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 12

Rissa tridactyla

Mi-janvier 2021



Goéland railleur - *Chroicocephalus genei*

Slender-billed Gull

Statuts : Liste rouge : VU (Europe) LC (UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : Mer noire & Méditerranée (repr.)

Taille : 120 000-140 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 1 700 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 298 individus dénombrés sur 6 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	272	94	174	296	298
Nb sites	5	5	7	5	6
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	6	17	62	92	227

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Camargue**	149
Etangs du Narbonnais**	89
Etangs Montpellierains (34+30)**	53
Complexe de l'étang de Berre**	5
Étang de Biguglia	1
Baie de Bourgneuf - Île de Noirmoutier	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 4

Chroicocephalus genei

Mi-janvier 2021



Mouette rieuse - *Chroicocephalus ridibundus*

Black-headed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) VU (UE) Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : O Europe/O Europe, O Méditerranée, O Afrique

Taille : 2 500 000-3 400 000 ind. Tendance : DEC Seuil RAMSAR1% : 31 000 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 279 653 individus dénombrés sur 310 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	234 572	331 421	262 781	314 571	279 653
Nb sites	265	290	286	306	310
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	326 329	369 802	300 867	278 887	289 135

*Seuil National 1% 2017-2021 : 2900 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	18 247
Estuaire Seine**	17 062
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon**	16 729
Lac de Grand-Lieu**	15 100
Littoral Picard**	14 201
Vallée de la Seine**	9 328
Rance**	8 493
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	8 013
Vallée de l'Oise et Plan d'eau du Laonnois**	7 620
Étangs d'Hédé (nord de Rennes)**	7 355

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 21

Chroicocephalus ridibundus

Mi-janvier 2021



Mouette mélanocéphale - *Ichthyæetus melanocephalus*

Mediterranean Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : I

Population(s) : O Europe, Méditerranée & NO Afrique

Taille : 190 000-290 000 ind.

Tendance : DEC/STA

Seuil RAMSAR1% : 2 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 11 979 individus dénombrés sur 62 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	9 092	13 084	9 758	10 033	11 979
Nb sites	47	69	60	61	62
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	4 058	3 670	5 578	6 911	12 673

*Seuil National 1% 2017-2021 : 130 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral La Rochelle : de Port neuf à Marsilly*	3 302
Côte Nord du Cotentin**	1 161
Golfe du Morbihan**	967
Autres sites - 40 (Landes)**	889
Baie de Quiberon**	785
Littoral vendéen**	576
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol**	519
Baie de Morlaix & Penzé**	425
Etangs de Thau et de Bagnas**	408
Ile de Ré**	404

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 18

Ichthyæetus melanocephalus

Mi-janvier 2021



Goéland cendré - *Larus canus*

Mew Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : canus, NO & C Europe/côte atlantique & Méditerranée

Taille : 1 400 000-2 000 000 ind.

Tendance : DEC?

Seuil RAMSAR1% : 16 400 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 18 817 individus dénombrés sur 103 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	15 264	21 271	11 891	13 143	18 817
Nb sites	107	106	102	98	103
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	11 734	17 761	15 266	16 554	16 094

*Seuil National 1% 2017-2021 : 160 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Littoral Picard**	5 091
Estuaire Seine**	3 602
Les Marais du Cotentin et du Bessin**	1 335
Baie des Veys**	1 186
Lac de Grand-Lieu**	950
Littoral du Pas-de-Calais**	696
Littoral Augeron**	506
Le Pays d'Auge**	473
Baie de Goulven & anse de Kernic**	435
Littoral Dunkerquois**	418

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Larus canus

Mi-janvier 2021



Goéland brun - *Larus fuscus*

Lesser Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : (a) *graellsii*, O Europe/Méd. & O Afrique (b) *intermedius*, S Scand., Pays-Bas, delt. Èb

Taille : (a) 480 000-500 000 ind.
(b) 560 000-610 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) STA

Seuil RAMSAR1% : (a) 5 500 ind.
(b) 6 300 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 20 318 individus dénombrés sur 115 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	8 900	18 201	12 985	14 450	20 318
Nb sites	99	107	112	112	115
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	9 147	12 927	15 543	17 921	15 576

*Seuil National 1% 2017-2021 : 160 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac du Cébron et étangs associés**	5 200
Vallée du Loir**	4 711
Bassin d'Arcachon**	1 966
Autres sites - 14 (Calvados)**	1 430
Lac de Grand-Lieu**	1 330
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	586
Le Littoral Seino-Marin**	536
Vallée de la Somme en amont de Péronne**	495
Lac du Drennec**	460
Autres sites - 49 (Maine-et-Loire)**	428

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 17

Larus fuscus

Mi-janvier 2021



Goéland argenté - *Larus argentatus*

Herring Gull

Statuts :

Liste rouge : LC (Europe) VU (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) :

(a) *argentatus*, N & NO Europe (b) *argenteus*, Islande & O Europe

Taille : (a) 860 000-1 000 000 ind.
(b) 860 000-1 000 000 ind.

Tendance : (a) DEC
(b) DEC

Seuil RAMSAR1% : (a) 14 400 ind.
(b) 10 200 ind.

Dénombrements mi-janvier 2021 : 57 468 individus dénombrés sur 150 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	91 369	118 068	65 055	60 548	57 468
Nb sites	114	130	132	133	150
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	74 573	73 013	78 915	73 279	79 399

*Seuil National 1% 2017-2021 : 790 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na


• Distribution 2021

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin**	6 048
Littoral Picard**	4 933
Estuaire Seine**	4 292
Lac de Grand-Lieu**	2 860
Vallée de la Somme en amont de Péronne**	2 240
La côte de nacre**	2 231
Rade de Lorient**	1 777
Baie de Vilaine**	1 648
Étangs du Nord Loire-Atlantique**	1 573
Littoral vendéen**	1 546

Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 18

Larus argentatus

Mi-janvier 2021



Goéland leucopnée - *Larus michahellis*

Yellow-legged Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe & UE)

Directive Oiseaux : -

Population(s) : Méditerranée, pén. ibérique, & Maroc

Taille : 1 200 000-1 500 000 ind. Tendance : STA

Seuil RAMSAR1% : 13 900 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 35 224 individus dénombrés sur 170 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	31 180	41 046	28 719	36 965	35 224
Nb sites	144	145	166	157	170
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	37 335	41 241	23 729	26 409	35 307

*Seuil National 1% 2017-2021 : 350 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Etangs Leucatois (11+66)**	5 721
Camargue**	4 288
Complexe de l'étang de Berre**	3 278
Autres sites - 11 (Aude)**	2 918
Autres sites - 83 (Var)**	2 342
Etangs Montpelliérains (34+30)**	1 820
Etangs de Thau et de Bagnas**	1 280
Autres sites - 38 (Isère)**	1 139
Étang d'Urbino**	977
Lac de Puydarrieux**	860

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** : 19

Larus michahellis

Mi-janvier 2021



Goéland marin - *Larus marinus*

Great Black-backed Gull

Statuts : Liste rouge : LC (Europe) NT (UE)

Directive Oiseaux : II/B

Population(s) : N & O Europe

Taille : 240 000-310 000 ind.

Tendance : DEC

Seuil RAMSAR1% : 3 600 ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 10 336 individus dénombrés sur 101 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	13 860	18 657	13 140	11 282	10 336
Nb sites	81	85	94	91	101
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	3 858	5 356	10 576	12 069	13 610

*Seuil National 1% 2017-2021 : 140 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Le Littoral Seino-Marin*	5 074
île d'Ouessant**	520
Littoral Picard**	340
Archipel des Glénan**	328
Littoral du Pas-de-Calais**	299
Estuaire Seine**	289
Littoral vendéen**	283
Le Pays de Caux**	261
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron**	151
Littoral Dunkerquois**	149

Nb sites d'importance internationale* : 1

Nb sites d'importance nationale** : 11

Larus marinus

Mi-janvier 2021



Érismature rousse - *Oxyura jamaicensis*

Ruddy Duck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 14 individus dénombrés sur 1 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	185	150	97	59	14
Nb sites	4	2	7	2	1
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	39	149	190	159	99

*Seuil National 1% 2017-2021 : 1 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na


• Court terme na

• Distribution 2021

TOP 10 - SITES	NB. IND.
Lac de Grand-Lieu**	14

Oxyura jamaicensis

Mi-janvier 2021



Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Bernache du Canada - *Branta canadensis*

Canada Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 7 553 individus dénombrés sur 97 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	6 536	8 270	6 966	8 494	7 553
Nb sites	80	92	77	93	97
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	397	1 446	3 942	5 770	7 922

*Seuil National 1% 2017-2021 : 80 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Trilbardou, Jablines, Isles-Les-Villenoy**	693
Cours du Rhin (67/68)**	477
Autres sites - 91 (Essonne)**	438
Alsace hors-Rhin (67/68)**	381
Autres sites - 94 (Val-de-Marne)**	375
Seine de Freneuse à Mézières-sur-Seine**	370
Vallée de la Meuse **	345
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)**	315
Étangs St Hubert, St Quentin, Saclay, Noës**	279
Vallée de l'Huisne**	212

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Branta canadensis

Mi-janvier 2021



Ouette d'Égypte - *Alopochen aegyptiaca*

Egyptian Goose

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 803 individus dénombrés sur 42 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	835	796	469	741	803
Nb sites	28	41	36	47	42
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	7	38	175	478	727

*Seuil National 1% 2017-2021 : 7 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Alsace hors-Rhin (67/68)**	338
Cours du Rhin (67/68)**	196
Vallée de la Moselle**	54
Lac du Der-Chantecoq (51/52)**	36
Vallée de la Meurthe**	26
Vallée de la Bar**	13
Val de Saône (70/90)**	12
Bas Rhône-Basse Isère**	10
La vallée du Doubs de Verdun à Fretteran**	10
Vallée de la Meuse**	9

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Alopochen aegyptiaca

Mi-janvier 2021



Tadorne casarca - *Tadorna ferruginea*

Ruddy Shelduck

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 147 individus dénombrés sur 11 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	452	316	229	286	147
Nb sites	10	12	13	10	11
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	11	7	22	84	284

*Seuil National 1% 2017-2021 : 3 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Cours du Rhin (67/68)**	115
Alsace hors-Rhin (67/68)**	20
Baie du Mont-Saint-Michel	2
Étangs de la région de Vaux	2
Etangs forestiers au sud de l'Oise	2
Etang et Marais du Vermandois	1
Gravières de la Seine amont	1
Baie des Veys	1
Le Pays de Caux	1
Autres sites - 84 (Vaucluse)	1

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Tadorna ferruginea

Mi-janvier 2021



Ibis sacré - *Threskiornis aethiopicus*

Sacred Ibis

Statuts : Liste rouge :

Directive Oiseaux :

Population(s) :

Taille : ind.

Tendance :

Seuil RAMSAR1% : ind.



Dénombrements mi-janvier 2021 : 431 individus dénombrés sur 16 sites

• Totaux nationaux 5 ans


ANNEES	2017	2018	2019	2020	2021
Nb ind.	315	248	353	448	431
Nb sites	14	12	13	11	16
Indices	-	-	-	-	-

• Effectifs nationaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	1997-2001	2002-2006	2007-2011	2012-2016	2017-2021*
ENMC (Nb. ind.)	322	1 729	2 575	766	359

*Seuil National 1% 2017-2021 : 4 ind.

• Tendance/historique mi-janvier



• Long terme na

• Court terme na

• Distribution 2021


TOP 10 - SITES	NB. IND.
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic**	272
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves**	50
Marais Breton**	29
Loire Aval**	22
Golfe du Morbihan**	15
Sud Loire**	11
Marais de Bordeaux**	10
Camargue**	5
Petits marais côtiers vendéens**	5
Baie de Quiberon**	4

Nb sites d'importance internationale* :

Nb sites d'importance nationale** :

Threskiornis aethiopicus

Mi-janvier 2021





AUTRE ESPÈCES DÉNOMBRÉES À LA MI-JANVIER 2021

Ordre	Famille	Nom latin	Nom vernaculaire FR	Nom vernaculaire UK	Nb indivi- dus	Nb sites
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	Black Swan	57	33
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	Bar-Headed Goose	23	14
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	Mandarin Duck	63	25
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin	Wood Duck	7	4
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	Green-winged Teal	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas	White-cheeked Pintail	3	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula cyanoptera</i>	Sarcelle cannelle	Cinnamon Teal	2	2
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	Garganey	1	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court	Pink-footed Goose	4	4
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser cygnoid</i>	Oie cygnoïde	Swan Goose	48	11
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Petit Fuligule	Lesser Scaup	3	3
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	Ring-necked Duck	8	6
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta bernicla nigricans</i>	Bernache du Pacifique	Pacific Brent Goose, Black Brant	6	5
Anseriformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Canard de Barbarie	Muscovy Duck	20	11
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	Dendrocygne veuf	White-faced Whistling-Duck	5	1
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc	Surf Scoter	1	1
Phoenicopteriformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	Pied-billed Grebe	1	1
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoeniconaias minor</i>	Flamant nain	Lesser Flamingo	1	1
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane	Purple Swamphen	30	4
Pelecaniformes	Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	Black Stork	13	3
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	Great Bittern	25	18
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Cormoran pygmée	Pygmy Cormorant	1	1
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	Black-winged Stilt	19	4
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	Bécassine sourde	Jack Snipe	52	24
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	Temminck's Stint	4	1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Chevalier à pattes jaunes	Lesser Yellowlegs	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	Whiskered Tern	38	4
Charadriiformes	Laridae	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	Audouin's Gull	2	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique	Pontic Gull	78	16
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	Ring-billed Gull	1	1
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus glaucoideus</i>	Goéland à ailes blanches	Iceland Gull	2	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre	Glaucous Gull	3	2
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	Little Gull	9	5
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	Bonaparte's Gull	1	1



SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE À LA MI-JANVIER 2021 (critères Ramsar 5 & 6)

Sites du réseau de comptage Wetlands	>20 000 ind.	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadome de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Canard souchet	Canard chipecau	Canard siffleur	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Plongeon imbrin	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis falcinelle	Foulque macroule	Grue cendrée	Aigrette garzette	Avocette élégante	Pluvier argenté	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepierrre à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau variable	Goéland marin	Mouette mélanocéphale	
Nb sites	26	1	12	1	6	2	5	1	17	6	1	2	10	6	1	3	3	1	1	10	1	9	5	3	1	6	5	5	7	1	1	
HAUTS-DE-FRANCE																																
Littoral Picard	●												●																			
NORMANDIE																																
Le Littoral Seino-Marin																															●	
Estuaire Seine	●																															
Vallée de la Seine	●																															
Le Pays d'Auge	●																															
Baie des Veys	●												●																			
Les Marais du Cotentin et du Bessin	●								●																							
Côte Ouest du Cotentin				●																												
GRAND EST																																
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	●						●			●				●																		
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	●						●			●			●	●						●												
Étangs de la Woëvre										●	●																					
Cours du Rhin (67/68)	●						●	●		●																						
BRETAGNE																																
Baie du Mont-Saint-Michel	●		●		●				●															●					●	●		
Archipel de Houat-Hoëdic															●																	
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol			●																													
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux			●																													
Baie de Goulven & anse de Kernic	●																															
Rade de Lorient		●																														
Golfe du Morbihan	●	●	●		●				●				●				●					●					●			●		
Baie de Quiberon		●																														
Baie de Vilaine																						●										
PAYS-DE-LA-LOIRE																																
Presqu'île Guérandaise dont Traits du Croisic	●		●		●				●						●						●	●					●					
Loire Aval	●								●					●								●										
Loire Amont									●																							
Lac de Grand-Lieu	●						●		●	●			●																			
Sud Loire									●																							
Baie de Bourgneuf Île de Noirmoutier	●		●																			●	●			●	●	●	●	●		

56 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces) de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2021

56 sites atteignent les critères 5 et 6 (pour une ou plusieurs espèces) de la convention de Ramsar lors des comptages de la mi-janvier 2021



- 2 ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2021
- 3 PRÉAMBULE - PRÉSENTATION DES ANNEXES TECHNIQUES
- 7 FICHES ESPÈCES
- 98 AUTRES ESPÈCES DÉNOMBRÉES EN 2021
- 99 SITES IDENTIFIÉS D'IMPORTANCE INTERNATIONALE EN 2021



**Faune
France**

Ce travail a été réalisé grâce à www.faune-france.org, démarche participative rassemblant plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales et des dizaines de milliers de contributeurs. Ce projet permet des actions de préservation de la biodiversité, de connaissance et participe aux politiques publiques. Le projet Faune France est coordonné par la LPO.



ODF (Oiseaux de France) est un projet adossé à Faune-France qui vise à mettre à jour et diffuser l'état des connaissances de l'avifaune française (Outre-Mer inclus). ODF s'appuie massivement sur des données opportunistes mais aussi sur tous les dispositifs protocolés existants (VigieNature, Wetlands, Observatoire Rapaces, etc.).



**Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel**

Les données de comptage des oiseaux d'eau alimentent la plateforme thématique de référence du SINP - Système d'Information sur la Nature et les Paysages - dédiée à la « géodiversité et biodiversité », l'INPN.

LPO France

CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX • Tél. 05 46 82 12 34
Fax 05 46 83 95 86 • www.lpo.fr • lpo@lpo.fr

Service éditions LPO n°ED2112003AB © LPO 2021



**AGIR pour la
BIODIVERSITÉ**