

19 Mars 1950.

Début d'une première journée de
Trichostema georgii en bordure de forêt
à Keransour. 19 Mars 1950.

26 Mars 1950.

une lettre de Pouliquet me signale:

Gros bec : 15 Mars 50. 21
Zonelle d'été 23 Mars 50. 21
un héron blongios ♀ 24 Mars. 50. 21

d'autre part il me récapitule : un bon et un
Zonelle d'été : un ♂ sans date
un ♂ 19 Mars 1945. 21
un ♂ + 2 ♀ 5 Mars 1945. 21
un ♂ + 1 ♀ 24 Mars 1950. 21

un héron blongios 30 Mars 1947. 21

1^{er} avril 1950.

à Prunel dans le jardin de Kér An
un ♂ de Rossignol de muraille. 21

12 avril 1950.

2 couples de Choucas sur le
clocher de Presmiles.

1 Choucas sur une cheminée à
Loqueffret, le clocher ne paraît pas
se prêter à une nidification,
un petit vol autour du clocher
de Brie.

M. Merzule ramassé naturalisé en
devanture chez Guyonnet à
Opme.

Concarneau

Présentation à la Station :

M. Boupin, Jovet, Frenier,
de Abbayes et M. ^{et M^e}, M^e Allorge.
Sizemore, le Maire, Masse...

13 avril 1950.

Embarquement à 8^h à bord du
bateau des Ponts et Chaussées pour les
Gleizans.

Débarquement à l'Île Perpet
à 9^h 30.

La partie la plus intéressante de l'Île
est la pointe derrière le sémaphore. ou
nous trouvons entre des touffes rabouges
et épaves d'Ulex europaeus une très belle
station d'Isètes et d'Ophioglossum
la première en particulier très commune en
mélange avec les principales espèces suivantes

Isètes delabarrea

Ophioglossum lusitanicum

Romulea columnae

Tufolum subterraneum

Lotus (sp?)

Alchemilla microcarpa

Raphanus maritimus

Mimulus creta

Spergula vulgaris

Fesdalia

Crastium stragelium

dans les endroits les plus secs:
Cladonia rangiferina
Cladonia foliacea var *alpicornis*.

Dans la dune en montant vers la
plaine nous trouvons un peuplement
dense de *Crepis bulbosa* dont les bour-
geons floraux commencent à pointer
en fait c'est une plante commune sur
l'île.

Tout sur une belle nappe de *Vicia*
lobyrioides en fleur.

Quelques plants d'*Asphodelus arundinaceus*
tout le long et à l'emplacement de
for de goémon de plages importantes de
Fucus hygrometricus.

Parmi les *Ophioglosses*, recueillis seule-
ment sont fructifères.

Hergula se présente sous une forme
rampante et rampante, mais les graminées ex-
posées ont tous les caractères de *Vulgaris*
avec leur bordure blanche et leurs papilles
jaunâtre.

Départ midi arrivé au loch à midi -
séjour sur place.

Cynoglossum officinale débute 13 fleurs.

nous retrouvons mes le moins grand nombre
Crepis bulbosa.

Près de l'étang peuplement surtout *popule*
avec jeunes *maritima* et *acuta*.

Colanthe dulcamara
Ranunculus repens
Galium aparine
Iris pseudo-acorus
Ligustrum vulgare
Arum italicum
Quercus hydrocotylum.

Dans la prairie proche où j'ai trouvé
Euphrasia viscosa; je les compte sur
une touffe 2 *Polbitis velleina*
2 *Dryas octopetala*
1 *Phlox pulchella*.

Pelouses à *Isotria* sur le sud.
Toujours *Ranunculus acris* = *vernus* etc
à l'abri sous rocher
Une bande de *Helianthus scaber* éparpillés
sur 50 mètre.

Petits groupes d'*Asphodelus* dans la dune.

Départ 15^h arriv. St. Nicolas

Un champ entier de *Juncus* *olus* *cladatus*
visité de la station de *Nardus* *reflexus*.

Le pimplon se maintient très vivace
plus tard. Pucier en pleine floraison
trouve 1 pucier à 5 fleurs et 2 à 4
Omphalodes au début de sa floraison
en avance sur le bois.

Crambe toutent sa tige en bordure
de la plage.

Récolte *Cystosera granulata* et *Werner-*
Tania articulata sur son stipe.

Départ 10^h arriv. Concarneau à
18^h 30 et entrée à Quimper.

M. Morize Inspecteur principal
des Eaux et forêts
10 quai de l'Odéon
Quimper.

Père Pelletier

Roz Avel rue de Rosmadec Quimper.

14 avril 1950.

Première *Spionelle* de *Chironia* survolant
la place de Pleyben.

15 avril 1950

On a entendu le Coucou à Plougonven
la Fauvette tête noire chante à Ker Iza.
16 avril 1950

Je l'entends chantant sur la tige du
Seriphon le Coucou

16 avril 1950

trouvé près de Ker Bruck au Plougonven
(inséparable au dessus de l'eau en courant) sous
des pommes, une graminée de Verpe,
digitalis

de *Fridolonus* *georgii* en bordure de Cyprès
et de route à St. Nicolas Plougonven

Precollément les mêmes observations avant
récolte sur les dunes de laquie la
nouvelle *Spionelle*. (Au début de l'été
facile au fût retournant vers Boul an Hery)

23 avril 1950

Eutoloma (clipteris?) dans la
bande à bruyère de la P^o de Prunel fr^o
de l'emplacement de la bastille vers le N.
qq. Scleroderma fr. jeunes avant la crevasse.

Hypnum subterranum
Holcus erecta
Cochlearia danica
Crastium glomeratum
Humifera corymbosa
Silene maritima
Polygala defensa
Ulex europaeus

en fleur.

debut d'*Erodium*
transplanté quelques pieds d'*Isotria medeolae*
et *Ophioglossum lunatum*
à la Pointe venant de Perpet de glorieuse
et quelques plaques de *Filix mas*
venant de l'île du loch.

14 Mai

Preuve Martinet au dessus de la rue
Villeneuve à St Martin des Champs.
Nombreuses hirondelles autour de Noisier.

3 Mai 1950

Promenade à la Pointe de Prunel.

Cochlearia officinalis en pleine floraison
falaises de la crevasse et jus qu'à un premier
rocher face N; aussi rocher à l'extrémité N.O
de la queue de Pointe de Prunel.
Rosette de feuilles de *Conium maculatum*
avec *Erythraea flaviflorescens*.
Ulex europaeus en fleur.
Silene maritima "
Indigofera tinctoria "
Arenaria maritima "
Polygala defensa.
Cochlearia danica (beaucoup en fruit)

9 Mai 1950

Le coucou chantait à 23^h 15 à Prunel
et recommença vers 4^h le lendemain matin.

15 Mai 1950

Une geai à Prunel près de la Chapelle.

2 Juin 1950

Madame Caspulat se plaint de
dégât de geai au 2^e petit pois que j'ai
constaté.

15 octobre 1950.

Polygonum polystachyum. Talus en bordure de la nationale à la Belle eau. A la sortie d'Huelgoat route de Berruis sur 100 m. Bourg d'Huelgoat dans le rallon derrière l'hôtel d'Angleterre.

23 octobre 1950.

- *P. polystachyum* talus entre le quersel et la pointe des blaques.

- *Geranium nodosum* belle tache au pied du mur de clôture de St Francis au St Martin des champs, côté route nationale encou en fleurs.

Tricoxyle geophyllum (forme lilacine) en bordure de bois sous feuillus, bas de l'allée, de l'entrée de l'ancien route locale en route.

Remarque : *P. polystachyum* existe en très belle tache à la sortie N. de Blougesme route de Lussel ; aussi près de la ferme du Gosven même commune.

29 octobre 1950.

Gare de Ploujean. Pelouse

Hygrophorum pratensis
nivus

Tricholoma pessundatum

Lactarius controversus

} tous fréquents

sur la route du bas de la rivière.

sur les touces : *Auricularia mellea*

Auricularia hemelloides

sur talus.

Clytoxyle nebulosus

Bois du Bas de la rivière.

Clytoxyle nebulosus

Hyecena epipterygia

Lepista nivosa

Hyecena pura

Pluteus cervinus

Laccaria laccata.

Amantia muscaria

Flamula sapinacea

Collybia radicata

Russula ochroleuca.

Hydnum repandum

Hydnum rufescens

Boletus erythropus

" *variegatus*

Cantharellus tubiformis

Russula landonia au moins en ayant
tous les caractères - un immédiatement \bar{H}_2O
à eau mais choisi ne respirant pas tous
l'action de l'Anuroscopie.

Inocybe geophyla

Rhodopapilles nudus

Collybia ? chapeau et lamelles gris
furent été rancida.

Cortinarius nigridus probablement.

Le cortinaire présentait au moment de la
cueillette un zone circulaire beaucoup plus
pale de 2mm environ en bordure du chapeau
qui était brun. maron. lamellonné.
en s'élevant devant soyeux.
Le pied est couvert de fibres longitudinales
qui sont plus ou moins cohérentes au chapeau
mais + pale.

Le pied sous une certaine incidence de lumière
à des reflets chatoyants qui le font paraître
comme possédant des zones argentées.

Clytocybe infundibuliformis.

1^{er} novembre 1950.

Allée St. François St. Martin Is. Ch.

Touffe de *Coprinus micaceus*.

sur touche de frênes.

14 Novembre 1950

Bois de la Salette St. Martin.

Sous allée de Hêtres.

Cortinarius uniceflus : 1 cch.

Amanita citrina . plusieurs

Boletus chrysenteron . plusieurs

Hyena galericulata AC

Russula emetica ici et la

Russula nigricans 10

ochroleuca 40

Clitocybe nebularis les + nombreux

Collybia maculata une petite touffe

Stropharia squamosa 1 cch.

Laccaria laccata ici et là

Lactarius blennius 1 cch.

Sous Sapins

Phallus impudicus 2 cch.

Crepidotus mollis
Calocera viscosa

sur 2 touches
sur 1 touche

Pluteus (sp.?) 2 cch.

Russula pantodermis . ici et là

Lepista nivosa . 1. cch.

Scleroderma aurantium . 2 cch.

Sous putain mélangée.

Myceus fura . 1. cch.

Lactarius chrysorheus ici et là

Stropharia squamosa 2 cch. ensemble

Cantharellus tubiformis ensemble de fleurs

Lactarius vellereus . 99. un .
une touffe .

Hypoholoma sublaticum 1 touffe .

Myceus polygramma . en 2 places

Clavaria cristata 1 pied .

10 . cinerea . une touffe .

Clitocybe candidus (?) en touffe par place
sur fûts morts .

Fomes marginatus

1 ex. sur bois.

Très peu de champignons. Seul *Clitocybe nebulosus* le rencontré en trouffes fréquentes. 2^e rencontré de *Stropharia squamosa* dont je n'avais encore trouvé qu'un exemplaire à Mir Rozan.

Rhodopapillus dimorphus a été trouvé par le page route de Paris dans l'herbe à l'entrée d'un champ. 2^e échantillon. (Me n'avait pas été signalé depuis la première trouvaille de ce champignon faite par lui dans un pré sec près du ruisseau et en bordure de la route de Plouzeau en face du champ de tri.)

Belle me montre *Nematotoma capensis* trouvée sur touché derrière le Vergat Plouzeau ou nous l'avions déjà trouvée ensemble le 25 oct. 45. J'en avais fait une mauvaise planche.

A trouvé aussi à nouveau et pour la première fois a été indiqué (personne de Coates) *Hypoglyphis amoena*.

Excursion en Forêt de Beffou 6 Novembre 1950.

J'ai parcouru le parti de la forêt au SW de la maison de l'Usine partie que nous avions visitée avec le Comité Mycol. de France et la partie au S.E. - Toitets deux en bordure de la route de Callac. En général les champignons sont plus nombreux.

Xylaria polymorpha - en touffes de 5 individus réunis par le même pied sur une vaille touché tous taillis -

Xylaria hypoxylon - ici et là sur les touchés en individus peu développés.

Craterellus comucopioideus. Très nombreux peut être l'espèce la plus répandue au parti.

Hydnum repandum, pas ici, pas très nombreux.

Hydnum rufescens - pas individuellement. 2 dans le premier bois, + 2 dans le second.

Radulum orbiculare - nous rapportés à cette espèce, une série d'individus sur branché morte tombée. (à voir)

Cantharellus cibarius - 3 individus en tout

Cantharellus tuberosus - pas en grand nombre

Stropharia squamosa : 1 exemplaire dans le 2^e bois

Clavaria cornuta - AC à terre
Clavaria inaequalis - 99 petites taches.
Clavaria stricta - les petits buissons sont
 assez nombreux sur les espaces ou il
 se trouve.

Cystoderma amianthinum - 3 ex. rencontrés
Lepiota chrysolaria - 2 ex. rencontrés.
Tombia capitata - 1 groupe
 sur Strophomyces.

Boeckmannia variabilis - EC.
Panus tomulosus - un groupe sur 1 souche
Laccaria laccata - EC pour l'espèce
Russula emetica - partout dans les bois
Russula ~~ogata~~ + ~~alba~~ - EC
Russula densifolia | = un peu partout
Russula nigricans |
Lactarius blennius - EC ici et là
Lactarius vellereus - rares groupes.
Lactarius chrysorrheus - EC.

vous n'avez pas remarqué d'autres
 lactaires quoiqu'en ayant rencontré de
 la famille des Subdulces

Cephaelis mollis sur 2 souches.
Arumita flalloides - 2 individus très éloignés
Entoloma thodopolum - Partout
Entoloma molosorum mais vous trouvez
 de ind. variant fortement, mais
 n'avez pas fait la diff. avec rhodo.

Hebeloma cretaceiformis 1 ex.
Lycoperdon conopseaeforme 1 ex. sur un
Sclerium chrysenteron - 1 ex. sur un if.
Amillaria mellea - 1 seule touffe, mais
 bien d'autres parasites dans le bois

Leucites quecena -
Collybia radicata - EC et mal venue.
Collybia butyracea 1 ex.
Hypoholoma fasciculatum 1 seule touffe.
Pholista ventabilis - 1 touffe avancée et souche
Pluteus 1 ex.
Tricholoma sulfuraceum - quelques touffes dans
 les deux bois

Tricholoma baponaceum : 2 ex ensemble
Tricholoma serotinum : H ou 5 en tout
Tricholoma columbella : a peu près autant R. aujour
Clytocybe candida, je continue à rapporter
 cette espèce les petits clytocybes blancs a
 pied creux que je trouve en petites touffes
 sur les feuilles en forêt et qui n'est pas
 rare, bien plus qu'a C. infundibulif.

Marasmius ureus - ici et là EC.
Marasmius prosoemus - AC, sur les
 fruits de hêtres - Malheureusement la détermi-
 nation sur place de Romagnon, com-
 me fusco-purpureus, je continue à
 appeler M. prosoemus - l'odeur
 est franchement aliène, et la chair est
 nettement poivrée au bout d'un moment - le
 pied est fibuleux et tomentueux, viscé au som-
 met, et court à la base.

Cortinarius volaris 1 exemplaire
Cortinarius phoeniceus 1 petite touffe.
Cortinarius terminalis - vous lui rapportez
 un certain nombre d'exemplaires trouvés
 (6 ou 7) ch. blanc-jaunâtre, lamelles serrées

cornuelle - pied légèrement bulbueux
à la base, cortine formant anneau,
devenant coloré par les spores.

trouvé H Cortinarius en touffe caespiteuse sous
arbustes. Chapeau pale beige grisissant, légèrement
marbré et comestible d'un pied blanc, pied
blanc, fibule, soyeux, légèrement radicant.
cortex et lamelles séparables - chair douce
mais cuticule sapide C. duracemus ?
C. causticus !

trouvé un petit cortinaire foncé sous les
caractéristiques font de C. pallidus.
Tous ces cortinaires sous feuillus.


Cortinarius elatus 1 sp.

Hypoglyphus memorius - trouvé H
ou 5 échantillons rapportés à cette sp.
ch. rugelé surtout sur le centre. Plein
orange qui fusturise - la chair est
légèrement fauve - Parmi les
feuillus sous feuillus.

Hypoglyphus caesus - ici et là sous feuillus

Hypoglyphus Russula ? ici et là aussi trouvé
un H. blanc, mais pas visqueux.
ch. satiné, chair blanche, lamelles
renies à la base.

Le pied est blanc, mais de couleur
légèrement purpurine sur le 1/3 ou le
1/2 inférieur. se rapprochant de Hypoglyphus
Russula dont je ne pourrais
pas la description exacte.



Les spores de ces ichneutes
ont été examinées au microscope
sur Belle et trouvées globuleuses
ce qui en ferait alors un
C. delibutus. au lieu
de turnati.

A voir donc

Hycena pura - ici et là

Hycena galerulata - ici et là

Hycena polygramma - R.

Hycena un Hycena clair

Et commun sur les fruits que nous
n'avons pas déterminés avec certitude,
le chapeau est jaune pâle fusturisé et
le pied blanc - pas visqueux. pied blanc
sans lait: albo-echinella, lactia, nigra?

Omphalia - une petite omphalie du
groupe des Hycenae était. Et commun sur
les fruits morts du sous bois (feuillus) ch. gris
stries brunes, lamelles grises décurrentes,
pied long - en touffe de Hycenium isolés
nous opinions pour O. speirea ou
setipes - (le chapeau est retourné à la fin.

Cortinarius

Ch. ananelonné faux
le rest du ch. couvert de stries plus fines
brunes. Pied blanc, stipe de brun jaune
avec un vague anneau clair vers le bas
(comme rigatus) - pied grêle et utriculés
en pointe. Lamelles rouges à reflets
chatoyants rouge ... C. incisus?

Cantharellus emereus

En faisant seules la récolte de Can-
tharellus, comme copieux. nous avons trouvé
un certain nombre d'exemplaires de ce champ.
il est facilement reconnaissable à ses pieds
ramifiés comme d'une pruine blanche. et
ne pourra plus être confondu par nous.

Autour de Morlaix

16 Novembre 1950

Route de Ploujean par le Gray et retour
par la Vierge Noire.

Bord de la route tout et en bordure futur de
Héris avant la maison de garde de Héris.
cueilli une petite troupe de 6 Cortinarius
Orellanus. [faux différencie avec crocus]

Très typiques par le chapeau mordou-orange
rougeâtre, fibrilleux, squamuleux au bord -
manchon devenant bossu - lamelles très
larges et ventrues de couleur typiquement
ocre-orange à reflets rougeâtres. Pied jaune
plume, à l'extrémité, un peu squamuleux et
plus foncé à la base - Chair jaune

Omphalia umbellifera en petites troupes
au joints de pierre tout d'un mur

Hydnum riparium 1 sp.

Hebeloma erubescens, bel exempl.
dans l'herbe d'un talus.

Clitocybe rivulosa 1 exempl.
Clitocybe geophylla un groupe de 4.

Sur vieilleries d'allée derrière Nergout

Hypholoma hydrophyllum très nombreux.

Coprinus nicaeus - troupe.

Panus tomlosus 1 expl.

Pelouses à Coatscherho.

<u>Hygrophorus niveus</u>	cc
<u>portacenus</u>	c.
<u>tratusis</u>	cc
<u>chlorophanus</u>	cc
<u>coccineus</u>	1 expl.

Paniculus campanulatus 99.

Nota - Rencontre dans l'allée ci-dessus indiquée
un Tropidonotus natus (Coul. à estier)

Quelques jours après notre passage. Belle y a trouvé sur
leu ch et à nouveau Hematozona capricornis.

Autour de Morlaix

19 Novembre 1950.

Mes peu de Champignons !.

Coat Cougar.

Seulement Russula emetica Ac.

Russula ochroleuca 1 ex.

Russula fragilis 1 ex.

À proximité sous Pinus insignis dans
laide fraîchement coupé.

Boletus luteus ici et là

Boletus bovinus 1 ex.

Clytopilus fumeus H ou 5 ensemble

Hymena galopoda 1 ex.

Nolanea mammata plusieurs troups.

→ Clitocybe (caerula?) H à chautillon

de 5 à 6 cm de diam. brun - pied concolore au
peu plus foncé, creux - ch. légèrement ombiliqué
lamelles sombres.

Nous avons examiné en détail les spores de la Nolanea
elles paraissent grandes, et ce pourrait être hantips.

Un examen + approfondi du Clitocybe, nous laisse
plutôt penser à C. orbiformis, et pas muticulus
car ce pied blanc au sommet et farineux.

Le champignon est très hygrophane. L'autre point au
chapeau... Une nouvelle étude de mémoire, nous donne un
doute pour Clitocybe car en va peut. A priori avant de faire état.

Prunel 21 novembre 1950.

Decomica coprophyla. Jolie troupe
sur croûtes de cheval dans le terrain
tonton Jean. 1^{er} rencontré de l'espèce très
typique.

Galleria hyphorum. nombreux petits
bois sur les mousses de felous de Ker
(Hyphnum cuspidatum).
L'axe des lamelles ont été épaissies
au milieu. les spores sont très grosses.
les poils marginaux sont à bouts
montés sur un très long col.
La cuticule est composée d'hyphes
compactes. Ceci en fait un
Conocyste non un galeride. et dans
les Conocyste un cespitace. donc
pas hyphorum.

Keourou, Ploujean.

26 Novembre 1950.

La traversée du bois nous a donné quelques
nouveaux champignons.

Clitocybe suaveolens. 1 sur talus.

Clitocybe nebularis. 2 groupes

Calyptra radicata. 1 très jeune spécimen.

Hyecina polygramma. une dizaine de spécimens
de ci de là.

Amillaria mellea en deux places.

Bois de Puits maritimes.
avant la propriété Omer de ce bois
Blouin
30 Septembre 1950.

Lholiota spectabilis 2 sp. sur une souche

Laccaria laccata R. exempl.

Polletia bovinis AC dans toute
l'étendue du bois.

Polletia lutea quelques spécimens.

Rodospirilla nuda 1 sp. sur aiguille
de pin, vers l'été, en bordure de
bois avec Clitocybe sp?

Lactarius à chair douce du groupe
subdulcis. ici et là en petits
groupes.

Cortinarius anomalus 1 exempl.

Hieholoma portentosum plusieurs taches
dans le bois.

Russula sardonia ici et là mais presque
tous fin avancés.

Clitocybe rivulata var fulvoflylla (?).
un groupe avec le Rhodospirilla.

Collybia metachroa - je rapporte à cette
espèce un champignon AC formant un
groupe un peu partant vers bois à chapeau
brun uni lissant apparaissant le dernier des
lamelles, devenant gris. Clitocybe avec lèvre
peu ornée, finies au sommet. *voir note*

Collybia butyracea 1 sp.

Lophomyces floriformis (?) une touffe sur
une souche que nous identifions avec
une grande part de certitude. Je note que
les pots du bord sur 8 cm franchent vers.

Collybia myosura (?) - 1 sp. avec son pied couvert
d'un pulvin blanc et 13 autres caractères, ce doit
être ce Collybia, mais nous ne l'avons pas déterminé et ne
pourrions dire s'il s'agit d'une espèce
laude à Puits les espaces
de l'autre côté de la route.

Collybia metachroa tous les arbres

Lactarius subdulcis (?) quelques.

Stropharia semiglobata 1 sp.

Il y aurait lieu de bien vérifier si mon Collybia metachroa
ne serait pas Clitocybe appallens.

Petit bois mixte de Robou
(*L. sylvestris* et *Castanea vulg.*)

2^d décembre 1950.

Collybia radicata 1 sp.

Marasmius androsaceus 2 sp.

— Bois de *Pinus maritima*
de Boul. stang. Elongasnon.

Aurantia rubescens 1 sp. très fort
à pied usonné.

Waccaria laccata. d'ici et là surtout
le var *amelchytæ*.

Boletus bovinus 3 jeunes sp. mal venues

Hygrophorus hypothicus. une belle forme
et quelques autres sp. dissimulés.

Boletus baduus 1 sp.

Russula santonica un bon nombre
d'exemplaires dissimulés.

Cortinarius anomalus 7 exemplaires en
trouilles.

Polansea fusca. 1 sp. bordure de l'allée.

Dothioropus variabilis c. sur truiselle.

Bois de *Pinus maritima* à tous
bois de haute. Boul. à brayou launec
8 décembre 1950.

Hygrophorus hypothicus: une trisle.

lettre de Pouepiquet 17. Janv. 1951

signale la capture de 2 antennes
à lesneval en Belgique. Congo

qui m'ont été envoyés

1 ♀ 447 gr.

1 juv. 635 gr.

28 Janvier 1951

une touffe de Nematobium cap-
noïdes sur souche - talus du
bord de la route entre Ploujean
et Terge noire.

11 Février 1951.

1 Pluteus coronis talus bas de
la Rivière -

12 Février 1951.

Collybia velutipes : un bon groupe sur
une souche de Ficus fruit de la salette.

aussi Coprinus micaceus.


28 Février 1951.

Allée de manoirs château de Trividy.

2 Clytocybes maveolens

1. Conocybe (Ficus)? du groupe

des capitatae



gros pores
ovales.

1 Mars 1951.

Negot. Ploujean -

1 galericina ?



8 avril 1951.

Petite récolte des fleurs de *Tricholoma*
georgii, haie de Keranroux à l'endroit
habituel et belle tâche au pied d'un pommier
face de Ker Jeannette route bas de la Rivière.

même endroit 1 *Rhodoprepes undus*.

même endroit 1 touffe *Coprinus micos*

13 avril 1951.

Prunel

lande à la Pointe 2 *Nolanea linitipes*

Jardin Ker Arzel en touffe sur espèce
probablement *Galera coprophyla* Kuhn.
les spores sont grandes, les pieds du bord des
canalis. très typiques

8

Après la première *Merulonia* de finit
au dessus de Prunel.

et revue le lendemain.

impression avoir vu un *Martinet*

16 avril 1951.

Nouvelle récolte de *Tricholoma georgii*
- mais moindre dans les mêmes haies de
Keranroux.

17 avril 1951.

Prunel : 1^{er} chant du Coucou
en un *Martinet*

20 avril 1951.

Merulonia de chemins le long de la
route de Prunel à Morlaix
en traquet Hosteur champ d'aviation.

21 avril 1951.

une *Huppe* vue par deux fois sur le
bord de la route à côté de Melandres,
Prunel. Plougasnou.

23 avril 1951.

Martinet à Morlaix.

Coucou chante à Belle eau - Traon en velis.
2 *Tricholoma georgii* sur talus herbi Belle eau.

13 Mai 1951.

Sur les pelouses de la place du château
à Prest:

1 ♂ de traquet fièvre
nombreuses *Bergesonnets* de Roin en migration

1 abier Ildut
1 Porshoder

1 Etourneau
1 Etourneau.

19 Mai 1951.

3 taches de *Tricholomas* de la St. gu
le long de la voie charretière sous la Croix
de Mission à Prunel.
Superbes chanterelles.

25 Mai 1951.

Plougastou.

nombreuses taches de *Boletus vellereus*
dans futaie ou sont abandonnés de velle
tiges d'arbres.

Boletus granulatus sous *L. nigris* (B.)

1 *Lholista aureus*

1 *Lepista procera*

quelques *amanita rebercaei*.

11 septembre 1951.

1 Lic épicé à Prunel

1 gobe-mouche ^{noir} (jeune) Ker Iffick
à Prunel.

12 sept. 1951.

Revu le gobe-mouche au même endroit.

Bois de Luis de Boul. Hong Plougastou

1 *Boletus badius*.

amanita rebercaei

Russula copallens (quelletti, *rustonia*?)

Lepista cristata 2 taches sous bois

3 *Lactarius deliciosus*

Cortinarius multiformis.

Bois de Luis de chef en tourek

2 *Lectonia* (*asplenum*?)

Phanerochaete *var lamellosa*.

Boletus scaber.

Excursion en Forêt de Beff

14 septembre 1951.

Forêt face à la maison de garde

<i>Cortinarius delibutus</i>	une tache
<i>Armillaria mellea</i>	très abondante
<i>Russula foetida</i>	1
<i>Cortinarius rigidus</i>	petites touffes
<i>Laccaria laccata</i>	partout mais pas abondant
<i>Russula amaena</i>	ici et là
<i>Clypeolus ?</i>	1 touffe
<i>Collybia distorta</i>	qq. touffes
<i>Mycena polygramma</i>	2 sp.
<i>Tricholoma sulfureum</i>	2 exemplaires en 1 lieu
<i>Cortinarius paleaceus</i>	touffes
<i>Hidnum urandum</i>	1 large tache abondante
<i>Cortinarius mucifluus</i>	1
" <i>bolaris</i>	1
<i>Russula emetica</i>	Rare
<i>Polyporus pes-caprae</i>	1
<i>Collybia radicata</i>	R
" <i>butyracea</i>	R.
<i>Boletus shobergii</i>	1

Très peu de champignons. Le concentré dans les parties + humides et en particulier sous bois en bordure du petit ruisseau.

Forêt à flanc de coteau en montant derrière la maison de garde.

<i>Tricholoma rhodopolium</i>	ici et là
<i>Collybia radicata</i>	d°
<i>Cantharellus cibarius</i>	d°
<i>Hypodermia fasciculata</i>	d°
<i>Boletus variabilis</i>	d°
<i>Pluteus cervinus</i>	1
<i>Amanita vaginata</i> (gris)	1
<i>Laccaria laccata</i>	ici et là
<i>Cratellus cornucopioides</i>	2 belles taches
<i>Russula cyanoxantha</i>	1
<i>Hypophyses iburneus</i>	petit et PC
<i>Mutinus mucidulus</i>	1
<i>Armillaria mellea</i>	ici et là
<i>Leotia lubrica</i>	assez commun
<i>Cortinarius anomalus</i>	1 touffe
<i>Lactarius blesensis</i>	de ci de là
<i>Tricholoma scieroides</i>	2
<i>Russula emetica</i>	AR
<i>Phallus impudicus</i>	1 touffe
<i>Hypodermia sublaticum</i>	1 touffe
<i>Russula fasciculata</i>	d°
<i>Russula amaena</i>	P. très commun mais beaux exemplaires de 2 formes

rien remarqué que précédemment

Environnement, route de Collevé
et la chapelle neuve.

Sous touillis

<i>Ustia lubrica</i>	en nombre
<i>Laecania laeata</i>	un peu partout
<i>Russula emetica</i>	P.C.
<i>Cortinarius blunensis</i>	de ci de là
<i>Russula amara</i>	A.C.
<i>Chlorosporium aeruginosum</i>	1
<i>Cortinarius volvens</i>	1
<i>Clavaria cinerea</i>	1
<i>Clavaria fusiformis</i>	1
<i>Pluratus</i> ? (mitis?)	1
<i>Mycena pura</i>	ici et là
<i>Hydnum repandum</i>	plusieurs belles touilles
<i>Cortinarius violaceus</i>	3
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	qq. touilles
<i>Cantharellus cinereus</i>	avec nombre
<i>Mycena galopoda</i>	1
<i>Rhizoglyphus cerinus</i>	1
<i>Lycoperdon echinatum</i>	1
<i>Collybia dryophila</i>	quelques uns.

La partie de bois visitée semblait
avoir été la plus riche en exemplaires.

Bois de sapins au dessus.

<i>Russula ochroleuca</i>	1
<i>Amanita citrina</i>	1
<i>Amanita rubescens</i>	1
<i>Boletus strobilaceus</i>	1

La meilleure récolte est celle de
deux exemplaires de *Boletus strobilaceus*
que j'ai vus pour la première fois.

Ces échantillons se trouvaient dans deux
bois différents, dans mousses formant bûche
et recouvrant de vieilles souches, le premier
sous if en futaire de hêtre, le deuxième
sous if dans futaire d'Abies.

Le champignon est brun
à pied entièrement strié de
plus blanc.

Il est velouté et une
cortine prend nettement
naissance à son bord.

légèrement hygrophane alors le
chapeau devient chamois à reflet
violacé surtout sur les bords
un peu comme *C. torvus*. Le
pied à la même coloration
que le chapeau.

lamelles épaisses et fines
très serrées à l'origine un
peu blanc denté.



déterminé
comme

Cortinarius
brunneus

contini

20 septembre 1951.

Vu chez Belle un très joli spécimen
de *Clathrus cancellatus* récolté à
Krozan Bloujean. par x.

21 septembre 1951.

Prunel. Bois de Prie Prière
Boletus granulatus commun toujours.

2 *Armanita rubescens*

Scleroderma.

1 *Tricholoma rubricatum* ?

Au terrapleur et ailleurs pas
un *Psalliote*


22 septembre 1951.

Ponte de Prunel.

Rares *Psalliota lepristoides*.

Boletus rubellinus. de ci delà

de rapport à *Marasmius globularis*
Un champignon poussant sur une
touffe de *H. indivisus* agglomérés dans
une bryère rose.



Chapeau globuleux, à peine
marginé, à marge nettement
striée. De couleur chamois mais
tâché de rose-violet-lilac à
la marge par plaques -

Pied lisse brillant rouge-lilac
sauf à la base légèrement renflé
où il devient blanc-fané et
se couvre de fils entremêlés blancs.
Pied creux jusqu'au chapeau
chair blanc-lilac comme les
lamelles, les derniers sinués
surtout au bord.

26 septembre 1951.


Trouvé sur une planche de la chambre
n° 8 à l'hôtel de la Falaise un groupe de
champignons que je rapporte à

Pleurotus serotinus. Schrad.

bonnet orange? jaune très vif.
chapeau blanc, jaunâtre quand on frotte.
avec des plaques verdâtres.

Vers le pied le chapeau est vrillé et sur
les bords couvert de granulations brunes.

non: c'est *Lepidella*
farinoides = *Larnellinques*
var. *isripes*.



chapeau crème farineux
tache de rouille.
tache d'un brun violet vers le bord
lun brun et granuleux



abord un peu brun
non.
laine jaune-orange
vif.

28 septembre 1951.

Recette à nouveau dans le bois de Puis
de tout otang en Plougasnou. des *Russula*
qui avec *Heccaria* et quelques *Marasmius*
rubescens sont les seuls champignons du
lieu.

Les russules sont à chair âcre, à cuticule
sépable, les lamelles sont jaunes pâles.

Elles appartiennent à :

Russula quelle on appelle
laquelle = *R. sardonia*
ce qui confirmerait le rapprochement de la
chair par l'analyse microscopique.

Excursion en forêt du Oranou (avec Belle)

30 septembre 1951.

Partie générale des champignons, et pour
les espèces rencontrées variété de exemplaires.
absence totale de tous Bolets.
à noter comme particulièrement à Boffou les
pousses se produisant sur des miscanux et sous les
petits lots d'Abies.

Parties visitées: Bois à droite et gauche, à gauche
de la ligne de Carrière depuis 1^{er} journal
au pont du chemin de fer.

Parties au Sud du Pont dans
un rayon de 500 mètres et englobant le
miscanux du Pont Rouge.

Partie au nord de la maison
forestière de la Roche Noire au dessus de la
route de Kergrignon.

<i>Coriolus ruscicolor</i>	2 fois
<i>Craterellus cornucopioides</i>	5 fois
<i>Fraxella mesenterica</i>	1
<i>Cantharellus cibarius</i>	2 fois
<i>Clavaria decipiens</i>	1 fois
<i>Cortinarius</i> ?	
<i>Cortinarius anomalus</i>	3 fois
<i>Hydnum repandum</i>	3 fois
<i>Russula emetica</i>	3 fois

<i>Laccaria laccata</i>	qq.
<i>Ruonia fulva</i>	4 fois
<i>Calodon ferruginus</i>	2 fois
<i>Lactaria camphoratus</i>	2 fois
" <i>subdulcis</i>	1 fois
<i>Collibya platyphyllo</i>	2 fois
<i>Myccena sanguinolenta</i>	1 fois
<i>Lactaria chrysorheus</i>	1
<i>Cortinarius Ferrus</i>	1
<i>Xylaria hypoxylon</i>	2 fois
<i>Ustia lubrica</i>	2 fois stamp up.
<i>Cortinarius pallidus</i>	3 fois en troupe
<i>Scleroderma aurantium</i> 2	2 fois sous racines Abies et épicéas
<i>Collibya radicata</i>	2
<i>Chlorosporium aeruginosum</i>	assez répandus
<i>Myccogala ephedron</i>	1
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	1
<i>Hypoboloma fasciculare</i>	2 fois
<i>Stereum hirsutum</i>	
<i>Collibya distorta</i>	1 fois
<i>Cepidothes molle</i>	1 fois
<i>Marasmius ureus</i>	1 fois
<i>Amantia variegata</i>	1 fois
<i>Russula adusta</i>	1 fois
<i>Cantharellus tubiformis</i>	1 fois
<i>Clavaria cristata</i>	1 fois
<i>Cortinarius mucifluus</i>	3 fois

trouvé un tricholome H. compl. sous allée
à Abies par maison garde.
Chapeau brun rougissant en partie écailleux et
glacé.
Banc du pied concolore - le site jamais peut légèrement

famille - lamelle gaine pale de l'adant
de brun. Chair isolée.
Je le rapporte à Tricholoma flavobrunneum

Homme 3 cortinaires sur lesquels il ne
m'a pas été possible de mettre un nom.

Cependant l'un d'eux pourrait bien
être C. duracium.

1^{er} octobre 1951.

Route de Molain au Pas de la Rivière.

Armillaria mellea touffes sur souches.
Marasmius oreales 1 spécimen sur herbe.
Coprinus micaceus 1 touffe.
Tubaria inquilina troupe sur la terre d'une
trouée d'excavation d'un
souché d'orme arraché.

Hypophyses psittacina 1 sur pelouse
Psilocybe cereus 1.
Hypholoma lecyneobundum 1 sur pelouse
Coprinus ? 1
Collybia radicata sur talus

Larrea trichospora touffe sur souche.

Hypocrepis epicriferiformis 1 sur talus.

Heranion. partie propriété côté gare Elouin


- 2 Cantharellus cibarius
- 1 Collybia radicata
- 1 Tricholoma mitis
- 1 Lactarius chrysorheus
- 1 Russula cyanosporilla
- 1 troupe Marasmius urens.
- 1 troupe Laccaria laccata
- 1 troupe Collybia erythropus.
- 1 Mycena pura (rouge et blanc) épais.
- 1 Mycena helianthina
- 2 Boletus badius

2. *Psathyrella gracilis*

1 *Polyponus triqueter*

1 *Polyponus* mal déterminé qui pourrait être *arvensis* ou plutôt *margaritatus*.

son chapeau se présente avec une zone brune terreuse vers l'attache, brun plus clair ensuite légèrement zoné de rouge incarnat le bord du chapeau étant blanc et de la même couleur que le dessous par ailleurs cependant au feu crême, la chair et les pieds étant aussi crême.



Bois de Costenon

2 octobre 1951.

Toujours très peu de champignons:

- | | |
|---|---------------------|
| <i>Hydnum repandum</i> | quelques uns |
| <i>Russula emetica</i> | 3 ou 4 |
| <i>Tricholoma scissile</i> | 1 |
| <i>Lactarius vellereus</i> | 2 |
| <i>Cantharellus cibarius</i> | quelques groupes |
| <i>Lactarius camphoratus</i> | ici et là |
| <i>Omphalia fibula</i> | 2 |
| <i>Heccaria heccata</i> | quelques groupes |
| <i>Cantharellus tubiformis</i> | 1 groupe |
| <i>Cortinarius cinnabarinus</i> var. <i>mus</i> | 2 |
| <i>Hebelome sacchariolus</i> | une troupe ← |
| <i>Colodon ferrugineum</i> | 2 groupes |
| <i>Amanita rubescens</i> | 1 |
| <i>Russula foetida</i> | A.C. |
| <i>Hypoholoma fasciculare</i> | 1 |
| <i>Russula nigricans</i> | quelques uns. |
| <i>Sphaeria militaris</i> sur <i>erythrole</i> | 1 |
| <i>Collybia erythropus</i> | un groupe |
| <i>Cortinarius paleaceus</i> | 2 |
| <i>Scleroderma aurantium</i> | AC |
| <i>Boletus parasiticus</i> | 1 |
| <i>Amanita vaginata</i> var. <i>fulva</i> | 2 |
| <i>Hypoglyphus psittacinus</i> | 3 |
| <i>Boletus erythropus</i> | 1 échant. mal connu |
| <i>Coriolus varicolor</i> | 1 |
| <i>Polyponus adustus</i> | 1 |

Bois nouveau de Costenon

Clavaria cristata
Phylacteria mollissima



Hygrophorus aureus

1 troupe.

Polyporus sapinea

1

Boletus scaber.

1

Inocybe fastigiata.

1

Inocybe lanuginosa =

1 pas de cystes uniques
vu au micros

= I. Casimiri

Bois de Coatcongou

11 octobre 1951

Psathyrella disseminata.

Scleroderma aurantivium

Russula nigrescens
erectica

Laccaria laccata

Russula felix
dichroidea

Amanita citrina

Lactarius camphoratus

Russula cyanopallens

Clavaria cinerea } tous faux bois
cristata }

Hydnum repens

Cantharellus tubiformis

Psilocybe erina

Collybia erythropus

Amanita vaginata (fulves)

Russula integra.

Stereum sanguinolentum

Mycena polygramma

Hypobolus fasciolaris

Xylaria hypoxylon

Tricholoma rutulosum

Mucida mucidula

Cantharellus cibarius

Calodon ferrugineum

Boletus variegatus

Coprinus micaceus

Tricholoma sciodes


Cratellus cornucopioides

Amanita pantherina

Psallium involutum

3 Cortinarius torvus en troupe.

3 Cortinarius largus: chapeau brun rougeâtre
lamelles rouille, légèrement dentées. Pied long
et ferme terminé en bulbe, soyeux blanc
blanchâtre très pâle, couvert de fibrilles blanches de
haut. Verticille brun-rouge pour les spores
chair très épaisse au centre du chapeau blanche
à reflet bleuâtre-rosacé pâle.



1 Inocybe plumosa = I. ovoides
cystioles uniques vu au micros

2 Cortinarius terminalis

Cortinarius brunneus 1 troupe.

Cortinarius ~~patens~~? 1 troupe
mais peut être flabripes. et d'après les spores irréguliers

Inocybe ~~terminalis~~ ^{geophila}
cystiole unique, spores ^{lisses} ~~anguleux~~

1 Tropicostoma
natrip
dans le bois.

H. Psaliota + anthoderma talus au.
dessus du grand monarque en montagne
à la Madeline.

Excursion en forêt de Beffoy

7 octobre 1951 (avec Billie
et moi)

Partie W de la route de l'abbaye au dessus de l'Osier

Xylaria hypoxylon
Amanita Prosa.
Marasmius rotula.
Laccaria laecata
Russula emetica
cyanopantha.
Boletus chrysenteron
Clavaria cristata
Cortinarius torvus
Marasmius ranealis
Hypholoma hydrophyla
Hydnum fura
Collybia radicata
Lactarius blennius
Inocybe geophila f. blancha
Hecideus rubicula
Cortinarius volvariis
Cantharellus cibarius
Hydnum repandum
Tricholoma columbella

Russula fellaea
Thelium caninus.
Auriscalpa fibula
Hydnum polygrammum
Botrya brubica
Coriolus versicolor
Aureolaria uellea.
Clavaria fusiformis
Amanita citrina
Marasmius harioleum = Collybia = complexus
Hydnum sanguinolenta Sous if.
Hypholoma fasciculare
Tricholoma sulphureum.
Marasmius androsaceus
Cortinarius paleaceus.
Cantharellus tubiformis
Cortinarius anostolus
Hygrophorus nemorosus (?)
Lactarius vellereus
Hydnum clypeolara
Hygrophorus amarus
Tricholoma seioides.

Bois taillis à l'embranchement route Plonges
à l'abbaye et chapelle-neuve.

Cantharellus cicerus.
Xylaria polymorpha
Cortinarius rubicellus
Coprinus micaceus
Hydnum felicitatis
Lactaria sylvicola
Tricholoma ustale ?

Cyathus hirsutus
Corticium ocellatum sous abis
Russula ochroleuca
Lecanora = Daedalea quercina
Clitocybe viridis
Tricholoma nidulosum
Hydnum ~~gr.~~ rufescens
Cystoderma aurantinum
Clitocybe catina
Tricholoma ustale
Mycena setosa var discopus
Polyporus perennis
Corticium purpureum
" bivelus
" rigidus
Hypoglyphus minutus
" ~~clavatus~~
Nalarea ~~stanspora~~ stanspora
Hydnum graveolens
Hypoglyphus cornus.

Pris de Kerpello Ploujean
10 octobre 1951.

Surtout Pinus sylvestris.

Pholiota utilans
Aurantia muscaria
Psalliota sylvestris
Colybia radicata
Marasmius aurivellus
Laccaria laccata
Mytilus ostreiformis
Hydnum zonatum (rouge)
Hydnum cyathiforme (gr. min.)
Aurantia purpurea
Cantharellus cibarius
Russula caerulea
Russula turci.
Aurantia rubescens
Hydnum repandum
Polletus erythropus
Clavaria cristata
Hebeloma radicosum umbicatum
Tricholoma ~~truncatum~~ (sous pin)
Aurantia phalloides (sur tronc)
2 Corticium anomalus. (albo-cyanus)
Cystoderma aurantium
Polletus calopus
Pholiota spectabilis
Tricholoma albo-unicum
Lactarius blennius

Russula cyanospanta
Hypholoma fasciculare
Calocera viscosa
Russula felix
Pholus unpuccias Lamp. juncei.

Bois de Penne

13 octobre 1951.

Daedaleia brunnis sur touche hêtre
Collybia radicata
Cortinarius bobaris Ac.
Laccaria laccata
Russula emetica
Cortinarius terminalis
Marasmius androsaceus
Russula sandonia
Boletus bovinus
Cortinarius anomalus
Mycena epterygia
Amanita vaginata fomes-brun.
Collybia maculata
Hypholoma fasciculare
Hydnum repandum
Tricholoma seides.
Cantharellus cibarius
Paniculus campanulatus
Lactarius chrysoreus
Lactarius vellereus

Galera tenera
Cantharellus tubiformis
Scleroderma aurantium
Lepillus involutus
Collybia ?
Amanita rubescens
Coprinus micaeus
Trametes gibbosa
Pholista spectabilis

M. Belle a trouvé sur falaises route
de la rivière Boletus costaricus. (Vers le 10 oct)

Route Moreaix - Bas de la Rivière

14 octobre 1951.

Hypholoma hypophyllum.
Collybia radicata.
Coprinus atromentarius
Lycoperdon excipuliforme.

Bois de Penlan Plourin

19 octobre 1951.

Marasmius ramealis
Lactarius subdulcis ?
Scleropus variabilis
Hydnum rufescens
Amanita muscaria
Colodon fermyricum.
Hydnum urandum
Ustia lubricum.
Cortinarius palisaeus
Russula nigrescens
" eructica
Laccaria laccata
Lactarius camphoratus
Russula felix
Durocybe plumbea
Marasmius ureus
Clytocybe claripes
Pezizella involutus
Lactarius chrysorheus
Russula adusta
Tricholoma flavo-brunneum
Cortinarius semi sanguineus
Myctalis asterospora
Amanita rubescens
" citrina
Russula ochroleuca
Colocera
Cantharellus tubiformis

Clavaria cinerea
Hebelome crustuliniformis
Hypholoma fasciculare
Amanita flavo-oides
Tricholoma saponaceum
Boletus calopus
" piperatus
Collybia radicata.

Bois de Lesquifion
en bordure route de Carhoix.
23 octobre 1951.

sur la route en allant
Pleurotus conchatus ?
Laricinus campanulatus
" splinctinus.
dans le bois. Tous sont les champignons
en grande et nombre.

Scleroderma aurantium e Bois
Russula ochroleuca
Colocera viscosa
Lactarius subdulcis
Laccaria laccata
Flammula sapinea
Cortinarius semi sanguineus
Russula cyanopantha
Omphalia fibula
Amanita rubescens
Boletus submentosus
Cortinarius anomalus var azureus

Pholista mutabilis
Armillaria mellea
Cortinarius paleaceus
Polyporus adustus
Collybia radicata
Cortinarius crassus.

Bois de Puits de Foul-stung.

Plougasnou 6 novembre 1951.

Laccaria laccata nombreux
Mycena lactea 1 tache
Russula sardonia 2.

Bois du Relecq.

8 novembre 1951.

les champignons en nombre et types sont rares.

Tricholoma (probablement *separatum*) 1
Hymenoglyphus assez nombreux
Cantharellus cibarius quelques
Cortinarius rigidus (sm) 2 trouffes.
Flammula sapinea sous hii ici et la.
Collybia distorta 1 trouffe
Enocyste ? 2
Russula emetica R.
Laccaria laccata AR
Clitocybe brunnalis ? trouffe sous Puits
Cortinarius paleaceus 3 ep. en 2 places
Mycena chrysergia ici et la
Lactarius blennius 2 uncountés
Collybia maculata 1 trouffe
Boletus pinis variabilis
Cantharellus tubiformis 2 fois
Amantia vaginata fulva 1
Boletus variegatus 1
Boletus tuberosus 1 trouffe
Armillaria mellea 2 uncountés
Cortinarius bolani 1
Amantia muscaria 1
Stropharia aeruginosa 1
Russula amara 1
Tricholoma sericeum 2
Polyporus adustus 1 trouffe.

Hypoboloma sublatentum 1 touffe
 fasciculare 2 "
Stropharia semi-globata 1 troupe
Copellus involutus 1

Bois de la Salette St. Martin
 9 Novembre 1951.

Clyocybe nebulans
Mycena pura
Stropharia squarrosa 3 places.
Russula emetica
 felicea
Cortinarius nigricolus
 elatus
Cantharellus tubiformis
Amanita citrina
Lycoperdon perlatum
Scleroderma aurantium
Clyocybe asterospora
Hydrocybe hydriphyllum
Hypoboloma sublatentum
Collybia butyracea
Leucocybe cervinus

10 Novembre 1951.

Bois de Jorsan Gardan.
 sous P. cambria et Héliez

Mycena rubro-marginata
 lactea
 ?
Russula sandonia
Cantharellus tubiformis
Calocera viscosa
Cortinarius cinnamomeus fulvus
Laccaria laccata
Polyphorus marginatus
Lycoperdon perlatum
Cantharellus cibarius (sans chataignier)
Tricholoma vitellium
Hypoboloma sublatentum
Clyocybe brunnealis
 Bois de la Roche Gardan

Laccaria laccata
Mycena pura (violet pale)
Clyocybe nebulans
 clavipes
 unifurcata
 brunnealis

Boletinus variabilis
Lactarius vellereus
Tricholoma saponaceum
Collybia butyracea
Phallus caninus
~~*Psathyrella*~~
Mycena ?

Psathyrella gracilis
 en troupe sur sapin,
 de sapin, chapeau blanc rose
 à sommet déprimé et + foncé
 lamelles roses à la base

26 février 1952

Azolla filiculoides. Trouvée sur une mare qu'elle recouvre à Kerfissien en Cléguer.

Point le plus au N que je connais actuellement.

L'Alouette huppée se rencontre communément dans toute la région de Roscoff à Plouescat dans la ~~part~~ ^{part} de la route St Pol - Plouescat jusqu'à la limite de la région que je vois de fréquentes pendant un mois.

28 Mars 1952

Aperçu 2 Tringettes moutons sur les arbres au talus bordant la route Morlaix. Près à la hauteur du Cuen en St. Martin de Champ (in migration. 1^{er} encounter).

29 Mars 1952

Première récolte de Trichostema georgii sur le bord de la mer sous la houe bordant les prairies de Keransony et le chemin du Pas de la Rivière.

11 avril 1952

Première rencontre Hieracium ustica. à Keransony (Plougasnou) 4 individus.

12 avril 1952

Plusieurs à Morlaix.

14 avril 1952

Première chant du Coucou à Prunel.

18 avril 1952

Près du Grilly en Ploum, une queue muscinum a établi son nid à la manière d'un rouge gorge dans une ouverture de terre dans la paroi d'un talus bordant un chemin. Talus sur lequel ne pousse aucun arbre ou arbuste et seulement une végétation herbacée. Une queue très visible y court tout le temps.

19 avril 1952

Chant du Coucou en Pleyber-Christ.

15 avril 1952

Helotoma viridifella et Morchella spongiosa récoltés par Belle sur les dents de la queue.

23 avril 1952.

Premier *Martinet* dans le ciel au dessus de Pleyben.

20 avril 1952

Jolie récolte de *Morchella spongiosa* sur la dime de la Brie à Boquice. (tout au goue)

29 avril 1952

Retrouvé seulement 4 échantillons de *Morchella spongiosa* à Boquice.

Dans la région autour de l'Étarch en Boquice, on trouve communément: *Ombellifera sylvestris* (ombellifères)

1 Mai 1952.

Tricholoma de St. George à Quern ar Mersac en Serignac dans l'herbe au pied d'un tas de fougère et sur un talus de la route près du bourg de Serignac.

Callitriche palustris au Four à Chaux Serignac

7 septembre 1952

Clathrus cancellatus: trouvé par l'abbé Corillon dans le jardin du presbytère de Tréflévenez.

19 septembre 1952

Excursion avec l'abbé Corillon aux étangs de Glomel. (côté du nord)

Rencontré un trèfle cultivé dans un champ au bord de la route près de Paule que nous rapportons à *Ochroleucum*.

Plus un exemplaire sur la banquette de la route de Glomel à Tréogan à hauteur de la ferme St. Eloi (chemin allant à Kersode)

Étang de Coroneg.

Sur la vase domchée du bord rencontrée en quantité *Coleanthus subtilis*, qui est de ce fait la localité la plus à l'ouest où cette plante rare a été trouvée.

Elatine hepandria
Limnium littoralis
Littorella lacustris
Scirpus acicularis.

Étang du Héronnet

Scutellaria galericulata
Luzula oryzoïdes
Puccinellium palustre

Étang de Botearou.

Luzula oryzoïdes
Elatine hepandria

Etang de Crizius

Peuplements denses de *Elodea canadensis*
Nitella translucens

[Camp Eden = C. demissa.]

7 septembre 1952

Boletus strobilaceus, 1 bel exemplaire
trouvé par Bellec en forêt de Beffou.

21 septembre 1952

Compte rendu à l'ore du Bois du Relleg.

1 touffe *Boletus edulis*

99. *Hymenium upandium*.

Gomphocarpus cibarius

Compte rendu à Costenon.

Cortinarius torvus.

Tricholoma acerbum retrorsum 1 sp. même place

Boletus edulis 1 tache (n)

Craterellus cornucopioides 1 large tache.

Clethra prunifolia 1 tache.

21 février 1953

Très belles stations de *Calamagrostis nemoralis*
sur talus à l'entrée d'une ferme à
Creach au glas en Plouzevet.

23 février 1953

1^{er} essai de l'Alouette à Hespaul.

Agrostis fliculoides: marée à la ferme de
Kerviniec en Plouzevet.

On voit un peu portant en fleur sur les talus.
Linum catharticum, *Potentilla fragariifolia*
Androsace hirsuta.
dans les endroits ombragés: *Ficaria*.

24 février 1953

Floaison de narcissus pseudo-narcissus.
à Plouzevet.

13 Mars 1953

ici et là premières *Viola riviniana*.
+ *Viola hederifolia*.

15 Mars 1953

2 Buxes hautes des spirales au dessus de
Kerviniec.

Brignogan: *Smyrnium olusatrum*.

7 Mars 1953

1 fauvette tête-noire ♂ dans le jardin de
Ker Jza.

21 Mars 1953

1 *Pomolox velox* chanté à Ker Jza. B

31 Mars 1953.

Première cueillette de *Tricholoma Georgii* en petites tiges non épanouies dans la baie bordant les prairies de Kersnouez et le chemin du Bas de la Rivière. La tache est toujours étendue et très belle, avec promise d'une importante récolte sous peu de jours. (L'année dernière 1^{re} récolte minime le 29 mars. Cependant la période antérieure a été très sèche durant un mois avec forte gelée blanche presque tous les jours.

5 avril 1953.

Dunes de Toul au goué loquiere

Psamma arenaria.

Agropyrum ...

Euphorbia paralias

Anthyllis vulneraria

Crastium tetrandrum

Myosotis hispidus

Polygala oxyptera

Bellis perennis

Tharaxacum dens leonis

Luzula campestris

Saxifraga hircoclytis

Hieracium filicella

Hypochaeris

Daucus

Carex

Plantago lanceolata

Lotus corniculatus

fleuri.

fleuri.

1 pied fleuri.

fleuri.

fleuri.

fleuri.

fleuri.

Plantago coronopus.

Gallium

Cardua vulgaris plante desséchée.

Jedum

Draba verna fleuri

Ranunculus bulbosus

~~*Parietaria*~~ (cantonni) dans le dard des fougères des bords dans sa partie sous l'île blanche et le dessous. C'est *Heliotropium alba*.

Pas de mouilles, ni un seul champignon

Parabola ruraliformis

Hypnum - cupressiforme

~~*Ceratodon*~~ - purum.

Brachythecium albicans

Bryum capillare caespiticium

Trichostomum crispulum (?)

11 avril 1953

3 premiers troncs de cheminé charnés en groupe le long des rochers Pont du Douff en mer. Pas de la Rivière.

17 avril 1953.

Premier chant du coucou à Gardan, puis entendu le 24 à Toul coast Ploniquelan; le 28 à loquiere

28 avril 1953.

Les 3 premiers tourterots dans le ciel de Morlaix.

28 avril 1953.

les premiers Noailles sur la dune de
Toul au golf à l'ocquie, 10 très belles
et aussi en bordure de plage sur sable blanc
3 *Agaricus haemorrhoidarius*.

Un grand nombre disséminés en taches, lâches
dans la partie à sable blanc ouousse unique
ment *Agropyrum*. (sur l'île blanche dans dune)
un champignon à spores brun foncé. (~~Stropharia?~~)

En pleine floraison: *Poleaceae ammophilum*

Polygala oxyptera.

Hieracium filisilla

Ranunculus bulbosus

Lotus corniculatus

Anthyllis vulneraria } 1 pied fleuri.

Eriogonum acris

Eryngium maritimum sort du sable.

Cerastium seminudum est tout aussi
commun que le diploforme de *C. tetrandrum*

Arenaria Noydii infl.

29 avril 1953.

Martinetts dans le ciel à Bodilis, Plouider¹⁵

les Choucas nichent dans le manoir de
Kerno en Plouder.

Bande de Choucas sur les dunes de Kereanna
près Chapelle Guvroc au Tréflex.

Nous visitons une bande de St Coultis sur
la dune à couple de Cornard dans l'eau au

dés tranché anti-char. *Bergersonella Paq.*
à St Coultis sur la plage (sur la dune aussi à Goulven)

Dans la tranchée anti-char.

Epave naiffe de chara fruchie: *Ch. foetida*
Lotamogeton pectinatus. var *longibractea*

Ranunculus aquatilis var *succulentus* (v. sp. p. du)

Lotamogeton polygonifolius.

Lycopodium europaeum.

Château du lescot Lannarilly: *Quararicum nodosum*

1 Mai 1953.

Martinetts à St. Pol de Léon.

Dunes de Lante: j'ai retrouvé *Euphorbia*
cyparissias en pleine floraison au même
endroit qu'il y a quelques années. de part et d'autre
d'un chemin ~~so~~ à peine tracé dans la dune
à 100m dans le sud du rocher.

Un peu partout aux endroits frais de "rosettes"
de *Lycopodium*.

j'y ai identifié comme louses:

Barbula ruraliformis

Brachycremum albicans

Hypnum furum.

Hypnum cupressiforme

Brigsum fendulum.

Trichostomum tophiaceum ?

Barbula fallax

Barbula ~~subulata~~ ? } à revoir

subulata

6 Mai 1953.

Partie de Dune entre l'Île Blanche et la
rivière Gouron en Loquerec

I
Zone basse à sable fin et végétation
de continue épaisse.

<i>Psamma arenaria</i>	5
<i>Euphorbia paralias</i>	2 (déb. fl. 13 Mai)
<i>Erigeron maritimus</i>	3
<i>Cakile</i>	quelques très jeunes pieds
<i>Psilocibe amophylla</i>	cb. dimorphique comm. sur les bords d'un veld arctique pied étiré, rasé à la base.

II
Zone moyenne à sable fin *Agropyrum*
et *Psamma*.

<i>Agropyrum</i>	5
<i>Psamma arenaria</i>	2
<i>Thymis hirta</i>	2
<i>Berkonia taraxacifolia</i>	3 en fl.
<i>Anthyllis maritima</i>	1 (déb. fl. 6 13 Mai)
<i>Helictes alba</i>	1
(1 pied <i>Bromus mollis</i>)	

III
Zone supérieure à végétation continue

<i>Helictes alba</i>	
<i>Cerastium tetrandrum</i>	flor. termin.
<i>Berkonia taraxacifolia</i>	en fleur
<i>Euphorbia paralias</i>	
<i>Anthyllis vulneraria</i>	déb. flor.
<i>Phleum arenarium</i>	déb. fl.
<i>Senecio vulgaris</i>	fl. term.

Thymis hirta

Arenaria Lloydii

en fruit

Senecio jacobaea

Bellis perennis

en cou. en fl.

Misaria sp?

Barbula subulata
Barbula fallax

fr. cc
c

• Mousses: *Bryum pendulinum* - fruit.

Cerastium semidecandrum

Saxifraga triactylites

fin de fl.

• Mousses *Bryum caespiticium* - fruit.

Mniera maritima

Brachyterum albicans

• *Hypnum ferum*

• *Bryum pendulum* - fruit.

• *Hypnum cupressiforme*

terreum

Polygala oxyptera (w.) (1) en plein flor.

Nyctelia hirsuta

fl.

Luzula campestris

en fruit

• *Barbula unaliformis*

Loa trivialis

Anthoxanthum odoratum

• *Fesidius taxifolius*

Lotus corniculatus

première fl.

(1) seulement un pied ♂ fl. bleu.

Vicia angustifolia.

13 Mai 1953.

À reporter: Zone I: *Convolvulus soldanella*.

Zone III: *Polygala oxyptera* ♂ fl. blanc. et bleu

fauconnant donc après les velds

Scleropoa loliacea.

Sur la dune de 'Toul au goni': *Avena pubescens* c.

peut-être *Barbula unguiculata*.

10 Mai 1953.

En suivant le dessus de la Falaise
de la plage de Beg au fr. à un chemin
de Boul Redou j'ai recolté:

<i>Ranunculus nemorosus</i>	AC
<i>Lathyrus sylvestris</i>	PC
<i>Orobanchia siliquosa</i>	C
<i>Cirsium bulbosum</i>	C
<i>Cineraria spatulifolia</i>	AC
<i>Symphoricarpos tuberosus</i>	C
<i>Mercurialis perennis</i>	AC
<i>Equisetum hyemale</i>	Ac.

Les trouve *Dianthus barbatus* signalé
par Cronan des! Jean du Bois à la queue
tout au moins sur cette partie de la côte.

17 Mai 1953.

Jellon de St Anne St Pol.

Spergula rubra

St Anne St Pol.

Oenanthopus perpusillus (pas d'autre)

Spergula vulgaris (fr. rouge noir, feuilles jaunies sur
le dessus, parties vives en couleur blanchâtre)

Nid de corvus corone dans les Luis avec petits.

21 Mai 1953.

Sur la route Auray à Vannes à 11 H 500 de
cette dernière ville 21 fleurs dans un frs
avec un troupeau de vaches.

Ce serait l'indication d'une Corbeaute
à rechercher dans les environs, très riche en
Bois de Pin. (Région Ploeren)

Sur le côté droit de la route Auray. Vannes
une fleur avant la route allant vers le Bruch
(se trouve des aphyllis) sur une cinquante-
taine de mètres.

31 Mai 1953.

Jilene nantes : Station le long du chemin
menant de la gare des! guirec au phare à Ploumanach
déjà reconnue l'an dernier.

Ile grande : *Anthyllis vulneraria* } *Barbula muraliformis*
Lagurus ovalis } *B. subulata*
Thlasium minus } *B. squamosa*
Poterium digitatum } *B. fallax*

Wissenden : *Rubia perigrina*
Lagurus ovalis
Anthyllis vulneraria

7 Juin 1953.

Etang de Kerloc'h Plogoff.
Butomus umbellatus en bonne floraison
Utricularia minor. Ombelle filuleuse (fl)

Nemophila alba
Juncus valerandi
Scirpus tabernaemontani
Hypnum polygamum sur la dune humide.
Las ve ou entendeur de Rousserolle.

Choucas à Plazévet, Ploubinec, Audierne

J'ai trouvé ces jours-ci à Quimper en
bordure de la route de Brest après le dépôt
Mantini en Kerfontaines. *Gandussia fragilis*
avec *Hordeum sicalinum*. (28 Mai 1953)
Retrouve *Gandussia* le 7 juin en bordure de
la route longeant le fort du Sibir après ~~chez~~
le chantier Rolland.

8 Juin 1953.

Dunes derrière l'Hotel de la Falaise à Prunel.

Ranunculus bulbosus
Lapaver rhoeas
Glaucium luteum
Raphanus raphanistrum
Ligusticum officinale
Arenaria Lloydii
Cerastium vulgare
Cerastium
Lycium divica
Coronopus didymus
Malva sylvestris
Lavatera arborea
Geranium molle
Geranium purpureum

Trifolium striatum
Trifolium repens
Trifolium minus
Lotus corniculatus
Medicago maculata
Medicago lupulina
Medicago denticulata
Vicia angustifolia
Ononis asperus
Trifolium campestre
Umbilicus pendulinus
Sedum acre
Daucus carota
Eryngium mantinum
Faniculum officinale
Therapsid arvensis
Galium aparine
Bellis perennis
Cirsium tenuiflorus
Thymus hirta
Hypochaeris radicata
Juncus jacobae
Achillea millefolium
Berteroa taraxacifolia
Helminthia edwardsii
Convolvulus arvensis
Hyoscyamus niger
Sonchus oleraceus
Orobanche minor
Salvia verbenaca
Anagyris arvensis
Plantago lanceolata
Plantago coronopus
Betula maritima

Rumex crispus
Paritaria officinalis
Spiranthes autumnalis
Carex arenaria
Dactylis glomerata
Mibora annua
Phleum arvense
Hordeum murinum
Scleropora loliacea
Lolium perenne
Bromus mollis: *B. hordeaceus*
B. Funaria
Festuca

Brachyotum albicans
Barbula ruraliformis
Barbula subulata
Barbula fallax
Bryum caespitium
Barbula unguiculata

L'Abbé Corillon me donne les stations suivantes:

Najas major: AC à Triguennec et vers Ploërmel etangs de Trunival et Kergalan, et canaux avoisinant.

A Triguennec à droite et à gauche de la route allant vers la mer par la route qui traverse le palue et aboutit non loin de anciens établissements allemands de cuirant tout près de la ligne de galets.

Zanichella palustris: même stations comme dans presque tous marais et canaux saumâtre coté S.

Ruppia: même stations et très dense dans marais de Kermor entre Combout et l'île ludo de minn guiseny (ancien marais salant); au port de Locqueineau derrière un cordon de galets.

20 septembre 1953.

très nombreux Notocella alba³⁺ de forme dans la prairie en bordure de la rivière d'Ingeny sous l'ambry de la route à Coemmaria. Quelque

21 septembre 1953.

dans la lande en bordure de la route de Quimper en montant vers le Roch Trivizel, un o⁷ de Rosignol de muraille (migration)

24 septembre 1953.

sur la dune au pied de l'île Blanche à Coquiere encore de nombreux fuchs fleuris de Melilotus alba.

Erigeron acris

sur la dune de tout au long.

Erigeron acris fl.

Erythraea cicutarium fl.

Eupatoria cannabinum fl.

Thalictrum luteum.

Hypochaeris radicata.

Ononis repens

Euphrasia nemorosa

Hypochaeris conicus 1 sp.

Isotria medeoloides.

Verbena ?

24 septembre 1953.

un jeune ramier de quelques jours éclo dans un nid à Keravexer en Pleyben-Christ

30 septembre 1953.

1 o⁷ de Buscard cendré dans les landes près du Roch Trivizel.

2 octobre 1953.

une très belle niche de Psittacus vide a été trouvée à Belle en proximité du champ d'aviation de l'Aviation. J'ai vu de Spizelles qui couraient sur à la planche du Harthanc, mais beaucoup moins clair.

lieu champ de course, soit facile à l'air et humide. ce qui est beaucoup plus normal comme station.

4 octobre 1953.

Bois de Puis de Boul. Stung. Plougasnou.

<i>Amanita rubescens</i>	2
<i>Laccaria laccata</i>	nombreux.
<i>Hebeloma crustuliniformis</i>	1 très grande tache
<i>Boletus scaber</i>	1
<i>Boletus borvius</i>	AC
<i>Boletus luteus</i>	AC
<i>Boletus edulis</i>	1 large tache
<i>Russula</i>	ici et là
<i>Cortinarius deliciosus</i>	ici et là
<i>Clitocybe amantiaea</i>	ici et là

5 octobre 1953.

A la recherche de *Guertmania campestris* dans les landes de Land ar Foas en goulon-Plouguen. Visite se jour la partie à droite et à gauche de la route de Plouguen à partir du maréchal du Foulecost vers Plouguen talo meos.

Landes microphyte en frente à *Nolina canulea*

Ulex ligularis

Orea Athodip et cilicis

Pteris aquilina

Rares *Puis sylvestris*.

Cobelia unis, *Leucobryum glaucum*, *Cladonia*

lous les Puis *Boletus edulis*

B. scaber 1

B. borvius TC

Gomphidius roseus 2

Cortinarius multicoloris une tache 8

Entoloma ? nombreux tachs.

Stropharia umiglobata 2

Coprinus stercorearius 1 sur croûtes

J'ai trouvé dans un bois mitoyen 2 exemplaires typiques de *Mycena Serini* Quellet, sur un cone de *Pinus maritima* tombé à terre dans la lande rase. (1^{er} fois).

9 octobre 1953.

En vitrine chez Belle un groupe de *Pleurotus dryinus*.

Il me montre aussi un *Inocybe cookii* à caractéristiques nets.

et me montre des exemplaires d'un *Cortinarius* du groupe *fraguoloides*.

Landes du Coust ar. Foas avec *Puis*

<i>Boletus variegatus</i> c	99	<i>Amanita rubescens</i>
<i>borvius</i> TC	100	<i>Cantharellus tubiformis</i>
<i>edulis</i> et <i>pinicola</i> AC	AC	<i>Russula sudorosa</i>
<i>luteus</i> c	AC	" <i>turci</i>
<i>erythropus</i> 99	2	<i>Laccaria laccata</i>
<i>scaber</i> 99	99	<i>Amanita muscaria</i>
<i>submentoides</i> AC	99	<i>Stropharia umiglobata</i>
<i>Calocera roseosa</i> 1	1	<i>Coprinus narcoticus</i> ?
<i>Cortinarius bicolor</i> ? 1 tache	1	<i>Clitocybe colimitis</i>
<i>Cortinarius</i> (de couleur jaune) 1 tache	1	<i>Melcosia</i>
" <i>hemisanguineum</i> 1	1	
" ? (Cantarelles) 1	1	

14 octobre 1953.

Visite à Kerbrion St. Luthope.

Clytocybe virvosa
 Laccaria laevis.
 Lactarius vellereus
~~Hypholoma nidulans~~ Ecceba grisea umbella
 Boletus calopus
 subtomentosus
 edulis
 Amanita rubescens
 Clytocybe claripes
 Russula tereci
 felix.
 Amanita citrina
 Collybia butyracea
 Tricholoma columbellum
 Amanita muscaria
 Boletus scaber
 Amanita pantherina
 Boletus erythropus
 Collybia radicata
 Hypholoma fasciculare
 Boletus luteus.
 bormus
 piperatus
 Cortinarius eliduchus
 anomalus
 Mycena pura

15 octobre 1953.

Belle au mont, 5 ou 6 exemplaires de *Clytocybe gigantea*
 = *Laccaria gigantea* récoltés à Coatsches.

19 octobre 1953.

Belle au mont, tout une série de *Cortinarius*
limulatus type *v. colli* près de Coatsches.
 J'ai trouvé hier sous hêtres dans le bois du Pallez
 un *Cortinarius* diversus.

25 octobre 1953.

Bois de Beffou :

La notation d'abondance est naturellement valable pour ce jour.

Lactarius bleunius . c.
 Lactarius pallidus . 2.c
 Lactarius vietus . AC
 Lactarius vellereus . c
 Lactarius thuyosporus . PC
 Lactarius nitidissimus . 2.c sous abris
 Mycena parasitica . 1^{er} rencontré
 Amanita phalloide . c.
 citrina et v. maffa . PC
 pantherina . AC.
 muscaria . R
 vaginata (prise l. 1)
 rubescens . c
 Hypholoma fasciculare . AC
 subtomentosum . AC
 Hysterangium strigosum . 2.c
 squamosa . c.
 Lezyza
 Xylaria hypoxylon . PC
 Tricholoma rodopolum . c.

28 octobre 1953.

Bois de Luis de Corn au Camp Flougesum
et terres voisines.

Lactarius chrysorheus
vellereus
subdulcis
zonatus (?)

Hopleria aeruginosa
Collybia butyracea

Armillaria mellea

Boletus bovinus

Boletus rufus 3 sp.

Lactarius controversus (sous aulx)

Russula sandonia

Russula rouge et douce ?

Cantharellus cybarius

Clytocybe aurantiaea

Clytocybe

Hebeloma ...

Myccena lactea

" fusa

Boletus edulis 1

Coprinus flicatilis

Laccaria laccata

Amantia rubescens

" muscaria

29 octobre 1953.

Bois de Kerpells. Ploujeun. (Bois de la Rivière)

Amantia rubescens avec canis de Lincum avec melze

Champignons rares à part Lactarius tubulatus

et Tricocybe geophila

Amantia muscaria

Armillaria mellea

Clytocybe infansibuliformis

Myccena rubromarginata sous pins.

Tricocybe geophila

Clytocybe nebulosa } sous melze

Tricocybe peridoma }

Myccena : bord de lamelles rouge foncé
rubromarginata 2 pins

Tricocybe

Collybia ruficida

"

Clavaria

Hopleria aeruginosa

Scleroderma aurantium

Calocera viscosa

Collybia dryophila

" butyracea

Lactarius vellereus

Lactarius controversus (sous bouleaux)

Russula

Lactarius chrysorheus

Russula sandonia

Amantia rubescens

Laccaria laccata

Collybia radicata

Cantharellus cybarius

Cortinarius pallens

Annulata cithina
Lactarius blennioides (sous hôte)
Boletus luteus (sous hôte)

30 octobre 1953.

Sauve lieu à Ulep-lica ciliaris - Molina-Pun
claus (maritimus et sylvestris). à tous chez le terrain
de Sport de Plourin :

Boletus bormius avancés en quantité
Marasmius (Hymenium?) ici de la
Leptania lamprospora Stades. (certain)
La caria lactata (forme orange) 1 tâche
Russula sandonina 1 tâche
Clytophila prunella 1 tâche ensemble
Tricholoma colosse 1 très avancé
Colybia dryophila
Gomphidius roseus 1
Boletus luteus 1 sous *Pinus sylv.*
Trichobola foeniculata plusieurs tâches
Lactarius deliciosus 1 sp.

Sauve idem mais à Molina pas que fure entre
la route Plourin-Cout claus et celle de Plourin-gau
du cloître. Lannuron.

Pratiquement rien en dehors de qq. *B. bormius*.

Sauve idem en haut nouvelle route Plourin face
à Lannidy.

Rien et pas trace de *B. colosse* depuis rencontré
à cet endroit mais plus haut dans boqueteau
(avec *Gomphidius roseus*.)

Truncatella melanospora: peu de ch. mais note.

Russula sandonina
Boletus edulis en liquefaction.
Cantharellus aurantioculus.
Colybia butyracea
Lactarius subdulcis 1/2 sous *Pinus sylv.* et 1/2 chens.
Lactarius chrysorheus. (mais le lait jaunâtre très lentement
monte poils blancs au pied: *Uromyces*?)
Annulata cithina 1 tâche.

1^{er} Novembre 1953.

Font du ~~Boff~~ Oranion ^{2/3 des champignons au dessus de}
_{du cloître de Lannuron.} (avec Lannuron) =

Route des champignons :

<i>Lactarius vellereus</i>	c
<i>pipitatus</i>	pc
<i>Laccaria laccata</i>	AR
<i>Amaloria mellea</i>	c
<i>Russula emetica</i>	c
<i>ochroleuca</i>	AC
<i>felles</i>	
<i>Lactarius subdulcis</i>	pc
<i>Annulata vesiculosus</i>	pc
<i>Scleroderma aurantium</i>	pc
<i>Hololeuca fusca</i> (pas l'identité) très abondant c'est <i>Flammula</i> <i>lutea</i> - gaillet.	
<i>Flammula sapinea</i>	pc
<i>Boletus</i> sp. variables	c
<i>Colybia radicata</i>	c
<i>Huachuca unicolor</i>	AC
<i>Hoplocybe quadrata</i>	c
<i>Coprinus picaceus</i>	3 sp. sous taillis

Aspidospora mollis
Ascoloma vinctum 1
Hydrophorus ludicrius probablement 2 sp.
Intoloma rodofolium Ac
Xylaria hypoxylon c
Thalles communis 1
Amantia vaginata (f. *grisea*) 2 sp.
Caetania blennius sous *trita*.
Dylocybe hydrosplilum 1 fois
Hypolestium fascicula - plusieurs fois
subaequantium - 1 fois

Cortinarius anomalus ici et là
Mycena epyplygia
Proletus chryseus 2 taches
Tricholoma columbina 1 tache
Tricholoma rufopileum 1 groupe
 1 tache en bordure d'allée qui pourrait être

C. bicolor - chapeau brun hygrophanes pied violet plus pâle en haut, en diamant cessant vers le bas. certainement bicolor.

Russula lutea - 2 sp.
 1 tache certainement chapeau brun rouge au centre haut du pied violet.

Hebeloma probablement *Birman*
~~2 cordons~~ ~~trouvent~~ *Hebeloma* *crenata* gros
 et très forte lamelle et haut du pied blanchâtre
 pied clariforme.

Cet *Hebeloma* est très très commun dans
 toutes les parties du forêt. (très vigoureux / il pleuvait)
 chapeau de *S. erubescens* très clair, pied nettement
 pelucheux (excellent) sauf en haut.

C'est *Flammula lenta* dont j'avais déjà
 trouvé 2 exemplaires à Beffou il y a 8 jours.

2 Novembre 1953.

Costeulo Pleajean en bordure route Carrière
 j'ai ramassé:

Russula trampeana pied react. rut a (50°F E)
Tricholoma pessundatum
Cortinarius bimaculatus
Hydrophorus cantharellus
Lactarius scicifluus
Dylocybe nanospora
 Belle me présente *Pleurotus dryinus* trouvé sur *porcini*
 et probablement corticatus à lamelles jaunâtre sur fente
 jeune de *chêne* petit à petit en vieillissant en *corona*
 sur la marge du chapeau.

Bois du Pileq
 8 Novembre 1953.

Tricholoma ustale
Lactarius blennius
Laccaria laccata
Russula emetica
felix
Marasmius urvus
Tricholoma seodes
Proletus edulis
Hydnum rhomboides
Cantharellus cibarius
tubiformis
Stropharia ardequiniana
Proletus bovinus
erythropus
Marasmius rubescens

Alyce rouge

- Lactaria capitata*
- Lactaria pipervata*
- Omphalia sicula*
- Mycena pura*
- Boletus chrysenteron*
- Russula ochroleuca*
- Collybia confluens*
- Clytocybe cyathiformis*
- Lepiota exornata* var *gracilentata*
- Lactaria blennius* cf *Heter*
- Russula nigrescens*
- Amantia rubescens*
- Collybia distorta*
- Cystoderma amianthinum*
- Polyponus adustus*
- Mycena galopoda*
- Hypnum fulgens*
- " *repandum*
- Hypoglyphus cossus*
- " *virgineus*
- Psalliota arvensis* (sors if)
- Tricholoma album*
- Hypoloma fasciculatum*
- Amantia franchina*
- Polyponus ruficolor*
- Limeta*

à l'Est (fruitier surtout Hété) au-dessus de l'Ornie

- Lactaria pallidus*
- Russula sordida* probablement *R. Rossetii*
- Marasmius urvus*
- Hypoglyphus cossus*

- Psallus caninus*
 - Sylaria lycopylon*
 - Caterella cornucopioides*
 - Cortinarius torvus*
 - " *croceus*
 - Amantia phalloidi*
 - Lepota clypeolaria*
 - Psallus impudicus*
 - Stropharia aeruginosa*
 - Psotiota mutabilis*
 - Tricholoma vestale*
 - " *sciodes*
 - Lactaria vellereus*
 - Cortinarius flaccidus*
 - Lactaria theiogales* (lait blanc puis jaune après 1')
 - Coprinus nicaeus*
 - Lactaria pyrogalla*
 - Lactaria fuliginosa* var *ficinus*
 - Clytocybe maxima*
- à l'W de l'Ornie près du château (fruitier surtout Hété)

- Boletus variegatus*
 - Tricholoma japonicum*
 - Tricholoma inaequalatum*
 - Tricholoma columbina*
 - Mucidula vinicida*
 - Tricholoma crustuliniformis*
 - Amillaria sur if.*
 - Collybia platyphloea*
- sors sur vers la prairie au chevreuil.

- Russula sardonia*
- Hypoloma fasciculatum*

Hebeloma magnimanina Karst
 un temps de H dans un
 dipersion humide de la forêt.
 contact par un gros manelon
 épais et aplati, un long pied lui
 donne un aspect de longicodium.

Collybia rancida
Annularia mellea
Amantia muscaria
Hydnum repandum
Cortinarius semisanguineus
Cantharellus tubiformis
Lactarius theiogalus
Boletus piperatus
 variegatus
 luteus

Lactarius indulsis
Cortinarius elator
Calocera viscosa
Hydnum auriscalpium
Cortinarius anomala
Tornubia capitata
Collybia radicata
Clitopilus prunulus

* Belle qui a été chez de la Nonnerie et Thizonne
à un moment :

Boletus piperatus
Lactarius rufus

15 Novembre 1953.

Bois du Marignien Commaris. Burein.

Palissade de Hêtre et chêne, et en bordure de
route Norduy-Carlaris: sapins sur 20m en profondeur
en bordure de bois sur la banquette de la route

Boletus edulis
Claviceps cyathiformis
Hypoglyphis nives
Hydnum repandum
Volvariella
Helvella vesipelle sp. *mesophorum*

sous bois :

Amantia muscaria
Cortinarius elator
Xylaria hypoxylon
Tricholoma ustale
Lactarius theiogalus
Russula emetica
Crepidotus mollis
Cantharellus tubiformis
Tricholoma flavobrunceum
 Columbella
Russula *fulva*
 nigricans
 fulva *et emetica*
Collybia butyracea
Boletus variegatus
Amantia gemmata

Qui est en Italie.
Pis Proel. en Gallie. No. 104
13 avril 1966

Boletus chrysenteron

Flammula lenta

Laccaria laccata

Armillaria mellea

Cortinarius seminivivens

torres

Collybia radicata

Tricholoma sciodes cf. *nitens* et *chrysosporium*

Cortinarius sanguineus cf. *chrysosporium*

anomalous

Craterellus cornucopioides

Lactarius blennius

Ammonita citrina

Collybia platyphylla

Duriphaea sicula

Collybia distorta

Hypobolus sublateritium cf.

Cortinarius curvimonus

" *orellanus*

fulvaceus

Pholiotus spectabilis

Cantharellus ammonitum

Cortinarius sanguineus

sous les grands sapins

Calocera viscosa

Cortinarius obtusus

Lactarius nebularis

Cortinarius palustris

Russula fallax

imbecilis

Cortinarius seminivivens

Tricholoma pessundatum, *acerbum*?

Cantharellus aurantiacus

Ammonita muscaria

Flammula repens

Russula ochroleuca

Bois de Hêles: sous 4 hêtres et sapins.

Hypophorus hypophyses

Ammonita geminata

Russula duronii

Russula caerulea

Flammula repens

Hypophorus niveus

Hijena nives

Boletus luteus

Clitopilus prunulus

Boletus variegatus

Calocera viscosa

Russula noronhai

Cantharellus aurantiacus

Stropharia dryophila

Tricholoma sejunctum

1^{er} Décembre 1953.

Landes près de la source de St. Cadran Baspart.

Molanica asterospora vuifié au micro.

Hypophorus sciophilus.

trouvé sur *Russula* dans l'eau d'un autre

fontaine proche. *R. fulvipes* (?)

un autre *Molanica*.

trouvé *Batrachospermum vagum*

(quelques *Rhodophycées*) dans source en bordure

nationale 78 face à l'auberge au pied
du Hernez Michel. Braspart.
S'y trouvait aussi une *haricula*.

Belle ms montre trouvée sur les dents de
Loequine

Geoglossum cookianum Nannf.

Rhodopapillus sordidus

Ce geoglossa a été déterminé par comparaison
avec ceux trouvés au même endroit lors d'une session
de récolte en 1950.

3 Décembre 1953.

Bois de lais de Toul Stang. Longaona.

Cortinarius obtusus: un groupe
que nous rapportons à ce *Cortinarius*, en
tous les cas survenant un *Acute* de *Longaona*.

Dents de Toul au genre Loequine

6 Décembre 1953.

Geoglossum cookianum

Rhodopapillus sordidus

Lesiza sylvestris (Aluria)

Boletus granulosus

Coprinus roseotinctus ??

Hygrophorus nigrescens
sp. *subradialis*

Volvaria speciosa

Tricocybe brunnea

Tricocybe fuliginosa

Hebeloma duhaucii

Diplasia pyxidata

Hebeloma

Clitocybe dealbata

13 Décembre 1953.

Excursion au Roch. Trisezel.

Geopodium selago: trouvé en plant
dans une fissure de rocher, entre R. Trisezel
et R. Buzel. noz. Il est recouvert par les
feuilles sèches d'un plant de *Agrostis setacea*.

Hymenophyllum unilaterale: a été spéciale-
ment recherché. Rien n'a été trouvé qu'une petite
tache dans une fente au même endroit
qu'une fois à l'abbaye en 1947. Elle paraît en voie
de régénération totale. (voir à Montelan à l'ège)

Ricotte *Parrella fuliginosa* sur Roc'h
à Buzel. noz. mod: Cuel + R.

Nolanea haurospora - C. dans toute la lande
du Roch. Trisezel où la végétation est rase.

Ricotte sous rochers les Mousses suivantes dans
l'abrupt de ciel.

Hylacomia loreum

Hypnum splendens

" *Schoberi*

" *cupressiforme*

Plagiobryum undulatum

" *distichum*

" *elegans*

Sclerobryum scoparium

Eurynotum *Hobbesii* *Compsopogon flexuosus*
fracturatum *trifidus*
Rhacomitrium heterostichum *brivipilus*
 Et parmi les hépatiques.
Sporocarpium resupinatum
Diplophyllum albicans

17. Décembre 1953.

Asplenium ruta muraria sur un mur église
 de La Fautte.

20 Décembre 1953.

Bois du Relecq.

<i>Gonia lubrica</i>	1	
<i>Lactaria blennius</i>	3	sous hêtre
<i>Hypnum repandum</i>	2	
<i>Conocephalum virens</i>		
<i>Corticia clathrata</i>	1	
<i>Lactaria vellerea</i>	1	
<i>Omphalia acicula</i>	1	
<i>Lanolinia campanulata</i>		
<i>Clypeus cyathiformis</i>	1	
<i>Hypnum sublaetivum</i>	1	
<i>Rhizoglyphis</i>	1	
<i>Galeria sphagnorum</i>	pl.	
<i>Boletus ^{subtomentosus} apertus</i>	1	
<i>Laccaria lacata</i>	pl.	
<i>Tricholoma</i>	2	
<i>Clypeus</i>	2	
<i>Polystichum perennans</i>	2	
<i>Marasmius gemmatum</i>	1	f. blanchi

Vallée de Moulins Quéméné. Ploumieu.

Reconnu dans le massif

Lichen : *Endocarpon fluviale* = *Dermatocarpon*

Mousse : *Fontinalis antipyretica*

Hépatique : *Stegaria undulata*

Calyptogonia trichomanis

Près des bords

Mousse : *Mnium hornum*

Autocommia palustris

Pinguicula lusitana f.

Sur les rochers

Lichen : *Parmelia conspersa*

Mousse : *Rhacomitrium lanuginosum*

" *protensum*

Polytrichum juniperinum

Sur les rochers moussus

Lichens : *Parmelia pilosella*

laevigata

Sticta fuliginea (thalle très ridé)

Leptogium caninoides

Cladonia digitata

Cladonia ?

Cladonia furcata

Mousses : *Dicranum scoparium* f.

Polytrichum formosum

Hépatique : *Stegaria furcata*

Plagioclypeus squarrosus

Eurynotum *Stohrii* *Comptosia* *flexuosa*
fracturum *longipes*
Rhacomitrium heterostichum.
 Et parmi les hepatices.
Spacaria usupurata
Diplophyllum albicans

17. Decembre 1953.

Asplenium ruta muraria sur un mur eglise
 de La Foudre.

20 Decembre 1953.

Bois du Relecq.

<i>Gonia lubrica</i>	1.	
<i>Lactaria blennius</i>	3	sous hêtre
<i>Hypnum repandum</i>	2	
<i>Conocephalum virens</i>		
<i>Corticia clathrata</i>	1	
<i>Lactaria vellerea</i>	1	
<i>Omphalium acicula</i>	1	
<i>Panicum campanulatum</i>		
<i>Clypeus cyathiformis</i>	1	
<i>Hypnum subulatum</i>	1	
<i>Rhizidium foveolatum</i>	1	
<i>Galium sphagnorum</i>	pl.	
<i>Boletus ^{subulatum} spontaneus</i>	1	
<i>Laccaria lacata</i>	pl.	
<i>Tricholoma</i>	2	
<i>Clypeus</i>	2	
<i>Polystichum perennis</i>	2	
<i>Monarda guineensis</i>	1	f. blanda

Vallée de Moulins Quevenet. Plouneour.

Reconnu dans le massif

Lichen. *Endocarpon flaviviride* = *Dumatoconyon*.

Mousse *Fontinalis antipyretica*.

Hepatique: *Stapania undulata*

Calypogeia trichomanis

Les bords.

Mousse: *Mnium hornum*.

Autocomnia palustre

Pterogophyllum lucens fr.

Sur les rochers.

Lichen: *Parmelia conspersa*.

Mousse *Rhacomitrium lanuginosum*.

" *protussum*.

Sur les rochers mouillés. *Polytrichum juniperinum*.

Lichens: *Parmelia pilosella*

laevigata.

Sticta fuliginea (Halle l'india).

Peziza canina.

Cladonia digitata.

Cladonia ?

Cladonia furcata.

Mousses *Dicranum scoparium* fr.

Polytrichum formosum

Hepatique. *Stegaria furcata*.

Plagiocladus spiralis.

25 Décembre 1953.

Forêt du Fréau en Poulasour.

Hypotrachyna fasciculata
substantivum

Cephaelotes nullo Polyporus
Lactarius dryosporus jaune lentement

Collybia dryophila

Coryzites sp. Hispania

Trametes sp.

Dothiorella pubescens

Sophocoles bicinctata

Calypogeia trichomanis

Fruticaria dilatata

Les spores sont oblongues et
certaines légèrement en croissant
le chapeau n'a pas été un
peu plus en cloche que pour
dans l'année

sur fontaines
sur roche et mousses



Uromyces rubiginosa

Lamella capitata

physodes

verigata

Fontinalis squamosa - herbe dans une petite cascade

Misium punctatum

undulatum

Eurocladium striatum?

Hypnum splendens

Schroberi

Phragmium tamaricinum

Platyochyllum lucens

Hylocomium loreum

biquetrum

Solystichum formosum

Fissidens

Dicranum scoparium

Hylocomium brevirostre

27 Décembre 1953.

Ancienne gare de Plouzan.

sur touche de fusiliers : *Flammula garrulosa*

Polyporus adustus

sur murs et falaises

Barbula muralis

Mur

Lamella capitata

unquiculata

H.

clavellii

sur mur

Hypnum parvum

cupesiforme

Cladonia rangiformis

Eurocladium otokewi

Phragmium tamaricini

Barbula fallax

H.

Hypnum splendens

Fal. *Homalothecium sicicum* H.

Solystichum filiferum

Fruticaria tamaricini cf. *H. cupesiforme*

31 Décembre 1953. Balie au mont 1 sp. de *Morchella vulgaris*

qui vient de lui être apporté d'un jardin de Kernegis.

Coat-Congar. Plouzan.

Lepillus atrotomentosus

Dothiorella variabilis

Russula ochroleuca

" *cinctica*

Lactarius blennius

Lamellis trichotera
claudii
reticulata : *strata*
subia ? } sur Hêde.

1 Janvier 1954.

Dunes de Roscoff à Santez

Geopodium coulinae . abondant par place
Rhodopanelles sordidus . c.
Psalliota bernardi . c.
Lametes campanulatus . ici et là sur coques
galus .
Nolania . c.
Tetraspora mammosa . c par place
Collybia velutipes . Houffe sur rogne
Polbitus rufellus . 2 spécimens
 des champignons blanchâtres
 ayant l'allure de *Melanoleuca* .
Psilocybe amospiata . Pc.
Barbula muraliformis . ccc.
Bryum pendulinum . c.
Hypnum cupressiforme . Pc
Prachytium albicans . c.

Bruant de neige . 1 en bordure de dunes
 plage du Saut à Roscoff.
 1 autre idem plage de l'Hotel
 du quai Stream à Santez

Joseph en avait vu aussi à Yeu une quinzaine
 à St. Eabu.

2 Janvier 1954.
Trézier : Phare et cap Corseu.

Dunes : *Barbula muraliformis*
 " *fallax*
 " *fulvum*
 Talus : *Dicranum scoparium*
Barbula unguiculata.

Dunes : *Cladonia rangiformis* AC.
 Talus : *Peltigera canina* . AC
polydactyla c.

Lametes campanulatus
Hygrophorus conicus
Eutoloma ? 1
Psalliota ?

Corbeaux Choues nombreux au dessus de maisons
 de Sigeus.

10 Janvier 1954.

Marais et lande à Lhuis de Foulcoat Plouguen

Boletus quieti : 1. sous Lhuis.
Collybia rancida 1 sous Lhuis.
Nematoloma (diposum?) sur sphériques.
Boletus borvini qq trichus sous Lhuis.
Nolanea ? 1. lande.
Nolanea mammosa ? 1 lande.
Lepus atroquamosus ? touc. sous Lhuis.

Hypnum rubellum
Hypnum stellatum avec *Aureus fungosus*
 + *Fissidens arisantoides*
Hypnum squarrosum
Hypnum cuspidatum avec *Aureus* et *Fissidens*
Hypnum verrucosum (avec *H. stellatum*)
Hypnum scorpioides var *fulvaceum* (?)
Hypnum furum
Dicranum scorpiarium } avec *calypogea*
Aulaacomnium palustre souvent avec *Dicranum*
Leucobryum glaucum
Hypnum mollescens avec *Aureus* et *Fissidens*
Bryum plurivittatum
Fissidens polyphyllus

Calypogeia trichomanis sur *Alacomnium*
Hypnum furum sur *Empetrum fruticosum*
sur troncs de pins

Parmelia caperata
 " *trichotoma*
 " *directa*
 " *revoluta*
 " *tubulosa*
Usnea hirta
 " *rubiginosa*

sur quartz dans la lande

Parmelia fuliginosa
Campopletes fragilis
Polytrichum fulvum

dans la lande clauque seini. sur un os de sternum.
Weberia nuda sur un os de sternum.

au pied d'un talus en bordure d'un talus

Thuidium tamariscinum avec
Alacomnium et *calypogea*
Hypnum Schuberi
cepensiforme
Pterogoplyllum lucens
Mnium hornemannii
 " *subglobosum* (?)
Empetrum fruticosum
Hypnum corolifolium
Calypogeia trichomanis
Hieracium polytrichum
Thuidium tamariscinum
Endrostochium templetianum

17 Janvier 1954.

Dunes de Kenic en Bonivaz. Cochet

Asaphoglossum luteo album
Selagin nigricans sous la palud.

Anastylis elialis } sur branches de Pin.
Xanthoria parietina }

Cladonia rangiformis
Colluria fulvopurpurea } sur le sable de la Dune.

Cladonia rangiformis
Cladonia furcata

Duphalia pygidata
Duphalia thomae (?) } dans vallonnements abrupts
Pulmonaria macrantha } parmi *Barbula muralis*
Euroleia ampullifera } formis.
Psidium campense (?)

Barbula muralis } sur joints de pin d'un front
Bryum capillare } dans la dune.

Quinnia fulvibrata var *longipila* fr. } sur bloc de
 " *apocarpa* fr. } rocher dans
Barbula muralis fr. } la Dune.
Barbula fallax
Microstromum (?)
Xanthoria parietina
Ramalina
Leptodermis aquila

Barbula muraliformis
Procladonia albicans dans le dum.
Barbula subulata
 " *fallax*
Przyrhus pendulum

Hypnum cupressiforme sur fûtes.

Hypnum cuspidatum var
Hypnum polygamum / *lapidum*
Przyrhus speciosus / *triputum*
2 subgenus (var. *montana*?)
Hypnum prunum

} bord d'un fossé de drainage dans le dum.

25 janvier 1954.

Ulex H. francos

Fomes fomentarius.

Bois de la hallette

Proletus chrysenteron nombreux
Microgaster gemmatia 4.
Dryocetes hydrophilus
Clitocybe subperidoniiformis 3
Cantharellus rubescens 1.
Collybia butyracea 1

sur Nêves :

Parmelia caperata
pellata ?
trichostema ?
capitata ?

Thuidium Faurianum
Leucocarpum strachan
 " *Stoddesii*
Dicranella heteromella
Loganella albida
Hypnum cupressiforme
Hypnum boninense
 " *rostratum*

Leucocarpum myosuroides
Leucocarpum glaucum
Prunella ?

8 avril 1954.

trouvé à Remungol sur le tronc d'un chêne à gauche de l'église *Leptodon Smithii* (Horn) abondant et pour la 1^{re} fois.

11 avril 1954.

la fleur sur le dum de 'Toul au gou' en
 Coeur de : *Polypodium* : *dumense* (?) rose
Bellis perennis, *Trisaxium* des lions,
Asperula tridactyla, *Draba verna*.

9 avril 1954.

2 *trichostema georgii* trouvé sur *Lyda* dans
 l'allée de Lannidy. Ce sont les premières et
 depuis sur ces allées (16 avril), autres très
 ke : foie, associée.

19 avril 1954.

Marais de Menaonezan: 1 nid de Coucou
avec 4 œufs.

Réculte dans le marais plusieurs exemplaires
de *Hibula fulvosa* (Champignons)

23 avril 1954.

Rubia perigrina commun dans le bois de
Pin à Moulins-Mer en Coponne-Dorval.

19 avril 1954.

Dunes de St Monquent Landédu -

Arenaria arenaria

Eryngium compositum rosette.

Euphorbia portulacica fl.

Geranium molle fl.

Matthiola binnata

Bellis perennis fl.

Lampyris des levis fl.

Carex arenaria

Lotus corniculatus

Ranunculus bulbosus fl.

Hibos. arvensis fl.

Erodium cicutarium fl.

Plantago lanceolata

Chrysium hirta

Trifolium repens fl.

Cerastium tetrandrum fl.

Cardus marianus

Urtica urens

Quercus agrifolia

25 avril 1954.

Dun de Toul au goué Coqueuc

Les uns une moule

ni un *Psilocybe amorphus*.

16 Mai 1954.

Dun de Toul au goué Coqueuc

Les uns une moule

plusieurs autres *Psilocybe amorphus* et
autres dans la partie sous l'île Blanche dans
l'agropuratum.

21 Juin 1954.

Orchis apifera: belle station sur les pelouses entre les

Pin entre la plage de Toul au goué et la route allant

au bord de Toul au Henry. à Coqueuc avec *Orchis*

pyramidalis, encore très florissante de 13 Juin 1955
filiale.

Orchis pyramidalis, cc. sur le bord de la route

et la forêt entre St Efflam et St Michel au goué

coû du bord.

Ruppia maritima, en nappe uniforme dans

au port de Coqueuc avec derrière la barrière de galets

Campylopus maritimus, c. sur cette barrière de galets

13 Juin 1954. Dunes de Hergellau. Hergellau.

ai recolté sur la mesure de la dune.
Calophaca fulgens = Pleurodictum fulgens.
Leptogium de Bonlieu noir.
Limonella phlegmaria. (determinata de Hergellau)

21 Juin 1954.

Les Hergellau de passage à Hergellau pour le concept. une dune.

Hippocrepis es. sur dune du Toulingent.
Isola forme hémisphérique, pointe fine à dunes
près de Kerloch Cornouailles.

Agrostis verticillata sur H. Rouff.
Gracilicollis, forme hémisphérique à dunes blanches.
petit dune longan et à dunes à Hergellau.

Trichomanes radicans près de Porsp.
à St. Hergellau.

Hieracium auratum: sur dune d'autre de la chapelle
près de Hergellau; si ce n'est
la chapelle de St. Hergellau.

Leptogium viviparum à Hergellau près de la
chapelle à un route de Porsp.

Malaxis palustris sur près de Hergellau de Hergellau
en Bloumeon Hergellau sur un Cyclopodium Hergellau.

Grammitis leptophylla retrouvée dans un
chêne creux au environs de Hergellau sur
le chêne.

Cotoneaster Lycopodium: en quantité dans
un grande propriété dépendant de Clohars:
Foussant et près de construction de cette localité
de Hergellau le Juin 1954.