

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- A. Chaigneau : Instructions aux bagueurs. Préface du Pr. Bourdelle ; Editions du Service de Recherches sur les Migrations, Muséum Paris.
- G. de Crousaz : Notes sur la pratique du baguage, dans le « Héron », journal des jeunes ornithologistes suisses.
- P. A. D. Hollom : Trapping Methods for Bird ringers. 1 brochure Sh. 2/6. British Trust for ornithology, 2, King Edward Street, Oxford - 1949.
- L. Lippens : Les oiseaux en Belgique - Chap. IV ; E. Vercrusysse - Vanhove ed. 167, Chaussée de Ghisteltes, Saint-André, Bruges.
- R.-M. Lockley et Rosemary Russel : Bird Ringing ; Crosby Lockwood, 39, Thurloe Street, London S W 7 - 1953.

NOTE SUR LA FLORE PHANEROGAMIQUE DES RIVES DE LA RIA DE L'ODET

D'après Bonnemaïson Picquenard et quelques observations personnelles, la flore phanérogamique de la ria de l'Odét n'a pas été étudiée dans son ensemble, le travail reste à faire. Nous nous bornons à donner ici quelques indications utiles pour entreprendre une herborisation plus complète.

L'Odét maritime, long de 16 km. de Quimper à son embouchure, nous présente une flore où se mélangent des plantes d'origines très diverses.

Nous pouvons distinguer trois sections dans son cours : de Quimper à la baie de Kerogan, la baie de Kerogan, la partie allant de la baie à Bénodet.

1. DE QUIMPER A KÉROGAN. — Il se développe sur cette section de la rivière un mélange de phanérogames halophiles et de phanérogames banales. Le long des quais et sur la parement du chemin de halage on voit des peuplements d'*Erigeron mucronatum* DC. (Asch.). Comme le faisait prévoir Lloyd, cette plante a pris une extension considérable. Par place on voit aussi *Cochlearia officinalis* L. var. *aestuaris* LLOYD, reconnaissable à sa grande taille, qui y avait été signalé par Bonnemaïson. Cette espèce endémique semble être ici à la limite de son aire.

Le long des berges, au-dessous du chemin de halage, il faut noter des peuplements importants de *Cochlearia Anglica* L. et de *Cochlearia Danica* L., disposés en rangées parallèles sur les bords des pelouses de *Glyceria maritima* (Huds.) Wahlg. A noter la présence d'un petit peuplement de *Tussilago Farfara* L. dans l'enceinte de l'Usine à gaz. Cette plante calcicole, bien que banale, n'est pas fréquente dans le Finistère.

2. LA BAIE DE KÉROGAN. — Cette baie, résultat de dislocations Post Eocènes, nous montre sur sa rive droite un vaste peuplement de *Zostera nana* ROTH. qui couvre les bancs de vase du Ledanou. Cette espèce a remplacé *ZOSTERA MARINA* L., là comme ailleurs ; on ne voit pas

ses bancs en voie de reconstitution. Cette population est surmontée de *Salicornia herbacea* L. qui marque la place de la slikke.

La petite plage située à droite du port du Corniguel a été étudiée en détail par Gravot et Picquenard qui ont décrit les associations à *Plantago maritima* L. et *Plantago coronopus* L.

La construction du port a modifié ces localités.

Non loin de là, à Keraval, à un niveau à peine supérieur à celui des Salicornes se trouve *Spartina stricta* ROTH. Cette plante a été signalée d'autre part par Picquenard sur l'autre rive de la baie, à Locmaria, à Kerogan et à Lanros.

Sur la rive gauche, nous avons noté la présence de *Bidens cernua* L., de *Narcissus pseudo-narcissus* L. et d'*Orchis laxiflora* LMK, dans les terrains humides, au Sud de Laniron. Plus loin, le long de la « plage des gueux », on peut voir aux environs de la fontaine une petite tourbière de pente peuplée d'espèces banales telles que *Anagallis tenella* L., *Eriophorum angustifolium* ROTH., *Hypericum Helodes* L., *Polygala depressa* WENDER., *Narthecium ossifragum* HUDS., *Drosera rotundifolia* L. et *Drosera intermedia* HAYNE. D'après Bonnemaïson, il existait au bord de la grève *Glaucium luteum* SCOP.

La présence d'une tourbière de ce genre au bord de la mer est une chose exceptionnelle dans nos régions.

3. LE COURS INTÉRIEUR. — Dans cette partie du cours se jettent les anses de Toulven et de Combrit. La végétation y est banale. Une note de Bonnemaïson signale la remontée de *Silene maritima* WITH. dans l'anse de Toulven, à Saint-Cadou. Cette espèce se retrouve aussi dans la baie de Kerogan.

Il faut noter aussi sur l'ensemble du cours de la rivière des formations du schorre avec *Obione portulacoides* MOQ., *Glyceria maritima* HUDS., *Aster Tripolium* L. A un niveau un peu supérieur, on trouve *Juncus maritimus* LMK et *Phragmites communis* L.

En résumé, l'Odet maritime est occupé par une flore halophile banale dont la répartition est à préciser, cette flore ne diffère pas de celle des estuaires voisins de la Bretagne décrits par R. Corillion.

A.-H. DIZERBO.

Bibliographie

- Bonnemaïson Th. : *Herbiers et manuscrits*, Bibliothèque de la ville de Quimper.
- Corillion R. : *Les halipèdes du Nord de la Bretagne*. Paris, Librairie Générale de l'Enseignement, 1953.
- Dizerbo A.-H. : *Les algues de la vallée marine de l'Odet (Finistère) et leur répartition*. Bull. Soc. Sc. Bretagne, t. XXV, 1950, p. 93-98.
- Gravot M. : *Etude des plantains de la flore armoricaine*. Thèse, Pharmacie, Paris Lefrançois, 1936.
- Picquenard C.-A. in Lloyd J. : *Flore de l'Ouest de la France*, Nantes Guist'hau, 1895, passim.