

de collier est fréquente chez les couleuvres de Fouesnant puisque sur seize sujets examinés :

- 7 possédaient un collier, complet ou incomplet mais bien marqué ;
- 8 ne présentaient aucun collier ;
- 1 était presque entièrement noir.

Cette couleuvre, tuée près de Beg-Meil, le 16 Octobre 1954, mesurait 86 centimètres. Le dos et les flancs étaient noirs parsemés de quelques gouttelettes jaunes et blanches ; le ventre, ardoisé, présentait les mêmes macules. Seuls le menton et les lèvres étaient franchement marqués de jaune pâle. Il semble que cette couleuvre puisse être attribuée à la variété *Natrix Ater*, décrite par ANGEL (Faune de France. Reptiles et Amphibiens, p. 141).

LA COULEUVRE LISSE OU CORONELLE (*Coronella Austriaca*).

Un exemplaire de cette espèce a été obtenu le 23 Juin 1954 à Creac'h-Keta, en Pleuven. Sa taille (0,63) dépassait le maximum généralement donné par les auteurs (0,60).

La faible taille de la Coronelle, sa couleur rousse, sa viviparité la font sans doute confondre avec la vipère.

Peu abondante peut-être, elle doit être cependant trouvée dans d'autres points du Finistère.

LA COULEUVRE VERTE ET JAUNE (*Coluber Viridiflavus*).

Un très bel exemplaire de Couleuvre Verte et Jaune a été obtenu au début de Mai 1954, à Lespont, en Fouesnant. Malheureusement cette capture n'a été sue que tardivement et ce sont des débris mutilés qui ont été examinés le 24 Mai. L'identification a été facile grâce à la couleur uniformément jaune de la face supérieure. L'origine de cette capture, faite par un groupe de cultivateurs, ne peut être suspectée, pas plus que la mensuration faite par un menuisier présent : 1 m. 42.

C'est donc pour Fouesnant la seconde référence concernant la Couleuvre Verte et Jaune.

L. MARSILLE.

NOTES ET FAITS DIVERS

Grive litorne baguée.

Pendant la récente vague de froid, notre collègue JEAN CORNEC, instituteur honoraire à DAOULAS, a découvert, le 20 février 1956, dans son jardin, une GRIVE LITORNE, *Turdus pilaris*, morte d'épuisement. Elle portait une bague norvégienne, STAVANGER MUSEUM NORWAY 735 120.

Le Museum de Stavanger vient de nous faire savoir que cet oiseau avait été bagué au nid, le 21 juin 1955, à LÖFALD, 63°6 N - 9°16 E, KINDAL, dép. NORDMØRE, NORVÈGE. Cela représente un port de bague de 8 mois et un déplacement théorique de 1.850 km. sw.

M. H. J.

Camp d'été à l'île d'Ouessant.

De nouveau cette année, nous comptons organiser, avec l'aide du Service départemental de la Jeunesse et des Sports et du Centre de Recherches sur les migrations (Museum National d'Histoire Naturelle), un camp de baguage et d'étude des migrations à Ouessant.

Dates : 31 Août au 15 Septembre.

Prix : environ 500 francs par jour.

Logement : à l'Ecole publique.

Dans notre prochain numéro nous reparlerons plus longuement de ce camp.

M. H. J.