

sais qu'on peut au moins le rencontrer, l'ayant capturé au filet japonais, le 11 Septembre 1959 à Etel.

Ma dernière découverte date du 29 Avril 1960 : il s'agit de la Locustelle tachetée. De ceux dont on dit qu'ils progressent en Bretagne, le Serin cini est à l'avant-garde : il fréquente Carnac assidûment. Le Bec-croisé des sapins a poussé ici son invasion l'an dernier et j'en ai capturé un au filet le 26 Août à Etel. Avec l'hiver, de nombreux Passereaux nous arrivent du Nord en abondance et variété, jusqu'au Bruant des neiges (21-11-1959).

Ce tableau d'un coin du Morbihan n'est pas complet. Il veut seulement tenter celui qui passe, lui suggérer de s'arrêter, pour mieux se renseigner et nous renseigner tous.

René BOZEC.

A PROPOS DU FAUCON HOBEREAU NICHEUR DANS LE FINISTERE

Depuis la parution de l'« Ornithologie de la Basse-Bretagne » en 1934, observations et informations nouvelles m'avaient donné la certitude de la nidification de *Falco subbuteo* dans la région des Monts d'Arrée à laquelle la note de M. Lucien KÉRAUTRET (« Penn ar Bed », n° 19, Déc. 59) vient d'apporter la preuve palpable.

Le 5 Juin 1938, me trouvant avec mon fils dans la partie de la « Montagne » comprise entre les routes Plounéour-Ménez - La Feuillée et Le Relecq-Berrien (Roc'h Feunteun), et nous étant assis au pied d'un bloc de quartzite, nous vîmes un Rapace, chassant en rasant la lande d'un vol rapide, venant de la direction de Botmeur.

Il vint à un moment directement sur nous et je pus apercevoir ses joues qui me parurent blanc-rougeâtre et comme il allait contourner notre rocher, il fit une volte-face soudaine, passa à deux mètres de nous poursuivant un gros insecte, nous montrant son dos d'un noir cendré. Plongeant serres ouvertes, il manqua sa proie, vire-volta à nouveau pour repasser à deux mètres au-dessus de nos têtes, découvrant ses dessous couverts de raies longitudinales noires, ses culottes et ses sous-caudales rousses et nous montrant ses larges moustaches noires. Aucune erreur d'identification ne pouvait être possible. Si nous interprétons l'observation KÉRAUTRET comme ayant eu lieu route Saint-Rivoal - Saint-Cadou à la hauteur de Roudoudersch, la distance à vol d'oiseau se trouve être de 11 kilomètres.

Le 8 Avril 1954, un Hobereau posé sur le bas-côté de la route Morlaix-Quimper, à proximité de la borne Morlaix 25 km, en pleine Montagne, s'envole au passage de notre voiture (la distance est cette fois moindre de 5 km).

Entre temps, un ami de Plounéour-Ménez me signalait en 1941 que parmi les œufs apportés par les enfants aux autorités chargées de distribuer des primes pour destruction de nuisibles, il reconnaissait au moins 3 espèces de Rapaces qu'à leurs descriptions je déterminais comme Buse, Epervier et Crécerelle, mais il ajoutait parmi ces derniers « œufs rouges » : « ... je ne sais pas si tous sont de la même espèce, il y a une différence de taille et les taches paraissent dissemblables ». La variabilité des maculatures sur l'œuf de la Crécerelle me fit à l'époque ne pas apporter une attention spéciale à ce propos venant d'un non initié.

Une observation plus curieuse est celle du 22 Février 1954, où un de ces Faucons fut vu posé au sommet d'un hêtre dans la région de Bezvon, en Lannéanou, quand on sait que tous les manuels s'accordent à considérer son arrivée en Europe en Avril-Mai.

D'autre part, je signalerai un envoi du Dr MARSILLE d'un mâle, tué au-dessus d'une lande à Penfoulc, en Fouesnant, le 21 Septembre 1938, dans la Coll. Lebeurier, n° 1224, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et la capture d'un autre mâle, tué le 24 Novembre 1957 à Keraël, en Botsorhel, par M. COZANET, de Morlaix, qui fut identifié par M. GOAZIOU, libraire, grâce à la planche du Gérondet, et qui me fut parfaitement décrit par la suite.

Nous pensons que des recherches suivies à la bonne époque dans les boisements de pins de la Montagne doivent mener à de nouvelles découvertes de l'espèce nicheuse.

Ed. LEBEURIER.