

La Mare de Vauville

par L. LECOURTOIS et A. TYPLOT

Conservateur : G. BÉGUIN, Equeurdreville.

Garde : E. RABASSE, Equeurdreville.

La création de cette réserve par la S.E.P.N.B. est toute récente : 1^{er} mai 1970. Nous remercions M. et M^{me} PELLERIN, les propriétaires, d'avoir bien voulu nous louer pour un prix quasi symbolique, les 30 hectares de la Mare et prés marécageux voisins qui présentent un grand intérêt biologique. Ceci nous a permis de créer une réserve qui doit être le premier pas concret dans la protection d'un site plus vaste : l'anse de Vauville-Biville dont l'important complexe dunaire s'étend sur 10 km entre le massif de la Hague au Nord et le massif de Flamanville au Sud.

La Mare provient de l'accumulation d'eau douce dans le creux des dunes, l'infiltration s'arrêtant au contact de la nappe phréatique salée qui occupe la profondeur des sables. La Mare de Vauville constitue un site botanique extrêmement intéressant par la richesse et la variété des associations végétales de l'hygrocère qui, ici, est particulièrement bien développée.

A partir de la pelouse sèche, on observe successivement :

- une pelouse humide à *Anthemis nobilis* où abondent *Trifolium fragiliterum*, *Agrostis alba*, *Erythraea pulchella*, *Juncus lamprocarpus*...
- d'énormes touffes de *Juncus acutus*
- une zone à *Heleocharis palustris*, contenant *Oenanthe fistulosa*, *Mentha aquatica*, *Veronica scutellata*
- une zone à grandes halophytes montrant une ceinture d'*Iris pseudacorus*, *Rumex hydrolapathum*, *Lysimachia vulgaris*, *Lythrum salicaria*, *Sparganium ramosum*, *Galium palustre*, *Carex riparia*...
- puis une ceinture caractérisée par la présence constante de l'eau libre, mais sous une faible épaisseur : *Scirpus lacustris*, *Polygonum amphibium*, *Typha angustifolia*, *Ceratophyllum*...
- dans l'eau libre et profonde : *Hydrocharis*, *Potamogeton*, *Ceratophyllum submersum*.

La mare attire de nombreux oiseaux : les Colverts, Sarcelles d'été et Grèbes castagneux y nidifient avec Poules d'eau et Foulques ; parmi les migrants, on note des Garrots, des Chevaliers, des Avocettes. Jusqu'ici, la pression cynégétique et le braconnage constituaient un danger permanent pour ces oiseaux. Maintenant, la réserve sera un bon refuge, mais pour une pleine efficacité, la protection devrait s'étendre à l'étroite bande dunaire qui sépare la Mare de la mer et qui, par ailleurs, complète indiscutablement l'intérêt botanique de la zone humide en montrant les flores typiques d'un bord de plage, d'une dune mobile et d'une dune fixée. Parmi les plantes les plus remarquables, citons : *Lagurus ovatus*, *Armeria plantaginea*, *Viola nana*, *Rosa pimpinellifolia*, *Veronica spicata* et *Asparagus prostratus*.

Malheureusement, cette bande dunaire, propriété communale, ne sera pas volontiers abandonnée des chasseurs locaux qui trouvent là trop belle occasion de tirer les oiseaux entrant ou sortant de la Mare. Sans doute n'ont-ils pas encore compris que les chasseurs doivent participer à l'efficacité des réserves, dans leur propre intérêt, pour sauvegarder l'avenir de la chasse.

D'autre part, le précieux tapis végétal dunaire subit de plus en plus chaque été les déprédations inhérentes au camping sauvage et à l'envahissement abusif par les automobiles. Récemment, la commune de Vauville a heureusement limité à une partie de la dune sa tolérance à cet égard. Espérons donc que la protection ainsi amorcée s'élargira et parviendra à sauver un remarquable ensemble tant apprécié des naturalistes et des touristes éclairés.