

LES CAMPS D'OUessant EN 1957

par A. LUCAS

En 1957, les camps d'Ouessant ont eu lieu du 23 août au 4 septembre et du 17 au 28 septembre. Comme les années précédentes ils ont été organisés par le C.R.M.M.O. (Museum de Paris) et le Cercle des Naturalistes du Finistère. (Voir au sujet de cette organisation le n° 9 de *Penn ar Bed*.)

Les participants étaient au nombre de 30 au premier camp, de 35 au second et parmi eux nous avons compté des ornithologues de différents pays : Mlle Durieux, MM. Simon et Roche (Belgique), MM. Naylor et Clapham (G.-B.), M. et Mme Queiroz (Portugal), M. Stjernstedt (Suède), M. L'Hardy (Suisse).

En plus du baguage et de l'observation des oiseaux, nous avons consacré une matinée à l'étude de la faune côtière, M. Gouygou nous a entrete nu de taxidermie, M. Guillou nous a fait le compte rendu du camp d'étude installé au Grand Paradis (Italie) où des jeunes naturalistes ont jeté les bases d'une action en vue de la protection de la nature. M. Pichot nous a projeté des diapositives en couleurs. Sur chaque espèce d'oiseau, M. Le Pape a effectué des prises de sang pour le docteur Undritz, hématologue de Bâle. Enfin nous avons eu la visite et les encouragements de M. Bouxin, sous-directeur du laboratoire de Concarneau.

Nous avons tenté d'inaugurer de nouvelles méthodes de captures (emploi du glycochloral et de pièges), mais sans succès. En particulier, M. Lalanne a monté un ingénieux piège à linottes et alouettes, tels que ceux qui sont efficacement utilisés dans les Landes, mais à Ouessant ce système n'a pas donné de résultats appréciables.

Aussi, comme les années passées, les captures ont eu lieu au phare (50 oiseaux) et surtout grâce aux filets japonais posés dans les grèves ou les vallées (1240 oiseaux).

Nous avons procédé à 661 baguages au premier camp et à 629 au second. Ce sont là des résultats globalement équivalents, mais pour certaines espèces migratrices, le nombre des captures a beaucoup varié d'un camp à l'autre comme le montre le tableau suivant :

ESPECE	Nombre de captures au premier camp	Nombre de captures au deuxième camp	
Hirondelle de cheminée	66	10	Migrateurs précoces
Phragmite des joncs	55	7	
Pouillot véloce	20	2	
Bergeronnette printanière ..	32	11	
Rouge-gorge	48	105	Migrateurs plus tardifs
Fauvette des jardins	9	24	
Pouillot véloce	2	23	
Bergeronnette grise	8	19	

Il est impossible de citer toutes les observations intéressantes et les prises remarquables qui se sont échelonnées au cours des deux camps, nous devons nous limiter aux principales. Ainsi le 18 septembre, l'équipe Erard trouvait dans ses filets un Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*), espèce américaine tout à fait accidentelle en France. On se souvient de la controverse qui eut lieu en 1955 au sujet de la détermination douteuse de cette espèce. Cette fois l'oiseau en question a été photographié, décrit, mesuré, bagué et enfin relâché. Six jours plus tard, nous l'avons revu en compagnie d'un Bécasseau variable sur la « palud » de Pern. Comme il est peu sauvage nous avons pu l'approcher de près et le photographe dans la nature. Ce fut là pour les ornithologues une scène vraiment inoubliable.



Cliché La Nature

Tournepierre en plumage nuptial, bagué à Ouessant

Mais le principal événement ornithologique est l'invasion de l'île par des espèces qui y étaient rares ou inconnues.

Rappelons que l'avifaune d'Ouessant est spéciale et que jusqu'ici les *Picidae* et les *Paridae* étaient ignorés et que les *Fringillidae* (sauf Linottes et Bruants) étaient mal représentés.

Or dès le mois d'août nous avons été frappés par l'abondance relative du Bouvreuil et les apparitions du Verdier, de la Mésange bleue et de la Mésange charbonnière.

Au second camp c'était les arrivées du Pic épeiche, oiseau tout à fait inattendu dans ce paysage sans arbres et du Tarin des aulnes, montagnard en précoce erratisme hivernal, tandis que les Mésanges bleues ne cessaient d'affluer (par exemple : 29 captures le 27 septembre).

Ces observations ont été heureusement complétées par celles qui ont été faites en octobre par M. Paul Malgorn, ornithologue ouessantien, que je cite :

« Une véritable invasion a eu lieu du 1^{er} au 10 octobre, avec un maximum d'oiseaux pendant la période du 3 au 8, puis le départ soudain le 10 octobre.

« La très grosse majorité des oiseaux étaient des Mésanges bleues, mais il y avait aussi des Gobemouches, des Pouillots, des Roitelets, des Fauvettes à tête noire, des Pinsons, des Rougegorges... Il y en avait partout, on les comptait par dizaines sur les arbustes et les roseaux.

« Dans la matinée du 7 octobre je suis allé à Pern pêcher à la côte et j'ai assisté à l'arrivée de Mésanges. Elles venaient en direction de l'ouest par groupes de deux à cinq. Quelques-unes se sont posées à quelques mètres de moi, sur les rochers. Elles progressaient ensuite par bonds en s'arrêtant souvent. J'ai pu en remarquer deux à trois dizaines en deux heures, sur cent mètres de rivage.

« Au même moment, M. Chalm pêchait à 1 ou 2 miles devant moi, au large de Pern. Il a vu plusieurs oiseaux s'arrêter sur son bateau et une Mésange bleue est venue s'agripper quelques instants à la ceinture d'un homme d'équipage.

« Le temps était beau, le ciel ensoleillé, les vents faibles et variables dominant de N.-W. »

J'ai tenu à citer intégralement ces observations remarquablement précises, car dans la relation de tels phénomènes la plupart des témoignages sont douteux par suite d'imprécision ou d'exagération.

**

Ainsi l'île d'Ouessant apparaît comme un observatoire incomparable pour l'étude des migrations régulières ou des invasions exceptionnelles. D'autre part en posant cette année 1290 bagues nous avons prouvé qu'il est possible d'y opérer des baguages massifs, même avec des moyens économiques et des installations éphémères.

Regrettons seulement que cette expérience soit limitée à vingt jours par an et souhaitons que le projet de station permanente de baguage aboutisse sans tarder. Nous sommes persuadés que l'île d'Ouessant connaîtra alors une activité scientifique de premier ordre.



Photo Stempell

Cliché La Nature

Phare du Créac'h la nuit

BAGUAGES RÉALISÉS AUX CAMPS D'OUessant 1957

	Phare	Filet
Fou de Bassan, <i>Sula bassana</i>		1
Râle d'eau, <i>Rallus aquaticus</i>		2
Grand gravelot, <i>Charadrius hiaticula</i>		5
Tournepipe, <i>Arenaria interpres</i>		24
Bécassine des marais, <i>Capella Gallinago</i>	1	
Chevalier guignette, <i>Tringa hypoleucos</i>		3
Bécasseau maubèche, <i>Calidris canutus</i>	5	
Bécasseau violet, <i>Calidris maritima</i>		1
Bécasseau variable, <i>Calidris alpina</i>		18
Bécasseau sanderling, <i>Crocethia alba</i>		2
Bécasseau rousset, <i>Tryngites subruficollis</i>		1
Phalarope à bec large, <i>Phalaropus fulicarius</i>	4	
Engoulevent, <i>Caprimulgus europæus</i>		1
Martin-pêcheur, <i>Alcedo atthis</i>		5
Huppe, <i>Upupa epops</i>		2
Pic épeiche, <i>Dendrocopos major</i>		2
Alouette des champs, <i>Alauda arvensis</i>		1
Hirondelle de cheminée, <i>Hirundo rustica</i>		76
Hirondelle de rivage, <i>Riparia riparia</i>		3
Mésange charbonnière, <i>Parus major</i>		2
Mésange bleue, <i>Parus cæruleus</i>		56
Troglodyte, <i>Troglodytes troglodytes</i>		10
Grive musicienne, <i>Turdus ericetorum</i>	1	32
Merle noir, <i>Turdus merula</i>	1	75
Traquet motteux, <i>Cyananthus cyaneus</i>	2	7
Traquet pâle, <i>Saxicola torquata</i>		10
Traquet tairier, <i>Saxicola rubetra</i>		3
Rougequeue à front blanc, <i>Phœnicurus phœnicurus</i>	2	3
Rosignol, <i>Luscinia megarhynchos</i>		8
Gorgebleue, <i>Cyanosylvia svecica</i>		4
Rougegorge, <i>Erithacus rubecula</i>	5	148
Rousserolle effarvatte, <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	7
Phragmite des joncs, <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	15	47
Fauvette à tête noire, <i>Sylvia atricapilla</i>		4
Fauvette des jardins, <i>Sylvia borin</i>	2	31
Fauvette grisette, <i>Sylvia communis</i>	2	41
Pouillot véloce, <i>Phylloscopus collybita</i>	1	24
Pouillot fitis, <i>Phylloscopus trochilus</i>	1	21
Pouillot siffleur, <i>Phylloscopus sibilatrix</i>		1
Roitelet huppé, <i>Regulus regulus</i>		4
Roitelet triple bandeau, <i>Regulus ignicapillus</i>		2
Gobemouche gris, <i>Muscicapa striata</i>	1	44
Gobemouche noir, <i>Muscicapa hypoleuca</i>	3	89
Accenteur mouchet, <i>Prunella modularis</i>		45
Pipit des arbres, <i>Anthus trivialis</i>	2	13
Pipit farlouse, <i>Anthus pratensis</i>	1	37
Pipit maritime, <i>Anthus spinoletta</i>		53
Bergeronnette grise, <i>Motacilla alba</i>		27
Bergeronnette des ruisseaux, <i>Motacilla cinerea</i>		3
Bergeronnette printanière, <i>Motacilla flava</i>		43
Pie-grièche écorcheur, <i>Lanius collurio</i>		2
Verdier, <i>Chloris chloris</i>		2
Tarin des aulnes, <i>Carduelis spinus</i>		3
Linotte, <i>Carduelis cannabina</i>		50
Bouvreuil, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>		7
Bruant jaune, <i>Emberiza citrinella</i>		40
Moineau domestique, <i>Passer domesticus</i>		95
Totaux	50	1 240

Total général : 58 espèces, 1 290 captures.