


## NOTES

## DEUX NOUVELLES ESPÈCES POUR L'AVIFAUNE DE BRETAGNE CAPTURÉES A L'ÎLE D'OUessant : CALIDRIS MELANOTOS ET MUSCICAPA PARVA

Le 21 Septembre 1959, en fin de matinée, un petit limicole très peu farouche picore dans les prés marécageux du fond de la vallée, à quelques dizaines de mètres de la plage où se perd le mince ruisseau de Pors Arland, sur la côte Est de l'île. Sans grande peine, il est rabattu vers l'un des réseaux de filets japonais qui barrent le petit vallon et capturé. Aussitôt dégagé des mailles, il se comporte comme un oiseau fatigué, baissant la tête, fermant les yeux. Ramené à la station, il s'avère après un examen approfondi que nous avons affaire au rare Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*), originaire de l'Alaska et de la Sibérie orientale très probablement et une femelle en raison de la taille. Une première série de photographies est prise, elles permettront ultérieurement à l'un de nous (JULIEN) de confirmer l'identification par comparaison avec les sujets de la collection du Laboratoire d'Ornithologie au Muséum National d'Histoire Naturelle.

Les dimensions prises au moment de la capture étaient les suivantes : aile, 125 mm ; culmen, 27 ; tarse, 27 ; écart entre la troisième et la deuxième rémige primaire, 9. Poids 40 grammes. Nourri toutes les deux heures d'environ 4 g de cœur de mouton et abreuvé convenablement, le Bécasseau tacheté, qui paraissait condamné quelques heures plus tôt, reprend en fin de journée quelque force. Il sera bague et relâché le lendemain près du port de Lampaul après un dernier et copieux nourrissage. Parti immédiatement vers la zone des roches découvertes par la marée et parsemées de flaques d'eau, il passera une dizaine de minutes à se baigner dans l'une d'elles, avec une application qui témoigne de sa vigueur retrouvée et sans se soucier aucunement du photographe qui parvient à l'approcher à environ un mètre. Le bain terminé, l'oiseau picore un peu avant de s'envoler et de disparaître dans les rochers. Dix jours plus tard, il était tué à Brucourt, sur les bords de la Dives, près de Caen (Calvados), à 375 km ENE d'Ouessant. Le chasseur ayant donné la patte et la bague à un excellent ornithologue de Caen, celui-ci, le Dr SIMON, les apporta au Centre de recherches sur les migrations.

Cette capture est la seconde pour la France, la première avait eu lieu également dans le Calvados, à Sallenelles, à moins de 10 km WNW de Brucourt. Une référence existe pour les îles anglo-normandes, à Jersey, vers 1875 (Alauda, XVII-XVIII, 1949-1950, 2, p. 85).



Le Bécasseau tacheté

Photo R. Stempell



Le Gobe-mouches nain

Photo P. Le Caro

L'autre prise se rapporte au Gobe-mouches nain (*Muscicapa parva*) dont les lieux de reproduction s'étendent de l'Europe centrale et la Baltique aux confins de la Sibérie et de l'Iran, mais qui habituellement va hiverner dans la partie occidentale de l'Inde. On n'en connaît que trois captures en France, trois autres dans les Iles anglo-normandes et aucune en Bretagne ; la plus proche étant celle effectuée près de la station ornithologique de Jersey par nos amis, M<sup>me</sup> F. LE SUEUR et M. E. D. H. JOHNSON, le 18 Septembre 1958 (Bull. Société Jersiaise, 1959, p. 222).

Notre oiseau, un immature aux grandes couvertures alaires frangées de roux et avec des liserés brunâtres à la poitrine, dont la capture a eu lieu le 20 Septembre 1959, mesurait environ 107 mm, aile pliée 64, culmen 9,5. Il a été relâché bagué.

M.-H. JULIEN, Ph. LE CARO, P. MALGORN.

#### OBSERVATION DU GOÉLAND PYGMÉE

Le 13 Septembre 1959, vers 16 h. 30, j'ai été surpris par la petite taille d'un laridé survolant le terrain des sports de Founesnant. Je n'ai vu l'oiseau que quelques secondes, avec un éclairage médiocre, mais j'ai nettement distingué des rémiges noires, une bande sombre en diagonale sur l'aile, une barre noire à la queue. La taille réduite de l'oiseau permet d'éliminer la Mouette tridactyle. Il s'agit sans aucun doute d'un immature de Goéland pygmée.

Cette espèce se rencontre de temps à autre dans le Sud-Finistère : 14 Décembre 1927 et 19 Mars 1932 (Baie de Concarneau) ; 15 Février 1951 (Marais de Moustierlin).

Dr MARSILLE.