



Le Gobe-mouches nain

Photo P. Le Caro

L'autre prise se rapporte au Gobe-mouches nain (*Muscicapa parva*) dont les lieux de reproduction s'étendent de l'Europe centrale et la Baltique aux confins de la Sibérie et de l'Iran, mais qui habituellement va hiverner dans la partie occidentale de l'Inde. On n'en connaît que trois captures en France, trois autres dans les Iles anglo-normandes et aucune en Bretagne ; la plus proche étant celle effectuée près de la station ornithologique de Jersey par nos amis, M^{me} F. LE SUEUR et M. E. D. H. JOHNSON, le 18 Septembre 1958 (Bull. Société Jersiaise, 1959, p. 222).

Notre oiseau, un immature aux grandes couvertures alaires frangées de roux et avec des liserés brunâtres à la poitrine, dont la capture a eu lieu le 20 Septembre 1959, mesurait environ 107 mm, aile pliée 64, culmen 9,5. Il a été relâché bagué.

M.-H. JULIEN, Ph. LE CARO, P. MALGORN.

OBSERVATION DU GOÉLAND PYGMÉE

Le 13 Septembre 1959, vers 16 h. 30, j'ai été surpris par la petite taille d'un laridé survolant le terrain des sports de Fouesnant. Je n'ai vu l'oiseau que quelques secondes, avec un éclairage médiocre, mais j'ai nettement distingué des rémiges noires, une bande sombre en diagonale sur l'aile, une barre noire à la queue. La taille réduite de l'oiseau permet d'éliminer la Mouette tridactyle. Il s'agit sans aucun doute d'un immature de Goéland pygmée.

Cette espèce se rencontre de temps à autre dans le Sud-Finistère : 14 Décembre 1927 et 19 Mars 1932 (Baie de Concarneau) ; 15 Février 1951 (Marais de Moustertlin).

D^r MARSILLE.