

3) Résultats obtenus :

En un an, nous avons bagué 300 chauves-souris. Nous avons enregistré 6 reprises :

1° Un grand rhinolophe fer à cheval (*Rhinolophus Ferrum Equinum*), bagué le 8 mars 1953 en Ergué-Gabéric sous le numéro ZC 3.098, mâle, retrouvé le 5 juin 1953 à Plomodiern (Finistère), donc 4 mois après. Distance parcourue : 26 kilomètres.

2° Un grand rhinolophe fer à cheval, bagué le 8 mars 1953 en Ergué-Gabéric, sous le numéro ZC 3.087, mâle, retrouvé le 22 août 1953 à Kerfany-les-Pins, en Moëlan-sur-Mer (Finistère), donc 6 mois après. Distance parcourue : 32 km.

3° Un grand rhinolophe fer à cheval bagué le 8 mars 1953 en Ergué-Gabéric sous le numéro ZC 3.071, mâle, retrouvé le 8 octobre 1953 à Elliant, donc 8 mois après. Distance parcourue : 10 kilomètres.

4° Un grand rhinolophe fer à cheval, bagué le 11 novembre 1953 en Lothey (Finistère) sous le numéro ZA 937, mâle, retrouvé le 17 décembre 1953 en Ergué-Gabéric, donc 1 mois après. Distance parcourue : 24 kilomètres.

5° Un grand rhinolophe fer à cheval, bagué le 8 mars 1953 à Ergué-Gabéric, sous le numéro ZC 3.134, retrouvé le 1^{er} janvier 1954 à Melgven (Finistère), relâché le 2 janvier à Melgven. Contrôlé le 26 décembre 1953 en Ergué-Gabéric, il a donc fait le trajet de 18 kilomètres dans un maximum de 5 jours.

6° Un grand rhinolophe fer à cheval, mâle, bagué jeune (ZC 9.327) à Kerdévot (Ergué-Gabéric), le 16 décembre 1953, retrouvé à Locmaria (Ergué-Armel), le 31 janvier 1954. Déplacement intéressant par son caractère hivernal. Distance : 13 km.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE :

CASTERET : Profondeurs (II^e partie, ch. IV). Perrin.

CASTERET : Une vie de chauve-souris. Didier.

CASTERET : L'étrange peuple des chauves-souris. In Science et Vie.

HAINARD : Cheiroptères in Mammifères sauvages d'Europe. Delachaux et Niestlé.

RODE : Les chauves-souris de France. Boubée.

LA COULEUVRE VERTE & JAUNE Dans le Finistère

En juillet 1953 une belle couleuvre de 1 m, 12 de long est tuée à Kersinaout, en Fouesnant. L'aspect de celle-ci étonne l'auteur de la capture et ses voisins ; ils n'ont jamais vu un serpent avec ces parties supérieures sombres, presque noires, semées de la tête à la queue de petits points ou traits jaunes bien en ligne. De plus le ventre est entièrement jaune.

Le sujet m'est présenté. J'avoue mon incompetence et adresse la couleuvre à M. Lebourier, naturaliste connu, de Morlaix, qui nous en donne l'identification : il s'agit d'une espèce méridionale, la couleuvre verte et jaune (*Zamenis viridiflavus* — Lacep).

Informé de cette capture, M. H. Saint-Girons, herpétologue, habitant Puceul (L.-I.), écrit : « Ce serpent a déjà été trouvé aux environs de Vannes. Cette capture de Fouesnant donne une localité nouvelle et confirme de façon indiscutable la présence de la couleuvre verte et jaune sur la face méridionale de la Bretagne. Il s'agit là d'un habitat résiduel à la suite d'une période xéothermique postglaciaire. Il est néanmoins curieux de constater que dans le Morbihan la couleuvre verte et jaune — qui est absente de la Loire-Inférieure — cohabite avec *Vipera berus*, serpent septentrional, et non avec *Vipera aspis*, serpent méridional que l'on trouve en Loire-Inférieure. »

Il serait donc intéressant dans les années à venir d'étudier de près les serpents du Finistère et de la Cornouaille en particulier. Le Cercle Naturaliste du Finistère me paraît tout désigné pour mener à bien cette enquête.

D^r L.-A. MARSILLE.