

NOTES ET FAITS DIVERS

NOTES D'HERPÉTOLOGIE

En 1955 et 1956 j'ai identifié un certain nombre de serpents en provenance des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Pleuven, Clolus-Fouesnant et Ergué-Armel.

LES VIPÈRES. — Toutes les vipères examinées, une trentaine, étaient des *Vipères Pélade* (*Vipera Berus*) = Ecusson de trois grandes plaques sur la tête, œil séparé des labiales par une seule rangée d'écailles, museau non retroussé.

L'une d'elles présentait deux crochets venimeux à droite. Il s'agit là d'une disposition passagère, la dent en activité ne tombant qu'après la repousse de la dent de rechange.

Les trois plus forts sujets mesuraient 60,5, 60,3 et 60 centimètres : la longueur de la queue était respectivement de 6, 6,6 et 6 centimètres, c'est-à-dire inférieure à celle que j'avais indiquée dans une note précédente. En réalité il s'agissait ici de trois femelles, portant des œufs. La queue est plus longue chez le mâle sur qui j'ai trouvé les chiffres de 8,5, 8 et 7 centimètres pour des longueurs totales de 58,3, 57,5 et 54 centimètres.

La coloration de la face supérieure était assez constante : grisâtres à dessins noirs chez les mâles, brun-roux à dessins marrons chez les femelles. Par contre, la face inférieure était tantôt noire ou noirâtre tachetée de blanc, tantôt ardoisée, tantôt roussâtre.

Quelques autopsies ont confirmé que la nourriture des vipères se composait surtout de petits rongeurs : mulots, campagnols. Le nombre des œufs trouvés variait de 6 à 11. Une femelle du 2 Septembre 56 portait 9 œufs contenant des vipéreaux prêts de naître.

LES COULEUVRES. — La Couleuvre à Collier (*Natrix Natrix*) est très commune elle aussi sur le canton de Fouesnant. J'en ai examiné quelques-unes et constaté comme en 1954 que le collier jaune manquait sur la moitié des sujets. Cette absence de collier ne semble en rapport ni avec l'habitat ni avec l'époque de l'année. Peut-être l'est-elle avec l'âge, car ce sont surtout les sujets de forte taille qui en sont dépourvus, tandis que les couleuvres de moins de 75 centimètres présentent presque toujours le collier jaune, caractéristique de l'espèce.

La Couleuvre Lisse (*Coronella Austriaca*), déjà signalée à Pleuven en 1954, a été trouvée le 4 Août 56 à Kernoter, en Ergué-Armel, et le 21 Août 56 à Beg-Meil, en Fouesnant. Cette dernière mesurait 56 centimètres de longueur totale et 11,3 centimètres de queue. Elle présentait quatre rangées de petites taches brunes sur un fond roussâtre. Le ventre, à l'état frais, était rougeâtre avec des reflets dorés.

L. MARSILLE

Ces lignes font suite aux notes et articles suivants : La Couleuvre verte et jaune dans le Finistère (*P.A.P.* n° 2 1954), L'identification des Serpents (*P.A.B.* n° 6 1955), Les Serpents dans le Sud-Finistère (*P.A.B.* n° 8 1956). Ils correspondent à l'enquête n° 6 de *Penn ar Bed* menée par le Docteur Marsille, à Fouesnant. Nous demandons à nos lecteurs de lui envoyer leurs observations et si possible de lui faire parvenir leurs captures. L'intérêt pratique d'une telle enquête est évident, mais pour que les résultats soient généralisables il faut un important réseau d'observateurs. Et surtout que chaque observateur n'omette pas de signaler le moindre renseignement.

(N.D.L.R.)

ACTIVITÉ NOCTURNE DES LARIDÉS

Le 5 Novembre 1955, à 2 h. 30, tandis que trois chalutiers déchargeaient leur poisson à la Criée de Concarneau, un certain nombre de Mouettes rieuses (*Larus ridibundus*) allaient et venaient le long de ces bateaux, pêchant comme en plein

jour.

Il semble, d'après une enquête sommaire, que le fait soit habituel.

Peut-être serait-il intéressant d'approfondir cette activité nocturne des Laridés et de rechercher les « stimuli » qui font quitter aux oiseaux leurs dortoirs : arrivée des chalutiers dans le bassin, éclairage de la criée, bruits des treuils... ?
L. M.

MOUETTES MELANOCÉPHALES BAGUÉES

Lecteur assidu de *Penn-ar-Bed*, je pense qu'il est intéressant de communiquer les reprises suivantes opérées à Méze, sur les rives de l'Etang de Thau (Hérault), dans la 3^e décennie de Novembre 1954.

J'attendais d'avoir des renseignements précis à ce sujet, ceux-ci ont tardé, les oiseaux ayant été tous deux bagués en Russie.

Il s'agit de Mouettes mélanocéphales « *Larus melanocephalus* » baguées au nid le 24 Juin 1954 à la réserve de l'Île d'Orlov, 46° 17' N — 31° 45' E dans le golfe de Tendrowsk en Mer Noire (U.R.S.S.), par les « Services du Bureau de Langage de Moscou ».

Ces deux mouettes portent les bagues : MOSKWA E 341400 et MOSKWA E 337147.

J'avais eu quelque peine à identifier avec exactitude ces deux mouettes et je les aurais facilement confondues avec des Mouettes rieuses sans l'appui du « Guide des Oiseaux d'Europe » de Peterson. Leurs lieux de nidification se trouvent dans le désert de Gobi et sur les rivages de la Mer Noire et de la Mer Egée, aire de reproduction par conséquent assez restreinte au point de vue géographique.

Il est absolument normal qu'elles aient été capturées à leur passage sur les rives des étangs littoraux bordant la Méditerranée à Méze (l'antique Mézua de Pomponnius Mela).

En automne et en hiver elles se répandent d'ailleurs dans toute la Méditerranée et même jusqu'au Golfe de Gascogne, tandis que par le Dniepr, les Marais du Pripet d'autres oiseaux de cette espèce gagnent la Baltique, la Mer du Nord, la Manche et même l'Océan Atlantique puisque l'une d'entre elles baguée MOSKWA E 175065 a été capturée à quelques milles à l'Ouest de Belle-Ile (Morbihan) fin Novembre 1949 (baguée également à l'Île d'Orlov, le 2 Juillet 1949).

Personnellement très heureux de communiquer ces renseignements à tous les lecteurs de *Penn-ar-Bed* j'ai été doublement satisfait puisque ces deux spécimens sont venus enrichir les vitrines de ma collection ornithologique qui, bien qu'à ses débuts, compte à présent plus de cent spécimens différents.

A. FRAISSINET, *Instituteur à Méze.*

Oiseau bagué.

Le 23 Février 1956, un ETOURNEAU (*Sturnus vulgaris*) était trouvé mort à Quessant. (Reprise signalée par le C^t Paul Malgorn.) Nous venons d'apprendre qu'il avait été bagué jeune le 9 Juin 1955 à la Réserve de Pouscha Bétovetskaja : 52° 33' N / 23° 40' E, à 60 km. au Nord de Brest-Litovsk, U.R.S.S. ; port de bague : 8 mois 1/2 — distance théorique parcourue : 2.100 km. W.S.V.

M.-H. J.

AVIS

— M. Maillat, Sous-Directeur de la Station biologique des Eyzies (Dordogne), désire se mettre en rapport avec des zoologistes finistériens ayant étudié ou récolté des Hemiptères homoptères (en particuliers Jassides ou Cicadelles).

— Nous rappelons que M. Tourseiller, 156, boulevard Montparnasse, Paris, XIV^e, cherche à prendre contact avec des Algologues.

Les Gérants : Michel-Hervé JULIEN & Albert LUCAS.

Dépôt légal : 1^{er} Trimestre 1957.

IMPRIMERIE DU CAP-HORN — 16, rue de Pont-l'Abbé, QUIMPER.