

Activités de la Station et des Stages ornithologiques d'Ouessant en 1960

par Michel-Hervé JULIEN

Bien que le chiffre des baguages et des reprises effectués à Ouessant et dans les archipels voisins ait légèrement diminué en 1960 par rapport à 1959 (3.335 contre 3.854), les activités de la station ont été très satisfaisantes tant dans le domaine de l'observation que dans celui du baguage. La légère régression du nombre des captures provient essentiellement de la diminution des opérations de baguage au nid décidée à la suite de la mise en réserve d'un certain nombre d'îlots ; par ailleurs les conditions météorologiques peu favorables lors de certains stages n'ont pas permis d'augmenter le chiffre des oiseaux bagués au filet qui est demeuré à peu de chose près celui atteint en 1959. Cependant le nombre des espèces baguées est passé de 87 à 94.

La Station a fonctionné durant un mois au printemps (M. Christopher CLAPHAM), deux semaines à Noël (équipe dirigée par M. Joël MATHEZ) et quelques jours en été (équipes dirigées par MM. Philippe LE CARO, C. CLAPHAM et M^{lle} Claude BRULEZ) avant les stages traditionnels qui se sont tenus du 3 au 14 Septembre et du 17 au 28 Septembre groupant à eux deux près de cent participants. Des baguages ont en outre été effectués dans l'archipel de Molène par MM. Jean-Marie BOURDON, Serge BOUTINOT et Jean PILVIN et à Ouessant par le Ct Paul MALGORN, MM. Jean LUCAS et Jean-Louis MINIOU. Remercions ici tous ces dévoués ornithologues ainsi que les chefs d'équipe des différents stages qui ont permis à la Station de fonctionner durant une période nettement plus étendue qu'au cours des exercices précédents. Le tableau ci-après donne le nombre d'oiseaux bagués sur l'île proprement dite et dans les îlots des archipels d'Ouessant et de Molène entre le 1^{er} Janvier et le 31 Décembre 1960. La première colonne se rapporte aux baguages de poussins dans les nids, la seconde aux baguages d'oiseaux capturés (au filet, au phare, adultes sur leurs nids, etc...), la troisième donnant le total par espèce :

Pétrel cul-blanc, <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	»	1	1
Pétrel tempête, <i>Hydrobates pelagicus</i>	»	33	33
Puffin des Anglais, <i>Procellaria puffinus</i>	»	5	5
Busard des roseaux, <i>Circus aeruginosus</i>	»	1	1
Faucon crécerelle, <i>Falco tinnunculus</i>	»	3	3
Râle d'eau, <i>Rallus aquaticus</i>	»	18	18
Huitrier pie, <i>Haematopus ostralegus</i>	4	»	4
Grand Gravelot, <i>Charadrius hiaticula</i>	»	5	5
Gravelot à collier interr. <i>Charadrius alexandrinus</i>	2	»	2
Pluvier guignard, <i>Charadrius morinellus</i>	»	1	1

Tourne-pierre à collier, <i>Arenaria interpres</i>	»	7	7
Bécassine des marais, <i>Capella gallinago</i>	»	44	44
Bécassine sourde, <i>Lymnocryptes minimus</i>	1	»	1
Chevalier guignette, <i>Tringa hypoleucos</i>	»	7	7
Bécasseau maubèche, <i>Calidris canutus</i>	»	2	2
Bécasseau minute, <i>Calidris minuta</i>	»	1	1
Bécasseau variable, <i>Calidris alpina</i>	»	11	11
Phalarope à bec large, <i>Phalaropus fulicarius</i>	»	17	17
Goéland marin, <i>Larus marinus</i>	2	»	2
Goéland brun, <i>Larus fuscus</i>	75	»	75
Goéland argenté, <i>Larus argentatus</i>	158	»	158
Sterne pierregarin, <i>Sterna hirundo</i>	15	1	16
Sterne arctique, <i>Sterna macrura</i>	4	»	4
Sterne de Dougall, <i>Sterna dougallii</i>	18	1	19
Sterne naine, <i>Sterna albifrons</i>	1	»	1
Sterne caugek, <i>Sterna sandvicensis</i>	37	»	37
Petit Pingouin, <i>Alca torda</i>	1	»	1
Guillemot de Troïl, <i>Uria aalge</i>	»	2	2
Macareux moine, <i>Fratercula arctica</i>	6	1	7
Pigeon ramier, <i>Columba palumbus</i>	»	1	1
Tourterelle des bois, <i>Streptopelia turtur</i>	»	18	18
Coucou gris, <i>Cuculus canorus</i>	»	4	4
Engoulevent d'Europe, <i>Caprimulgus europaeus</i> ..	»	2	2
Martinet noir, <i>Apus apus</i>	»	1	1
Martin-pêcheur, <i>Alcedo atthis</i>	»	26	26
Huppe fasciée, <i>Upupa epops</i>	»	1	1
Torcol fourmilier, <i>Jynx torquilla</i>	»	1	1
Hirondelle de cheminée, <i>Hirundo rustica</i>	3	81	84
Hirondelle de fenêtre, <i>Delichon urbica</i>	»	1	1
Hirondelle de rivage, <i>Riparia riparia</i>	»	3	3
Loriot, <i>Oriolus oriolus</i>	»	2	2
Mésange charbonnière, <i>Parus major</i>	»	2	2
Mésange bleue, <i>Parus caeruleus</i>	»	2	2
Mésange noire, <i>Parus ater</i>	»	1	1
Mésange à longue queue, <i>Aegithalos caudatus</i> ..	»	5	5
Grimpereau des jardins, <i>Certhia brachydactyla</i> ..	»	3	3
Troglodyte, <i>Troglodytes troglodytes</i>	»	18	18
Grive litorne, <i>Turdus pilaris</i>	»	1	1
Grive musicienne, <i>Turdus ericetorum</i>	»	144	144
Grive mauvis, <i>Turdus musicus</i>	»	34	34
Merle à plastron, <i>Turdus torquatus</i>	»	2	2
Merle noir, <i>Turdus merula</i>	»	210	210
Traquet motteux, <i>Oenanthe oenanthe</i>	»	34	34
Traquet pâtre, <i>Saxicola torquata</i>	»	130	130
Traquet tarier, <i>Saxicola rubetra</i>	»	46	46
Rouge-queue front blanc, <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	»	30	30
Rouge-queue noir, <i>Phoenicurus ochruros</i>	»	2	2
Rossignol philomèle, <i>Luscinia megarhynchos</i> ..	»	9	9
Gorge-bleue, <i>Cyanosylvia svecica</i>	»	7	7
Rouge-gorge, <i>Erithacus rubecula</i>	»	405	405
Locustelle tachetée, <i>Locustella naevia</i>	»	4	4
Locustelle lusciniôide, <i>Locustella luscinioides</i> ..	»	1	1
Rousserolle effarvatte, <i>Acrocephalus scirpaceus</i> ..	»	27	27
Phragmite des joncs, <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	»	102	102
Hypolaïs polyglotte, <i>Hippolaïs polyglotta</i>	»	8	8
Hypolaïs icterine, <i>Hippolaïs icterina</i>	»	7	7
Fauvette orphée, <i>Sylvia hortensis</i>	»	1	1
Fauvette à tête noire, <i>Sylvia atricapilla</i>	»	24	24

Fauvette des jardins, <i>Sylvia borin</i>	»	105	105
Fauvette grisette, <i>Sylvia communis</i>	»	94	94
Pouillot véloce, <i>Phylloscopus collybita</i>	»	70	70
Pouillot fitis, <i>Phylloscopus trochilus</i>	»	84	84
Pouillot siffleur, <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	»	1	1
Roitelet huppé, <i>Regulus regulus</i>	»	5	5
Roitelet triple bandeau, <i>Regulus ignicapillus</i>	»	25	25
Gobe-mouches gris, <i>Muscicapa striata</i>	»	76	76
Gobe-mouches noir, <i>Muscicapa hypoleuca</i>	»	276	276
Accenteur mouchet, <i>Prunella modularis</i>	»	78	78
Pipit des arbres, <i>Anthus trivialis</i>	»	34	34
Pipit farlouse, <i>Anthus pratensis</i>	»	125	125
Pipit maritime, <i>Anthus spinoletta petrosus</i>	1	46	47
Bergeronnette grise, <i>Motacilla alba</i>	»	47	47
Bergeronnette des ruisseaux, <i>Motacilla cinerea</i>	»	14	14
Bergeronnette printanière, <i>Motacilla flava</i>	»	33	33
Pie-grièche écorcheur, <i>Lanius collurio</i>	»	1	1
Etourneau sansonnet, <i>Sturnus vulgaris</i>	»	3	3
Verdier, <i>Chloris chloris</i>	»	9	9
Chardonneret, <i>Carduelis carduelis</i>	»	4	4
Linotte mélodieuse, <i>Carduelis cannabina</i>	4	121	125
Bouvreuil pivoine, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	»	82	82
Pinson des arbres, <i>Fringilla coelebs</i>	»	15	15
Bruant jaune, <i>Emberiza citrinella</i>	»	88	88
Bruant des roseaux, <i>Emberiza schoeniclus</i>	»	4	4
Moineau domestique, <i>Passer domesticus</i>	»	15	15

Total : 94 espèces 331 3.024 3.355

Comme captures remarquables, relevons celles des deux Loriots, le 1^{er} Mai 1960 et le 1^{er} Septembre 1960 (au sujet de ce dernier, voir le § concernant les reprises) ; autres baguages intéressants : Pouillot siffleur le 26 Avril 1960, Busard des roseaux le 30 Août 1960, Fauvette orphée le 11 Septembre 1960 et Bécasseau minute le 21 Septembre 1960. A noter également l'importance du nombre des baguages de Bécassines des marais, de Rouge-gorges, d'Hypolaïs icterine et polyglotte, des Roitelets triple bandeaux dont 20 furent bagués en une seule nuit (23-24/10/60) par notre dévoué collègue, M. J.-L. MINIOU, Maître de Phare du Créac'h. Remarquons enfin la capture d'espèces rarement baguées : Pétrel cul-blanc (14/9/60), Pluvier guignard, Bécassine sourde, Sterne de Dougall, Engoulevent, Torcol, Grimpereau des jardins, Merle à plastron, Gorgebleue, Locustelle luscinoïde (4/9/60). L'observation la plus inattendue fut sans doute celle d'un Héron bihoreau, par M. Christopher CLAPHAM, le 29 Avril 1960.

REPRISES D'OISEAUX BAGUES

Liste établie dans l'ordre chronologique des reprises et faisant suite à celle du compte rendu 1959 (« Penn ar Bed », n° 20, 7^e année, Mars 1960, pp. 145-146).

Abréviations : pull. signifie bagué poussin ; imm. = immature ; ad. = adulte ; + = tué ; x = trouvé mort ; // = contrôlé ; Eq. = équipe.

Le numéro de bague suit le nom d'espèce.

Sauf indication contraire, il s'agit d'oiseaux bagués à Ouessant même.

26. Merle noir, *Turdus merula*, Paris GF 0289
imm. le 24-8-59, par Eq. GOURDEAU.
+ le 6-3-60 entre Landerneau et Guipavas (Finistère), 50 km E
27. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris DC 7303
pull. le 19-6-59 à Bannec, par Ph. MERVEILLEUX DU VIGNAUX.
+ le 8-3-60 à Porto (Portugal), 800 km SSW
28. Pétrel tempête, *Hydrobates pelagicus*, Paris JM 6170
ad. le 19-6-59 à Bannec, par Ph. MERVEILLEUX DU VIGNAUX
× le 17-8-60 à Saint-Nazaire, plage (Loire-Atlantique), 245 km SE
29. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris DD 6870
pull. le 17-6-59 à Keller, par le Cdt P. MALGORN.
// le 20-8-60 à Tour-du-Parc (Morbihan), 200 km SE
30. Lorient d'Europe, *Oriolus oriolus*, Paris
femelle le 1-9-60, par C. et F. BRULEZ et C. CLAPHAM.
// le 18-9-60, Ile d'Heligoland, 54.11 N/7.55 E (Allemagne), 1.050 km NE
31. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris DE 0353
pull. le 21-6-59 à Lytiry, par Ph. MERVEILLEUX DU VIGNAUX.
le 3-10-60 à Aveiro, 40.38 N/8.40 W (Portugal), 900 km SSW
32. Bécassine des marais, *Capella gallinago*, Paris GD 7669
ad. le 14-4-60, par C. CLAPHAM.
+ le 12-11-60 à Waringstown, 54.26 N/6.18 W, Comté de Down (Irlande du Nord), 700 km N
33. Merle noir, *Turdus merula*, Paris GD 7487
femelle imm. le 28-8-58, par Eq. MÉLOU.
× fin 12-60 à Salao-de-Cima, 39.41 N/8.17 W, Tomar (Portugal), 1.100 km SSW

Les reprises enregistrées en 1960 sont moins nombreuses que celles effectuées durant l'année 1959. Toutefois les quelques résultats présentés ici sont intéressants ; ainsi sont notés : la première reprise à distance d'un Pétrel tempête bagué en France ; la dispersion jusqu'au littoral portugais de Goélands argentés immatures ; la reprise en Novembre en Irlande du Nord d'une Bécassine des marais baguée à Ouessant en Avril (se trouvait-elle encore en Novembre dans sa patrie d'origine ? d'autres reprises d'oiseaux de cette espèce seront nécessaires avant de pouvoir formuler une quelconque hypothèse), le déplacement anormal vers le Nord-Est du Lorient contrôlé 17 jours après à la Station allemande d'Heligoland, alors que cet oiseau aurait dû se diriger vers le Sud-Est, enfin ces deux reprises de Merles noirs, oiseaux réputés sédentaires à Ouessant. Faut-il voir dans ces déplacements inattendus la conséquence de la surpopulation observée depuis déjà plusieurs années sur un territoire exigu d'un oiseau qui n'existe à Ouessant comme nicheur que depuis quelque 40 ans ? Un phénomène analogue semble affecter les Grives musiciennes (voir reprise n° 23, compte rendu 1959, « Penn ar Bed », 1960, p. 146).

En terminant ce compte rendu de la seconde année de fonctionnement de la petite Station ornithologique et biologique de l'Ile d'Ouessant, souhaitons que dans les prochaines années les ornithologues y séjournent de plus en plus nombreux et de plus en plus longtemps en dehors des stages d'été et notamment pendant les mois d'Octobre, Novembre et Février, mois au cours desquels l'aspect des migrations à Ouessant demeure presque inconnu.