


Fiches de Faunistique bretonne

HEXANCHUS GRISEUS Bonnaterre. GrisetHEXANCHIDAE



DESCRIPTION. — Requin caractérisé par ses six fentes branchiales latérales et son unique nageoire dorsale.

L'adulte mesure de 4 à 5 m., mais peut atteindre 8 m. Coloration brune ou grisâtre.

BIOLOGIE. — Vit en profondeur jusqu'à plus de 200 m. de fond. Carnassier se nourrissant de poissons. Ovovivipare.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE. — Espèce des mers tropicales et subtropicales. Dans l'Atlantique, on le trouve sur les côtes de Cuba, de Mauritanie, des Canaries, des Açores, de la Péninsule ibérique et jusque dans la Manche occidentale. Exceptionnel en Mer du Nord.

OBSERVATIONS. — Les côtes bretonnes et anglaises correspondent à la limite nord de l'espèce. DESBROSSES (Rev. des Trav. 11, p. 53, 1938) signale qu'« à l'entrée occidentale de la Manche, les jeunes effectuent deux migrations côtières : l'une en avril-mai, l'autre en novembre-décembre ». Cependant, ni LE DANOIS (Poissons de Manche occidentale, 1913), ni GADEAU DE KERVILLE (Faune de Normandie, 1897), ni Max POLL (Faune de Belgique, 1947) ne signalent le Griset. Dans le « Plymouth marine fauna », il est signalé une seule capture (femelle immature de 1 m 12, mars 1933).

Le « Télégramme » du 13 décembre 1952 publie la photographie d'un squalo de 6 m 50 et d'environ 500 kilos, ramené au port de Roscoff : il s'agit sans aucun doute d'un Griset. Sur les côtes méridionales de la Bretagne, GUÉRIN-GANIVET (1912) considère l'espèce comme « très rare » et ne cite qu'une capture au Croisic en 1885.

A. LUCAS.