

NOTES

NOUVELLES DONNÉES SUR LA RÉPARTITION DE TRITODYNAMIA ATLANTICA (MONOD)

Jusqu'à ces dernières années, ce Crustacé Décapode de la famille des Pinnotheridae n'était connu que des côtes africaines et de la région de Roscoff. On pouvait supposer que cette espèce était représentée par des populations séparées de la Manche au golfe de Guinée (Monod, 1956 et Bocquet, 1963). La découverte récente de cette espèce dans le bassin d'Arcachon (Salvat, 1962) a permis de renforcer cette hypothèse. Nous en apportons ici confirmation : quatre exemplaires de couleur beige (2 mâles et 2 femelles dont une immature) ont été dragués entre 10 et 20 mètres de profondeur, sur sédiment envasé au large de l'embouchure de la Vilaine et au Sud de l'île Dumet (1). Leur largeur et longueur céphalothoraciques sont respectivement (en mm), pour les mâles 8,2 - 5,1 et 7,5 - 4,8 ; pour la femelle mature 8,9 - 5, pour la femelle immature 5,3 - 3,6. Ces tailles coïncident avec celles notées par Bocquet, sauf en ce qui concerne la femelle immature. Il ne nous a pas été possible de préciser si ces individus étaient libres ou commensaux comme ils le sont dans la région de Roscoff.

A. LUCAS a également trouvé un individu femelle mature au Sud de la presqu'île de Plougastel dans un sédiment envasé intertidal. Sa coloration est orange et noir, ses largeur et longueur céphalothoraciques : 9,5 et 6,1 mm.

M. GLEMAREC.

NOUVELLES STATIONS DE SIPHONOCETES SABATIERI DE ROUVILLE

Cet Amphipode de la famille des Corophiidae habite, tel un Pagure, les coquilles vides de *Rissoa* et de *Bittium*, dont il prolonge l'ouverture d'un tube de vase et de fragments de coquilles agglomérées. Durant de nombreuses années, il n'est resté connu que de l'étang de Thau où il avait été décrit (1894). GAUTHIER l'a retrouvé en baie d'Alger (1942) également sur sable vaseux, et plus récemment CALLAME (1955) a noté sa répartition sur les côtes vendéennes en zone intertidale dans un sable fin légèrement envasé, au niveau des basses mers de mortes eaux. Dans un biotope similaire, nous avons retrouvé de nombreux exemplaires de cette espèce à la pointe de Penvis (presqu'île de Rhuy).

Dans le golfe du Morbihan, cet Amphipode habite un sédiment vaseux non exondable, où les coquilles vides de *Rissoa* et de *Bittium* abondent, c'est-à-dire à proximité des herbiers intertidaux de *Zostera nana* (le nombre d'individus est d'ailleurs fonction de la quantité de coquilles vides). Dans ces deux types de stations, la présence de *Siphonocetes sabatieri* est liée à celle de débris végétaux. Cette espèce possède donc une répartition méditerranéenne et lusitanienne.

M. GLEMAREC.

(1) Mission du « Kornog », avril 1962.

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

PONTE ET HIVERNAGE DES BATRACIENS (voir « Penn ar Bed », vol. 3, p. 110)

Ponte du Crapaud commun. — Je n'ai pu en 1962 constater personnellement aucun accouplement se situant en dehors de la période de ponte habituelle. Toutefois, plusieurs pêcheurs m'ont certifié avoir bien souvent découvert les années précédentes, dès février, des œufs dont la description