

Activités de la Station et des Stages ornithologiques d'Ouessant en 1961 - 1962 - 1963

par Michel-Hervé JULIEN

Le compte rendu suivant porte sur l'ensemble des travaux de baguage effectués à Ouessant ces trois dernières années, au cours desquelles a pris corps le vieux projet de création d'une station ornithologique, relancé en 1956 par un numéro spécial de « Penn ar Bed » (le n° 9 actuellement épuisé).

C'est en effet le 31 janvier 1961, au cours de la réunion d'un Conseil d'administration du Centre de Recherches sur les Migrations des Mammifères et des Oiseaux, qu'il fut décidé de proposer à la commission du Plan quadriennal d'équipement du Centre National de la Recherche Scientifique (1962-1965) la création d'une station ornithologique à Ouessant. Nous devons remercier ici le Professeur Pierre DRACH de la bienveillante activité qu'il a déployée pour assurer un heureux dénouement à cette affaire. Le projet était accepté quelques mois plus tard par le C.N.R.S., qui devait lui affecter un crédit de 500.000,00 F et l'inscrire dans la tranche 1964.

Les 14 et 15 septembre 1962, une commission composée du Professeur Jean DORST, alors sous-Directeur du Laboratoire de Zoologie (Mammifères et Oiseaux), de MM. Robert-Daniel ETCHECOPAR, Directeur du C.R.M.M.O. et Président de l'International Bird Ringing Committee, et R. GRÉCO, Architecte D.P.L.G. du C.N.R.S., se rendait à Ouessant pour rencontrer les autorités locales et déterminer l'emplacement de la future station. Cette dernière devant comporter une section de biologie marine, c'est un terrain en bordure de la rive Nord de la baie de Lampaul qui fut choisi, aux lieux-dits « Liors-an-Tallec » et « Cleuz-Porsnoan ».

Ce terrain de 45 ares 47 centiares comporte une vingtaine de parcelles appartenant à une quinzaine de propriétaires. Retrouver tous ceux-ci, souvent éparpillés aux quatre coins du monde, fut une tâche longue et malaisée dont la réussite revient au dévouement obstiné de notre collègue, le Commandant Paul MALGORN, Délégué local du C.R.M.M.O. Et c'est le 3 juin 1964 qu'est paru au *Journal Officiel* l'arrêté approuvant l'acquisition des différentes parcelles. Il reste maintenant à signer les actes, à élaborer les nouveaux plans de la station qui, nous y tenons particulièrement, doit s'insérer harmonieusement dans le magnifique paysage qui va l'accueillir.

Signalons que depuis 1962, une fourgonnette 2 CV a été attribuée à la station par le C.N.R.S. Ce véhicule facilite grandement le travail de baguage et l'organisation des stages.

En 1961, la station provisoire a fonctionné aux périodes suivantes :

1^{er} et 2 janvier (Eq. MONNAT) — du 22 mars au 21 avril (Eq. CLAPHAM, MONNAT et ROUGIER) — 22 août au 16 septembre (stages ornithologiques) — 16 septembre au 10 octobre (MM. J. VIELLIARD, CLAPHAM et J.-M. THIOLLAY) — 26 au 31 décembre (Eq. MONNAT et LE MENN).

En 1962 :

30 mars au 24 avril (M. C. CLAPHAM et M^{lle} L. LECOURTOIS) — 1^{er} au 24 août (M^{lle} L. LECOURTOIS) — 24 août au 19 septembre (stages ornithologiques) — 19 au 21 septembre (Eq. NICOLAU-GUILLAUMET) — 19 octobre au 4 novembre (MM. J.-M. BOURDON et J. VIELLIARD) — 28 au 31 décembre (Eq. MONNAT).

En 1963 :

1^{er} au 4 janvier (Eq. MONNAT) — 2 au 12 avril (M^{lle} L. LECOURTOIS et M. R. BRAILLON) — 3 au 12 août (stage des étudiants de Liège dirigé par M. J. ROCHE et travaux de G. LE PAPE) — 30 août au 13 septembre (stage ornithologique) — 2 au 11 novembre (MM. J. VIELLIARD et H. KOWALSKI) — 27 au 31 décembre (Eq. MONNAT).

De plus, quelques baguages ont été effectués par MM. P. MALGORN, J.-L. MINIOU et S. BOUTINOT.

Un important travail sur les observations et les baguages effectués jusqu'alors à Ouessant étant en cours d'élaboration et devant sortir au moment de l'inauguration de la nouvelle station, nous ne donnerons ici que les faits ornithologiques les plus marquants de ces trois dernières années.

En 1961, signalons le 28 août la capture par l'équipe CHANCHUS du rare Chevalier solitaire, *Tringa solitaria*, originaire d'Amérique du Nord ; le 29 septembre, d'un Roselin cramoisi, *Carpodacus erythrinus*, Fringille du Nord-Est de l'Europe et du Nord de l'Asie, partie du monde vers où se dirigent toutes ses migrations ; le 10 octobre, d'un premier record européen : le Rougequeue américain *Setophaga ruticilla*, ces deux dernières captures étant dues à M. J. VIELLIARD ; une Fauvette épervière, *Sylvia nisoria*, était prise le 2 septembre par C. CLAPHAM.




Fig. 1. — La trappe d'Heligoland à Penn-ar-Land

(Photo L. Schimpfessel)



Fig. 2. — Filets japonais placés sur une grève de l'île

En 1962, une seconde Fauvette de cette espèce devait être capturée le 15 septembre par l'équipe JARRY et une troisième en 1963. Le 11 septembre, première capture certaine pour la France et l'Europe occidentale de la Locustelle fluviatile, *Locustella fluviatilis*.

En 1963, le 9 septembre, première capture pour Ouessant de la Fauvette babillarde, *Sylvia curruca*, et le 23, par C. CLAPHAM, première capture française du Bruant à tête rousse, *Emberiza bruniceps*, un immature.

Le tableau suivant donne les totaux de baguages par espèce pour chaque année et pour l'ensemble des années 1961-1962-1963. L'année 1961 constitue le record pour le nombre de baguages de ces 10 dernières années et ceci malgré l'absence complète d'oiseaux bagués au nid. On notera les importants chiffres de Gobemouches noirs en 1961 et 1962 correspondant à une migration exceptionnelle par ailleurs notée dans les Iles britanniques. Le nombre nettement plus faible des bagues posées en 1963 s'explique par le fait qu'il n'y eut cette année-là qu'un seul stage d'été. La lecture du tableau permet aussi de se rendre compte des divers effets du froid de l'exceptionnel hiver 1963 sur les espèces sédentaires et sur le Martin-pêcheur qui a totalement disparu à Ouessant. Le nombre élevé des Moineaux bagués en 1963 est dû au fait qu'une thèse sur cet oiseau est actuellement en préparation par notre collègue M. J. BARLOY.

	Total 1961	Total 1962	Total 1963	Total 61-62-63
Pétrel culblanc, <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	1	—	—	1
Pétrel tempête, <i>Hydrobates pelagicus</i>	4	3	1	8
Puffin des Anglais, <i>Procellaria puffinus</i>	1	4	6	11
Cormoran huppé, <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	—	1	—	1
Sarcelle d'hiver, <i>Anas crecca</i>	—	1	—	1
Epervier d'Europe, <i>Accipiter nisus</i>	—	1	—	1
Faucon crécerelle, <i>Falco tinnunculus</i>	—	2	—	2
Caille des blés, <i>Coturnix coturnix</i>	1	—	—	1
Râle d'eau, <i>Rallus aquaticus</i>	35	13	9	57
Marouette ponctuée, <i>Porzana porzana</i>	—	2	—	2
Râle des genêts, <i>Crex crex</i>	—	1	—	1
Huitrier pie, <i>Haematopus ostralegus</i>	1	—	1	2
Vanneau huppé, <i>Vanellus vanellus</i>	—	34	2	36
Grand Gravelot, <i>Charadrius hiaticula</i>	3	8	2	13
Pluvier doré, <i>Charadrius apricarius</i>	1	4	—	5
Pluvier guignard, <i>Charadrius morinellus</i>	—	2	—	2
Tournepierré à collier, <i>Arenaria interpres</i>	3	22	19	44
Bécassine des marais, <i>Capella gallinago</i>	46	21	21	88
Bécassine sourde, <i>Limnocryptes minimus</i>	1	5	5	11
Bécasse des bois, <i>Scolopax rusticola</i>	—	1	2	3
Courlis corlieu, <i>Numenius phaeopus</i>	—	2	1	3
Chevalier culblanc, <i>Tringa ochropus</i>	—	1	—	1
Chevalier sylvain, <i>Tringa glareola</i>	1	—	—	1
Chevalier solitaire, <i>Tringa solitaria</i>	1	—	—	1
Chevalier guignette, <i>Tringa hypoleucos</i>	2	1	3	6
Bécasseau maubèche, <i>Calidris canutus</i>	3	—	4	7
Bécasseau variable, <i>Calidris alpina</i>	12	2	11	25
Bécasseau sanderling, <i>Crocelhia alba</i>	2	1	—	3
Phalarope à bec large, <i>Phalaropus fulicarius</i>	11	—	1	12
Goéland marin, <i>Larus marinus</i>	—	—	1	1
Goéland brun, <i>Larus fuscus</i>	2	—	1	3
Goéland argenté, <i>Larus argentatus</i>	—	46 *	—	46
Sterne pierregarin, <i>Sterna hirundo</i>	—	—	1	1
Macareux moine, <i>Fratercula arctica</i>	—	—	1	1
Tourterelle des bois, <i>Streptopelia turtur</i>	33	9	24	66
Coucou gris, <i>Cuculus canorus</i>	—	4	4	8
Chouette effraye, <i>Tyto alba</i>	—	1	—	1
Hibou des marais, <i>Asio flammeus</i>	—	—	1	1
Engoulevent d'Europe, <i>Caprimulgus europaeus</i>	—	1	1	2
Martinet noir, <i>Apus apus</i>	—	1	—	1
Martin-pêcheur, <i>Alcedo atthis</i>	45	26	—	71
Huppe d'Europe, <i>Upupa epops</i>	1	—	—	1
Pic épeiche, <i>Dendrocopos major</i>	—	—	1	1
Torcol, <i>Jynx torquilla</i>	10	3	5	18
Alouette des champs, <i>Alauda arvensis</i>	—	15	4	19
Hirondelle de cheminées, <i>Hirundo rustica</i>	250	123	294	667
Hirondelle de fenêtre, <i>Delichon urbica</i>	1	—	—	1
Hirondelle de rivage, <i>Riparia riparia</i>	9	5	1	15
Mésange charbonnière, <i>Parus major</i>	5	—	11	16
Mésange bleue, <i>Parus caeruleus</i>	16	3	28	47
Mésange noire, <i>Parus ater</i>	2	—	—	2
Mésange rémiz, <i>Remiz pendulinus</i>	—	—	3	3
Troglodyte, <i>Troglodytes troglodytes</i>	53	63	67	183
Grive litorne, <i>Turdus pilaris</i>	3	4	4	11
Grive draine, <i>Turdus viscivorus</i>	—	1	—	1
Grive musicienne, <i>Turdus philomelos</i>	282	240	143	665
Grive mauvis, <i>Turdus musicus</i>	30	62	166	258
Merle à plastron, <i>Turdus torquatus</i>	3	2	2	7
Merle noir, <i>Turdus merula</i>	425	284	280	989
Traquet molleux, <i>Oenanthe oenanthe</i>	46	52	59	157

* dont 45 pull.

Traquet père, <i>Saxicola torquata</i>	279	95	21	395
Traquet tarier, <i>Saxicola rubetra</i>	99	47	22	168
Rougequeue à front blanc, <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	38	29	49	116
Rougequeue noir, <i>Phoenicurus ochruros</i>	2	1	1	4
Rossignol philomèle, <i>Luscinia megarhynchos</i>	11	20	5	36
Gorgebleue, <i>Luscinia (Cyanosylvia) svecica</i>	9	6	13	28
Rougegorge, <i>Erithacus rubecula</i>	340	229	213	782
Locustelle tachetée, <i>Locustella naevia</i>	1	2	2	5
Locustelle lusciniolide, <i>Locustella luscinioides</i>	—	—	1	1
Rousserolle effarvée, <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	96	58	64	218
Rousserolle verderolle, <i>Acrocephalus palustris</i>	5	2	—	7
Phragmite des joncs, <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	336	154	342	832
Phragmite aquatique, <i>Acrocephalus paludicola</i>	3	2	2	7
Hypolaïs polyglotte, <i>Hippolaïs polyglotta</i>	2	23	12	37
Hypolaïs icterine, <i>Hippolaïs icterina</i>	6	8	—	14
Fauvette épervière, <i>Sylvia nisoria</i>	1	1	1	3
Fauvette orphée, <i>Sylvia hortensis</i>	—	1	—	1
Fauvette à tête noire, <i>Sylvia atricapilla</i>	46	25	25	96
Fauvette des jardins, <i>Sylvia borin</i>	103	69	241	413
Fauvette grisette, <i>Sylvia communis</i>	177	139	167	483
Fauvette babillarde, <i>Sylvia curruca</i>	—	—	1	1
Fauvette pitchou, <i>Sylvia undata</i>	—	1	1	2
Pouillot véloce, <i>Phylloscopus collybita</i>	104	100	78	282
Pouillot filis, <i>Phylloscopus trochilus</i>	98	123	99	320
Pouillot siffleur, <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	—	2	7	9
Pouillot de Bonelli, <i>Phylloscopus bonelli</i>	4	1	1	6
Rougequeue américain, <i>Setophaga ruticilla</i>	1	—	—	1
Roitelet huppé, <i>Regulus regulus</i>	12	38	—	50
Roitelet triple bandeau, <i>Regulus ignicapillus</i>	4	13	1	18
Gobemouche gris, <i>Muscicapa striata</i>	164	106	166	436
Gobemouche noir, <i>Ficedula hypoleuca</i>	905	951	312	2.168
Gobemouche nain, <i>Muscicapa parva</i>	4	—	—	4
Accenteur mouchet, <i>Prunella modularis</i>	151	97	104	352
Pipit des arbres, <i>Anthus trivialis</i>	83	53	65	201
Pipit farlouse, <i>Anthus pratensis</i>	315	222	109	646
Pipit maritime, <i>Anthus spinoletta petrosus</i>	30	80	51	161
Bergeronnette grise, <i>Motacilla alba</i>	73	81	51	205
Bergeronnette des ruisseaux, <i>Motacilla cinerea</i>	9	5	4	18
Bergeronnette printanière, <i>Motacilla flava</i>	149	27	73	249
Pie Grièche à tête rousse, <i>Lanius senator</i>	3	—	—	3
Pie Grièche écorcheur, <i>Lanius collurio</i>	6	—	1	7
Etourneau, <i>Sturnus vulgaris</i>	15	77	16	108
Verdier, <i>Carduelis chloris</i>	7	7	4	18
Chardonneret, <i>Carduelis carduelis</i>	8	4	—	12
Tarin des aulnes, <i>Carduelis spinus</i>	1	3	—	4
Linotte mélodieuse, <i>Carduelis cannabina</i>	408 *	210	160	778
Bouvreuil pivoine, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	123	56	77	256
Roselin cramoisi, <i>Carpodacus erythrinus</i>	1	—	—	1
Becroisé des sapins, <i>Loxia curvirostra</i>	—	1	—	1
Pinson des arbres, <i>Fringilla coelebs</i>	4	112	33	149
Pinson du nord, <i>Fringilla montifringilla</i>	—	4	—	4
Bruant proyer, <i>Emberiza calandra</i>	4	4	4	12
Bruant jaune, <i>Emberiza citrinella</i>	136	93	80	309
Bruant zizi, <i>Emberiza cirlus</i>	2	—	—	2
Bruant ortolan, <i>Emberiza hortulana</i>	2	2	—	4
Bruant des roseaux, <i>Emberiza schoeniclus</i>	4	14	8	26
Moineau domestique, <i>Passer domesticus</i>	34	31	208	273
TOTAL, 2	5.763	4.506	4.085	14.354

* dont 3 pull.



Fig. 3. — Initiation des stagiaires à la pose des filets



Fig. 4. — Bécasseau variable

(Photo L. Schimpfessel)

REPRISES D'OISEAUX BAGUES

Listes établies annuellement dans l'ordre chronologique des dates de reprises et faisant suite à celles des derniers comptes rendus de la station (« Penn ar Bed », vol. 2, n° 20, Mars 1960, pp. 145-146 et vol. 3, n° 26, Septembre 1961, pp. 100-101).

Abréviations : pull. = bague poussin ; imm. = bague immature ; ad. = bague adulte ; + = tué ; × = trouvé mort ; // = contrôlé ; Eq. = Equipe ; ♂ = mâle ; ♀ = femelle ; ca. = environ ; loco = sur place ; () = date de la lettre signalant la reprise ; * = bague jointe à l'avis de reprise.

Le numéro de bague suit le nom scientifique d'espèce.

Sauf indication contraire, il s'agit d'oiseaux bagués à Ouessant même.

34. Linotte mélodieuse, *Carduelis cannabina*, Paris SC 241
 ♀ 29-8-58, par Eq. OLIER
 × 1-1-61, Gijon, 43.32 N/5.40 W, Asturies, Espagne, 550 km S
35. Goéland brun, *Larus fuscus*, Paris DE 440
 pull. 21-6-59 à Lytiry, par Ph. MERVEILLEUX DU VIGNAUX
 × 26-3-61, Tréoupan en Ploudalmézeau (Finistère)
36. Fauvette grisette, *Sylvia communis*, Paris 35 002
 8-9-60, par Eq. CLAPHAM
 × 5-6-61 ca. 53.44 N/7.47 W, Comté de Longfort, Irlande, 600 km NNW
37. Pétrel tempête, *Hydrobates pelagicus*, Paris JP 116
 ad. 10-7-60, Ile Bannec, par J.-P. LUCAS
 × 10-7-61 loco, par S. BOUTINOT
38. Goéland brun, *Larus fuscus*, Paris DE 2362
 pull. 7-6-60, Ile Molène, par J.-M. BOURDON
 × 28-8-61, Falmouth, 50.08 N/5.04 W, Cornouailles, Grande-Bretagne, 200 km N
39. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris DH 204 *
 pull. 9-6-60, Ile de Lytiry, par J.-M. BOURDON
 × 31-8-61, Lampaul-Ploudalmézeau (Finistère), 30 km NE
40. Rougegorge, *Erithacus rubecula*, Paris 34 099
 10-9-60, par Eq. PRIGENT
 13-6-61, Gourin (Morbihan), 115 km ESE
41. Hirondelle de cheminée, *Hirundo rustica*, Paris 79 474
 28-8-61, par Eq. LARIGAUDERIE
 ca. 4-9-61, Murtosa, 40.25 N/8.35 W, Portugal, 900 km SW
42. Chevalier sylvain, *Tringa glareola*, Paris JM 5217 *
 ♂ imm. 21-8-61, par Eq. CLAPHAM
 + 5-9-61 à 3 km de Dives (Calvados), 375 km ENE
43. Merle noir, *Turdus merula*, Paris GJ 2973
 imm. 29-8-61, par Eq. CHAUCHEPRAT
 + 26-9-61, Plouay (Morbihan), 145 km ESE
44. Pouillot fitis, *Phylloscopus trochilus*, Paris 75 045 *
 imm. 23-8-61, par Eq. CLAPHAM
 4-10-61, Erandio, 45.15 N/2.56 W, Bilbao, Espagne, 600 km SSE
45. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, Paris 174 918
 2-9-61, par Eq. HEROLD
 (7-10-61), Mesquita, 37.11 N/8.27 W, Algrave, Portugal, 1250 km SSW
46. Tourterelle des bois, *Streptopelia turtur*, Paris GM 4250
 5-10-61, par Eq. CLAPHAM
 + 15-10-61, Marinha, 39.45 N/8.55 W, Portugal, 1100 km SSW
47. Bécassine des marais, *Capella gallinago*, Paris GE 7336 *
 7-9-59, par Eq. BROSELIN
 + 23-10-61, Houtteville (Manche), 295 km NE

48. Linotte mélodieuse, *Carduelis cannabina*, Paris 75 477
 ♀ imm. 29-8-61, par Eq. LARIGAUDERIE
 + 29-10-61, Santura, 43.20 N/3.03 W, Vizcaya, Espagne, 550 km S
49. Traquet père, *Saxicola torquata*, Paris 175 005
 31-8-61, par Eq. HEROLD
 1-11-61, Santa Elena, 38.21 N/3.32 W, Jaen, Espagne, 1100 km SSE
50. Bécassine des marais, *Capella gallinago*, GJ 2318 *
 27-12-60, par Eq. CHEVILLAT
 + 16-11-61, Kervallon (Finistère), 100 km E
- *.*
51. Gobemouche gris, *Muscicapa striata*, Paris 174 988 *
 2-9-61, par Eq. CLAPHAM
 × (18-6-62), Middlesbrough, 54.35 N/1.14 W, Yorkshire, Grande-Bretagne, 600 km NE
52. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, Paris 174 868
 29-8-61, par Eq. CHANGHUS
 27-8-62, Agosto, 43.11 N/2.54 W, Vizcaya, Espagne, 600 km SSE
53. Tourterelle des bois, *Streptopelia turtur*, Paris FF 1556
 imm. 10-9-61, par Eq. LE MENN
 + 21-9-62, Saint-Hilaire-de-Talmon (Vendée), 340 km SW
54. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, Paris 179 251
 30-8-62, par Eq. LECOURTOIS
 (30-9-62), Rio Frio, près Bragança, 41.48 N/6.46 W, Portugal, 800 km S
55. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, Paris 179 926
 ad. 3-9-62, par Eq. JARRY
 + 30-9-62, S de Porto, ca. 41.09 N/8.37 W, Portugal, 850 km SSW
56. Traquet tairier, *Saxicola rubetra*, Paris 178 616 *
 imm. 25-11-61, par Eq. CLAPHAM
 + 10-10-62, Castelo Branco, 39.50 N/7.30 W, Portugal, 1000 km SSW
57. Étourneau sansonnet, *Sturnus vulgaris*, Paris GM 4084 *
 27-10-62, Aod-Meur, par J.-M. BOURDON et J. VIELLIARD
 × 3-11-62, Phare du Créac'h
58. Merle noir, *Turdus merula*, Paris GM 4560 *
 imm. 19-9-62, par Eq. FRANCAZ
 + (24-11-62), Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime), 400 km SE
59. Bécassine des marais, *Capella gallinago*, Paris GM 4031 *
 12-4-62, Ker-Yegu, par C. CLAPHAM
 + 13-12-62, Stang-Korz
60. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris EE 3707
 pull. 8-7-59, par M. SAUTEREAU
 × (19-12-62), Porspoder (Finistère), 23 km ENE
61. Grive musicienne, *Turdus philomelos*, Paris JP 614
 imm. 28-8-62, par Eq. JARRY
 + 27-12-62, Sainte-Marie, 47.07 N/2.06 W (Loire-Atlantique), 265 km SE
- *.*
62. Vanneau huppé, *Vanellus vanellus*, Paris GM 4576
 31-12-62 (de nuit au phare), par Eq. MONSAT
 + 1-1-63, Silviella de Belmonte de Miranda, Asturies, Espagne, 600 km SSW
63. Bergeronnette grise, *Motacilla alba*, Paris 218 272
 imm. 14-12-62, par Eq. ROUGIER
 × 17-1-63, Plougasnou (Finistère), 75 km ENE
64. Étourneau sansonnet, *Sturnus vulgaris*, Paris GM 4146
 30-12-62, par Eq. MONSAT
 × (24-1-63), Le Conquet (Finistère), 30 km SE

65. Etourneau sansonnet, *Sturnus vulgaris*, Paris GM 4697
29-12-62, par Eq. MONNAT
(25-1-63), Landerneau (Finistère), 60 km E
66. Grive mauvis, *Turdus musicus*, Paris JP 998
26-12-61, par Eq. LE MENN/MONNAT
(26-1-63), Brizambourg (Charente-Maritime), 450 km SE
67. Etourneau sansonnet, *Sturnus vulgaris*, Paris GM 4298 *
29-10-62, par J. VIELLIARD et J.-M. BOURDON
(2-2-63), Plouvien (Finistère), 30 km E
68. Fauvette des jardins, *Sylvia borin*, Paris SL 4632
6-10-60, par Eq. JEANTET
// 30-5-63, Ile d'Héligoland, 54.11 N/7.55 E, Allemagne, 1150 km NE
69. Gobemouche gris, *Muscicapa striata*, Paris 218 180 *
16-9-62, par Eq. TRUCHOT
+ 10-9-63, Les Molines, 37.27 N/0.59 W, Murcia, Espagne, 1300 SSE
70. Pouillot fitis, *Phylloscopus trochilus*, Paris 306 879 *
3-9-63
+ 11-9-63, Burgos, 42.21 N/3.41 W, Espagne, 600 km S
71. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, Paris 179 226 *
imm. 30-8-62, par Eq. BRULEZ
22-9-63, Fundao, 40.08 N/7.30 W, Portugal, 1160 km SSW
72. Bergeronnette grise, *Motacilla alba*, Paris 345 719
imm. 11-9-63, par Eq. JARRY/ROUGIER
ca. 22-9-63, Leca, 41.08 N/8.40 W, Portugal, 960 km SSW
73. Pouillot fitis, *Phylloscopus trochilus*, Paris SJ 6132
13-9-60, par Eq. PRIGENT
18-10-63, Mouseron, 50.44 N/3.14 E, Belgique, 650 km NE
74. Pipit maritime, *Anthus spinoletta petrosus*, Paris 178 991 *
29-12-61, par Eq. MONNAT
+ 4-11-63 (contre la lanterne du phare de Start Point-Hallsando,
50.13 N/3.38 W, Devon, Grande-Bretagne, 220 km NNE
75. Linotte mélodieuse, *Carduelis cannabina*, Paris SA 97 129 *
ad. 13-8-63, par M^{lle} L. LECOURTOIS
+ 8-11-63, Saint-Girons (Landes), 575 km SSE
76. Bécasse des bois, *Scolopax rusticola*, Paris EH 639 *
ad. 3-11-63, par MM. J. VIELLIARD et H. KOWALSKI
+ 18-12-63, Guerlesquin (Finistère), 107 km E
77. Grive musicienne, *Turdus philomelos*, Paris GJ 2026 *
10-9-60, par Eq. PRIGENT, // 16-4-61
23-12-63, sur place
78. Rougegorge, *Erithacus rubecula*, Paris 345 114
7-9-63, par Eq. JARRY/ROUGIER
+ 30-10-63, Trubia, 43.20 N/5.59 W, Espagne, 700 km S

OISEAUX BAGUES AILLEURS ET REPRIS A OUESSANT

22. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, London 87.736
30-8-61, Lundy Island, 51.12 N/4.40 W, Devon, Grande-Bretagne
// 1-9-62, par Eq. DELABRE, 300 km S
23. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, London H 79.581
2-9-62, Bardsey Island, 52.46 N/4.48 W, Caernarvonshire, Grande-Bretagne
// 13-9-62, par Eq. NICOLAU, 475 km S
24. Grive musicienne, *Turdus philomelos*, London 406.807
5-1-61, Cookham, 51.34 N/0.43 W, Berkshire, Grande-Bretagne
17-1-63, par Cdt MALGORN, 450 km SW

25. Etourneau sansonnet, *Sturnus vulgaris*, Helgoland 7.211.889 *
pull. 16-6-61, Bergzow, 52.24 N/12.03 E, Kr. Genthin/Sachsen-Anhalt,
Allemagne
× 30-1-63, par le Cdt MALGORN, 1250 km SW
26. Huitrier pie, *Haematopus ostralegus*, Helgoland 442.325 *
ad. 28-6-55, Wangeroog-West, 53.47 N/7.51 E, Nordsee, Allemagne
× 6-2-63, par M. MARTIN, 1050 km SW
27. Pluvier doré, *Charadrius apricarius*, Reykjavik 613.609 *
ad. 11-8-61, Skipalon, 65.47 N/18.12 W, Högardalur, N. Islande
(25-2-63), par M. KARVAL, 2000 km SSE
28. Gobemouche gris, *Muscicapa striata*, Bruxelles 2 A 32.161
pull. 13-6-63, Westmalle, 51.18 N/4.42 E, Belgique
// 3-9-63, par Eq. GEERAERT, 760 km WSW
29. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, Helgoland 171.733
♀ 22-6-63, Bahrddorf, 52.23 N/11.00 E, Kr. Gifhorn/Niedersachsen,
Allemagne
// 7-9-63, par Eq. BRULEZ, 1200 km WSW
30. Gobemouche noir, *Ficedula hypoleuca*, London 345.416
1-9-63, Spurn Point, 53.35 N/0.06 E, Yorkshire, Grande-Bretagne
// 8-9-63, par Eq. BOURNAUD, 675 km SW
31. Hirondelle de cheminées, *Hirundo rustica*, London AK 91.308
imm. 3-10-63 (17 h.), St-Agnès, 49.53 N/6.21 W, Iles de Scilly, Grande-
Bretagne
// 4-10-63 (18 h. 30), par C. CLAPHAM, 25 heures 30 minutes, 185 km SSE

Les reprises sont en accroissement très net, de même que les contrôles à Ouessant d'oiseaux bagués par des stations étrangères. A noter les premières reprises loin au Sud de Linottes mélodieuses pourtant déjà baguées en nombre les années précédentes et qui n'avaient jusqu'alors donné lieu qu'à des reprises sur place, la capture au printemps en Irlande d'une Fauvette grisette marquée l'automne précédent à Ouessant, ce fait joint



Fig. 5. — Le premier Beccroisé des sapins capturé et bagué à Ouessant (le 31 août 1959)

(Photo E. Roche)



Fig. 6. — Trogodyte pris au filet japonais.

(Photo L. Schimpfessel)

aux reprises de Gobemouches noirs et gris en Grande-Bretagne et aux contrôles à Ouessant d'oiseaux bagués British Museum London prouve bien qu'un nombre important de migrateurs originaires des Iles britanniques transite par Ouessant. Comme suite à ce qui avait déjà été indiqué pour l'exercice 1960, on voit que les reprises sur le continent de Merles noirs et de Grives musicales bagués à Ouessant se multiplient. La reprise au Portugal d'un Traquet pâtre est intéressante. Un record de vitesse est obtenu par le Vanneau huppé bagué au phare dans la nuit du 30 au 31 décembre 1962 et repris à 600 km, en Espagne, le lendemain. Remarquons enfin que la station d'Ouessant obtient pour la première fois des reprises sur les espèces suivantes : Vanneau huppé, Chevalier sylvain, Grive mauvis, Traquet pâtre, Traquet tarius, Pouillot fitis, Pipit maritime et Linotte mélodieuse, tandis que pour la première fois également, un Huitrier pie venu de la mer du Nord et un Pluvier doré bagué en Islande, se faisaient reprendre à Ouessant (1).

(1) Nous remercions bien vivement nos collègues des « Naturalistes belges » de nous avoir prêté les clichés illustrant cet article.