

NOTES

QUELQUES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DANS LE NORD-FINISTÈRE DURANT L'ÉTÉ 1964

I. RAPACES DIURNES.

La protection — urgente — des Rapaces étant à l'ordre du jour, voici quelques précisions à leur sujet.

La Buse variable (Buteo buteo), sans être commune, paraît bien répandue. On l'observe surtout dans les régions boisées (Beffou, Le Tréhou, Saint-Rivoal).

L'Épervier (Accipiter nisus) semble clairsemé, mais son observation n'est pas facile.

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) m'a paru assez bien répandue puisque j'en ai observé trois individus, l'un à Plouagat (Côtes-du-Nord), les deux autres dans les forêts du Cranou et du Huelgoat.

Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : un mâle immature de cette espèce a été noté près de l'étang de Goulven, le 13 juillet.

Le Busard cendré (Circus pygargus) est l'espèce caractéristique des landes de la Montagne. Ses effectifs paraissent normaux dans ce biotope pauvre.

Le Circaète Jean-le-Blanc (Circus gallicus) : le 1^{er} août j'ai longuement observé un oiseau de cette espèce au-dessus du Tuchen Kador dans les Monts d'Arrée. C'est, semble-t-il, la première observation de ce magnifique oiseau en Basse-Bretagne.

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : un individu à Loqueffret le 11 août dans la soirée.

Le Faucon habereau (Falco subbuteo) est représenté par de rares couples dans les bois de résineux de la Montagne.

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est encore relativement commun dans la Montagne et au bord de la mer.

II. OBSERVATIONS D'ESPÈCES PEU COMMUNES.

1. *Le Pigeon colombin (Columba oenas)*, inconnu comme nicheur en Basse-Bretagne, s'est très probablement reproduit cette année à Loqueffret où un couple fréquentait quotidiennement, en juillet et août, une carrière de sable abandonnée.

2. *L'Alouette lulu (Lullula arborea)* : la même remarque s'impose pour cette espèce dont j'ai bagné deux juvéniles déjà observées en juillet dans la même carrière. Il faut noter ici que la construction de l'usine nucléaire de Brennilis, provoquant l'exploitation de nombreuses et vastes carrières, a créé ainsi un milieu nouveau recherché par certaines espèces.

3. *Le Râle des genêts (Crex crex)*. — J'ai observé un Râle de cette espèce le 1^{er} septembre, dans un chemin menant au Yeun Elez, en Botmeur. On m'a en outre rapporté l'observation d'un de ces oiseaux à Commana, au cours de la moisson, ainsi que l'audition des chants caractéristiques ce printemps à Guipavas.

Lucien KERAUTRET.

POUILLOT SIFFLEUR

Je réponds à la question posée par M. KERAUTRET au sujet du Pouillot siffleur (« Penn ar Bed », vol. 4, p. 240). Il est certain que la note parue dans *Alauda* (vol. 10, 1-2, 1938) a échappé à notre collègue. Nous écrivions : « Lorsqu'en 1934 commença de paraître notre faune des Oiseaux bas-bretons, c'est sciemment que nous avons écarté les espèces citées dans des travaux antérieurs, mais que le manque total de renseignements permettait de considérer comme douteuses... Nous devons faire amende honorable quant au Pouillot siffleur (*Phylloscopus s. sibilatrix* (Bechstein), qui nous avait complètement échappé quoique relativement commun dans les grandes futaies de feuillus ». J'ajoute qu'un nombre suffisant de pontes, dans ma collection oologique au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, en est la preuve irréfutable.

E. LEBEURIER.