

PRESENCE DE LA CHOUETTE HARFANG, NYCTEA SCANDIACA, EN BRETAGNE

Grâce à l'obligeance du Dr ROUSSIA, de Berven, les collections du Collège Scientifique Universitaire de Brest se sont enrichies d'un exemplaire de Chouette Harfang. Celle-ci avait été tuée le 21 octobre 1964 sur les dunes de Theven en Plougoulm (Nord-Finistère) par un chasseur, actuellement poursuivi par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Un autre Harfang a été observé à maintes reprises sur les mêmes lieux (Plougoulm, Sibiril) en octobre, novembre et décembre.

Le spécimen que j'ai eu entre les mains avait les dimensions suivantes (en cm) : envergure : 140 ; longueur : 58 ; aile pliée : 40 ; tarse : 11,5 ; queue : 24 ; poids (le 24-10-64) : 1.400 g.



Nyctea scandiaca

Exemplaire tué à Plougoulm. En haut vue ventrale, en bas vue dorsale

(Photo C.S.U. Brest)

On peut remarquer sur les photographies, que l'exemplaire capturé porte de nombreuses taches ou rayures brunes sur le ventre et le dos. On apprécie mal, par contre, l'aspect nacré du dessous des ailes et le jaune doré des yeux. Il s'agit vraisemblablement d'une femelle.

Ce bel oiseau se rencontre normalement dans les régions proches du Cercle polaire, il apparaît parfois en Europe du Nord, il est très exceptionnel en France et c'est sa première observation en Bretagne.

Albert LUCAS.