

NOTES

UN DEBRIS DE PLAGE SOULEVEE DANS LA GROTTE DE L'AUTEL A CROZON (FINISTERE)

La nomenclature des localités où l'on peut observer des plages soulevées le long du littoral n'est plus à faire après COLLIN (Bull. Soc. Géol. et Min. de Bretagne, nouv. sér., 2^e fasc. spécial, 1940).

Nous signalons ici la présence dans la grotte de l'Autel, la plus connue des grottes de Morgat, d'une plate-forme Monastirienne dont le niveau est à la limite des hautes mers de morte eau. Cette plage soulevée est difficile à observer dans la grotte en raison de l'obscurité et des organismes qui la masquent. Elle se situe au niveau du sommet du rocher central de la grotte, dit l'Autel, sur une petite plate-forme de 10 m² environ qui s'engage dans les diverticules situés à droite en regardant le fond de la grotte.

Contrairement aux autres plages soulevées de la région, elle emballe à sa partie supérieure, au-dessus des galets, dans du sable, des Coquilles Saint-Jacques, des Coques et des Bigorneaux.

Ce lambeau de plage fossile n'est certainement pas le dernier que l'on puisse mentionner sur nos côtes, il y aurait lieu de visiter la région l'hiver lors de la disparition des sables et de la végétation.

Nous remercions le Dr JACQUIN, Conseiller général, et J. DRÉVILLOX d'avoir mis à notre disposition les moyens d'investigation qui nous étaient nécessaires pour cette observation.

A.-H. DIZERBO et Jean TOURSEILLER.

LOCALITES DE PLANTES INTERESSANTES POUR LE FINISTERE

Cette liste a été établie selon la nomenclature utilisée dans les « Quatre Flores de France » de P. FOURNIER (1962). Elle comprend non seulement des localités de plantes indigènes, mais des adventices et des observations diverses.

Dans beaucoup de cas, les récoltes des étudiants du Collège Scientifique Universitaire de Brest sont à l'origine de cette nomenclature.

Achillea millefolium L. Composées. Fleurs rose foncé. Bohars.

Allium Ursinum L. Liliacées. Rosnoën (Coat-ar-Foeneq), Loperhet.

Allium Triquetrum L. Liliacées. Brest (Moulin-Blanc), Le Conquet, Ouessant.

Asplenium Marinum L. Polypodiacées. Fronde bifide. Ouessant.

Briza maxima L. Graminacées. Brest (Route de la Corniche), Le Fret en Crozon.

Chrysanthemum corymbosum L. Composées. Moëlan.

Doronicum Pardalianches (L.) Jacq. Composées. Plougonven (Rosampoul).

Eriophorum vaginatum L. Cypéracées. Lopéree (Le Nivot).

Hippophae rhamnoides L. Eléagnacées. Santez, Lampaul-Ploudalmézeau (Introduit).

Lonicera Japonica Thunberg. Caprifoliacées. Crozon (falaises du Portzic).

Lycopodium Selago L. Lycopodiacées. Argol (sommet du Ménez-Hom).

Monotropa Hypopitys L. Pirolacées. Plougonven (Rosampoul).

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglossacées. Le Loch (iles Glénan), Ouessant (Communiqué par M. BOULLARD).

Oxalis articulata Savigny. Lanarvily, Quélerne.

Primula grandiflora Lmk. var. *rubra* Sibth. Primulacées. Variété à fleurs roses. Argol, Fouesnant, Saint-Ségal, Brest (Moulin-Blanc), Plabennec (Pen-ar-Valy), Plonézoeh, Morlaix (La Salette).

Quercus Cerris L. Fagacées. Hanvec (à la limite de Saint-Eloy), Kerfeunteun (Ty-Mamm-Doue).

Ranunculus arvensis L. Renonculacées. Saint-Pol-de-Léon (prairie des Carmes), Crozon (Kerveron).

Salpichroa origanifolia (Lmk.) Thling. Solanacées. Lannilis.

Sedum Telephium L. Crassulacées. Le Faou (Prioldy).

Senecio cineraria DC. Composées. Le Pouldu.

A.-H. DIZERBO.