


Echouage de végétaux exotiques sur nos côtes

par A.-H. DIZERBO

Nos collègues GLÉMAREC et MONNAT ont publié ici même leurs observations sur les échouages d'animaux exotiques sur nos côtes ; la présence de ces animaux était due à une prédominance de vents d'Ouest pendant une période prolongée.

Jusqu'à ce jour, il ne semble pas qu'il ait été fait mention de plantes accompagnant ces animaux bien que l'échouage de Sargasses (*Sargassum natans* (L.) Borg.) sur les rivages du Massif Armoricaïn soit connu de Cherbourg (LE JOLIS), de Tatihou (HARIOT), de Jersey (PICQUET *in* VAN HEURCK), de Belle-Isle (COURAUD *in* WUITNER). Si ces algues ne sont pas signalées plus fréquemment, c'est qu'elles sont très appréciées des Talitres, comme nous avons pu le constater sur les côtes du Portugal, la plante disparaît entièrement, il n'en reste plus que les flotteurs. Il est difficile d'assigner aux Sargasses échouées une origine certaine en l'absence d'épibioses, car ces algues vivent au fond du golfe de Gascogne. Cependant, COLGAN a pu démontrer que les échantillons récoltés à Valentia (Co. Kerry, Irlande) et jusqu'au Danemark, provenaient de la mer des Sargasses et que sur les côtes Ouest de l'Irlande il avait été recueilli des organismes pélagiques tels que Salpes, Vellèles, Janthines, Physalies, qui ont été retrouvés par GLÉMAREC et MONNAT.

A ces espèces marines il faut ajouter les fruits et les graines de plantes supérieures qui les accompagnent. Dans notre région nous avons pu examiner des spécimens flottés de fruits d'*Attalea* sp., Palmier du Brésil, qui nous ont été communiqués par M. BOUXIN, du Laboratoire du Collège de France à Concarneau, que nous remercions ici ; ils provenaient des Sables-Blancs en Concarneau, où ils avaient échoué en masse en 1963.



Fruit d'*Attalea* sp. de profil (long. 80 mm, larg. 51 mm)

(Photo N. Vaudois)



Graine de *Dioclea reflexa* (long. 27 mm, larg. 21 mm)

(Photo Micheli)

Par ailleurs nous avons recueilli en avril 1968, à Porspoder, parmi les goémons d'épave, une graine de *Dioclea reflexa* Hook., Légumineuse appartenant à une espèce pantropicale fréquente aux Antilles, qui a été assez rarement récoltée dans les Orcades et les Shetlands, au Nord de l'Ecosse.

Ces deux récoltes montrent que nos plages, comme celles de l'Irlande, peuvent être des lieux d'échouage de plantes exotiques. Les graines et les fruits pouvant se conserver longtemps dans les sables, nous espérons que nos collègues de *Penn ar Bed* pourront ajouter à ce début de liste les espèces que le hasard aurait mis entre leurs mains.

Nous remercions M^{me} N. VAUDOIS, du Laboratoire de Paléobotanique de la Sorbonne, et M^{me} A. LE THOMAS, du Laboratoire de Phanérogamie du Muséum, de leurs déterminations.

Bibliographie :

- COLGAN N. - On the occurrence of Tropical Drift Deeds on the Irish Atlantic Coasts, *Proc. Roy. Irish Acad.*, 1919, XXXV, B, 29-54.
GLÉMAREC M. et MONNAT J.-Y. - Un récent échouage d'animaux exotiques sur nos côtes, *Penn ar Bed*, 1966, 45, 209-218.

MINÉRALOGIE

Les lorientais membres de la S.E.P.N.B. ont manifesté à plusieurs reprises le désir de voir se resserrer entre eux les contacts minéralogiques par l'organisation de sorties en groupe et de séances de travail.

M. RIOU accepte de s'en occuper, aidé en cela et de façon permanente par M. LULZAC, Géologue du B.R.G.M., et, chaque fois que les exigences professionnelles le leur permettront, par deux autres géologues.

Des séances de travail au domicile de M. RIOU, des sorties en groupe sur le terrain et des conférences sont envisagées.

M. RIOU demande à tous ceux que ce projet intéresse de se mettre en rapport avec lui en précisant les jours et heures leur convenant. Le voir à son domicile n° 20, rue de l'Eglise à Lorient, ou lui écrire.