

Les Oiseaux du Cap Fréhel

par Albert LUCAS

Dessins de Paul BARRUEL


Le Cap Fréhel, flanqué de la pointe de la Teignouse à l'Est et de la pointe du Jas à l'Ouest, constitue « une espèce de trident pointé face au Nord » (P. BROSSELIN). Avec les îlots de la Teignouse, de la Fauconnière, du Jas et de l'Amas du Cap, cet ensemble comporte environ 6 kilomètres de côtes escarpées dont plus de la moitié sont occupées par 700 à 800 couples d'oiseaux nicheurs.

Comme la plupart des colonies rupestres d'oiseaux marins de Bretagne, celles du Cap Fréhel sont caractérisées par l'installation récente du Fulmar, par l'augmentation des effectifs de Mouettes tridactyles, par la prospérité des Cormorans et Goélands et par les fluctuations des faibles effectifs de Pingouins. Mais le trait particulier du Cap est que les Guillemots, installés depuis peu, ont notablement augmenté en nombre, alors que partout ailleurs en Bretagne ils se maintiennent difficilement ou régressent.



Poussin de Pinguin torda

(Photo Mazé)




Réserve du Cap Fréhel : 1. Colonies d'oiseaux en 1969

Le Fulmar. — On pourrait le confondre avec le Goéland dont il a la taille et la coloration générale. Mais son vol particulier : battements rapides d'ailes rigides et longues glissades acrobatiques, permet à l'observateur averti de le distinguer aisément.

Longtemps localisé dans les mers boréales, le Fulmar a envahi les Iles Britanniques il y a quelques décennies et depuis 1960 s'est reproduit en Bretagne. Cette expansion est étonnante quand on sait que cet oiseau pélagique, qui ne fréquente les côtes que pour se reproduire, ne devient reproducteur qu'à l'âge de 7 ans, qu'il pond un œuf unique dont l'incubation dure 7 semaines et que le jeune ne s'envole guère avant 50 jours. En outre, l'installation du Fulmar dans un nouveau biotope ne se fait qu'après une longue fréquentation des lieux. Ce fut le cas au Cap Fréhel où la nidification fut effective pour un couple en 1969 (observation de M. BOURGAULT), mais où déjà en 1959, BROSSÉLIN avait noté un individu localisé et où, d'années en années, les observateurs constataient la présence estivale d'individus de plus en plus nombreux et réguliers (5 en 1963, 7 en 1968).

La Mouette tridactyle. — Oiseau de haute mer, que l'on n'observe à la côte qu'au moment de la nidification, la Mouette tridactyle recherche les falaises peu ensoleillées pour y accrocher son nid d'algues où elle pond 1 ou 2 œufs. La date d'installation au Cap Fréhel n'est pas exactement connue. Nous savons seulement qu'il y avait une colonie en 1943, mais qu'elle n'y existait pas en 1939. D'abord localisée sur la face Est du Cap Fréhel, elle se reproduisait progressivement en divers endroits (Amas du Cap, Fauconnière, pointe et îlot du Jas) à mesure qu'augmentait le nombre des nicheurs. Cette progression peut se résumer ainsi :



Mouette tridactyle couvant

Années	Nombre de nids	Nombre de colonies	Observateurs
1939	0	0	BERTHET
1943	?	1	KIRCHNER
1952	3	1	BOQUIEN
1958	73 environ	3	BROSSELIN et JULIEN
1959	124	3	BROSSELIN
1967	110-130	5	BROSSELIN
1968	110-130	6	BROSSELIN

Le Goéland argenté. — Des trois espèces de Goélands nicheuses en Bretagne, seul le Goéland argenté nidifie abondamment et régulièrement au Cap Fréhel : le nombre de couples était d'au moins 300 en 1968. C'est un Laridé comme la Mouette tridactyle dont il se distingue notamment par la taille plus grande et les pattes de couleur rose au lieu de noire. Réparti sur l'ensemble des falaises, il s'observe aisément sur la Fauconnière. Autour des colonies, quelques immatures, les « grisards » côtoient les adultes.

Le Cormoran huppé. — Environ 250 couples nidifient sur les falaises de Fréhel. Leur nid sommaire est situé sur une corniche ou dans un creux de rocher. Deux à trois œufs bleutés, puis des poussins à duvet noir. Les immatures ont le ventre clair et le dos brun ; ce n'est qu'après 2 ou 3 ans qu'ils prendront la livrée noire à reflets verts des adultes.




Cormoran huppé abritant un poussin

Le Pingouin torda. — Les Pingouins et les Guillemots, dont l'attitude dressée, lorsqu'ils sont à terre, est si caractéristique sont des oiseaux marins capables de voler, mais surtout plongeurs, ce qui explique qu'ils soient les principales victimes des hydrocarbures déversés en mer par les pétroliers. Les Pingouins nichent dans les anfractuosités des rochers, aussi est-il difficile d'apprécier leur population. En 1968, BROSSELINE dénombrait 26 individus au Cap Fréhel.

Le Guillemot de Troil. — Il se distingue du Pingouin par son bec plus fin. Il nidifie plus volontiers en colonies, sur les plates-formes des falaises. Un seul œuf par couple comme chez le Pingouin.


L'installation du Guillemot est récente au Cap Fréhel : quelques individus mais pas d'œufs en 1959, 12 couples nicheurs découverts en 1960 par BOURDON ; 72 individus en 1967 et



Pingouin torda criant

les années qui viennent, procéder au renforcement des mesures de protection, notamment à la saison des nids qui débute en mars et se prolonge jusqu'en août.

90-100 en 1968, ce qui laisse supposer une quarantaine de couples reproducteurs selon BROSSÉLIN. Les colonies avien-nes du Cap Fréhel se portent bien : les espèces y sont plus variées qu'autrefois, elles y sont aussi plus populeuses. Ce bilan positif résulte, sans nul doute, des mesures de protection qui ont été prises. Cependant nous sommes bien loin de la saturation et de multiples possibilités d'accroissement existent encore. Pour y parvenir il faudra, dans



Guillemot de Troil avec son poussin

BIBLIOGRAPHIE

- BERTHET (G.), 1950 - La Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* au Cap Fréhel (Côtes-du-Nord). *L'oiseau et la R.F.O.*, 23 : 153.
- BOQUIEN (Y.), 1952 - La Mouette tridactyle au Cap Fréhel. *Alauda*, 20 : 265.
- BROSSÉLIN (M.), 1969 - Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne : VII. De Paimpol à l'embouchure du Couesnon. *Ar Vran*, 2 : 26-37.
- BROSSÉLIN (M.) et JULIEN (M.-H.), 1959 - Les colonies d'oiseaux marins du Cap Fréhel. *Bull. Lab. marit. Dinard*, 44 : 22-25.
- JULIEN (M.-H.), 1957 - Quelques observations sur l'avifaune de la région de Dinard. *Bull. Lab. marit. Dinard*, 43 : 126-127.
- JULIEN (M.-H.), 1959 - Projet de réserve ornithologique au Cap Fréhel. *Penn ar Bed*, 2 : 102-104.