

L'Avifaune nicheuse de Trevoc'h

par Patrick DORVAL

Située à l'embouchure de l'Aber-Benoît, l'île de Trevoc'h est en fait constituée de trois îlots, séparés à marée haute ; ce sont du Nord au Sud : Enez Vihan Trevoc'h, An Dord, Enez Vras Trevoc'h.

La disparition presque totale des colonies de Sternes dans l'archipel de Molène fait ressortir l'intérêt de l'ensemble de Trevoc'h sur le plan ornithologique ; deux des îlots (Enez Vras Trevoc'h et An Dord), d'une superficie d'un hectare, ont été achetés en 1968 par la S.E.P.N.B., leur gardiennage étant assuré par M. J. MÉNEC, marin-pêcheur à Saint-Pabu.

En 1965, J. DIDIER et M. BROSELIN faisaient une estimation de la richesse de l'avifaune de Trevoc'h : une quantité importante de Sternes (Dougall, pierregarin, Caugek, naine, et même arctique) ont niché cette année-là sur l'île, dont l'intérêt ornithologique était connu depuis quelques années.

En 1966, commencèrent les dénombrements précis et systématiques d'oiseaux nicheurs, effectués durant les mois de mai et juin par les ornithologues d'Ar Vran, ils donnèrent les résultats suivants :

- *Huitrier-pie* : 4 à 5 couples en 1966 et 1967, 9 couples en 1968, 8-9 couples en 1969.
- *Grand Gravelot* : un seul couple nicheur en 1965.
- *Gravelot à collier interrompu* : 4 à 5 couples en 1966, 1967 et 1968, 11 couples en 1969.
- *Sterne pierregarin* : l'espèce niche sur le pourtour de chacun des îlots. 50 couples ont été dénombrés en 1966, 200 en 1967, 150 en 1968 et 200 à 220 couples en 1969.
- *Sterne arctique* : a niché en 1965, en nombre non précisé.
- *Sterne de Dougall* : l'espèce est répartie sur les 3 îlots et s'installe dans la végétation (ce qui rend difficile les opérations de comptage). La colonie comprenait 130 couples en 1966, environ 600 en 1967, 300 à 400 en 1968 et 230-260 en 1969.
- *Sterne naine* : elle niche sur la plage Sud d'Enez Vihan Trevoc'h. On a dénombré 6 à 10 couples en 1966, 4 couples seulement en 1967, 18 en 1968, 25 en 1969.
- *Sterne Caugek* : la colonie est localisée sur la pente nord d'Enez Vihan Trevoc'h, elle comptait 50 nids en 1966, 100 en 1967, 70 en 1968, 136 en 1969.
- *Goéland argenté* : l'espèce s'est installée en 1969 sur Enez Vras Trevoc'h où on a trouvé un couple nicheur.
- *Tadorne de Belon* : observé en 1968 et 1969 à Trevoc'h, mais la nidification probable de l'espèce n'a pu être prouvée.

Ce bref aperçu de la richesse de l'avifaune de Trevoc'h montre que cette île contient avec celle de Méaban dans le Morbihan une des plus belles colonies bretonnes de Sternes. La mise en réserve de deux des îlots ne peut que favoriser leur nidification compromise actuellement en bien des points du littoral par le développement du tourisme et de la navigation de plaisance.