

NOTES

QUELQUES POISSONS SIGNALÉS DANS LES EAUX NORMANDES

La capture de certains poissons a été signalée au Laboratoire de biologie marine de Luc-sur-Mer (14), et les échantillons nous ont été apportés, permettant ainsi une diagnose précise.

BRAMA RAIL (BLOCH) ou Castagnole. Bramidae.

Un exemplaire nous a été apporté le 1-12-1967. Il avait été pris sur une ligne posée sur la plage de Courseulles. Ses dimensions étaient les suivantes :

Longueur totale : 59 cm

Hauteur du corps : 21 cm

Longueur des nageoires : dorsale 26 cm ; anale 22 cm ; pectorales 14,5 cm ; pelviennes 3,8 cm ; caudale 13 cm

Poids : 2,400 kg

Il a été signalé dans la faune de Plymouth le 8-11-1932 et le 20-8-1950, ainsi qu'à Caen en 1928 et vers 1946.

BALISTES CAPRISCUS (GMELIN). Balistidae.

Un exemplaire a été capturé le 1-9-1970, dans un chalut à Luc-sur-Mer, par M. CAUVIN, marin pêcheur. Mis dans un aquarium au Laboratoire, il est mort accidentellement le 26 du même mois. Ses mensurations étaient les suivantes :

Longueur totale : 36 cm

Longueur du corps : 29 cm

Hauteur du corps : 16 cm

Poids total : 900 grammes.

Il est signalé dans la faune de Plymouth comme rare, bien que sa capture soit devenue plus fréquente récemment. Il semble être inconnu des pêcheurs locaux.

UROPHYCIS BLENNOIDES (BRUNN.). Gadidae.

Deux exemplaires ont été rapportés par le même chalutier de Port-en-Bessin, « La Brigitte », patron MARIE. Ces captures ont été faites près des côtes anglaises dans le secteur de la Manche ouest. Les mensurations n'ont pas été effectuées sur ces animaux. Les captures datent de fin janvier et début mars 1969.

Les pêcheurs semblent ne pas le connaître, mais il est fort probable que sa capture soit assez fréquente.

Il est signalé comme occasionnel dans la faune de Plymouth.

TRIPTERYGION NASUS (Riss.). Blenniidae.

J'ai capturé deux exemplaires le 29-5-1969, au lieu-dit « Mare aux marchands », près de Jobourg, sur la côte ouest du Cotentin.

Les mensurations suivantes ont été prises :

Longueur totale : 7,7 cm

Longueur du corps : 6,8 cm

Cette espèce ne semble jamais avoir été signalée sur nos côtes de la Manche. Elle est citée en Méditerranée seulement.

Il serait intéressant de savoir cependant si d'autres captures ont été faites pour ces espèces ou d'autres peu communes sur nos côtes.

P. LE GALL,

Laboratoire maritime de Luc-sur-Mer (Calvados).

HYMÉNOPTÈRES TENTHREDOIDES RÉCOLTÉS DANS LA REGION
DE PAIMPOL (Côtes-du-Nord)

par H. CHEVIN et R. SILVESTRE de SACY

Depuis 1960, chaque année du 15 juillet au 15 août, l'un de nous effectue des chasses entomologiques dans un rayon de 15 kilomètres autour de Kérity-Paimpol. Bien que cette période de l'année soit peu favorable aux récoltes d'Hyménoptères Tenthredoïdes, 639 représentants de ce groupe, appartenant à 31 espèces, ont été cependant capturés. Ces récoltes comblent partiellement une lacune dans la connaissance de la faune entomologique bretonne. En effet, dans le travail de BARBOTIN (1) consacré aux Tenthredes du Massif armoricain, le département des Côtes-du-Nord est rarement mentionné.

Les différentes espèces sont citées dans l'ordre systématique en indiquant pour chacune d'elles, la ou les plantes-hôtes connues, le nombre d'individus récoltés et les localités de capture. Les chasses ayant toujours eu lieu du 15 juillet au 15 août, il nous a semblé inutile de préciser les dates exactes de capture.

ARGIDAE

- Arge cyanocrocea* (Först.) - *Rubus* - 2 ♂ et 3 ♀ - Kérity et Pors-Even.
Arge gracilicornis (Kl.) - *Rubus idaeus* L., *R. fruticosus* L. et *Rosa canina* L. - 1 ♂ et 5 ♀ - Kérity et Pléhédel.
Arge melanochoa (Gmel.) - Plante-hôte inconnue - 1 ♂ et 4 ♀ - Kérity.
Arge pagana (Panz.) - *Rosa* - 2 ♀ et des larves - Kérity et Yvias.

CIMBICIDAE

- Zaraea fasciata* (L.) - *Lonicera* et diverses Caprifoliacées cultivées : *Symphoricarpos*, *Leycesteria*, etc... - 2 ♀ - Kérity.

TENTHREDINIDAE

Selandriinae

- Aneugmenus padi* (L.) - *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. - 1 ♀ - Kérity.
Selandria serva (F.) - Diverses Graminées, Cypéracées, Joncacées - 2 ♂ dont un de la var. *mascula* Fall. - Port-Donan et Plougrescant.
Dolerus germanicus (F.) - *Equisetum* - 1 ♂ et 2 ♀ - Trestel.

Blennocampinae

- Athalia rosae* L. = *A. colibri* Christ. - Crucifères sauvages et cultivées - 137 ♂ et 164 ♀ - Espèce commune récoltée dans les diverses localités visitées.
Athalia lugens Kl. - Plante-hôte inconnue - 15 ♂ et 3 ♀ - Kérity, Port-Donan, Trévère et Tréguier.
Athalia circularis Kl. = *A. lineolata* Lep. - *Glechoma*, *Lycopus*, *Plantago*, *Veronica* - 32 ♂ et 12 ♀ dont un mâle de la forme *libertoïdes* et un mâle de la forme *cordatoïdes* - Kérity, Plougrescant, Trévère et Tréguier.
Athalia cordata Lep. - *Ajuga*, *Antirrhinum*, *Plantago* - 23 ♂ et 4 ♀ - Kérity, Trévère et Port-Donan.
Athalia liberta Kl. - *Alliaria*, *Cardamine*, *Sisymbrium* - 1 ♂ et 1 ♀ - Tréguier et Plougrescant.
Ametastegia glabrata (Fall.) - Chenopodiacées et Polygonacées, en particulier *Polygonum* et *Rumex* - 1 ♂ - Kérity.

(1) F. BARBOTIN - Contribution à l'étude de la faune du Massif armoricain. Hyménoptères tenthredoïdes. *Bull. Soc. Sc. Bretagne*, 1951, 26, 129-139.

Ametastegia equiseti (Fall.) - Mêmes plantes et Lythracées - 1 ♀ - Kérity.

Ametastegia tener (Fall.) - *Rumex* - 1 ♀ - Kérity.

Eutomostethus ephippium (Panz.) - Graminées - 1 ♀ - Kérity.

Stethomostus fuliginosus (Schrk.) - *Ranunculus* - 1 ♀ - Kérity.

Profenusa pygmaea (Kl.) - *Quercus* - 1 ♀ - Kérity.

Tenthredininae

Tenthredo vespa Retz. - Oléacées et Caprifoliacées - 16 ♂ et 30 ♀ - Kérity, Yvias et Lancerf.

Tenthredo marginella F. - *Origanum*, *Lycopus*, *Mentha*, *Plantago* - 1 ♀ - Kérity.

Tenthredo amoena Grav. - *Hypericum* - 2 ♂ et 2 ♀ - Kérity.

Tenthredo livida L. - Espèce polyphage - 1 ♀ - Kérity.

Tenthredo acerrima Benson - *Lotus corniculatus* L. - 25 ♀ - Kérity, Tréguier et Lancerf.

Tenthredo schaefferi Kl. - *Trifolium* - 12 ♀ - Kérity, Lancerf, Trévérec, Pors-Even et Plougrescant.

Tenthredo schaefferi forme *perkinsi* (Morice) - *Trifolium* - 68 ♀
Espèce récoltée dans toutes les localités visitées.

Si les femelles des trois dernières espèces sont identifiables, les mâles, par contre, ne peuvent être séparés ; 51 mâles ont été capturés dans les diverses localités prospectées.

Pachyprotasis rapae (L.) - *Betonica*, *Scrophularia*, *Solidago*, *Fraxinus* - 2 ♀ - Kérity.

Macrophya ribis (Schrk.) - *Sambucus* - 1 ♀ - Kérity.

Nematinae

Pristiphora crassicornis (Htg.) - *Crataegus* - 1 ♂ - Kérity.

Euura mucronata (Htg.) - *Salix* - 1 ♀ - Kérity.

Pteronidea myosotidis (F.) - *Onobrychis*, *Trifolium* - 1 ♂ et 1 ♀ - Kérity.

L'examen de cette liste appelle quelques remarques d'ordre faunistique. Comme nous l'avons signalé en début d'article, les Tenthredes sont rares en été. En effet, la plupart des espèces sont soit univoltines et volent en mai-juin, soit bivoltines, les adultes apparaissant alors de nouveau en août-septembre. Les espèces de la première catégorie, telles que beaucoup de *Tenthredo*, *Macrophya*, *Tenthredopsis*, *Rhogogaster*, *Dolerus*, etc., sont donc absentes de nos relevés. Quant aux autres, elles commencent à apparaître vers la fin de notre période de chasse. Parmi ces dernières, les *Athalia* représentent presque les deux tiers des captures totales, *A. rosae* L. étant la plus abondante. Une espèce voisine, *A. glabricollis* Thoms., également commune en France et signalée du Finistère et d'Ille-et-Vilaine, n'a pas été observée dans nos récoltes. Nous ignorons si elle est réellement absente de cette région ou si elle apparaît plus tardivement.

Les espèces inventoriées sont en général communes et répandues dans toute la France, sauf *Athalia liberta* Kl. qui est rare et la forme typique de *Tenthredo schaefferi* Kl. qui est très localisée. En effet, après examen d'un grand nombre d'individus provenant de diverses régions de France, il apparaît que si la forme *perkinsi* a une vaste distribution, la forme typique existe seulement en montagne (Alpes, Massif Central) ou en Bretagne et fait totalement défaut dans les autres régions comme la Normandie ou le Bassin parisien. Des récoltes effectuées dans d'autres localités de Bretagne ou des régions voisines devraient permettre de préciser cette curieuse répartition géographique. C'est d'ailleurs un des intérêts de tels inventaires locaux.

(Laboratoire de Faunistique, INRA Versailles).