

Les Palmiers du Finistère

par A.-H. DIZERBO

Nous pensons intéressant de donner quelques indications sur les Palmiers cultivés actuellement dans le Finistère ; il y a en effet longtemps que les palmiers indigènes ont disparu comme en témoignent les empreintes fossiles trouvées dans les grès à Sabal de la Vendée au Finistère (E. REID). Les palmiers bretons actuels sont des plants introduits dans les jardins qui se reproduisent peu par graines. Leurs origines sont diverses, on y distingue les genres suivants :

- Feuilles pennées. Tronc lisse, massif sans traces des bases des feuilles *Jubaea*
- Feuilles pennées. Tronc lisse, massif avec des traces des bases des feuilles *Phoenix*
- Feuilles palmées. Tronc enveloppé de bourre. Plants de 4 à 10 m *Trachycarpus*
- Feuilles palmées. Tronc enveloppé de bourre. Plants de 1 à 2 m *Chamaerops*

Nous ajouterons quelques détails sur le comportement de chacune des espèces, dans le département :

Jubaea spectabilis H.B. et K. : cocotier du Chili, introduit vers 1856 à Pors-an-Trez près de Morlaix et à Brest dans le jardin de l'Hôpital maritime, où il atteignait 6 m en 1939, détruit en 1944.


Phoenix canariensis Hort. : palmier des Canaries dérivé du Palmier dattier (*P. dactylifera* L.), pousse en pleine terre à Morgat en Crozon (CORILLION).



Chamaerops excelsa



Phoenix canariensis



Chamaerops humilis

Trachycarpus (*Chamaerops*) *excelsus* Wendl. (*T. Fortunei* Thunb., *T. chinensis* Hort.) : le plus commun parce que le plus robuste, il résiste à — 17°. Connu sous le nom de Palmier-chanvre en raison de sa bourre, il est originaire du Japon. Il a été introduit en 1858 dans le jardin de l'Hôpital maritime de Brest et dans le parc de Pors-an-Trez, à Lesquiffiou, à Morlaix, en provenance de graines envoyées au Muséum par DE MONTIGNY, Consul en Chine (BLANCHARD, DE LAUZANNE) ; il fructifie et se reproduit.

Chamaerops humilis L. : c'est le Palmier nain ou Doum de l'Afrique du Nord ; cette espèce française, dont la station nicoise a été détruite, se propage par rejets, un beau spécimen haut de 2 m existait à l'Hôpital maritime de Brest avant la guerre. Des boutures en provenance d'Ajaccio ont donné naissance à des plants qui se maintiennent depuis 30 ans à Lanvéoc.

Ajoutons pour mémoire la présence de fruits d'*Attalea* sp., originaires du Brésil, recueillis sur les plages de Concarneau par H. BOUXIN.

REFERENCES

- BLANCHARD (J.-H.), 1872 - Observations relatives à l'action des derniers hivers sur les différents végétaux cultivés dans le jardin botanique de Brest. *Jour. Soc. Centrale Agric. France*, 2^e s., VI : 488-495.
- CORILLION (R.), 1964 - Notice sommaire de la carte de végétation de la France, N° 21. Brest, CNRS, 28 p.
- DE LAUZANNE (H.), 1884 - Notes d'histoire naturelle. *Bull. Soc. Et. Sci. Finistère*, Morlaix, I : 38.
- REID (E.), 1927 - Tertiary fruits and seeds from Saint-Tudy (Finistère). *Bull. Soc. Géol. Min. Bretagne*, VIII : 36-65, 3 pl.