

NOTES

Les Cigognes sont revenues nicher dans le Cotentin en 1974

En 1971, un couple de Cigognes avait déjà réussi une nidification heureuse, couronnée par la naissance de 3 jeunes, dans les marais de Crosville-sur-Douve, près de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), mais un nemrod local avait cru bon de tuer la mère dès l'ouverture de la chasse (*Penn ar Bed*, n° 68). Sans rancune les Cigognes sont revenues...

En 1972, un couple de Cigognes est vu trois fois en mai-juin à Crosville-sur-Douve. En juillet, un couple s'installe à quelques kilomètres de là, près de l'église de Selsoif où il commence un nid. Ils repartent le 20 août (*Penn ar Bed*, n° 72).

En 1973, trois Cigognes sont signalées errant au-dessus du marais de Carentan, au cours de la première semaine de juin. A Selsoif pas de nouvelles, les habitants sont devenus très discrets depuis qu'ils ont appris que les Cigognes attiraient des flots de visiteurs tous les dimanches.

En 1974, certains habitants de Selsoif taillent soigneusement leurs têtards dans les haies, pour attirer éventuellement les Cigognes. Le 8 mai, le « mâle » arrive ; plusieurs observations confirment cette apparition dans le marais de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Le 10 mai, une femelle le rejoint et dès le 11, ils arrangent les branches sur un têtard d'orme, d'une dizaine de mètres de hauteur, situé dans une haie tout près d'une maison et à 10 m d'une route.

Les Cigognes ont choisi le têtard le plus élevé de la haie et le mieux taillé. Elles passent des heures sur le nid, disposant les branches, craquant en renversant la tête en arrière, ou observant sans inquiétude les visiteurs. Pendant que l'une couve, l'autre ramasse des branches dans le marais. Elle les casse d'un coup sec avec son bec, et se bat parfois avec les corneilles. Au début de juillet, les branches du têtard ont poussé et masquent partiellement le nid qui a pourtant monté ; deux petites têtes dépassent à peine de l'échafaudage : ce sont les 2 jeunes qui viennent de naître.

La Fédération de la Chasse a la sage précaution de mettre en réserve tous les champs entourant le nid et cette année il n'y aura pas de deuil dans la famille Cigogne.

D'autre part, les habitants de Selsoif n'ayant fait aucune publicité, les curieux ne viendront plus déranger les Cigognes tous les dimanches, comme ils le faisaient à Crosville.

Le 10 septembre, les deux adultes et un jeune partent, la dernière Cigogne quitte Selsoif deux ou trois jours plus tard.

La section de la Manche de la S.E.P.N.B. a adressé ses félicitations aux habitants de la commune pour leur discrétion et leur attitude sympathique envers les Cigognes. Un exemple réussi de protection de la nature sans télé et sans flons-flons.

Nicole GIRARD.

Observations ornithologiques à Chausey du 24 décembre 1974 au 4 janvier 1975

Conditions atmosphériques : temps très doux, souvent ensoleillé, vents faibles ; Mer agitée le 24, peu agitée ensuite. Marée coef. 100 le 31 décembre.

Les observations ont été faites : pendant la traversée, sur la Grande-Ile et, à marée basse, à partir des îlots accessibles à pied.

Pour les oiseaux de mer, nous indiquons ici le plus grand nombre observé à la fois.

Espèces	Nombre	Espèces	Nombre
Pingouin torda	3	Pluvier argenté	32
Guillemot de Troil	2	Grand Gravelot	14
Plongeon arctique	2	Courlis cendré	80
Grèbe esclavon	12	Courlis corlieu	23
Grand Cormoran	20	Tournepie	30
Cormoran huppé	4	Barge rousse	5
Héron cendré	2	Chevalier gambette	57
Bernache cravant	130	Bécasseau variable	140
Tadorne de Belon	30	Goéland brun	2
Macreuse noire	45	Goéland marin	7
Harle huppé	14	Goéland argenté	le plus commun
Huitrier-pie	160	Mouette rieuse	10

Dans l'île, nous avons noté :

Faisan	prairie centre Grande-Ile	Grive draine	prairies
Alouette des champs		Fauvette pitchou	roncier Grande-Ile
Pipit maritime	sur la côte	Pouillot véloce	ferme verger
Pipit farlouse	prairies et dunes	Roitelet tr. b.	ajoncs
Troglodyte	partout	Mésange bleue	partout
Accenteur mouchet	partout	Mésange charb.	partout
Traquet-pâtre	dunes, ouest Grande-Ile	Grimpereau des j.	pins
Rouge-queue-noir	dunes, ouest Grande-Ile	Linotte melod.	arbres
Rouge-gorge	partout (arbres)	Pinson des arbres	partout
Grive litorne	Lande Pointe de Bretagne	Verdier	partout
Merle noir	partout	Chardonneret	prairies, fort
Grive mauvis	prairies	Bouvreuil	prairie
Grive musicienne	partout	Moineau domest.	près habitations

PROBLÈMES DE PROTECTION

LES CENTRALES NUCLEAIRES

Questions à l'usine atomique de La Hague

La S.E.P.N.B.C. qui a suivi la dernière conférence donnée par le C.E.A., à travers les comptes rendus de la presse locale, se réjouit de voir le C.E.A. s'ouvrir au public et fournir les taux de radioactivité qu'il libère dans l'environnement ; mais la S.E.P.N.B.C. souhaite que :

— qu'une information plus complète soit livrée à l'heure du tout-nucléaire, en particulier sur les recherches menées depuis 1968 par le laboratoire de Radioécologie marine, information à laquelle ont droit les populations de La Hague et de Cherbourg.

— que soient connues et publiées, comme en Angleterre pour l'usine de Windscale, les incidences des rejets de Strontium, Césium, Iode 131, Ruthénium... qui s'accumulent le long des chaînes alimentaires et aboutissent aux populations locales.

Le poisson pêché dans La Hague, étant vendu aux halles de Cherbourg et consommé dans la région, de même que le lait et la viande, de fortes concentrations de radioéléments à longue période risquent de se retrouver dans la chair et les os des habitants du Nord-Cotentin. Les usines traitant les algues risquent aussi de fabriquer des aliments gélifiants plus ou moins radioactifs.

La S.E.P.N.C.B. s'inquiète d'apprendre que les rejets seront multipliés par 30 lorsque l'usine atteindra sa pleine capacité, alors qu'elle a déjà