

Un dauphin rare trouvé sur les côtes du Finistère : *Lagenorhynchus acutus* (Gray, 1828)

par Raymond DUGUY *

Le 21 mars 1978, un dauphin était trouvé échoué sur la plage des Blancs-Sablons, au Conquet (Nord-Finistère). Son excellent état de conservation indiquait une mort très récente et permettait de l'identifier, sans aucun doute, comme étant un Lagenorhynque à flancs blancs, *Lagenorhynchus acutus* (GRAY, 1828). Ce spécimen était une femelle immature, de 163 cm de longueur, présentant la dentition habituelle de l'espèce : 29 | 31

30 | 29

L'intérêt de la découverte de ce dauphin tient à ce qu'elle fournit la première identification de Lagenorhynque à flancs blancs sur les côtes de France. Jusqu'à présent, aucune observation d'échouage, ni aucune pièce conservée en collection, n'était connue sur notre littoral (DUGUY et ROBINEAU, 1973).

L'aire de répartition de l'espèce se situe dans le Nord de l'Atlantique, mais sa limite Sud reste à une latitude plus haute que celle de l'espèce voisine, *Lagenorhynchus albirostris* GRAY, 1846. Selon les données fournies par les échouages en Mer du Nord et dans le Nord de l'Atlantique, on peut constater que le Lagenorhynque à flancs blancs est fréquent sur les côtes de Norvège (FRASER, 1974), moins commun sur les côtes de Suède et du Danemark (SCHULTZ, 1970), et très rare sur les côtes des Pays-Bas où trois échouages seulement sont connus (VAN BREE et HUSSON, 1974).

En Angleterre, une trentaine d'échouages ont été rapportés (FRASER, 1974) : ils se localisent sur les côtes Nord, Nord-Est et Est, mais aucun n'est connu sur les côtes Sud et Sud-Ouest. Toutefois, 17 échouages ont été observés en Irlande (WEST et O'RIORDAN, 1978). La répartition mensuelle de ces observations montre que les échouages se répartissent, presque tous, entre juin et septembre, mais qu'ils semblent également plus fréquents en février et mars (FRASER, 1974).

Si la découverte d'un Lagenorhynque sur la côte Nord-Finistère s'accorde bien, par sa date, avec cette variation de

* Centre d'Etude des Mammifères Marins. Museum d'Histoire Naturelle - 17000 La Rochelle.



Le Lagenorhynque à flancs blancs sur la plage des Blancs Sablons,
Le Conquet (Finistère)

(Photo J. Le Bournot)

fréquence sur les côtes anglaises, il n'en est pas de même en ce qui concerne la latitude. Selon les données actuellement connues, on peut estimer que la limite sud de l'aire de répartition de l'espèce se situe vers 51°30'N, alors que le lieu d'échouage ne se trouve qu'à 48°28'N. On peut donc penser que le spécimen trouvé au Conquet est un dauphin égaré hors des limites de son aire normale de répartition. Mais cette observation exceptionnelle souligne — s'il en était besoin — l'intérêt d'un examen systématique de tous les cétacés trouvés sur nos côtes.

OUVRAGES CITES

- BREE P.J.H. van HUSSON A.M. (1974) - Strandingen van cetacea op de Nederlandse kust in 1972 en 1973. *Lutra*, 16 : 10 p.
- DUGUY R., ROBINEAU D. (1973) - Cétacés et Phoques des côtes de France. Guide d'identification. *Ann. Soc. Sci. nat. Charente-maritime*, suppl., 1-93.
- FRASER F.C. (1974) - Report on cetacea stranded on the British coasts from 1948 to 1966. *British Museum (natural history)*, 14 : 1-65.
- SCHULTZ von Wolfhart (1970) - Über das Vorkommen von Walen in der Nord-und Ostsee (Ordn. Cetacea). *Sonderdruck aus Zoologischer Anzeiger* : Bd. 185 (3/4) : 203-264.
- WEST A.B., O'RIORDAN C.E. (1978) - A white-sided Dolphin from Mulranny, Co *Irish naturalists journal*, 19 (6) : 204.

Nous remercions très vivement D. PRIEUR, E. HUSSENOT et J. LE BOURNOT, à qui nous devons les premières observations et photographies, ainsi que la récupération du corps de ce Dauphin dont le squelette a pu être conservé (coll. Muséum de La Rochelle : M. 1080).