

Réserve Ornithologique des Iles Trevoc'h (Finistère)

par Max JONIN

Les îles Trevoc'h sont situées à l'entrée de l'Aber Benoît, à seulement 1 mille de la Pointe de Corn-ar-Gazel.

Elles comprennent principalement deux îlots : Trevoc'h Vras et Trevoc'h Vihan, mais les grandes marées isolent An Dord de Trevoc'h Vras. L'ensemble ne représente qu'une superficie de 78 ares environ.

Trevoc'h Vras est un îlot plat recouvert d'une végétation herbue dense dans sa partie occidentale et essentiellement rocheux dans sa partie orientale et sur An Dord. Une petite plage souligne la côte ouest. Trevoc'h Vihan montre un îlot rocheux plus élevé au-dessus de la mer, couronné d'une petite surface herbue.

Ces îlots furent occupés, épisodiquement, autrefois par des pêcheurs et des goémoniers. Sur Trevoc'h Vras, les ruines d'une maisonnette demeurent. Sur les deux îlots se retrouvent les restes de fours à goémon.

Depuis de nombreuses années, les îles Trevoc'h furent remarquées des ornithologues pour la colonie de sternes qu'elles hébergent chaque printemps.

La proximité du continent dans un secteur très touristique, le grand intérêt du platier rocheux alentour pour la pêche à pieds et le goémon aux grandes marées, rendaient cette île très vulnérable. Nous avons, à plusieurs reprises, constaté des actes de vandalisme effectués sur la colonie d'oiseaux.

En 1968, la S.E.P.N.B. acquiert Trevoc'h Vras et met l'ensemble des îles en réserve ornithologique sous le contrôle d'un conservateur et la surveillance d'un garde assermenté, pêcheur à Saint-Pabu. Très vite, cette réserve est acceptée et reconnue par les habitants et les touristes et l'on peut dire, dix ans après, qu'elle a pleinement rempli son rôle.

Actuellement, les îles Trevoc'h sont en instance de classement en Réserve naturelle par le ministère de l'Environnement.

L'intérêt ornithologique de Trevoc'h réside essentiellement dans le fait que chaque année, elle abrite une belle colonie de sternes : Sternes caugek, pierregarin, dougall et naine se partagent les îlots.

La colonie de sternes caugek est en constante augmentation. Elle occupe essentiellement la calotte herbue de Trevoc'h Vihan.

La Sterne de Dougall fut abondante certaines années. Les effectifs « tombèrent » à 20-25 couples seulement en 1976 et 1977, ce qui correspondait à une observation générale à l'échelle européenne. Depuis 1978, la colonie augmente régulièrement. Il faut remarquer l'intérêt de la nidification de la Sterne Dougall à Trevoc'h où elle se trouve en limite sud de son aire de répartition européenne.

La Sterne pierregarin est aussi une habituée des îlots avec des effectifs « moyens ».

Sternes pierregarin et dougall s'installent à la périphérie des îlots.

La Sterne naine constitue une petite colonie stable installée sur la plage de Trevoc'h Vras.

La Sterne arctique fut observée (BROSSELIN, 1965) mais sa nidification ne fut jamais reconnue.

	1966	1968	1969	1971	1973	1977	1978	1979
STERNE GAUKE	50	70	136	197	323	320-350	580	811
STERNE DOUGALL	130	3-400	230-260	214	350-400	22	79	120-130
STERNE PIERREGARIN	50	150	200-220	275	250	120-150	130	150-170
STERNE NAINE	6-10	18	25	28	27	25	0	27-30

Il faut noter que l'année 1978, qui fut celle de l'échouage de l'*Amoco Cadiz* à quelques miles à l'Ouest de Trevoc'h et de la gigantesque marée noire qui s'ensuivit, n'a pas eu d'effet sensible sur l'ensemble de la colonie de sternes, si ce n'est, bien sûr, au niveau des sternes naines qui abandonnèrent la plage dont le sable était imprégné de pétrole.



La Sterne de Dougall

(Photo M. Jonin)

Les autres espèces marines, dont Trevoc'h abrite la nidification, sont le Gravelot à collier interrompu, l'Huitrier pie et le Pipit maritime.

Le Grand gravelot fût décrit par BROUSSELIN et DIDIER en 1965, mais il n'a pas été observé depuis cette date.

	1966	1968	1969	1971	1973	1977	1978	1979
HUITRIER PIE	4	9	8-9	9	10	7-8	8	13
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU ..	4	4	10-11	2	7	3	3	2 min.
PIBIT MARITIME	3	4	5-6	?	2	non recensé		

Le Tadorne de belon fut souvent observé sur les îlots mais sa nidification jamais prouvée. En 1979, un nid de Canard colvert fut découvert sur Trevoc'h Vras.

Il est important de signaler que, depuis 1969, les goélands tentent de s'installer sur Trevoc'h. Fort de notre expérience dans les autres colonies d'oiseaux de mer, et particulièrement de l'archipel de Molène tout proche, nous avons aussitôt lutté contre cette installation en éliminant systématiquement œufs et poussins au début, en éliminant des adultes nicheurs aujourd'hui, dans le cadre d'une action menée à l'échelle régionale.

En ce qui concerne la colonie de Trevoc'h, on peut estimer que ce « contrôle » des goélands est satisfaisant si l'on considère l'évolution des effectifs des sternes nicheuses depuis 1969, date de la tentative d'implantation des goélands. En 1969, le couple observé était un couple de goélands argentés. Quelques couples seulement furent notés jusqu'en 1976. Le Goéland marin apparaît en 1971 et le Goéland brun en 1978. En 1977, au total une quinzaine de couples sont recensés. Ils seront 41 en 1978. En 1979, le contrôle de la population a lieu dès le début de l'installation de goélands et l'on peut estimer leur nombre à environ 50 couples à cette période.

En conclusion, nous pouvons reconnaître un bilan positif pour la réserve de Trevoc'h, onze années après sa création, dans les buts qu'elle s'était fixés.