

NOTES - INFORMATIONS

Observations de 4 Bernaches nonnettes (*Branta leucopsis*) en baie du Mont Saint-Michel en Janvier 1981

par Vincent SCHRICKE (*)

Une étude en cours sur les Anatidés de la baie du Mont-Saint-Michel m'amène à effectuer un suivi régulier de ces espèces sur cette zone. Parcourant les polders le 23 janvier 1981 à la recherche des Oies rieuses (*Anser albifrons*), j'ai eu l'agréable surprise d'observer, au centre d'une prairie, quatre Bernaches nonnettes qui pâturaient en toute tranquillité en compagnie de quelques Tadornes de belon (*Tadorna tadorna*) et de centaines de Vanneaux huppés (*Vanellus vanellus*). Cette prairie, située au sud du Mont-Saint-Michel dans le prolongement de la rivière du Couesnon, occupe une superficie d'environ dix hectares ; elle est utilisée essentiellement pour le pâturage des bovins qui restent cantonnés à son extrémité sud.

Toutes les conditions pour un stationnement durable de cette oie étaient réunies : nourriture abondante et disponible, sécurité du site du fait de sa surface et de l'absence de dérangement (nos observations étant faites après la fermeture générale de la chasse sur le domaine terrestre). Les Bernaches nonnettes sont restées jusqu'au 28 janvier.

Généralement, cette oie n'est observée en France qu'à l'occasion d'hivers très rigoureux : cela a été le cas durant la vague de froid de janvier 1979 où elle a été notée non seulement en baie (100 sur les herbues le 18.02) mais aussi dans le golfe du Morbihan (38 le 2.01) et l'estuaire de la Loire (7 le 16.01 ; 6 le 17.01) (YESOU, 1980).

Antérieurement, sa présence en baie a été signalée en 1969 (6 le 10.01) et 1970 (1 le 11.01) (*Ar Vran*). Enfin, HÉMERY *et al.* (1979) indiquent que ce sont 6 individus qui ont été notés en baie du Mont-Saint-Michel au cours de la période 1967-1976. Ainsi, les observations de ces Bernaches au cours de l'hiver 1980/81, relativement doux, soulignent une fois de plus l'intérêt des polders de la baie qui ont accueilli, en outre, durant cette même période quelques Oies rieuses, Oies cendrées (*Anser anser*) et Oies des moissons (*Anser fabalis*).

BIBLIOGRAPHIE

Ar Vran (1968-1974) - Actualités ornithologiques, in *tomes I à VII*.

HEMERY G. *et al.* (1979) - Distribution, géographie, importance et évolution numériques des effectifs d'Anatidés et de Foulques hivernant en France (janvier 1967 à 1976). *Bull. Off. nat. Chasse*, n° Sp. Scien. Techn., mai 1979 : 5-91.

YESOU P. (1980) - Synthèse « Cygnes, Oies, Bernaches/ Bretagne/ Hiver 1978-79 ». *Bull. Ar Vran*, n° 22 : 22-29.

(*) Université de Rennes I. Laboratoire de Zoologie et d'Ecologie. Avenue Général Leclerc - 35042 RENNES Cedex.