

Fiche signalétique*

* D'après Van Den Brinck (1967).

Classe: Mammifères

Ordre: Carnivores

Famille: Mustélidés

Nom scientifique: *Meles meles* (Linné)

Vieux français: Tesson

Espagnol: Tejon

Italien: Tasso

Breton: Broc'h

Anglais: Badger

Allemand: Dachs

Hollandais: Das

Poids: 10-18 kg, parfois beaucoup plus élevé (27 kg)

Tête et corps: 61-72 cm

Queue: 15-19 cm

Hauteur au garrot: 30 cm

Pelage: gris par dessus, noir par dessous ; tête marquée de noir et de blanc.

Corps épais, pattes courtes, queue brève et obtuse. Museau allongé.

Habitat: forêts de feuillus

Répartition: habite toute l'Eurasie tempérée ; en Méditerranée, on le trouve en Crète et à Rhodes, ainsi qu'aux Baléares (Corbet, 1978).

Mis à part le lynx dont quelques individus franchissent parfois nos frontières (Jura, Alpes, Pyrénées), l'ours brun dont quelques couples subsistent encore dans les Pyrénées et le loup, qui a été complètement exterminé, le blaireau est le plus gros de nos carnivores français (le renard pèse de quatre à dix kilos).

Le blaireau a d'abord été apparenté aux ours auxquels il ressemble indiscutablement par ses formes massives, sa démarche de plantigrade, son allure placide et ses habitudes alimentaires. Mais ses 38 dents et l'existence de ses **glandes anales** l'ont rattaché à la famille des **mustélidés** (belette, hermine, fouine, martre, putois, vison, loutre).

L'espèce *Meles meles* comprend une multitude de variétés géographiques définies selon la couleur du pelage. Le blaireau américain, ou carcajou (*Taxidea taxus*) et le blaireau africain, ou ratel (*Mellivora capensis*) sont des espèces radicalement différentes du blaireau européen, tant sur le plan morphologique que sur le plan alimentaire.



 Blaireau américain

 Blaireau africain

 Blaireau malais

 Blaireau européen

 Blaireau asiatique

 Blaireau des Philippines