

peut donc que s'interroger sur la raréfaction des données bretonnes. Il est peu vraisemblable que la pression d'observation ou le taux de transmission des données aient baissé depuis les années 1970 ; on s'attendrait plutôt au contraire. La diminution du nombre de cas pourrait donc refléter une réelle chute des effectifs de tortues luth fréquentant nos eaux. Ceci, soit dit en passant, serait cohérent

avec la décroissance générale des populations reproductrices dont font état divers organismes.

Jacques Bossard
& Jean-Claude Linard
S.E.P.N.B.

Des dauphins de Risso dans la Manche

La baie du Mont Saint-Michel est l'un des sites bretons où le grand dauphin (*Tursiops truncatus*) est régulièrement observé. Aussi, lors des animations estivales organisées par la SEPNE à la réserve de l'île des Landes, nous portons fréquemment notre attention sur la baie.

Gris clair et sans rostre

Le 1^{er} juillet 1983, vers 17 h 30, nous observons un groupe de dauphins. L'un d'entre eux se distingue par son aspect nettement bicolore, gris clair pour la partie antérieure et plus sombre en arrière de

l'aileron. Une demi-heure plus tard, deux nouveaux animaux clairs apparaissent accompagnés d'un grand dauphin, bien plus sombre ; tous trois ont la même taille, mais l'aileron des deux individus clairs est plus important et l'un de nous constate qu'ils n'ont pas de rostre. Nous les identifions d'emblée comme des dauphins de Risso (*Grampus griseus*).

Le dauphin de Risso est un cétacé de 2,5 à 3,5 mètres de long, de coloration gris clair avec des zébrures fréquentes. L'importance du melon (bosse formée par le front) est soulignée par l'absence de bec. Son aileron dorsal est plus haut et plus courbe que celui du grand dauphin.



Eric Hussenot

Plus régulier qu'on ne pensait

C'est une espèce cosmopolite. Dans nos mers, c'est en Méditerranée qu'elle est le plus fréquemment observable; elle l'est un peu moins dans l'Atlantique, et considérée comme plus rare encore dans la Manche (1). Les échouages confirment ces observations (2). Généralement, ce cétacé n'est guère présent que par des fonds supérieurs à cent mètres.

L'observation de dauphins de Risso en baie du Mont Saint-Michel (Manche), et par fonds de cinq mètres est donc remarquable. Leur présence à cet endroit peut être reliée à celle d'une de leurs proies principales: les seiches qui viennent pon-

dre sur les bouchots de moules à cette saison (3). Il ne s'agit pas là d'un fait isolé. De nouvelles observations seront faites ce mois-là. Par ailleurs, le témoignage d'un pêcheur de Port-Mer (Cancale) nous permet d'affirmer que la fréquentation de ce secteur par l'espèce est certainement antérieure à nos relevés. En 1982, il avait en effet remarqué ces dauphins plus clairs, parmi lesquels un individu à l'aile-ron coupé, donc facilement identifiable, et revu en 1983. Une nouvelle série de données obtenue en juillet 1984 par le groupe d'étude des mammifères marins de la SEPNB confirmera la régularité de sa présence dans les eaux de la baie.

(3) Turquier Y. & M. Loir 1981. Ouest-France Ed.

Laurent Gager & Eric Thoumelin
Groupe d'étude des mammifères marins
SEPNB
BP 32, 29276 Brest cédex

(1) Duguy R. & D. Robineau 1973. Annales Société Sciences naturelles Charente-Maritime.

(2) Hussenot E. 1984. C.I.E.M., Copenhague.

Un nouveau cytise en Bretagne: *Cytisus striatus* (Hill) (1)

Les Génistées du Massif Armoricain ont fait l'objet d'un recensement et d'une description détaillée dans la flore de H. Des Abbayes et collaborateurs en 1971 (2). Plus récemment R. Corillion (3) a élargi cette étude aux espèces du cours occidental de la vallée de la Loire. Mais aucune de ces deux flores ne signale la présence du cytise strié dans l'ouest de la France. Pourtant, depuis une quinzaine d'années environ, cette plante, originaire de l'ouest et du centre de l'Espagne et du Portugal, a été semée pour stabiliser les bordures des routes et autoroutes en France, et en Bretagne en particulier. Dès 1962, elle avait déjà été signalée dans les Landes et dans l'Allier par P. Dupont (4) et, très récem-

ment par Dupont et ses collaborateurs en Bretagne (5).



Marcel Le Pennec

Les gousses argentées du cytise strié.

(1) Tutin G., V.-H. Heywood, N.-A. Burges, D.-M. Moore, D.-E. Valentine, S.-M. Walters, D.-A. Webb (1968). — Flora Europea (volume 2). Cambridge University Press.

(2) Abbayes H. des, G. Claustres, R. Corillion, P. Dupont (1971). — Flore et Végétation du Massif Armoricain. Tome 1, Flore vasculaire. Presse Universitaire de Saint-Brieuc.

(3) Corillion R. (1983). — Flore et végétation de la vallée de la Loire (cours occidental). Jouve.

(4) Dupont P. (1962). — La flore atlantique européenne. Thèse, Toulouse Fac. Sc.

(5) Dupont P., M. Godeau, G. Rivière (1984). — Remarques sur des espèces ibériques d'Ajoncs et de Genêts semées au long des routes du Morbihan, de Loire-Atlantique et des territoires voisins. Bull. Soc. de Sc. Nat. de l'Ouest de la France. Nouvelle série, Tome 6 (3), 125-129.