

Rencontres naturalistes

Une tortue de Kemp sur les galets



Une tortue de Kemp (*Lepidochelys kempii*) s'est échouée le 31 janvier 1988 sur le cordon de galets de la baie d'Audierne, au droit de l'étang de Kergalan en Tréogat. Au moment de sa découverte, elle était déjà morte, mais dans un excellent état de fraîcheur. Sa carapace mesure 270×260 mm.

Il s'agit là de la première observation de cette espèce en Bretagne et la cinquième en France. Les échouages précédents avaient eu lieu à Saint-Jean de Luz en 1926, aux portes de l'île de Ré vers 1950, à Biarritz le 25 décembre 1981 et à Saint-Martin en Ré le 21 novembre 1985. Par ailleurs, les collections du British Museum comportent un spécimen trouvé vivant à Jersey en décembre 1938.

Cette tortue marine se reproduit sur les côtes de Floride et du golfe du Mexique. Après la saison de reproduction, certains animaux se laissent emporter par le Gulf Stream vers la région des Açores puis en Mer Celtique. La preuve de cette dérive

transatlantique a été fournie par l'animal capturé à Biarritz en 1981 : il avait été marqué en Floride 569 jours plus tôt, en juin 1980. Les quelque 25 échouages de cette espèce qui se sont produits en Europe ont tous eu lieu entre octobre et janvier, ce que ne dément pas le cas présenté ici.

Gaël Rault

24 rue des Ajoncs
Quimper

Références

Brongersma L.D. 1972. European atlantic turtles. *Zoolg. Verhandl., Leiden*, 121, 1-318.

Duguy R. 1985. Observations de tortues marines sur les côtes de France. *Annales de la société des sciences naturelles de Charente Maritime*.

Fretey J. 1987. Les tortues, p. 57-106 in *Livre rouge des espèces marines et littorales menacées en France. Secrétariat de la faune et de la flore. Muséum national d'histoire naturelle, Paris*.