

Les odonates des réserves



Jean David

Libellula depressa femelle.

33 sur 56 : en progrès, peut mieux faire

Ces dernières années, quelques naturalistes amateurs ont entrepris d'inventorier les libellules des réserves de la SEPNEB et, bien que ce travail soit loin d'être terminé, des résultats significatifs ont déjà été obtenus. Ainsi, trois réserves ont montré une richesse certaine : mares et fossés de Falguérec (28 espèces observées, 22 s'y reproduisant), l'étang de Trunvel (26 et 22) et la tourbière de Sérent (12 espèces observées et se reproduisant). Par contre, deux autres réserves, Goulien et Clesseven, se sont révélées pauvres. Au total, sur 56 espèces observées en Bretagne à ce jour, 33 ont été observées sur les réserves, 29 s'y reproduisant. Deux sites potentiellement intéressants restent à prospecter : Bois Joubert et le Cragou.

Au-delà des chiffres bruts, l'examen de la liste des espèces se reproduisant dans les réserves amène quelques remarques. Tout d'abord, les espèces d'eau courante sont sous-représentées (trois espèces seulement : les **caloptéryx vierge** et **éclatant**, et le **cordulégastre annelé**). Ensuite, deux familles importantes, les gomphidés et les cordulidés, n'ont aucun représentant. Mais on retiendra surtout la reproduction d'espèces rares à des degrés divers :

L'**agrion mignon** (Falguérec et Trunvel), bien qu'assez répandu en Bretagne sud, figure sur les listes rouges nationale (Dommanget 1987) et européenne (Conseil de l'Europe, 1988).

Le **leste dryade** (Sérent) et le **cordulégastre annelé** (Sérent, Goulien) sont également sur la liste rouge des espèces rares en France et sont considérés comme menacés dans les régions les plus peuplées

d'Europe. En Bretagne, le premier est localisé alors que le deuxième reste encore assez répandu.

L'**agrion nain** (Falguérec), espèce pionnière spécialisée dans les milieux pauvres en végétation (carrières, gravières, fossés) est considéré comme rare en France mais n'est pas menacé au niveau européen.

Le **caloptéryx vierge** (Goulien, Trunvel et Sérent), l'**agrion délicat** (Falguérec, Sérent), l'**aeschna isocèle** (Trunvel) et la **libellule fauve** (Trunvel) sont toutes quatre menacées dans les régions les plus peuplées d'Europe, les deux dernières étant effectivement très localisées en Bretagne, mais elles ne figurent pas sur la liste rouge française.

Signalons encore la reproduction d'espèces méridionales peu répandues au nord de la Loire : le **lestes sauvage** et le **sympétrum méridional** à Falguérec, et peut-être aussi l'**aeschna affine** observée tant à Falguérec qu'à Trunvel (un seul individu à chaque fois).

Des réserves de libellules ?

Ainsi, bien que la protection des libellules n'ait pas été un objectif affiché de la SEPNEB, la protection et la gestion de quelques belles zones humides amènent déjà des résultats intéressants, soulignant par là que ces insectes sont de bons indicateurs de la richesse et de la qualité de leur milieu. On regrettera toutefois qu'à part l'**agrion mignon**, les espèces les plus menacées ne vivent pas dans les réserves de la SEPNEB. Pourtant, l'**agrion de Mercure**, la **cordulie à corps fin**, l'**aeschna paisible**, le **gomphe à pince**, le **gomphe à crochet** et la **cordulie à taches jaunes**, tous considérés comme en danger ou vulnérables en Europe, se reproduisent encore en Bretagne. Sauvegarder ces espèces demanderait une politique de protection adaptée, visant tout particulièrement les eaux courantes. Pensons-y dès maintenant afin que demain il ne soit trop tard...

Noms scientifiques des espèces citées

aeschna affine	<i>Aeschna affinis</i>
aeschna isocèle	<i>Anaciaeschna isosceles</i>
aeschna paisible	<i>Bayeria irene</i>
agrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>
agrion nain	<i>Ischnura pumilio</i>
caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>
cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
gomphe à pince	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
gomphe à crochet	<i>Onychogomphus uncatus</i>
lestes dryade	<i>Lestes dryas</i>
lestes sauvage	<i>Lestes barbarus</i>
libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>