

La Sterne arctique a niché sur Béniguet

Pierre YÉSOU, Louis-Gérard d'ESCRIENNE,
Jacques NISSER et Jean-François HELLIO

L'archipel de Molène, monument ornithologique et bastion de la Sterne arctique en Bretagne.

L'île de Béniguet (archipel de Molène, Finistère) est une réserve gérée par l'Office national de la chasse (Ministère de l'Environnement), qui en est propriétaire. Aux yeux du naturaliste, cette île est l'une des plus riches de l'archipel et abrite un patrimoine archéologique et naturel de plus grand intérêt (Yésou & al. 1993). Au plan ornithologique, notons la présence de la plus grande colonie française de Goélands bruns (*Larus fuscus*) : environ 6 500 couples en 1992, ce qui confère à Béniguet une importance internationale pour la conservation de cette espèce. Par ailleurs, les huîtres-pies (*Haematopus ostralegus*) et les Grands gravelots (*Charadrius hiaticula*) y nichent avec des densités apparemment sans égal dans le reste du pays, et Béniguet est l'un des très rares endroits de notre littoral atlantique où quelques couples de Sternes naines (*Sterna albifrons*) s'installent régulièrement.

Nouveauté arctique

Au printemps 1993, l'avifaune de l'île s'est enrichie d'une nouvelle espèce avec la nidification d'un couple de Sternes arctiques (*Sterna paradisea*). Alors qu'une vingtaine de couples de Sternes pierregarin (*Sterna hirundo*) couvaient déjà sur le cordon de galets au nord de l'île, ces Sternes arctiques se sont installées tardivement au pied de la dune sur la côte orientale, en

compagnie de deux couples de Sternes pierregarin ; sept à dix couples de Sternes naines s'installeront peu après sur le même site. La première observation de Sterne arctique a été faite le 9 juin, puis un nid contenant un oeuf est découvert le 11 juin. Cet oeuf unique est encore couvé le 29 juin, et l'âge du poussin est estimé à une dizaine de jours lorsqu'il est observé le 14 juillet : la durée d'incubation ne dépassant pas 24 jours chez l'espèce, la ponte devait être très fraîche lors de sa découverte. Le poussin ne sera plus observé par la suite, soit que ses parents n'aient pas réussi à le nourrir, soit qu'il ait été victime d'un goéland. Malgré la disparition du poussin, une Sterne arctique est restée près du site jusqu'au 3 août au moins, participant parfois à l'alarme des Sternes pierregarin et naines.

Molène : nécessaire archipel

Ces observations s'ajoutent à une série d'autres cas qui font de la Bretagne la limite méridionale de l'aire de reproduction de la Sterne arctique, et de l'archipel de Molène le bastion de l'espèce dans notre pays. En effet, les premières preuves de nidification de l'espèce en France avaient été obtenues en 1914 et 1919 sur Banneg, une île de cet archipel. Par la suite, des couples isolés ou de petites colonies ont été

observés à plusieurs reprises dans l'archipel de Molène-Ouessant, mais aussi à Hoëdic (Morbihan) en 1946, sur l'île Dumet (Loire-Atlantique) en 1946 et 1960, et en baie de Morlaix (Finistère) en 1960, 1961 et 1965. Depuis lors, seules quelques rares Sternes arctiques se sont installées à la pointe du Finistère, en 1968 à Banneg, en 1969 à Ouessant, en 1971 et 1947 à nouveau à Banneg, en 1982 à Balaneg et en 1984 encore à Banneg : il s'agissait chaque fois d'un couple isolé, sauf en 1982 où il y a peut-être eu deux couples (Monnat 1968, Guerneur & Monnat 1980, Grandserre 1982, J.C. Linard & A. Thomas comm. pers.). Par ailleurs, un couple mixte formé d'une Sterne pierregarin et d'une Sterne arctique a niché en 1986 dans les îles Chausey, dans la Manche (Debout & Debout 1988).

Au sud du sud

Enfin, une Sterne arctique couvant assidûment sa ponte a été observée sur les marais de Guérande au printemps 1993 par Yves Chépeau. N'ayant pu

assister au changement de partenaire sur le nid, l'observateur n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un couple de Sternes arctiques, ou d'un couple mixte Sterne arctique et Sterne pierregarin. Quoi qu'il en soit, le marais guérandais est maintenant le point le plus méridional où une Sterne arctique ait niché en Europe. ■

Quelques lectures

DEBOUT C. & DEBOUT G. 1998 - Nidification d'un couple mixte de Sterne pierregarin et Sternes arctiques. Le Cormoran 6 (33) : 217.

GRANDSERRE E. 1992 - Sterne arctique. Travaux des réserves, 1 S.E.P.N.B : 17 - 18.

GUERMEUR Y. et MONNAT J.Y. 1980 - Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. S.E.P.N.B. 240 p.

MONNAT J.Y. 1968 - Statut actuel des oiseaux marins nicheurs de Bretagne.I. l'Iroise. Ar Vran 1 : 1 - 30.

YÉSOU P., d'ESCRIBENNE L.G. & NISSER J. 1993 - La réserve de faune de l'île de Béniguet (Finistère). Bull. mens.O.N.C. 180 : 28 - 39.



Sterne arctique.

M. Cossac