

... À propos ...

... de la Chouette chevêche

« Chronique d'une mort annoncée ?... » suite

Ces quelques lignes constituent un complément à l'article paru dans le numéro 163 de décembre 1996.

Les délais séparant la rédaction d'un article et sa parution pouvant être assez longs, certains ont cru avoir été quelque peu oubliés dans cette synthèse... alors même que le résultat de leurs travaux étaient postérieurs à la rédaction de celle-ci...

Une mise au point s'imposait donc.

De l'été 1994, date de rédaction de l'article, au printemps 1999, date de cette mise au point, l'eau polluée a continué de couler en Bretagne mais qu'en est-il de la chevêche d'Athéna ?

La Loire-Atlantique a vu s'activer un grand nombre d'ornithologues qui ont multiplié les sorties nocturnes pour obtenir une « couverture » remarquable de ce département. L'abondance de l'espèce est notée autour de la Brière, mais aussi dans le sud du département, autour de Machecoul, Legé, Montbert, alors que le secteur compris entre Guéméné-Penfao et Redon ou la région autour de Chateaubriand connaissent des densités faibles (autour de 0,1 chanteur / km²). Les ravages du remembrement sont visibles sur la commune de Nort-sur-Erdre où, en 1994, R.

Musseau recense 18 sites qui, en 95, ne sont plus que 4, après la destruction de 300 kilomètres de haies.

Pour ce département, D. Rabouin, en 1997, évalue la population à au moins 850 couples. On ne dira jamais assez combien la prospection réalisée sur ce département, hier par le GOLA et aujourd'hui par la LPO 44, est remarquable !

Par ailleurs, ici ou là, des recherches moins ambitieuses quant à la surface couverte se font jour. L'inventaire exhaustif de ces travaux dépasse le cadre de cette mise au point.

On notera cependant que dans le Haut Léon (Finistère), seule région de Bretagne où un suivi des populations nicheuses est mené, et ce depuis 8 ans, on note une certaine stabilisation de la population (au moins 53 couples pour environ 300 km²).

Je profite de ces lignes pour remercier tous les ornithologues qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à une meilleure connaissance de cette espèce en Bretagne. Le GOB, Bretagne Vivante-SEPNB, le GEOCA, la LPO de Loire Atlantique ont, chacun à leur façon, contribué à rendre les choses possibles...

D. Clec'h

*Jeune
Chouette
chevêche
tombée
du nid.*



D. Clec'h