

Préambule



Comme beaucoup de naturalistes, nous avons été très tôt attirés par les marais et l'impression de vie foisonnante qui s'en dégage du début du printemps jusqu'à l'automne, et surtout par son avifaune originale. C'est en patrouillant au printemps dans ce milieu que nous avons fait connaissance avec la rousserolle effarvate dont nous découvrons les nids régulièrement installés le long des berges de l'étang de Trunvel à Tréogat (29). Si nous nous sommes par la suite intéressés à cette espèce, ce n'est pas le fruit du hasard. En effet, d'avril à juillet, le chant de l'espèce résonne dans toutes les roselières de la baie d'Audierne et, durant cette période, c'est l'oiseau qui apparaît le plus régulièrement dans les filets installés dans les roseaux. Sur le secteur, c'est de loin l'espèce nicheuse la plus abondante et c'est tout naturellement que nous avons tenté de préciser la biologie de reproduction, de connaître la densité des nicheurs et d'aborder la dynamique de population de l'espèce.

Dans cet ouvrage, nous avons confronté les informations obtenues en baie d'Audierne à celles de la littérature et nous avons également collecté de nombreuses données inédites auprès de collègues ornithologues qui suivent cette espèce sur d'autres zones humides.



Localisation de la baie d'Audierne et des zones d'étude. Les roselières (en orange) couvrent une superficie de 215 ha pour l'ensemble du site. Les plans d'eau libre apparaissent en bleu.