



Données relatives à la présence du phragmite aquatique en Lettonie

Oskars KEISS




Le phragmite aquatique enregistre 41 présences avérées en Lettonie depuis 1940 : 29 captures au lac Pape, trois captures au lac Liepaja (Lipsbergs 1971, 2000), sept observations aux lacs Pape et Liepaja (Celmins *et al.*, 1993 ; Celmins, 2003), une observation sur la côte à proximité du lac Engure en 2005, mais une seule preuve de reproduction en 1940 au lac Babite (Roms, 1942). Le mâle est capturé le 21 juillet 1940 et se trouve dans la col-


lection du Musée letton d'histoire naturelle (numéro de collection : LDM Z 11/1300). J. Viksne (1994) fait aussi mention des marais de Sarnate/Uzava comme sites de reproduction de l'espèce, mais aucune observation n'a été faite dans ces marais, bien que celui d'Uzava ait pu constituer un habitat favorable au phragmite aquatique avant le drainage qui y fut effectué à grande échelle au milieu du XIX^e siècle (Strazds, 1997). Les collections du Musée zoologique de l'Université de Lettonie comprennent deux couvées de cette espèce collectées à Berzaune (district de Madona, dans l'est de la Lettonie) en 1919, et à proximité de Riga en 1923 (Baumanis, 1983). Toutefois en 2000, la première couvée (1919) était introuvable et l'identification de l'espèce concernant l'autre couvée (1923) n'a pas pu être confirmée (K. Schulze-Hagen, *comm. pers.*).

Les recherches de populations nicheuses de l'espèce spécialement organisées en





[1] Nombre de phragmites aquatiques (n=29) capturés aux filets au lac Pape (21°02'E; 56°09'N). La capture a été effectuée sans attirer les oiseaux par diffusion d'un enregistrement de son chant.



[2] Distribution saisonnière des phragmites aquatiques (n=29) capturés aux filets au lac Pape. La capture a été effectuée sans attirer les oiseaux par diffusion d'un enregistrement de son chant.

1997 dans les dix sites les plus prometteurs se sont avérées infructueuses (O. Keiss, rapport non publié). Et cela bien que des zones d'habitat favorable aient été repérées. En 2000 et dans les années qui suivirent (2001 et 2002), un à trois mâles chanteurs ont tout de même été observés au lac Liepaja (Celmins 2003). En 2003, le site n'était pas occupé, mais un mâle y chantait de nouveau en 2004. Puis ce site n'a plus été occupé jusqu'en 2008. Cet unique site letton est fortement menacé par la présence envahissante des roseaux et des saules et par un régime hydrologique défavorable qui l'assèche. Les cas de reproduction du phragmite aquatique sont donc sporadiques en Lettonie et sa population y est très réduite (zéro à trois mâles).

Les haltes migratoires au lac Pape et au lac Liepaja sont peut-être plus fréquentes, jusqu'à six mâles sont capturés par an au lac Pape [1]. La plupart des oiseaux a été capturée dans les dix derniers jours de juillet [2], mais la migration se prolonge jusqu'à la fin du mois de septembre. La date de capture la plus tardive est le 26 septembre 1970 (Lipsbergs, 1971). En passage, l'espèce se déplace peut-être des sites de reproduction biélorusses pour ensuite longer la côte de la mer Baltique. En Estonie, la seule présence enregistrée (une capture en 1992) (Leibak *et al.* 1994) semble correspondre à ce schéma. ■

Oskars KEISS, Laboratoire d'Ornithologie, Institut de Biologie, Université de Lettonie, Miera Street 3, LV-2169 Salaspils, Lettonie ; oskars.keiss@lu.lv