



Données ornithologiques morbihannaises inédites provenant des collections du Musée Vert du Mans

Nicolas MOREL

29 oiseaux naturalisés entre 1919 et 1931 provenant des côtes morbihannaises ont été inventoriés récemment au sein des collections du Musée Vert, musée d'histoire naturelle du Mans. Ils constituent d'intéressantes données ornithologiques nouvelles pour cette période relativement ancienne.



[1] Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)
24 septembre 1928 - St Pierre de Quiberon

Le Musée Vert est le musée d'histoire naturelle de la ville du Mans. Les plus anciennes collections scientifiques qui y sont conservées datent de la Révolution française. Durant les XIX^e et XX^e siècles un fonds zoologique, et notamment ornithologique, important y a été constitué.

La collection ornithologique Lamoureux

La collection ornithologique Lamoureux est l'une des plus importantes qui aient été réa-



[2] **Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*)**
10 septembre 1927 - St Pierre de Quiberon

lisée dans le département de la Sarthe durant la fin du XIX^e et la première moitié du XX^e siècle. Elle comprend aujourd'hui 345 oiseaux conservés au Musée Vert depuis leur don en 1940. Composée en très grande majorité d'oiseaux prélevés dans le département de la Sarthe entre 1885 et 1940, elle contient également 29 spécimens provenant de Bretagne.

Les oiseaux naturalisés composant la collection Lamoureux sont remarquablement étiquetés, ils constituent donc d'intéressantes données scientifiques anciennes qui n'ont à ce jour pas été publiées.

Les spécimens morbihannais de la collection Lamoureux

Ces 29 spécimens ont été capturés entre 1919 et 1931, principalement durant la fin août et le mois de septembre, avec quelques captures excentrées en avril et mai. Les sites de capture sont concentrés dans le département du Morbihan sur les communes de Saint Pierre Quiberon (site de la plage de Penthièvre) et de Plouharnel (sites des dunes et de la baie de Plouharnel), avec également une capture accessoire sur Belle-île.



[3] *Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius)*
28 septembre 1924 - St Pierre de Quiberon

Liste des spécimens collectés

◆ Puffin des Anglais

Puffinus puffinus

- Adulte trouvé mort le 8 mai 1931 sur la plage de Penthièvre

◆ Fou de bassan

Sula bassana

- Adulte collecté au cours d'une violente tempête le 20 septembre 1930 sur la plage de Penthièvre

◆ Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

- Spécimen immature collecté le 14 septembre 1927 sur la plage de Penthièvre

◆ Huïtier-pie

Haematopus ostralegus

- Spécimen juvénile collecté le 14 septembre 1922 sur la plage de Penthièvre

◆ Grand gravelot

Charadrius hiaticula

- Adulte collecté le 23 août 1919 sur la plage de Penthièvre

◆ Gravelot à collier interrompu

Charadrius alexandrinus

- Adulte internuptial collecté le 23 août 1919 sur la plage de Penthièvre

◆ Bécasseau maubèche [1]

Calidris canutus

- Juvénile collecté le 24 septembre 1928 sur la plage de Penthièvre

◆ Bécasseau sanderling

Calidris alba

Trois captures sur la plage de Penthièvre :

- Adulte en mue collecté le 23 août 1919
- Deux adultes en mue collectés le 25 août 1919

◆ Bécasseau variable

Calidris alpina

Deux captures sur la plage de Penthièvre :

- Adulte internuptial collecté le 25 août 1919
- Adulte internuptial collecté le 16 septembre 1921

◆ Bécasseau rousset [2]

Tryngites subruficollis

- Adulte collecté le 10 septembre 1927 sur la plage de Penthièvre

◆ Barge rousse

Limosa lapponica

- Juvénile collecté le 13 septembre 1921 sur la plage de Penthièvre

◆ Courlis corlieu

Numenius phaeopus

- Juvénile capturé le 31 août 1919 sur les dunes de la baie de Plouharnel



[4] *Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)*
13 avril 1928 - Belle-île.

◆ **Tournepierre à collier**
Arenaria interpres

Cinq captures sur la plage de Penthièvre :

- Adulte internuptial capturé le 7 septembre 1921
- Adulte internuptial capturé le 20 septembre 1927
- Deux spécimens en plumage nuptial capturés le 5 mai 1931
- Femelle ou mâle de 1^{er} été nuptial capturé le 6 mai 1931

◆ **Phalarope à bec large [3]**
Phalaropus fulicarius

- Deux spécimens en mue capturés le 28 septembre 1924 à Saint Pierre de Quiberon (Plage de Penthièvre)

◆ **Goéland brun**
Larus fuscus

- Trois captures sur la plage de Penthièvre :
- Adulte nuptial race *graellsii* capturé le 29 août 1919

- Juvénile 1^{er} hiver capturé le 18 septembre 1921
- Juvénile 1^{er} hiver capturé le 25 septembre 1924

◆ **Goéland argenté**

Larus argentatus

- Juvénile 1^{er} hiver capturé le 16 septembre 1927 en Baie de Plouharnel
- Deux adultes en plumage internuptial de la race argenteus capturés durant une forte tempête les 19 et 20 septembre 1930 sur la plage de Penthièvre
- Adulte nuptial race argenteus capturé le 6 mai 1931 sur la plage de Penthièvre

◆ **Guillemot de Troïl**

Uria aalge

- Adulte internuptial, sujet mazouté, capturé le 17 septembre 1927 en Baie de Plouharnel
- Adulte internuptial trouvé mort le 18 septembre 1927 sur la plage de Quiberon

◆ **Crave à bec rouge [4]**

Pyrhocorax pyrrhocorax

- Adulte capturé le 13 avril 1928 sur Belle-île

Cette espèce migratrice est observée de façon peu commune sur le littoral atlantique. La date du prélèvement correspond au pic actuel de la migration postnuptiale qui a lieu de mi-septembre à la fin novembre (Dubois *et al.*, 2000).

Le **guillemot de troïl** (*Uria aalge*) prélevé le 17 septembre 1927 en Baie de Plouharnel est intéressant du fait qu'il ait été retrouvé mazouté sur cette plage et qu'il s'agit d'une mention exceptionnellement ancienne de ce type de pollution. L'avifaune marine bretonne subissait donc déjà ce type de mortalité 72 ans avant l'Erika !

Le **crave à bec rouge** (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) prélevé le 13 avril 1928 sur Belle-île (sans mention précise de site) est une donnée intéressante car la population bretonne n'a été suivie avec précision qu'à partir des années 50 [4].

Il semblerait que le **crave à bec rouge** ait disparu temporairement de plusieurs îles bretonnes (Grox, Houat, Ouessant) à la fin du XIX^e siècle (Dubois *et al.*, 2000). Cette donnée confirme que l'espèce était bien présente sur Belle-île en 1928. ■

Discussion

Parmi ces spécimens, nous pouvons remarquer certaines mentions plus particulièrement intéressantes :

Le **bécasseau rousset** (*Tryngites subruficollis*) prélevé le 10 septembre 1927 sur la commune de Saint-Pierre de Quiberon [2].

Ce migrateur occasionnel d'origine néarctique est observé principalement sur la façade atlantique en migration postnuptiale durant les deux premières décades de septembre. Ce spécimen s'inscrit donc bien dans la phénologie actuelle de l'espèce. Cette mention est exceptionnelle du fait de la rareté des données anciennes concernant cette espèce. Il pourrait ainsi s'agir de la plus ancienne observation du bécasseau rousset en France.

Les deux **phalaropes à bec large** (*Phalaropus fulicarius*) prélevées le 28 septembre 1924 à St Pierre de Quiberon [3].

Bibliographie

DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P. 2000 – *Inventaire des oiseaux de France, avifaune de la France métropolitaine*, Nathan/HER, Paris, 397 p.

GUERMEUR Y. & MONNAT J.Y. 1980 – *Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne*, Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, Brest, 240 p.

KERBIRIOU C., THOMAS A., FLOC'H P., BENEAT Y., GAGER L. & CHAMPION M. 2005 – Statut du Crave à bec rouge (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) en Bretagne en 2002. *Ornithos*, n° 12-3, pp. 113 - 122

Nicolas MOREL est responsable du Musée Vert. Musée d'histoire naturelle du Mans 204, avenue Jean Jaurès, 72000 Le Mans musee.vert@villie-lemans.fr