

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT

BOTANIQUE ET LEGENDE (voir « Penn ar Bed », vol. 2, p. 240 et vol. 3, pp. 110 et 139)

Sous cette rubrique et dans ce dernier numéro, une note de M. CHEVILLOTTE laisse entendre que *Geranium sanguineum* (L.) ne se trouverait « que sur les ruines de Trémazan ».

Il existe en abondance dans cette localité sur le talus de droite de la route Kersaint-Trémazan dans sa partie proche de la mer et aussi sur tous les talus des pâtures et landes à droite de cette route. Cette station était en pleine floraison le 21 Mai 1961.

J'ajoute que dans ces environs, il existe encore à ma connaissance une autre station de cette Géraniacée entre la route Kersaint-Argenton et le fond de l'anse de Penfoul, que j'ai contrôlée depuis Août 1909 (spécimen dans mon herbier), mais la construction de quelques immeubles à cet endroit l'ont fortement réduite (Obs. 1961).

Ceci pour la seule région en cause.

LEBEURIER.

LES REQUINS DES COTES BRETONNES

N.D.L.R. — Parmi les espèces de squales, certaines sont pêchées régulièrement en Bretagne. Il s'agit de : *Lamna nasus* (Taupe), *Cetorhinus maximus* (Pèlerin), *Scylliorhinus caniculus* (Petite roussette), *Scylliorhinus stellaris* (Grande roussette), *Mustelus canis* (Hâ), *Mustelus asterias* (Emissole), *Prionace glaucus* (Peau bleue), *Squalus acanthias* (Chien de mer), *Squatina squatina* (Ange de mer).

D'autres espèces sont plus rares ou de captures plus irrégulières. A leur sujet, nous publierons des « fiches de Faunistique bretonne », qui renseigneront les lecteurs et leur permettront de tirer parti de leurs observations éventuelles.

M. LE PAPE nous donne quelques renseignements précis sur les tonnages de Requins rapportés à Penmarch en 1959. Ces renseignements sont d'autant plus précieux que les statistiques concernant les squales demeurent sporadiques et sont souvent négligées. D'autres communications de ce genre seraient les bienvenues.

A. L.

TONNAGE DE SQUALES PECHES DANS LES PORTS DE SAINT-GUENOLE ET KERITY EN PENMARCH

Année 1959

	St-Guérolé	Kerity
Roussette (<i>Scylliorhinus</i>)	24.600 kg	3.500 kg
Chien ou Spinell (<i>Squalus acanthias</i>)	22.030 kg	14.000 kg
Sonneur (<i>Lamna nasus</i>) (?)	13.015 kg	45.000 kg
Hâ (<i>Mustelus canis</i>)	7.150 kg	?
Touille (<i>Mustelus asterias</i>)	3.850 kg	?
Peau bleue (<i>Prionace glaucus</i>)	3.470 kg	12.500 kg

Dénomination : Le mot Touille ici désigne certainement *Mustelus asterias*, car l'on m'a dit qu'il était voisin du Hâ, en plus clair.

Quantités : Il est pêché en réalité beaucoup plus de Peaux bleues (6 à 7.000 kg), à Kérité notamment ; ils ne passent pas par la criée, mais sont vendus directement aux pêcheurs au casier qui en font des appâts.