

NIDIFICATION DE LA MOUETTE RIEUSE (*LARUS RIDIBUNDUS*)

DANS LE NORD-FINISTERE

par Edouard LEBEURIER

Le 29 avril 1967 lors d'une visite aux anciennes salines de Séné (Morbihan), notre attention fut attirée par le comportement d'un groupe de quatre Mouettes rieuses en plumage de noces. Elles volaient en tournant très bas au-dessus de flaques d'eau entourées de zones graveleuses à touffes clairsemées et rampantes d'*Obione portulacoides* où une autre Mouette, posée à terre en position de couveuse, pouvait faire croire à l'existence d'un nid. Dérangée, elle se reposa à proximité de cet endroit après un court moment de vol et reprit la même position au bout d'un instant; ceci se répéta plusieurs fois de suite.

Etant en avril, nous eumes l'impression d'assister à une figure du comportement anténuptial de l'espèce, telle qu'on en observe chez d'autres Goélands.

Au ssi ne fûmes nous pas surpris d'apprendre la découverte, le 18 juin 1967, d'un nid avec deux oeufs dans un autre coin de ces salines, première nidification signalée de l'oiseau pour la Basse-Bretagne (1).

A l'occasion d'une visite régulière à la réserve des Ilots de la Baie de Morlaix le 23 mai 1968, nous ne constatons que la présence du premier contingent des Sternes occupantes, mais le 6 juin nous eumes la surprise, en débarquant, d'observer une Mouette rieuse à capuchon au milieu du carrousel de Sternes.

Quelques moments plus tard, nous livrant au dénombrement des premières pontes de Sternes caugek, une deuxième Mouette se joignit à la ronde tourbillonnant au-dessus de notre tête en répétant ses "ouèk" d'inquiétude.

Le nid, à coupe peu marquée, consistait en un dépôt d'un centimètre d'épaisseur de débris ligneux récoltés sous une touffe rase d'Ajonc nain et apportés par les oiseaux dans une petite dépression d'un affleurement rocheux cerclé d'un anneau de *Silene maritima*. Il contenait deux oeufs et paraissait faire partie intégrante de la colonie de Sternes caugek puisque, situé en bordure de celle-ci, il n'en n'était éloigné que de la distance entre deux pontes de Sternes (0,50m). N'était la pré-

sence des matériaux du nid et la forme elliptique des oeufs, une confusion eut été possible avec certains oeufs voisins de coloration identique.

A notre visite suivante, le 16 juin, le nid était vide et nous ne trouvâmes aucun débris de coquille autour, mais un poussin de la grosseur d'un poing situé à un mètre de là dans la végétation. Ce poussin avait l'aspect extérieur de celui du Goéland argenté, à la différence que le fond gris du duvet était brun alutacé, parsemé des mêmes taches noires dessinant curieusement sur le dos une sorte de lyre.

Le 4 juillet, il ne fut plus trouvé trace du couple ni des juvéniles.

Cette observation apparaît être le premier cas de nidification observé dans le Finistère et donc le deuxième en Basse-Bretagne. Elle appelle les constatations suivantes :

1) Extension vers l'ouest de la nidification de la Mouette rieuse et peut-être prélude à un envahissement à terme d'une nouvelle espèce de Laridés.

2) Cas du choix d'un ilot en mer, situation non encore signalée en France à notre connaissance.

3) Affinité très nette avec les différentes espèces de Sternes (pierregarin, de Dougall et caugek) : nous n'avons observé aucune réaction d'alerte entre ces différentes espèces. Bien au contraire, les Mouettes s'associaient aux Sternes dans leurs réactions d'alerte, en vol comme à terre, ou pour pourchasser impitoyablement les Goélands quand des individus d'une colonie proche faisaient une incursion dans le voisinage de leur station commune.

(1) JONIN, Max, 1963.- Nidification de la Mouette rieuse en Basse-Bretagne. Ar Vran, I, 2, 75-77.