

OBSERVATION D'UNE STERNE FULIGINEUSE (*STERNA FUSCATA*) A OUESSANT

par Maurice LE DEMEZET

Jusqu'à cette année, la littérature ne mentionne que trois captures de la Sterne fuligineuse pour la France. L'observation qui fait l'objet de la présente note serait donc la quatrième de l'espèce à ce jour.

Le 2 avril 1967, trois d'entre nous, MM. G. CORNEN, M. LE DEMEZET et Y. PLUSQUELLEC faisaient, dans le cadre des activités du Camp des étudiants naturalistes de Brest, une tournée d'observations ornithologiques, sur la côte nord de Feunteun Velen à Ouessant. Nous étant arrêtés à Porz Korz pour effectuer un dénombrement des Laridés présents sur Youc'h Korz, nous remarquons très rapidement un oiseau présentant la silhouette caractéristique d'une Sterne, mais dont le plumage différait radicalement de celui des Sternes rencontrées habituellement sur nos côtes. A première vue, il nous apparut presque entièrement noir, ce caractère nous ayant d'ailleurs permis de le repérer parmi les Goélands. Posé au voisinage d'un Goéland brun adulte, il paraissait beaucoup plus sombre que ce dernier et presque aussi long (3/4 environ). La couleur uniformément noire du dos et des ailes contrastait violemment avec la blancheur de la poitrine et du ventre. Nous avons été particulièrement frappés par l'avancée noire produite par le poignet de l'aile sur le blanc éclatant des côtés de la poitrine. Le bec était noir et les pattes très courtes et sombres.

La grande taille et les caractères de coloration du plumage nous permettaient d'éliminer d'emblée toutes les Guifettes et Sternes européennes. La confusion restait néanmoins possible entre la Sterne fuligineuse et la Sterne bridée (*Sterna anaethetus*). Mais la taille, la couleur franchement noire des parties supérieures et l'absence du collier blanc montraient que nous avions bien affaire à la première des deux en plumage de noces complet.

Notons que cette observation a été réalisée dans de bonnes conditions : éclairage idéal, observation de longue durée (2 heures), la distance relativement grande qui nous séparait de l'oiseau étant compensée par la qualité de l'optique utilisée (lunette 25-60x60).

La Sterne fuligineuse ne se reproduit que dans l'hémisphère sud : Mer des Antilles, Ile de l'Ascension, Océan Indien et Océan Pacifique. Se basant sur le fait qu' "il est infiniment probable que ce sont les individus des colonies de l'Océan Atlantique et non de l'Océan Indien ou du Pacifique qui visitent accidentellement l'Europe..." Louis BUREAU (1904)

propose un tableau d'identification de la provenance des Sternes fuligineuses égarées sur nos côtes. Ainsi les sujets en plumage de noces observés de la mi-mai à la mi-août, date où la Sterne fuligineuse se reproduit en Mer des Antilles, proviendraient de cette région de l'Atlantique. Par contre, les individus qui, comme le nôtre, sont vus en plumage nuptial d'octobre à avril seraient originaires de l'île de l'Ascension.

-bibliographie-

BUREAU, L., 1904.- Note sur la présence accidentelle de la Sterne fuligineuse, *Sterna fuliginosa* Gmel. sur les côtes de la Loire-Inférieure. Bull. Soc. Sc. nat. Ouest, 2e sér., 4, 227-256.

KOWALSKI, S., 1957.- 3e record de la Sterne fuligineuse (*Sterna fuscata* fuscata Linné 1766) en France. L'Oiseau et R.F.O., V, 27, 96.

Notre calendrier étant divisé en trois périodes (du 15 novembre au 15 mars, du 15 mars au 15 juillet et du 15 juillet au 15 novembre), AR VRAN n°3 ne comporte pas d'Actualités Ornithologiques. L'analyse de la période du 15 mars au 15 juillet 1968 paraîtra donc dans le quatrième numéro.

Les collaborateurs qui ne nous ont pas encore fait parvenir leurs notes sur cette période seraient bien aimables de le faire au plus tôt. De plus, ils nous faciliteraient grandement la tâche en nous communiquant leurs observations par petits lots, tous les mois par exemple.