

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 15 MARS AU 15 JUILLET 1968

par Y. GUERMEUR, M. JONIN, M. LE DEMEZET, J.-Y. MONNAT & P. PETIT

Les actualités ornithologiques qui suivent portent sur une période de l'année où les observations sont particulièrement difficiles à interpréter. En effet, les oiseaux notés entre le 15 mars et le 15 juillet peuvent appartenir à quatre "catégories" :

- 1°) oiseaux en migration vers le nord;
- 2°) nicheurs locaux;
- 3°) "estivants" non nicheurs;
- 4°) oiseaux en migration post-nuptiale vers le sud.

Ces "catégories" s'intriquent parfois si profondément dans le temps qu'il est souvent malaisé, en particulier pour les limicoles et les Anatidés, de savoir à laquelle rapporter telle ou telle observation. Ces difficultés s'aggravent encore du fait que certains collaborateurs ne précisent pas toujours si l'espèce est, ou non, nicheuse à l'endroit de leur observation.

En ce qui concerne la nidification, nous n'avons traité que certaines espèces, et encore n'avons-nous retenu que les observations les plus marquantes, notamment celles d'oiseaux peu communs. Nous avons par contre renoncé à citer toutes les localités qui nous étaient signalées pour des oiseaux plus communs : le statut de ces espèces apparaîtra peu à peu au cours des saisons de reproduction, et une énumération de localités, outre qu'elle serait fastidieuse, ne saurait dans l'état actuel de nos connaissances être que très partielle et peu significative.

Le rapport présent a pu être établi grâce à la collaboration de trente ornithologues que nous sommes heureux de remercier ici :

MM. ANNEZO J.-P. (56), ANTOINE L. (29), BARON A.N. (29), BOZEC R. (56), BRANELLEC D. (29), BRAVE J.L. (29S), CHAUCHEPRAT M. (56), DE KERGARIOU E. (29N), DIDIER J. (22), DORVAL F. (29S), DORVAL M. (29S), DORVAL P. (29), GUERMEUR Y. (29-56), HUON T. (29N), JONIN M. (29), KERAUTRET L. (29N), KERVILLA M. (56), LEBEURIER E. (29N-56), LE DEMEZET M. (29-56), LE GARFF B. (35-56), LE LANNIC J. (56), L'HER M. (29N), LOARER L. (22-35-56), MAHED R. (56), MONNAT J.Y. (29-35-56), ONNO R. (56), PERESSE J. (29S), PERROT C. (22), PETIT P. (29-56), PRIEUR D. (29), THOMAS A. (29).

Les prochaines Actualités Ornithologiques porteront sur la période du 15 juillet au 15 novembre 1968. Nos correspondants seront bien aimables de nous faire parvenir toutes leurs observations concernant cette période pour le 15 janvier dernier délai.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*), 2 ind en plumage nuptial le 4 mai à Morgat (29S).

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*), 1 ind le 28 mars à Lampaul-Ploudal-mézeau (29N).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*), dernière observation en mer : le 16 mars, 15 ind dans le Golfe du Morbihan; 1 ind le 17 mars à Beg-an-Fri (29N).

Ensuite l'espèce n'est plus notée que sur les lieux de reproduction : Yeun Elez/Botmeur (29N), étangs du Morbihan et de l'Ille et Vilaine.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*), 3 oiseaux en plumage nuptial vus le 17 mars à Beg-an-Fri (29N).

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*), deux observations dans le Golfe du Morbihan : 3 ind le 16 mars et 7 le 8 avril.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*), un passage se poursuit encore jusqu'au 4 avril sur les étangs côtiers du Finistère. Ensuite, les Castagneux sont observés sur leurs lieux de reproduction : Yeun-Elez (29N), étangs du Morbihan et même sur Al Loc'h/Glenen (29S).

Fin-juin et début-juillet, alors que la nidification se poursuit, quelques mouvements sont notés : 7 ind à Kérizon/Crac'h (56) le 29 juin, 15 à St-Jean-Mendon (56) le 2 juillet et 1 à Kerjean/Le Conquet (29N) le 12 juillet où la nidification, bien que possible, n'a pas été observée cette année.

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*), passage noté à partir de la fin-mars à Corsen (29N). En outre 2 rassemblements : 1/ devant Kersaint (29N) le 4 mai : 1500 à 2000 ind en une heure et demie et jusqu'à 300 posés en même temps sur l'eau. 2/ 5000 posés devant la réserve Michel-Hervé JULIEN (29S) le 27 mai (observés de 15h à 18h, heure à laquelle ils se sont dispersés vers le nord-ouest).

* PUFFIN MAJEUR (*Puffinus gravis*), 1 ind devant Kermorvan/Le Conquet le 5 avril.

PUFFIN FULIGINEUX (*Puffinus griseus*), 1 devant Corsen/Plcuarzel le 31 mars.

PETREL TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*), un nouveau lieu de ponte a été découvert sur un îlot d'Ouessant (Ar Youc'h) et les emplacements déjà connus (Youc'h Korz/Ouessant et Ar Gest/Camaret) se révèlent plus riches que la littérature ne le laissait entendre.

FULMAR (*Fulmarus glacialis*), arrivée dans la deuxième quinzaine de mars à la réserve Michel-Hervé JULIEN/Cap-Sizun (29S) où, pour la première fois, deux couples sur les 10 installés ont mené à bien leur couvée : les deux poussins ont éclos respectivement les 12 et 17 juillet.

A la pointe de Corsen/Plouarzel (29N), des petits mouvements ont été observés le 31 mars (5 ind vers le nord en 15 minutes) et le 28 avril (7 ou 8 ind vers le sud en 10 minutes).

En outre, le 12 mai, 3 oiseaux étaient installés dans une falaise des Berniou Pez/Camaret (29).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*), des bandes importantes surtout composées d'immatures sont encore observées jusqu'au début-avril : le 28 mars, 17 au Port de Commerce de Brest (29N); le 6 avril, 40 à Locmariaquer (56). A cette époque, *Phalacrocorax carbo sinensis* est noté dans le Golfe du Morbihan (8 ind le 16 mars) et en rade de Brest (2 ind du 1 au 19 mars en des endroits non visités ultérieurement).

En avril-mai, quelques observations concernant surtout des immatures isolés, sans doute estivants : Port de Brest, Embouchure de l'Aber Benoit où l'espèce a niché dans le passé et Porspoder (29N). Le 6 juillet, 2 immatures sur la digue de la rade-abri de Brest.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*), mars à juin : les observations, très diffuses et pour la plupart localisées au Morbihan, ne concernent en général que des isolés. Alors que la première quinzaine d'avril totalise 9 observations pour 14 individus, l'espèce n'est notée qu'une seule fois entre le 1 et le 15 mai (1 ind le 5 mai à Lampaul-Ploudalmézeau (29N).

à partir du 20 juin les observations sont plus nombreuses : 1 ind à Goulven (29N) les 19 et 23 juin, 3 ind à Séné (56) le 23 juin, 5-15 dans le Golfe du Morbihan le 25 juin et 13 à Noyal (56) le même jour, 18 ind à Kerizon/Crac'h le 29 juin. On en voit aussi à cette époque dans le Yeun Elez (29) et en Rade de Brest. Enfin, durant la première quinzaine de juillet, pour un nombre de visites aux lieux favorables à peine supérieur à celui de la première quinzaine d'avril, le Héron cendré a été observé 15 fois pour 78 individus dont : 2 au Curnic/Guissény (29N) le 2 juillet, 6 jeunes à Trenvel (29S) le 3, 3 jeunes à Goulven (29N) le 4, 2 en vol à l'île Trevoc'h (29N) le 4, 2 ind les 10 et 11 à Goulven et 8 en vol à Kerfissien/Plouescat (29N) le 13.

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*), 1 le 17 avril à Belle-Ile (56) et 1 le 1 mai à Trenvel (29S).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*), 1 sujet au Conquet (29N) les 25 et 26 mai, revu le 2 juin. 1 ind à Séné (56) les 23 et 24 juin; 1 ind à Trenvel (29S) pendant la deuxième quinzaine de juin, revu le 3 juillet.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*), 2 oiseaux le 13 avril en Baie de la Fresnaie (22) (D. HALLEUX, Mulhouse). 1 adulte le 13 juin au Curnic/Guissény (29N).

OIE SP. (*Anser sp.*), 1 ind en vol au-dessus de la plage de Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 28 mars (peut-être une des Oies cendrées des 4, 5 et 10 avril ?) et 5 ind en vol vers le nord-est au-dessus de la Rade de Brest le 1 mai.

OIE CENDREE (*Anser Anser*), 2 ind notés les 4 et 5 avril à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) puis une seule le 10 qui n'est pas revue le 25 avril.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*), l'hivernage est terminé dans le Finistère dès le début de la période de considérée alors que quelques observations sont encore faites dans le Golfe du Morbihan : 29 ind le 16 mars et 1 le 5 avril.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*), encore des mouvements durant la deuxième quinzaine de mars : passage et arrivée des nicheurs locaux ? : une quinzaine du 20 au 24 mars à Saint-Marc/Brest, 6 dans l'Aber Benoit le 26 mars 20 à Loctudy le 31 mars. A noter également 30 Tadorne en Baie de la Fresnaie (22) à la mi-avril (D. HALLEUX).

Ensuite les couples sont cantonnés, nicheurs ou non. A signaler que cette espèce, présente maintenant dans la plupart des estuaires ou marais côtiers de quelque importance ainsi que dans les archipels, a niché cette année en milieu suburbain dans la zone portuaire de Saint-Marc/Brest : l'éclosion a eu lieu vers le 2 juin.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*), au 15 mars, il semble que les Colverts soient cantonnés sur les lieux de reproduction, c'est à dire un peu partout : étangs côtiers, étangs du Morbihan, Abers, Belle-Ile...

Dès le 4 avril, on observe des petits groupes comportant surtout des mâles : 17 ♂ à St Renan le 4 avril, 5 à Priziac (56) le 10 avril, 16 à St Renan le 25 avril...

Les premiers poussins sont vus le 15 avril à Iffendic (35) et le 25 avril à St Renan.

En mai et juin, les groupes comportent de plus en plus de jeunes et de ♀♀ : 11 ind au Curnic/Guissény (29N) le 8 mai, 28 immatures à St Renan le 16 juin et 11 ♀♀ à Séné (56) le 23 juin...

Enfin en juillet, on trouve des groupes de 12 ind (le 1/7) à Kerizon/Crac'h, 100 ind le 7 à Trevignon (29S), 150 à Trenvel le même

jour, 18 au Curnic le 10, 300 dans le Golfe du Morbihan le 15, etc...

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*), les observations se poursuivent fin-mars et jusqu'à la mi-avril (encore 1 ♂ le 24 avril à St Renan) sans que l'on puisse toujours préciser s'il s'agit de fin d'hivernage ou de migration...

Les plus grosses concentrations sont remarquées le 20 mars à Pont-Callec/Plouay (56) : 50 ind, et au Curnic/Guissény (29N) : 20 ind. Puis les 24 et 26 mars dans le nord-Finistère. Le 3 avril, on en compte 70 à St Jean/Mendon. Les jours suivants, on ne note plus que de petits groupes dans le Finistère et le Morbihan.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*), (dès le 15 mars il n'est plus noté sur les lieux d'hivernage. Quelques migrants sont observés : 1 couple au Curnic/Guissény (29N) le 3 avril, 1 ♂ à Guipavas (29N) le 12 avril, 1 ♂ à St Marc/Brest le 3 mai, 1 couple au Curnic les 5 et 8 mai et encore 2 couples au Curnic le 16 mai.

CANARD PILET (*Anas acuta*), 1 couple sur l'étang du Curnic/Guissény le 8 mai.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*), en mars, les observations se rapportent à des passages ou à l'arrivée des nicheurs locaux. Au total peu d'observations :

Le 20 mars, 2 à Pont Callec et 4 ♂ au Curnic. Le 24 mars, 10 couples à St Vio (29S) et 1 couple au Curnic. Le 31 mars, 2 ♂ et 1 ♀ à Trenvel (29S), 1 couple et 1 ♂ à Larvor (29S).

Ensuite les Sarcelles sont notées dans les endroits où elles pourraient nicher : Trenvel, Curnic, Goulven (29N), Kerlouan (29N), Larvor (29S), presque île de Rhuys (56).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*), un effectif important a été noté à Trenvel (29S) le 31 mars: 21 ♂ + 60 ind. Un passage a eu lieu partout du 9 au 14 avril : 25 à Trevignon (29S) le 9, 1 ♂ à Priziac le 10, 1 ♂ à Kerjean/Conquet (29N) le 11, 5 ♂ et 2 ♀ à Lorient le 13 et 1 couple à St Renan le 14.

Ensuite on a observé des Souchets à Trenvel et à Goulven où ils nichent ainsi qu'en des lieux favorables à la reproduction : 1 ♂ à Kerlouan (29N) le 16 mai et 2 ♂ au Curnic le 27 juin.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*), 1 ♂ le 8 avril à Lannenec/Ploemeur (56); 1 ♂ le 8 mai à Goulven (29N); 1 ♂ le 29 juin dans le Yeun Elez (29).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*), jusqu'à la mi-avril environ, on observe de petits groupes ou des isolés : 1 ♂ à St Renan le 24 mars, 25 à Priziac (56) le 27 mars, 5 à Trenvel (29S) le 31 mars puis 10 au Curnic/Guissény le 3 avril et 30 à Trevignon (29S) le 9 avril.

Pendant tout le reste de la période couverte par les présentes actualités, quelques Morillons sont observés, sauf au mois de juin : à Goulven (29N) le 8 mai (1 couple), au Conquet (29N) du 10 au 12 mai (2 ♀♀ et 1 ♂); au Cranic (56) le 26 mai (1 ♂); à Trenvel (29S) le 3 juin (1 ind) et au Curnic/Guissény (29N) le 4 juillet puis du 8 au 10 juillet (2 ind).

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*), 1 ♀ dans l'anse de Gwenntrez, près du Conquet (29N) le 1 mai.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*), 12 ind dans le Golfe du Morbihan le 16 mars, puis 1 ♀ à St Vio (29S) les 24 et 31 mars. Encore 1 ♀ à Priziac (56) les 27 mars et 9 avril. Enfin 1 ♀ en Rade de Brest le 2 mai.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*), [l'hivernage se poursuit durant la 2e quinzaine de mars pour se terminer vers le 20 avril : 20 ind en un point de la Rade de Brest le 25 mars; 50 ind dans le Golfe du Morbihan le 16 mars et 30 à St Philibert (56) le 24 mars. Dernières observations dans le Golfe du Morbihan : 2 ind les 20 et 21 avril.

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*), 1 ♀ observée jusqu'au 27 mars à Priziac (56).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*), un vol nuptial le 14 mars dans les Côtes-du-Nord. Par ailleurs, des observations isolées (Morbihan principalement) sur les lieux de reproduction.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*), les observations sont essentiellement faites dans le Morbihan : 1 ind à La Trinité-sur-Mer le 30 mars, 1 ind entre Pluvigner et Camors le 3 avril, 1 ind au vol en forêt de Camors le 5 avril, 1 à Pluvigner le 30 avril, 1 dans les marais de Tréauray le 9 juin, 1 à Brandivy le 26 juin et, ce même jour, un poussin est bagué au nid à Plouray.

Pour l'Ille-et-Vilaine, on note une observation d'1 ♀ adulte le 9 juin près de Martigné-Ferchaud et d'1 ind le 13 juillet dans les polders du Mont St-Michel.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*), deux observations dans le Morbihan : 1 couple vu dans la région de Camors le 5 avril, sans doute nicheur et un envol de juvéniles dans les Landes de Lanvaux le 10 juin.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*), deux observations morbihannaises : 3 ind le 19 mai à l'étang de Kerizon/Crac'h et 1 ind à Bailleron/Séné le 28 mai, volant vers l'est.

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*), pour le Morbihan, 1 couple est lo-

calisé à Ste-Anne le 20 mai. 1 ind chassant observé le 10 juin à Erdevén (56) et deux sujets le 25 juin à Surzur (56).

Pour le Finistère, une seule observation : 1 ind dans un bois près de St-Renan.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*), les seules observations pour cette période proviennent de la presqu'île de Rhuy dans le Morbihan : du 1 au 10 mai, 2 ♂ et 2 ♀ sont observés dans les marais de Suscinio. Du 10 au 15 mai il n'y est vu qu'un couple, ainsi que le 4 juillet. 1 ♀ est observée le 16 mai en un autre point de la presqu'île de Rhuy.

BUSARD-SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*), un couple localisé à Belle-Ile (56) le 17 avril.

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*), première observation le 24 mars à St-Vio (29S) : 1 ♂ au vol et 1 ♀.

Par la suite les observations sont localisées sur les zones de nidification : pour le Finistère, essentiellement la région de Chateaulin (où l'espèce semble bien représentée) et les marais de la Baie d'Audierne. Pour le Morbihan, les arrivées n'ont pas été notées. La reproduction est surtout observée dans deux régions : le Golfe du Morbihan (notamment 2 couples pour une même île les 28 mai et 27 juin) et les Landes de Lanvaux (par exemple 5 jeunes au nid le 13 juin).

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*), 3 observations dans le Morbihan : le 16 mai, 1 oiseau en chasse à Sarzeau et 1 ind volant assez haut en presqu'île de Rhuy. 1 ind au nid à Surzur le 25 juin.

2 observations en Ile-et-Vilaine : 1 ind à Rennes le 25 mai, volant vers le nord et 1 ind à Fleurigné le 28 juin.

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*), de nombreuses observations au cours de cette période montrant que ce petit rapace reste le plus commun dans notre région. Un accouplement le 25 avril au Gern/Telgruc (29S) et 2 oeufs le 1 mai près d'Argol (29S).

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*), entendue les 30 et 31 mai à Noyal-Pontivy (56).

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*), les effectifs de cette espèce ont été particulièrement suivis à St-Renan (29N) de mars à mai : 10 visites du 16 mars au 2 mai. Alors que le nombre d'hivernants atteignait 170 ind, on observe la chute d'effectifs suivante : 80 le 17 mars; 45 le 24 mars; 37 le 27 mars; 11 le 4 avril; 7 le 14 avril et 1 à partir du 25 avril.

C'est aussi durant la deuxième quinzaine de mars que disparaissent les hivernants de Trenvel qui passent de 3000 le 10 mars à 200 le

31 mars.

Dans le Morbihan les schémas sont moins nets en raison de la présence de couples nicheurs au Cranic, à St-Jean/Mendon etc...

A Signaler la découverte de 3 nids le 9 juin sur l'île du Loch aux Iles Glénen!

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*), la présence d'Huitriers dans certains secteurs tout au long de l'année ou presque, la proximité des points de nidification rendent très périlleuse l'interprétation de la plupart des observations (trop peu nombreuses : 25 pour le 29N, 3 pour le 29S, 10 pour le 56).

Nous retenons cependant : 500 ind le 17 mars dans l'estuaire de la Vilaine (56), 40 ind le 10 avril au Cap Sizun (29S) puis une abondance d'observations de mi-avril à début-juin, quelques unes qui nous paraissent significatives se situant toutes en mai et début-juin : 150 à la pointe de Penlan/Billiers (56) le 12 mai; 3 et 10 ind respectivement les 21 et 26 mai dans le fond de la Rade de Brest (29N); 50 ind à Penthievre (56) le 6 juin. Notons que des lieux aussi régulièrement visités que Lampaul-Ploudalmézeau et Treglonou (29N) n'ont fourni d'observations qu'à cette époque.

Estivants notés aux Glénans: 20 ind le 9 juin. A partir du 23 juin nouvelle série d'observations, notamment au fond de la Rade de Brest les 28 juin et 14 juillet et dans le Golfe du Morbihan (1 ind) le 29 juin. Il s'agit sans doute de la dispersion d'une partie des nicheurs locaux, peut-être accélérée par la tempête des 27 et 28 juin ?


Par contre, l'observation de 100 ind à Goulven (29N) le 4 juillet semble correspondre à une arrivée substantielle (cette localité a été suffisamment visitée en juin pour qu'on puisse affirmer qu'il ne s'agit pas d'estivants).

La population nicheuse de l'archipel de Molène semble en nette augmentation puisque 110 à 118 couples y ont été comptés en 1968 (sauf Kervourok) contre 85 à 95 estimés en 1967 et 30-35 en 1956.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*), dès la mi-mars les colonies nicheuses se forment, les oiseaux se cantonnent (Goulven (29N) le 17 mars). L'installation se poursuit jusqu'au début-avril. Cependant on note encore de petits passages à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) les 28 mars et 4 avril : 20 à 25 ind au dessus de la mer le 28/3 et 13 ind dont 4 couples nicheurs ou tentant de nicher le 4/4. 1 ind non nicheur le 6 avril au Magouero/Plouhinec (56); 2 ind (nicheurs?) à St-Jean-du-Doigt (29N) le 17 mars.

Premières pontes constatées le 28 mars près du Faouët (56): 2 nids contenant 4 et 3 oeufs. Le 6 avril, ponte complète au Loc'h/Guidel (56). Le 8 avril, 8 couples au moins ont pondu à Erdeven (56). Mais des pontes fraîches sont encore trouvées fin-mai et même début-juin dans des colonies où la majorité des pontes ont déjà éclos. Il faut signaler une ponte de 7 oeufs (probablement due à 2 femelles) le 6 juin à Kerizon/Crac'h (56) (le nid contenait 2 oeufs le 23 mai).

Alors que les juvéniles volent et forment avec la majorité des adultes des bandes importantes, des couples nichent encore en juillet (Tren-



vel, 29S; le Loc'h/Guidel 56; Anse du Kernic 29N).

Plus de 20 colonies nous ont été signalées ce printemps (voir carte ci-contre).

Dans la plupart des colonies, les bandes post-nuptiales, de part leurs effectifs, témoignent d'une parfaite réussite des couvées malgré quelques pontes de remplacement : 70 à 80 ind à Keremma-Goulven en juillet doivent rassembler les oiseaux de Goulven et du Kernic, soit 12 ou 13 couples et leurs jeunes. 110 ind + quelques couples encore nicheurs à Trenvel début-juillet; 20 ind au Curnic/Guissény (29N) le 29 juin.

Cependant, des effectifs anormalement élevés en certains lieux de reproduction et des observations en des localités où l'espèce n'a pas niché en fin-juin-juillet mettent en évidence une dispersion à cette époque : 48 ind et 1 couple encore nicheur à Guidel (56) le 15 juillet (pour 6 couples nicheurs !), 30 à Kerizon/crac'h le 29 juin (pour 2 ou 3 couples nicheurs ayant encore des juvéniles non volants à cette date: ponte de 7 oeufs le 6 juin ; 14 ind à St-Renan (29N) le 15 juin alors que la reproduction, bien que possible, n'a pas été constatée ni même présumée, aucune observation de l'espèce n'y ayant été faite auparavant malgré de nombreuses visites (lieu-témoin).

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*), après un creux de trois semaines, un petit passage se produit entre le 4 et le 16 avril : dans le Morbihan, un vol de 12 ind le 4 avril à Malguénoc et 3 ind le 6 avril dans les dunes de Plouhinec; dans le nord-Finistère, 1 ind le 4 puis 2 les 10 et 16 avril dans les dunes de Lampaul-Ploudalmézeau.

Nouveaux stationnements, plus forts, du 5 au 15 mai dans les dunes de Lampaul-Ploudalmézeau : 30 ind le 5 puis 11 ind le 9, les 2 ou 3 derniers plumiers à cet endroit le 16 mai.

3 ind (dont 2 en plumage nuptial) attardés le 11 juin dans l'anse comblée de St-Marc/Brest, lieu où cette espèce n'a jamais été observée auparavant. 2 ind, estivants ou très attardés, le 7 juillet à Trevignon (29S).

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squarata*), en tout 6 observations pour la période considérée : 1 ind le 31 mars à Trenvel (29S), 9 ind le 28 avril dans l'anse du Pô/Plouharnel (56), 8 ind le 8 mai à Goulven (29N), 2 ind le 16 mai et 1 ind le 21 mai au Curnic/Guissény (29N). Encore 15 ind le 15 juin à Goulven.

GRAND GRAVELOTT (*Charadrius hiaticula*), le Morbihan et le sud-Finistère n'ont fourni que 6 observations ! (26 ind) pour la période considérée. Aussi ne pouvons-nous utiliser que les données du nord-Finistère.

L'hivernage se prolonge en mars-avril pour quelques oiseaux.

Petits passages ne donnant lieu à aucun maximum général du 4 avril (13 à Lampaul-Ploudalmézeau) au 15 avril (7 à 11 à St-Marc); sentis au

Curnic le 10 avril (8 ind) et dans le Morbihan les 8 (4 au Loc'h/Guidel) et 11 avril (8 à Kerizon).

Vague beaucoup plus forte en mai (du 5 au 22) avec deux périodes distinctes : + du 5 au 9 mai (maximum de 30 à Lampaul-Ploudalmézeau le 9 mai; au Curnic, maximum de 40 le 8).

+ du 17 au 22 mai (St-Marc/Brest les 17 et 18 mai : 13 ind; Treglonou : 40 ind le 22).

Passages irréguliers en fin-mai-début-juin : le 29 mai à Lampaul-Ploudalmézeau (7 ind) et le 3 juin au Curnic (20 ind).

Dernière vague, la plus forte, du 11 au 15 juin : St-Marc le 11 juin (14 ind); Curnic le 13 (57 ind); Curnic le 15 (46 ind); Goulven le 15 (30 ind); La Trinité-sur-Mer (56) le 16 juin (6 ind dans une ancienne saline).

La présence de juvéniles dans les petits groupes observés à partir du 20 juin est l'indication d'une dispersion post-nuptiale : 4 ind dont au moins 1 juv à Goulven le 20. Mais ce n'est qu'à partir du 4 juillet que l'on revoit l'espèce à St-Marc/Brest et au Curnic. Puis 4 ind au Curnic le 8 juillet, 10 à 12 ind dans l'anse du Kernic le 10 juillet. Egalement noté en juillet dans le sud-Finistère : 2 à Trenvel le 3 juillet; 2 à Trevignon le 13.

Dans l'Archipel de Molène où l'espèce semble être en léger accroissement, il y avait des pontes complètes le 7 juin alors que des couples avaient déjà des poussins. Ceux d'un couple de Balaneg sont subvolants le 8 juin.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*), une seule donnée pouvant concerner des oiseaux de passage : 2 ind au Curnic/Guissény (29N) le 10 avril puis à nouveau 2 ind (couple?) le 8 mai. Mais il peut s'agir du couple qui a niché dans une sablière située à 2 Km environ.

Arrivée des nicheurs : le 19 mars, premier couple installé à St-Marc/Brest; le 25 mars, l'effectif nicheur définitif est atteint en cet endroit; le 27 mars, premier à St-Renan; le 31 mars, 3 ind à Rennes (vol nuptial).

Localités de nidification signalées en 1968 :

ILLE-ET-VILAINE : Rennes (dans une gravière); début de nidification puis abandon.

MORBIHAN : Vannes : 3 couples sur l'esplanade d'une école!
Marais de Séné : 6 à 8 pontes et 1 pull trouvés le 29 mai

Surzur: nidification présumée d'1 couple.

Kerizon/Crac'h: 1 couple au moins

Lanester : 2 couples très vraisemblables en 2 lieux.

Fort-Bloqué/Guidel : au moins 3 couples.

Le Loc'h/Guidel : 2 couples

FINISTERE : Trenvel (29S) : 4 couples en un point.

St-Marc/Brest : 3 couples.

St Renan : 3 couples

Vougot/Guissény : 1 couple.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*), une seule parmi les très nombreuses observations de ce printemps concerne un oiseau de passage: 1 ind le 28 mars à St-Marc/Brest. Toutes les autres ont été faites sur des lieux de reproduction.

Arrivée des nicheurs: commencée dès le 7 mars (au Curnic (29N)), elle est notée le 31 mars à Trenvel (29S), le 10 avril à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 14 avril au Fort-Bloqué/Guidel (56) puis elle se généralise et se poursuit sans doute jusqu'au début mai.

La nidification est signalée de 7 localités du Morbihan (30 à 35 couples au total), de 3 localités du sud-Finistère où elle n'a pas été spécialement recherchée (10 couples au moins) et de 10 localités du nord-Finistère, toutes situées sur la côte basse à dominante sablonneuse à l'est de Porsall : au total, un minimum de 40 couples entre Lampaul-Ploudalmézeau et Plouescat (il existe certainement à l'est de cette localité, mais cette portion n'a pas reçu de visites).

Quelques dates (parmi d'autres):

- + Pontes complètes : 2 mai sur l'îlot An Dord (entrée de l'Aber-Benoit (29N); 4 mai, 1 couve 3 oeufs à Lampaul-Ploudalmézeau; 19 mai, 3 oeufs au Vougot/Guissény (29N); 2 juin, 3 oeufs au Fort-Bloqué/Guidel et au Bas-Pouldu/Guidel (56); 10 juin, 3 oeufs sur Beniget/Le Conquet.
- + Eclosions : vers le 11 mai au Vougot/Guissény; vers les 12-13 juin dans les marais de Séné (56)
- + Juvéniles volants : le 23 mai au Curnic/Guissény (29N).
- + 2e ponte normale : à Goulven le 20 juin, 1 couple s'occupe à la fois de 2 juv volants et de 2 pull qui viennent d'éclore.

TOURNEPIERRE (*Arenaria interpres*), du 7 au 20 avril, fréquentes observations dans le Morbihan, correspondant sans doute à des déplacements locaux d'hivernants ou autres, car le nord-Finistère ne fournit aucune observation à cette époque (les hivernants étant partis pour la plupart au début du mois).

Le passage de printemps commence vers le 3 mai pour se terminer vers le 13 juin. Le maximum se situe entre le 8 et le 17 mai environ dans le nord-Finistère. Une seule observation à cette époque dans le Morbihan : 12 ind le 12 mai à St-Philibert.

Des localités non suivies auparavant sont occupées par de grosses bandes fin-mai-début-juin : 100 ind le 28 mai à Moustierlin (29S); 40 ind le 9 juin sur Kemenez (Archipel de Molène); 40 ind le 6 juin à Penthievre (56); 10 ind le 10 juin à Erdeven (56) et enfin (dernière observation) 30 ind à la presqu'île Ste-Marguerite (29N) le 13 juin.

BECASSINE DES MARAIS (*Capella gallinago*), dans le nord-Finistère, le passage qui avait atteint un maximum vers le 7-10 mars traîne jusqu'à la fin du mois, puis il ne reste que des isolés ou de très petits groupes en quelques points.

Cependant, dans le Morbihan, on note un passage assez fort entre

les 3 et 13 avril. Rien de semblable dans le Finistère à cette époque. Dernières en Ille-et-Vilaine le 4 avril. Les dernières demeurent un peu plus tard dans le nord-Finistère : jusqu'au 14 avril dans les marais de St-Renan, au 21 avril à Gouesnou, au 23 avril à Lampaul-Ploudalmézeau. Encore 1 ind à Kerlouan le 8 mai.

En ce qui concerne la nidification, et malgré le manque de preuves "matérielles", nous pouvons affirmer que la Bécassine des marais a niché en 2 et peut-être 3 localités du Finistère : marais du Curnic-Vougot/Guissény (29N) : 2 couples (alarme violente et soutenue accompagnée de chevrottements le 23 mai); marais bordant l'étang de Goulven, 1 couple (mêmes démonstrations en juillet). La nidification a été prouvée en ce lieu en 1967, des poussins ayant été capturés par des enfants et apportés au Garde-chasse. Dans le marais de Trenvel (29S), il est possible qu'un couple ait niché : le 3 juillet, levés à plusieurs reprises, deux oiseaux revenaient avec insistance au point d'envol.

Retours importants dès le 14 juillet dans le Golfe du Morbihan.

BECASSINE SOURDE (*Lymnecryptes minimus*), deux observations fin-mars dans le nord-Finistère : 1 ind à St-Renan le 24 mars et 1 ind à Porsliogan/Le Conquet le 31 mars. Deux observations début-avril dans le Morbihan, pendant la dernière vague de Bécassine des marais : 3 ind à l'étang de St-Jean/Mendon le 3 avril et 1 ind dans le petit marais du Loc'h/Guidel le 6 avril.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*), le 17 mars, 100 ind dans l'estuaire de la Vilaine (56). Ce même jour, 1 ind dans une lande tourbeuse de St Renan. Le 31 mars, il en reste encore 100 en rivière de Pont-l'Abbé (29S); du 28 mars au 5 avril, 50 ind à Lampaul-Ploudalmézeau (29N). Des effectifs relativement élevés (bandes de 15 à 20) sont encore observés en avril, tant dans le Morbihan que dans le Finistère. Mais il ne semble pas qu'il y ait passage à cette époque, mais plutôt prolongement de l'hivernage d'une partie de la population.

Très peu en mai (uniquement sur le littoral du nord-Finistère) : 1 ou 2 à Lampaul-Ploudalmézeau, quelques-uns à Goulven, 1 à Brélès, 10 puis 3 ind au Conquet.

Estivants nombreux en juin-juillet sur la côte nord-finistérienne : nombreux sur l'île de Trielen/Archipel de Molène le 9 juin, 10 sur Molène même le 10 juin, 20 à Goulven le 15 juin, puis en juillet, 100 à Lampaul-Ploudalmézeau le 16 juin, 1 au Curnic le 8 juillet, 4 à Ouesant le 10 juillet et 6 à Daoulas le 14 juillet.

Dans le Morbihan qui n'a fourni aucune donnée depuis le 18 avril on note des oiseaux à partir du 18 juin : 20 puis davantage à l'île Bailleron/Séné, 25 en Rivière d'Auray le 23 juin, 15 le 24 juin dans les marais de Séné.

Nidification: Le 29 mars, 3 couples en vol nuptial et des chants à Malguénac (56).

Nicheurs signalés dans le Bassin du Yeun-Elez (Monts d'Arrée), au Menez Querque/Châteaulin et au Menez Hom. !

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*), passage débutant le 31 mars : 4 ind à Trenvel (29S). Quelques petites chutes discontinues en avril : 19 ind près de Crozon (29S) le 12 avril, 15 dans l'anse du Pô/Plouharnel (56) le 19 avril, 16 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 23 avril et 15 à Rosmelec/Rade de Brest (29N) le 27 avril.

Un fort passage se produit du 4 au 25 mai environ provoquant de fortes chutes sur le littoral nord-finistérien. Maximum du 4 au 16 : par exemple : Lampaul-Ploudalmézeau, 50 le 4 mai, 100 le 5 mai, 100 à 120 le 16; à Goulven, plusieurs dizaines le 8 mai; observations de troupes de 10 à 30 ind un peu partout. Pas de chutes dans le sud-Finistère ni dans le Morbihan à cette époque; cependant, à Etel (56), un passage nocturne est noté le 13 mai. Encore 15 en Rivière d'Auray le 1 juin et 1 attardé dans l'anse du Kernic/Plouescat (29N) le 5 juin.

A partir du 18 juin des Corlieux sont notés dans le Golfe du Morbihan. Leur nombre semble aller croissant par la suite. 1 ind à Lampaul-Ploudalmézeau le 29 juin, 10 sur l'îlot de Méaban/Locmariaquer (56) le 30 juin et 10 à 20 à Goulven (29N) en juillet. Il s'agit sans doute d'estivants en erratisme, mais comme pour le Courlis cendré on ne peut exclure l'hypothèse de premiers retours très précoces : les localités du nord-Finistère citées ci-dessus ont reçu suffisamment de visites après la fin du passage de mai pour que l'on puisse parler d'arrivées. Dans quel sens?

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*), la migration pré-nuptiale se poursuit du 20 mars au 25 avril.

Dans le Morbihan : 50 ind à Kerizon/Crac'h le 11 avril et 1 à Groix le lendemain. Dans le Finistère, 1 au Curnic/Guissény le 20 mars, 3 au même endroit le 24 mars, 1 à St-Marc/Brest le 25 mars, 5 en Rivière de Pont l'Abbé le 31 mars, 1 le 15 avril à St-Marc/Brest et enfin 1 le 25 avril à Lampaul-Ploudalmézeau.

Cette année, 5 couples se sont reproduits dans les marais de la Baie d'Audierne (29S) : parades le 1 mai, nids avec pontes le 3 juin (cf. MONNAT, Ar Vran, 1968 fasc. 3).

Dès le 4 juillet, premiers retours dans le nord-Finistère : au Curnic, 3 le 4 juillet puis 2 jusqu'au 10 juillet, 1 le 15 juillet; à Goulven, 1 le 11 juillet.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*), pas de grands stationnements et séjour très bref des oiseaux qui s'arrêtent au printemps.

Première observation le 31 mars en rivière de Pont-l'Abbé (29S); 6 ind le 15 avril au Perello/Ploemeur (56); une bande de 100 en migration vers le nord à la pointe de Corsen/Plouarzel (29N) le 5 mai; puis 9 le 16 mai à Lampaul-Ploudalmézeau; 1 le 21 mai au Curnic/Guissény.

Il semble donc que le gros du passage se soit déroulé entre la fin-avril et la mi-mai.

En juin, 3 observations : 1 à Trenvel (29S) le 8, 50 à Trielen/Archipel de Molène le 9, 3 à Goulven (29N) le 15.

1 ind à Goulven le 4 juillet.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*), sur 7 observations pour toute la Bretagne dans la période considérée, 5 proviennent de l'étang du Curnic (29N) : 2 ind le 24 mars, 5 ou 6 ind le 10 avril, 2 le 16 mai, 1 le 21 mai, enfin 1 ind (en plumage nuptial imparfait) le 23 juin, date à laquelle 2 ind sont observés dans un marais de Séné (56). Le 13 juillet, un oiseau est entendu à l'embouchure de la Vilaine (56).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*), maximum d'observations entre le 15 mars et le 15 avril, correspondant à la fin de l'hivernage. Par exemple 150 dans l'estuaire de la Vilaine (56) le 17 mars. Dans l'Aber-Ildut (29N) : 25 le 10 mars, 20 le 23 mars 3 le 26 mars et 1 le 16 avril. Le départ des hivernants s'accompagne de très petites chutes au bord de quelques étangs : Kerizon/crac'h (56) le 24 mars (3 ind), Trenvel (29S) le 31 mars (4-5 ind), Curnic/Guissény (29N) le 24 mars (5 ind) et le 10 avril (4-5 ind), et notamment à Pri-ziac (56), étang situé très à l'intérieur des terres, le 27 mars (1 ind). De plus, petit passage nocturne à Locqueltas/Larmor-Plage (56) le 8 avril.

Comme les Barges, le Gambette survole la Bretagne au printemps, mais ne s'arrête guère : en tout 6 observations de 1 à 5 ind, toutes dans le Finistère, entre le 21 avril (Curnic, 2 ind) et le 2 juin (Curnic, 1 ind).

La nidification a encore été constatée cette année dans les marais de Séné (56) où l'on peut admettre un minimum de 4 couples nicheurs en 1968.

Par contre, les 30 ind du 23 juin et les 24 ind du 24 juin dans ce même marais ne sont certainement pas des nicheurs; ils appartiennent sans doute aux premiers contingents des migrateurs post-nuptiaux dont l'apparition est classique à cette époque : 1 le 26 juin, puis 25 ind le 29, puis 40 ind le 1 juillet à Kerizon/Crac'h (56); 1 ind le 27 juin, puis 20 le 4 juillet, 6 le 5 juillet, 1 le 8 juillet au Curnic (29N); 20 ind le 29 juin en Rivière de l'Hopital/Rade de Brest. Cette vague d'arrivée qui a atteint son maximum fin-juin-premiers jours de juillet (surtout le 4 dans le nord-Finistère) a donné lieu à plusieurs observations en d'autres points : 40 ind à Goulven (29N) le 4 juillet, Ilot de Trevoc'h/Aber-Benoit (29N) et anse du Kernic/Plouescat (29N) le 8 juillet, Ouessant (29N) le 10 juillet et Bailleron/Séné (56) à partir du 15 juillet.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*), l'oiseau observé dans l'Aber-Ildut les 23 mars et 16 avril est sans doute un hivernant. De même 1 ind le 24 mars à Kerizon/Crac'h (56).

Le passage de printemps commence le 8 mai (2 ind à Goulven (29N)) et se termine le 11 juin (1 ind à St-Marc/Brest (29N)). L'espèce est notée les 19 et 23 mai dans le Morbihan : 3 ind à Kerizon/Crac'h et dans le sud-Finistère le 3 juin : 1 ind à Trenvel/Baie d'Audierne. Dans le nord-Finistère, maximum net le 19 mai avec 31 ind pour 4 localités : 21 à Goulven, 7 au Vougot-Curnic/Guissény.

Premiers retours début-juillet: Goulven, 3 ind le 4 et 14 le 10.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*), départ de hivernants à Ste-Anne d'Auray (56) : 4 ind jusqu'au 30 mars, 2 jusqu'au 3 avril, 1 jusqu'au 20 avril.

Trois observations en avril : 1 ind à Gestel (56) le 10 avril, 1 à Kerizon/Crac'h (56) le 11 avril, 1 à St-Marc/Brest le 21 avril. Une seule observation en mai : 2 ind à Sarzeau le 16.

Retours dès le 15 juin : 1 ind à St Renan (29N) à partir de cette date; 5 dans les marais d'Ambon (56) le 25 juin; 1 à Kerizon le 29 juin 1 sur le Scorff (56) et 1 à Ste-Anne le 15 juillet.

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*), il se confirme que la Bretagne est en dehors des voies de migration pré-nuptiale du Chevalier sylvain : aucune observation.)

Premiers retours dès le 3 juillet : 4 ind à Trenvel/Baie d'Audierne (29S); 2 ind au Curnic/Guissény (29N) le 4 juillet puis 15 à 18 à Trenvel le 7 juillet et 2 au Curnic le 8.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*), prolongement de l'hivernage jusqu'au début-avril (1 les 10 et 23 mars, 2 le 26 mars dans l'Aber-Ildut (29N), 1 jusqu'au 5 avril à Kerjean/Le Conquet (29N), 1 à St-Marc/Brest jusqu'au 6 avril). 1 ind à Kervégant/Quéven (56) le 4 avril (aucune indication permettant de dire s'il s'agit ou non d'un hivernant).

Premier passage du 14 au 25 avril environ : trois observations d'isolés dans le Morbihan du 14 au 24 avril (les 14 et 24 avril sur l'Ellée/Fauët, le 15 avril à Guidel) et une observation dans le nord-Finistère : 2 ind le 25 avril à St-Renan.

Deuxième vague plus remarquée du 9 au 22 mai environ, dans le nord-Finistère seulement : à St-Renan le 9 mai (1 ind), à St-Marc le 12 mai (1 ind), puis les 21 et 22 mai (2 ind), en Rivière de l'Hopital-Camfrout/Rade de Brest le 17 mai (1 ind), en un autre point de la Rade le 18 mai (1 ind), à Goulven le 22 mai (2 ind). Le passage faible, les séjours très brefs des quelques oiseaux qui s'arrêtent, facilitent la délimitation des passages.

Ces caractéristiques s'opposent à celles de la migration post-nuptiale, laquelle commencerait dès le 20 juin (2 ind à Goulven). Puis 1 ind à Séné (56) le 24 juin, premier à St-Marc/Brest le 30 juin. Fort arrivage à partir du 4 juillet : 3 à St-Marc, 8 à 15 à l'île Bailleron (56) et premier au Curnic le 8 juillet, 3 ind à Kerjean/Le Conquet le 12 juillet puis 6 le 13, 5 ind à St-Marc le 14, 2 au Curnic et 7 sur 1 km le long du Scorff (56) le 15 juillet.

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*), en tout 6 observations ne concernant que de petites bandes de 1 à 8 ind, toutes situées entre le 3 mai (3 ind au Curnic/Guissény (29N)) et le 15 juin (8 ind à Goulven (29N)). En outre, 2 ind au Curnic et 1 à St-Marc/Brest le 2 juin et 5 à Trenvel/Baie d'Audierne (29S) le 3 juin.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*), seul le nord-Finistère semble avoir été touché par la migration du Bécasseau minute ce printemps, mais très tardivement : 1 ind à St-Marc les 9 et 18 juin, 2 ind à l'étang du Curnic le 13 juin.

BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*), 1 ind à l'étang du Curnic le 8 mai (2^e observation pour la Basse-Bretagne).

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*), quatre observations dans la période considérée, concernant sans doute des fins d'hivernage : 2 au Perello/Ploemeur (56) le 13 avril et 23 au même endroit le 15 avril (cet endroit est un lieu d'hivernage régulier du Bécasseau violet). 10 sur Enez Werc'h/Morgat (29S) le 28 avril et 2 sur les Berniou Pez/Camaret (29S) le 5 mai.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*), l'analyse des données bretonnes est très difficile pour plusieurs raisons dont les principales sont... 1°/ la non concordance des chutes en des localités pourtant proches, ce qui donne un nombre très élevé de maxima locaux. 2°/ l'omniprésence de l'espèce, les oiseaux pouvant être divisés en plusieurs catégories rarement discernables : les oiseaux séjournant longuement, les oiseaux séjournant quelques jours, les "nouveaux arrivés".

La plus forte vague, commencée le 2 mars, se termine vers le 20 environ avec de forts maxima le 16 mars à St-Marc/Brest (500), et le 17 mars à l'embouchure de la Vilaine (1000-1500).

Second maximum du 12 au 28 avril environ, noté à St-Marc et dans le Morbihan.

Troisième vague notée surtout en nord-Finistère (St-Marc, Curnic..) du 15 au 23 mai.

Fortes chutes début-juin en plusieurs secteurs du nord-Finistère (Curnic surtout).

Décroissance rapide ensuite, certains oiseaux traînant jusqu'aux derniers jours du mois de juin. Estivants nombreux en certains lieux : par exemple, 40 à 50 à Goulven en juin-juillet.

Retours certains à partir du 7 juillet (Curnic, Kernic/Plouescat, St-Pabu/Aber Benoit...).

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*), les observations, presque toutes sur les côtes du nord-Finistère, vont du 18 avril à juillet et permettent de distinguer :

Un passage important du 4 mai au début-juin avec deux vagues discernables : du 14 mai au 16 mai environ (Curnic, Lampaul-Ploudalmézeau) et du 23 mai au 3 juin (maximum de la période du 23 au 29 mai au Curnic et à Lampaul-Ploudalmézeau, 48 ind au Fort-Bloqué/Guidel (56) le 3 juin).

Des attardés en juin : 100 sur l'île de Trielen/Archipel de Molène le 9 juin, 1 près de Ste-Marguerite/Aber Benoit (29N) le 11 juin alors qu'il n'y en a plus depuis le 3 sur les lieux habituels de stationnement.

Les premiers retours commencent peut-être le 29 juin (7 à Lampaul-Ploudalmézeau), en tout cas le 7 juillet au Curnic (5 à 10 ind puis 35 ind le 10). Noté le 13 juillet à Trevignon (29S) et le 14 juillet à St-Pabu/Aber Benoit (29N).

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*), commencé le 10 mars, le passage se poursuit jusqu'en juin. Seul l'étang du Curnic a fourni des observations tout au long de cette période et permet de dégager deux maxima : 1°/ vers le 10 avril (12 ind). Les deux seules observations du Morbihan se placent juste avant 1 ♂ au Loc'h en Guidel les 6 et 8 avril.

2°/ vers le 16 mai (8-10 ind). Il y correspond une observation à St-Marc/Brest (1 le 17 mai), une à Lampaul-Ploudalmézeau (1 ind le 16 mai) et une à Goulven (1 ind le 19 mai).

1 ♀ demeure au Curnic pendant tout le mois de juin, alors que quelques attardés continuent à passer (4-5 ind à Trenvel le 3, 2 ♀♀ au Curnic le 16, 1 ♀ à St-Marc les 18 et 19 juin).

Un nid de combattant a été découvert dans les marais de la Baie d'Audierne (29S) cette année. ←

Dès le 4 juillet, on note les premiers retours au Curnic (10 à 12 ind) et d'emblée un premier maximum jusqu'au 10. En outre, 1 ♂ et 1 ♀ à Trevignon/Tregunc (29S) et 1 ♂ à Goulven le 11 juillet. Ces premiers arrivages comportent une nette majorité de ♂♂ dont certains très sombres.

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*), 1 ind sur la palud de Goulven (29N) le 22 avril et 5 ind à St-Renan (29N) le 20 avril.

3 ou 4 couples seulement se sont reproduits cette année dans les marais de Séné (56). Les Echasses n'ont pas reparu en Baie d'Audierne (29S).

Il faut chercher l'explication de cette diminution des effectifs de Bretagne méridionale non seulement dans les mœurs "fugaces" des Echasses, mais sans doute aussi dans les destructions occasionnées par la chasse du 14 juillet, cette année encore on nous signale deux victimes à Séné le 14 juillet. Et combien passent inaperçues.

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*), 3 à 5 ind dans les dunes d'Erdeven (56) le 14 avril. 1 ind dans les dunes de Plouharnel (56) le 25 juin.

LARIDAE, nos données sur la nidification de ces oiseaux sont trop nombreuses pour qu'elles puissent entrer dans ces actualités : nous publierons en 1969 un premier addendum au "Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne" portant sur l'évolution des effectifs en 1968 et 1969. Ne figureront donc dans les présentes actualités que des dates d'arrivée ou d'installation sur les colonies, ainsi que quelques données sur la "biologie".

-191-

GOELAND MARIN (*Larus marinus*), pas de variations sensibles des effectifs finistériens en 1968. Quelques localités nouvelles ont été trouvées.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*), augmentation globale des effectifs du Finistère malgré une légère diminution au Cap Sizun.

Il semble bien qu'un passage se soit produit dans la première quinzaine d'avril, avec notamment de petites bandes en vol vers le nord dans l'intérieur du Morbihan les 5, 8, 10 et 12 avril et des stationnements importants dans le nord-Finistère à cette époque.

Adultes non nicheurs présents ici et là sur la côte en mai-juin avec une augmentation sensible à la fin de ce mois.

GOELAND CENDRE (*Larus canus*), observations fréquentes dans le Finistère jusqu'au 8 mai. Derniers adultes notés le 16 mars (5-6) dans la rade-abri/Brest. Ensuite, petites bandes d'immatures en quelques points du littoral nord-finistérien (St-Marc, Curnic/Guissény, Lampaul-Ploudalmézeau, Aber-Benoit...). Forte bande de plus de 100 ind le 31 mars à Trenvel. Derniers à St-Marc le 5 mai, au Curnic le 8 mai (1 imm).

Du 4 au 11 juillet, une dizaine à Goulven (29N) (ad + juv ? + imm).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*), les départs d'adultes continuent dans la 2e quinzaine de mars et en avril. Les derniers adultes sont notés dans les premiers jours de mai bien que des passages se produisent encore du 16 au 21 mai (avec Sternes et Guifettes) dans le nord-Finistère.

Le nombre des immatures décroît progressivement en avril et des passages se produisent en mai et début-juin, les estivants (immatures) étant peu nombreux : par exemple de 3 à 8 ind seulement à St-Marc.

Dès le 3 juin, 1 juvénile est noté à Kerizon/Crac'h (56). Dans le nord-Finistère, les premiers retours sont notés le 19 juin à St-Marc (1 ad), le 23 juin au Curnic (1 ad); les juvéniles apparaissent le 27 juin au Curnic (1 ind), le 30 à St-Marc (4-5 ind). Dans le Morbihan, des juvéniles sont aussi notés le 23 juin à Séné.

Des arrivées importantes d'adultes, d'immatures et de quelques juvéniles se produisent alors dans les derniers jours de juin (Curnic, St-Marc, Goulven, Kerizon...). Rapidement les effectifs augmentent en juillet : par exemple, 250 au Curnic le 4 et le 8 juillet, 300 à 400 dans le Golfe du Morbihan le 9, 200 dans l'anse du Kernic/plouescat le 10 et 300 en Baie du Mont St-Michel le 13.

Des passages d'adultes accompagnés de quelques juvéniles sont notés le 7 juillet sur la côte rocheuse de la presqu'île de Crozon, les 11, 12 juillet et les jours suivants à Kerfissien (29N).

Rappelons la découverte d'un couple nicheur sur un des îlots de la Baie de Morlaix. Par contre, la Mouette rieuse ne s'est pas reproduite cette année (à notre connaissance) dans les marais de Séné (56).

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*), 15 observations en deux points du nord-Finistère. A St-Marc/Brest : 1 ad les 18 et 21 mars et les 12, 21 et 28 avril ainsi que les 1, 3, 5 et 21 mai, plus revu par la suite. 1 autre adulte le 22 mai et 1 imm le 5 mai. Au Curnic/Guissény, 2 imm les 21 et 23 mai et les 5 et 13 juin. Un autre immature le 5 juillet.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*), en fin-mars, observations fréquentes en Baie de Douarnenez ainsi que dans les parages de St-Mathieu/Le Conquet (29N). Observée le 10 mai près de Brest, le 26 mai au Conquet et le 2 juin à l'embouchure de l'Aber-Benoit (1 imm); 1 ind en Baie de Daoulas (fond de la Rade de Brest) le 25 juin et 4 sur la digue de la rade-abri/Brest le 6 juillet.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*), passage à Brest les 21 et 22 mai en bandes de 3 à 9 ind. Une seule observation dans le Morbihan le 26 mai (3 ind à l'étang du Cranic). Ces oiseaux ne font que passer : à St-Marc/Brest, ils arrivent du sud-est, piquent sur les lagunes et repartent aussitôt vers l'ouest. Au Cranic, les 3 oiseaux observés le 26 mai au matin étaient absents au début de l'après-midi.

GUIFETTE LEUCOPTERE ! (*Chlidonias leucoptera*), à St-Marc/Brest, 3 ind en plumage nuptial ont survolé quelques minutes les lagunes dans un vol de 12 à 15 Sternes pierregarin, le 17 mai vers 18h. C'est à notre connaissance la deuxième apparition de l'espèce en Bretagne.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*), les premières sont notées le 14 avril : 3 ind au Guilvinec (29S). Dans le Morbihan, observations en deux points le 18 avril : 4 à Belle-Ile, nombreuses dans le Golfe. Premières déterminées le 22 avril dans le nord-Finistère : 10 ind au Curnic/Guissény. Elles ne deviennent abondantes qu'au début-mai. Des passages sont observés à Brest du 17 au 25 mai.

Deux faits remarquables pour ce qui concerne la nidification : l'occupation par une quinzaine de couples des digues et des coffres d'amarrage de la rade-abri de Brest et le premier cas de reproduction de l'espèce sur les côtes mêmes du continent en Bretagne : 5 couples dans les marais de la Baie d'Audierne.

La dispersion des nicheurs se fait sentir dès le 27 juin : 12 adultes et 2 juvéniles nourris à l'étang du Curnic (29N). Les adultes constituent la plus grande partie des oiseaux observés avant le 15 juillet et l'on peut penser qu'il s'agit d'oiseaux ayant perdu leurs couvées : signalons entre autres 40 ind au Kernic le 10 juillet et 2 ind au Cranic le 2 juillet.

A partir du 12 juillet, des isolés et des petits groupes commencent à passer au long de la côte à Kerfissien/Cléder (29N).

Dès le 2 juin, l'éclosion est commencée sur l'îlot de Trevoc'h/Aber-Benoit (29N). Les 8 et 9 juin, 50% des pontes ont éclos dans l'Archipel de Molène. Pontes fraîches le 3 juillet à Trenvel (29S); encore des oeufs le 6 juillet au port de Brest. De nombreuses destructions de poussins sont signalées sur la côte nord du Finistère.

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*), 1 ind à St-Marc le 25 mai. Un couple nicheur dans l'Archipel de Molène.

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougallii*), aucune observation concernant le passage de printemps. Seulement 3 observations en juin aux abords des îlots de nidification.

→ La dispersion est constatée dès fin-juin : 1 ind le 25 en Baie de Daoulas/Rade de Brest, 7 ou 8 adultes et 1 juv le 30 à St-Marc/Brest; 1 ad au Curnic les 4, 8 et 10 juillet; quelques ind à St-Marc le 8 juillet.

STERNE NAIN (*Sterna albifrons*), ne semble pas avoir été observée dans le Morbihan. Dans le nord-Finistère, les premières sont observées le 23 avril (16 ind à Lampaul-Ploudalmézeau); en mai, quelques observations en dehors des lieux de nidification.

Dispersion dès fin-juin : par exemple, 5 ad et 1 juv au Curnic/Guissény (29N) le 27; 4 ou 5 ad et 4 ou 5 juv nourris au Curnic le 29; 3 ind à St-Marc le 30. En juillet, les apparitions se font plus fréquentes et les bandes plus nombreuses : de petits passages se produisent à ce moment (Curnic, Goulven, Kernic/Plouescat, Treglonou, Le Conquet, St-Marc, Kerfissien/Cléder, St-Pabu...).

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*), dès le 17 mars, une observation dans le Morbihan : nombreuses à St-Philibert. Ce n'est que le 24 mars qu'elle est notée simultanément dans le Golfe du Morbihan et en différents points du nord-Finistère, dans les parages de l'Aber-Benoit. Le passage se fait alors sentir sur les côtes du nord-Finistère avec une nette augmentation dès le 28. Après un maximum dans la première quinzaine d'avril (également senti dans le Morbihan) des bandes continuent à passer jusqu'à la fin du mois (40 ind à Corsen/Plouarzel en 10 minutes le 28).

La dispersion, bien que commençant vers le 25 juin comme pour les autres Sternes, est très faible dans la période considérée : 1 juv à St-Marc/Brest le 30 juin...

Un couple a très vraisemblablement niché sur un des radeaux du port de guerre de Brest!

PIGEON BISET (*Columba livia*), le 16 avril, 4 à Port Coton et 1 à la réserve Nar Mor/Belle-Ile (56).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*), 10 à Priziac (56) le 30 mai.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*), En dehors d'observations isolées du Morbihan et du Finistère, notons que des bandes sont signalées tout au long de la période de reproduction : 30 à Noyal-Pontivy (56) les 16 mars et 31 mai; 10 ind à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 21 mars; 8 à l'Aber-Ildut (29N) le 23 mars; 30 à 40 à Goulven (29N) les 10 avril, 8 mai et 20 juin; 8 au Conquet (29N) le 2 mai et 5 à Trévignon/Tre-gunc (29S) le 7 juin.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*), les premières sont notées dans la 2e quinzaine d'avril pour tous les départements : 16 et 17 avril à Belle-Ile (56), 20 et 25 avril en presqu'île de Crozon (29S), 21 avril à St-Jacut-la-Mer (22) et 26 avril à St-Renan (29N). Une éclosion est observée le 27 mai en Ille-et-Vilaine et une autre le 1er juin. Des nids sont encore en construction le 13 juin à Moigné (35).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*), nous signalerons seulement 1 couple observé à l'île Molène (29N) le 9 juin, ce qui semble être un apport nouveau pour l'avifaune de l'île.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*), premières observations pour le Finistère : le 26 mars, 1 ♂ près de St-Renan; le 28 mars, 1 ind à l'étang du Roual/Dirinon (29N) et le 4 avril, 1 ind dans l'intérieur, près de Laz (29S).

Dans le Morbihan, premières observations le 4 avril entre Pluvigner et Camors et à Brandivy, puis le 9 avril près de Lorient et à Groix, le 10 avril enfin à Beg Minio/Plcemeur.

Les arrivées sont également notées le 4 avril dans l'Ille-et-Vilaine et le 10 avril dans les Côtes-du-Nord.

Les observations deviennent nombreuses en avril, un peu moins en mai, rares en juin (manque d'attention).

Quelques individus en phase rousse notés en différentes localités : 1 ♂ le 18 avril à Auray (56), 1 ind à Ruillé-Froid-Fonds (35) le 27 avril, 1 ♂ à Noyal-Pontivy (56) le 31 mai et 1 ♂ morte à Grandchamp (56) le 13 juin.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*), deux sujets dans le Yeun-Elez/Monts d'Arée (29N) le 29 juin.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*), un couple a niché dans les falaises de la réserve Michel-Hervé JULIEN/Cap-Sizun (29S).

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*), deux observations dans des falaises maritimes : 1 ind le 4 mai sous le phare de Morgat (29S) et un autre le 26 mai à la réserve Michel-Hervé JULIEN/Cap-Sizun (29N).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*), chant à l'Île-aux-Moines (56) le 24 mars.

MARTINET NOIR (*Apus apus*), les premiers sont notés le 13 avril à Vannes (56) puis à partir du 16 avril dans l'ensemble du Morbihan. Les premières arrivées à Brest sont enregistrées le 20 avril et dès le 21 avril, la densité d'oiseaux observés est moyenne. Le 26 on note des couples installés (2 à Lanrédec (29N)). A noter que quelques individus de très grande taille (?) ont été notés le 17 avril à Belle-Ile (56).

Dans le courant de mai, quelques rassemblements importants sont notés, indices éventuels d'un maximum de passage : 3000 ind à Kerizon/Crac'h (56) le 19, plusieurs centaines au Cranic le 26 mai.

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*), les observations sont trop éparées et trop décousues pour que l'on puisse en tirer quelque conclusion. Tout au plus pouvons-nous constater que l'espèce est présente dans tous les lieux qui lui sont favorables. Un couple nourrit sur l'E-lorn le 25 mai (29N); 1 sujet avec des pull au Faouët (56) le 3 juillet.

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*), 1 oiseau cantonné dès le 3 avril à Livré en Mayenne. Le 8 avril l'espèce est observée en 4 localités du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine : 4 ind à Groix (56), 2 ind à Kerhilio/Erdeven (56) et 1 ind à Loperhet/Erdeven ; 1 ind à Renazé (35). Les jours suivants, l'espèce est régulièrement notée à Groix et 1 ind est vu au Loc'h/Guidel (56) le 10 avril. 1 chant à Paimpont le 15 avril; 4 ind à Belle-Ile 56 le 16 avril. Le premier oiseau du Finistère n'est vu que le 1 mai à St-Vio (manque d'observateurs dans la région en avril).

La Huppe semble en augmentation par rapport à 1967 en Ille-et-Vilaine. Dans le sud-Finistère, 1 oiseau a été vu à Cléden-Cap-Sizun le 3 juin et un autre à la réserve Michel-Hervé JULIEN/Cap-Sizun le 8 juin.

PIC CENDRE (*Picus canus*), chant noté le 27 mars et courant avril à Beauvais/Paimpont (35) et à la mi-avril à Montfort-sur-Meu (35) (D. HALLEUX, Mulhouse).

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*), chante le 27 mars en forêt de Paimpont (35). 1 nid contenant des poussins le 27 mai près de l'étang du Cranic (56).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*), 1 ♀ à Languéro/St-Renan (29N) le 26 mars; 1 ind creuse son nid le 9 avril à Beauvais en Paimpont. 1 ind le 2 mai à Ste-Anne (56).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*), noté ici et là : 1 ind au port de commerce de Brest les 25 et 28 mars; 1 couple à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 28 mars; 1 chanteur au Loc'h/Guidel (56) le 10 avril.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*), observée à Paimpont (35) le 27 mars. Notée assez fréquemment dans la première quinzaine d'avril : à Paimpont, Lanester (56), Erdeven (56), Ploemeur (56); il s'agit à chaque fois de chanteurs. Un nid avec 3 pull de 6 à 8 jours est

découvert le 12 avril à St-Just (35) (cas de nidification très précoce. Observations en mai et juin dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Passage de 15 ind à Lampaul Ploudalmézeau (29N) le 5 mai.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*), l'arrivée des migrateurs est sensible à partir de début-mars et présente des maxima caractérisés sur les secteurs-témoins du nord-Finistère vers le 17 mars et surtout dans les tous derniers jours de ce mois (Lampaul-Ploudalmézeau, St-Renan, St-Marc/Brest). Dans ces secteurs-témoins, les couples sont cantonnés début-avril, l'effectif nicheur définitif étant atteint vers la mi-avril.

Le 21 avril, un nid contient des oeufs dans la région du Mont-St-Michel (35); le 16 mai, 4 pull au nid à Lampaul-Ploudalmézeau.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*), notée à partir du 20 mars : 1 au Faouët (56) et 10 à Guissény (29N), puis par petites bandes isolées (maximum de 60 le 26 mars à Guissény) jusqu'au 3 avril. A partir de cette date, le passage s'intensifie et demeure important jusqu'au 25 avril environ: grosses bandes au dessus de plans d'eau du Finistère et du Morbihan, passage par vagues à Groix et Erdeven (56) le 8, des centaines à St-Marc/Brest le 12, encore 200 à St-Marc le 21, forte arrivée à St-Renan entre le 20 et le 25 avril. Début-mai, quelques couples construisent leurs nids à Pontivy (56). Début-juillet, un dortoir de 200 à 300 ind est découvert dans la roselière de Goulven.

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*), l'arrivée se situe fin-mars : 1 ind à St-Marc/Brest le 28 mars, 12 ind en Rivière de Crac'h (56) le 31 mars, quelques ind isolés le 2 avril à Ste-Anne d'Auray (56), St-Jean/Mendon (56), Pluvigner (56) et Craon (35). Le 4 avril, on note de petites bandes de 8 à 10 ind au Cranic (56), à Guignen (35) et à l'étang de la Forêt (56) alors que dans le Finistère les observations restent rares. Le 8 avril, on note un gros passage à Erdeven (56), l'arrivée se faisant par vagues successives. Dès le 18 avril, il semble que la plus grosse partie des effectifs soit arrivée.

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*), les premières sont observées à Rennes le 21 mars. Aucune observation dans le Finistère jusqu'au 6 avril. Vers la fin avril les emplacements connus sont occupés. A signaler que l'espèce est peut-être nicheuse à l'île Molène (29N).

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*), 1 ind le 14 avril dans les dunes d'Erdeven (56), 1 autre le 15 avril à Paimpont (35).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*), peu de données sur cette espèce dont le statut en Bretagne serait

intéressant à préciser. Premières observations dans le Finistère : 1 chanteur près de Ploumoguier (29N) le 31 mars et 1 ind, certainement migrateur dans les dunes de Lampaul-Ploudalmézeau le 4 avril.

Localités citées en période de nidification : St-Adrien/Ploemeur (56), Kervenanec/Lorient (56), Menez-Hom (29S), Beauvais/Paimpont (35).

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*), observations extrêmement nombreuses et difficilement interprétables.

Alors que les nicheurs locaux sont déjà cantonnés dans les secteurs-témoins du nord-Finistère, on assiste à des passages et au départ des derniers hivernants jusqu'au 4 avril environ.

Les chants ont commencé à se faire entendre dans la première quinzaine de mars. 1 couple construit au Menez Querque/Chateaulin (29S) le 1 avril, et le 5 avril sur les paluds de Kervégant/Queven (56). 1 nid contient 4 oeufs le 9 avril à Beauvais/Paimpont (35); 1 nid avec 4 oeufs au Menez Querque le 27 avril. Nourrissages notés le 4 mai à Morgat, le 5 mai à St-Marc/Brest et au Menez Querque. Des jeunes sont nourris hors du nid le 12 mai à St-Marc/Brest.

En ce qui concerne la répartition, signalons que nous avons découvert l'espèce sur l'Archipel de Molène: 1 juv tout juste volant sur Ledenez Molène le 7 juin; 1 chanteur et 1 juv à Balaneg le 8 juin et 2 chanteurs au moins sur Molène le 9 juin.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta spinoletta*), 1 ind le 24 mars dans les dunes de Lampaul-Ploudalmézeau (29N), en plumage nuptial presque complet.

PIPIT MARITIME (*Anthus spinoletta petrosus*), le premier nid ne nous est signalé que le 12 mai aux Tas-de-Pois (29S) (4 oeufs). Des nids contenant des oeufs sont trouvés jusqu'au 15 juin.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava flava*)

& BERGERONNETTE FLAVEOLE (*Motacilla flava flavissima*), 1 ind de sous-espèce non précisée le 23 mars à Rennes (35). Les premières flavéoles sont notées à St-Marc/Brest le 25 mars (2 ♂ et 1 ♀). Cependant, les arrivées doivent se poursuivre pendant la plus grande partie du mois d'avril dans le nord-Finistère puisque le nombre de couples définitif (20 à 30) n'est pas encore atteint à Lampaul-Ploudalmézeau le 21 avril. Les premières printanières types ne sont notées que le 4 avril à Kervido/Lanester (56) : 3 ♂ apparemment non cantonnés.

Répartition: dans le Morbihan les observations ne concernent que la sous-espèce type. De nombreuses localités sont signalées du Golfe du Morbihan (Marais de Séné) à l'estuaire de la Laïta (Marais du Loc'h/Guidel) où les colonies ne sont composées que de *M. flava flava* à deux exceptions près : 1 couple composé d'une ♀ *flava* et d'un ♂ *flavissima* nourrit des jeunes sortis du nid le 15 juillet au Loc'h/Guidel; Un 2e couple ayant la même composition à l'étang de Berringue/Plouhinec au

mois de juillet également.

Dans le sud-Finistère, seulement deux localités : Moustierlin avec 1 couple *flavissima* le 7 juillet et les marais de la Baie d'Audierne avec une importante "colonie" de *flavissima*, parmi lesquels ont été observés 2 couples de la race type le 3 juin.

Dans le nord-Finistère, uniquement *M. f. flavissima* dans une dizaine de localités dont une située quelques kilomètres à l'intérieur des terres (St-Renan avec 3 couples) : Archipel de Molène, Lampaul-Ploudalmézeau, Le Curnic etc...

2 nids découverts dans le nord-Finistère : 6 oeufs le 16 mai à Lampaul-Ploudalmézeau et 5 oeufs le 26 mai à St-Claude/Plougastel. Le 21 mai, un nid contient des poussins de 4 ou 5 jours à St-Marc/Brest : les jeunes sont sortis du nid le 28 mai et volent le 4 juin.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*), nicheuse à St Vran (22):
éclosion le 14 mai (4 pull).

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*), le passage maximum se situe du 19 au 28 mars pour les lieux-témoins de St-Renan et de St-Marc/Brest. Par la suite les oiseaux ne sont plus guère observés que sur les lieux de nidification : 1 couple à St-Marc, 1 à St-Renan, 1 au Curnic/Guissény (29N) et 2 sur le territoire de la station biologique de Beauvais/Paimpont (35). Tous les couples recensés en Finistère-nord nourrissaient pendant la période du 15 au 30 mai.

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*), 1 à Belle-Ile le 16 avril et 1 en Baie du Mont-St-Michel le 21 avril.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*), les premiers arrivants dans le Finistère sont notés à partir du 19 mars à Plouguerneau et le passage se poursuit jusqu'à la fin du mois au moins dans ce département. Dans le Morbihan, un très fort passage est noté du 8 au 11 avril (Groix et Belle-Ile), période où l'espèce est notée dans l'intérieur : 1 ind à Beauvais/Paimpont le 9 avril.

Les nicheurs locaux semblent s'installer très tôt dans le nord-Finistère : plusieurs chanteurs à Lampaul-Ploudalmézeau le 28 mars. A cet endroit, plusieurs couples construisent le 25 avril.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*), dernière observation sûre d'un hivernant ! : 1 ♂ le 19 mars à St-Marc/Brest. Au moins deux couples à Ste-Anne d'Auray (56) qui ont élevé chacun deux nichées.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*), nicheur peu abondant dans le Morbihan, sauf peut-être à Belle-Ile où la densité semble plus élevée. En Ille-et-Vilaine, le remembrement semble avoir provoqué une diminution générale du nombre des nicheurs.

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*), très localisé comme nicheur en Morbihan (Presqu'île de Rhuys). Dans ces lieux de nidification, la densité est toutefois bonne, parfois élevée.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*), 7 observations dans la période considérée dont 4 très tardives : 1 à Camors (56) le 5 avril, 1 ou 2 dans le nord-Finistère le 7 avril, 1 ind à Loperhet/Erdeven (56) le 8 avril et 1 à Noyal-Pontivy (56) le 12 avril.

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*), 1 à Groix (56) le 11 avril et 1 à la pointe de Corsen/Plouarzel (29N) le 15 avril.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*), ~~entendu~~ 5 ind le 17 mars à Ploudalmézeau (29N).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*), les seules observations concernant cet oiseau nous viennent du Morbihan de la région de Lorient : au moins 4 chanteurs localisés à l'étang de Lannenec/Ploemeur dans la première décade d'avril; 1 chanteur à Kervran/Gâvres le 6 avril et 1 autre à Lomener/Ploemeur le 7 avril, et de la région de Vannes : chants notés en de nombreux points de la presqu'île de Rhuys et spécialement dans les marais de Suscinio du 16 au 29 mai.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (*Locustella luscinioides*), comme pour l'espèce précédente, c'est de la région lorientaise (56) que provient l'essentiel des observations : 5 chanteurs localisés sans recherches spéciales sur l'étang de Lannenec/Ploemeur en avril (chant dès le 5 avril). 3 chanteurs le 6 avril sur les étangs de Kervran et Kerzine/Gâvres.

Dans le Finistère : 5 chanteurs dans les roselières de St-Vic/Baie d'Audierne le 1 mai et 3 chanteurs dans le Yeun-Elez/Monts d'Arree le 29 juin.

LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella tachtée*), premiers chants notés dans le Morbihan : le 7 avril à Lomener/Ploemeur et le 8 avril à l'île Bailleron/Séné ainsi qu'en différents points de la côte lorientaise.

Par ailleurs, l'espèce est commune dans toute la région de Chaoteulin (diverses prospections dans la dernière décade d'avril).

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*), premières arrivées aux derniers jours de mars dans le nord-Finistère : 6 dont 2 chanteurs le 28 mars à Lampaul-Ploudalmézeau puis 1 chanteur à St-Renan le 31 mars, localité visitée tous les jours précédents sans que l'espèce y ait été rencontrée. Les premiers oiseaux du Morbihan nous sont signalés dans les premiers jours d'avril : 1 entendu à St-Jean/Mendon le 3 avril et de nombreux

chanteurs à Lannec/Ploemeur le 5 avril.

Les effectifs nicheurs normaux semblent atteints dans la 2e quinzaine du mois, tant dans le Finistère (St-Renan, Lampaul-Ploudalmézeau) que dans le Morbihan où l'espèce nous est signalée partout, dans l'intérieur, sur les côtes et même à Belle-Ile.

ROUSSEROLLE EFFARVATE (*Acrocephalus scirpaceus*), l'arrivée de cet oiseau, en tout cas plus tardive que celle de l'espèce précédente, ne semble pas avoir été notée: première observation le 8 mai (dans le nord-Finistère) !

Dans le nord-Finistère d'où proviennent toutes les observations, l'espèce s'est reproduite dans les localités suivantes : étang de Kerhuon (7 ou 8 couples d'un seul côté de l'étang), étang de Kerjean/Le Conquet (1 nid avec 3 oeufs le 25 mai), St-Renan (1 couple le 15 juin), Lampaul-Ploudalmézeau (1 chanteur le 9 mai), marais du Vougot (23 mai), marais de Kerlouan (abondante le 16 mai) et les roselières de l'étang de Goulven (Très abondante, plusieurs dizaines de couples le 8 mai, 20 juin et début-juillet).

HYPOLAIS POLYLOTTE (*Hippolais polyglotta*), premier chant à Vannes le 6 avril. Un oiseau observé près de St-Just (35) le 11 avril semble être de passage puisqu'il n'a pas été revu à cet endroit par la suite.

L'espèce nous est signalée de mai à juillet dans différentes localités de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan : en Ille et Vilaine, 1 couple nicheur à Beauvais/Paimpont le 15 mai, à la limite orientale du Morbihan, 2 couples en mai à St-Jacques-la-Lande au sud de Rennes et 1 ind le 13 juillet dans les polders du Mont-St-Michel. Morbihan : pour la région vannetaise, l'espèce est considérée comme assez répandue par les observateurs. Elle nous est signalée de Vannes même (6 avril) et des environs de Suscinio (1 ind le 17 juin). Plus à l'ouest, 1 ind observé dans d'anciennes salines près de La Trinité-sur-Mer et 2 couples accompagnés de juvéniles sont localisés près de Crac'h (26 juin).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*), premières observations dans la 1e quinzaine d'avril : 1 à Beauvais/Paimpont (35) le 9 avril et 1 à Groix (56) le 13 avril. Par la suite, l'espèce est négligée de la plupart des observateurs. A côté de quelques observations isolées, signalons 9 couples (!) pour deux kilomètres de bordure de rivière à Noyal-Pontivy (56).

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*), comme pour la précédente, nous ne disposons pour cette Fauvette que de notes isolées (7 pour toute la période considérée !). Premiers chants notés au Conquet (29N) le 5 avril et en forêt de Toullfoen/Clohars-Carnoet (29S) le 7 avril. Un nid contenant 3 oeufs le 20 avril à Rennes-Beaulieu (35) (éclosion le 21 avril). L'observation de 5 ind à la pointe des Poulains/Belle-Ile (56) le 16 avril pourrait bien correspondre à un passage à cette époque.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*), très grand espacement des trois premières observations :

1/ 24 mars : chante à l'Ile-aux-Moines/Golfe du Morbihan (56).

2/ 1 avril : un cri près de Châteaulin (29S).

3/ 12 avril : 1 à Groix (56).

Notons qu'à cette époque l'espèce était recherchée presque journellement dans le nord-Finistère. Quoi qu'il en soit, l'oiseau est régulièrement observé à partir du 15 avril : des couples et des chanteurs sont cantonnés un peu partout dès cette date (Mengamm/Brest (29N) le 15 Lannec/Ploemeur (56) le 15, Beauvais/Paimpont le 17 etc...).

A Belle-Ile (56) il semble qu'il y ait eu un passage à cette période : alors que 11 sujets étaient comptés à la pointe des Poulains le 16 avril, il n'en était vu aucun à cet endroit le lendemain 17.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*), 14 observations pour la période considérée :

FINISTERE : Région du Menez Hom (3 obs); Mousterlin (1 obs)

MORBIHAN : région de Lorient (1 obs); Belle-Ile (3 obs); Golfe (2 obs); Landes de Lanvaux (nb couples).

ILLE-ET-VILAINE : région de Paimpont (3 obs).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*), premières observations le 29 mars dans le Finistère (1 chanteur à Languéro/St-Renan) et fin-mars en Ille-et-Vilaine. L'arrivée se poursuit dans les premiers jours d'avril : le 3, 1 entendu au Cranic (56), le 4, chant à Lanester (56) et à Kervégant/Quéven (56), le 5, 1 à Kerjean/Le Conquet (29N) etc...

D'après les lieux témoins suivis dans le nord-Finistère, il semble qu'à cette époque un passage se soit superposé à l'installation des nicheurs locaux. Par exemple : le 6 avril, 4 chanteurs et quelques ind à St-Marc/Brest; le 12 avril, 5 chanteurs et 3 ind puis le 21 avril, 1 seul chanteur au même endroit. De même, 1 chanteur a été observé dans un jardin à Brest le 15 avril alors que l'espèce ne niche certainement pas dans le quartier.

La situation se régularise au cours du mois d'avril et à la 3e décade, il ne subsiste sans doute que les couples nicheurs.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*), dispersées la première quinzaine de mars (cf. Actualités précédentes), les observations deviennent très régulières et abondantes à partir du 24.

Les lieux-témoins du nord-Finistère montrent tous un passage très net entre le 24 mars et le 6 avril environ. A partir du 10 avril, il n'y reste plus guère que les nicheurs locaux :

Languéro : non observé avant le 25/3; 6 chanteurs et 3 ind le 25 et les jours suivants jusqu'au 1 avril; seulement 2 chanteurs le 21 avril (1 ou 2 couples nicheurs en cet endroit.).

St-Renan : 0 le 17/3; 6 chanteurs et 4 ind le 27/3; 7 chanteurs et qq ind les 31/3 et 4/4; seulement 3 chanteurs à partir du 10/4 (2 ou 3 couples nicheurs ultérieurement).

St-Marc : 1 chanteur les 16 et 21/3; 11 chanteurs et qq ind le 6/4; 5 ou 6 chanteurs les 12 et 21/4 (5 ou 6 couples ultérieurement).

A noter le nombre d'oiseaux chantant en migration. En Ile-et-Vilaine, le mauvais temps a perturbé la nidification : les Pouillots véloces ayant commencé leur nid dès la mi-avril les ont abandonnés et des oiseaux ont été notés commençant de nouveaux nids à la fin-mai. Signalons enfin qu'un Pouillot véloce bagué au sortir du nid à Moigné (35) le 11/7/65 a été repris au même endroit le 31/5/68. 

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*), nicheur commun en forêt de Paimpont (35) mais moins abondant que le suivant (15, 16 et 17 mai).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*), le 7 avril il n'est pas encore arrivé en Forêt de Toullfoen/Clohars-Carnoet (29S) où il est nicheur alors qu'en Ile-et-Vilaine les premiers sont là à la mi-avril. Nicheur abondant en certains points de la forêt de Paimpont (35) (Beauvais, Paimpont, Pas-du-Houx...) les 15, 16 et 17 mai.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*), seulement 6 observations (du 27 mars au 23 mai) dans la période considérée, toutes concernant des chanteurs.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*), seulement 4 observations (du 15 au 26 mars). 1 à Ste-Anne d'Auray le 15 mars, 1 à Crac'h (56) le 16 mars, 2 à Languérol (29N) les 17 et 26 mars.

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*), 2 chassent à l'Ile-aux-Moines/Golfe du Morbihan le 30 juin.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*), première observation le 13 avril d'un couple à Groix (56). Les premiers arrivants sont notés fin-avril dans l'Ile-et-Vilaine. Les seules données sur la nidification nous viennent de ces deux départements : 1 ind à Kerbois/Crac'h (56) le 11 mai, revu (?) le 30 mai; 3 captures à Moigné (35) dans les derniers jours de mai; à Noyal-Pontivy (56), 1 ind sans partenaire "occupant" un nid vide le 30 mai, 1 couple à 1 km de là le 31 mai et 1 autre couple dont le nid contient 4 oeufs le 3 juin, à 200 m du premier. Le 26 juin, 1 ind près de Plumergat (56) et le 29 juin, 1 ind près de Locminé (56).

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*), seulement 5 observations. Notons 1 nid le 5 avril dans le bois de Ca-

mors (56) et une famille de juvéniles volants le 20 juin à St-Renan (29N).

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) , 2 couples au moins ont niché dans un bois en bordure de l'Elorn/Plougastel (29N) :

Le 19 mai, un couple est localisé; le 26 mai, 2 familles avec des juvéniles à peine volants au même endroit.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*), les premiers chanteurs se sont manifestés peu avant le 15 mars à la pointe de Corsen (29N).

! Toutes les observations de l'espèce (une vingtaine) sont localisées sur une étroite bande côtière allant de Quiberon (56) à Cléder (29N) en incluant la plupart des îles.

56 Quiberon: quelques observations le 18 avril.

Belle-Ile: les 16 et 17 avril, chante partout et sans arrêt, un des oiseaux les plus communs de l'île.

Plouhinec: le 3 juin, qq ind à Plouhinec.

1 chanteur au minimum au Magouero le 20 juillet.

Riantec: 1 chanteur au Dreff en juillet.

Groix: densité moyenne sur l'île du 8 au 13 avril.

1 chanteur à Locmaria le 15 juillet.

Ploemeur: 1 chanteur à Lomener le 7 avril.

1 chanteur à Courrégant début-juillet.

Guidel: 2 chanteurs au Loc'h le 15 juillet.

29S Moelan: 3 chanteurs à Portzec le 21 juillet.

Fouesnant: 1 chanteur à Moustierlin le 7 juillet.

Loctudy: 1 chanteur à Larvor le 30 avril.

Treguennec: 1 chanteur à Trenvel (où l'oiseau est commun) le 3 juillet.

29N Le Conquet: 1 chanteur à Pors Liogan le 31 mars.

Molène: 1 chanteur à l'île Kemenez le 9 juin.

Plouarzel: 2 couples à la pointe de Corsen.

Ploudalmézeau: 4 ou 5 chanteurs le 16 mai à Lampaul-Ploudalmézeau.

Guissény: 1 chanteur minimum au Curnic le 8 juillet.

Kerlouan: 1 chanteur à la pointe de Pontusval le 8 mai.

Cléder: 2 chanteurs au Theven-Kerbrat le 16 juin.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirulus*), 7 observations dans la période considérée, toutes dans le Morbihan et le Finistère. Notons seulement que le Bruant zizi était plus commun que le Bruant jaune du 8 au 13 avril à l'île de Groix (56).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*), les mouvements printaniers de cet oiseau sont très difficiles à analyser. Le lieu témoin de St-Renan (29N) montre deux maxima semblant significatifs (le premier l'est en tout cas) : le premier localisé autour du 31 mars, le second vers le 14 avril (ce dernier cor-

roboré par un maximum à Languéro). Comme dans le cas du Pouillot véloce, ces lieux-témoins font apparaître une grande fréquence du chant chez les oiseaux de passage.

L'espèce nous est signalée d'un très grand nombre de localités qu'il nous est impossible de citer en totalité. Notons cependant 5 couples pour 1500 m de rivière dans la région de Noyal-Pontivy (56).

1 nid contient 3 pull de 1 ou 2 jours le 29 mai à Cesson (35) et un autre 4 oeufs le 30 mai à Priziac (56).

X BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*), encore 1 ♂ le 28 mars à St-Marc/Brest (29N).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*), les derniers hivernants séjournent jusqu'au 28 mars dans l'anse St-Marc/Brest : encore 25 ind, en majorité des ♀♀, le 19 mars, moins de 15 le 21 mars, les 2 derniers le 28.

Premiers chants notés le 19 mars à Paimpont (35) et le 21 mars à Guilers (29N). 2 nids achevés trouvés le 11 avril à Languéro/St-Renan (29N).

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*), 1 ♂ à Lampaul-Ploudalmézeau le 28 mars.

CHARDONNET (*Carduelis carduelis*), peu de chose sur cette espèce : le premier chant nous est signalé le 26 mars, et dès cette époque l'espèce est cantonnée un peu partout. Une abondance notée dans les dunes de Lampaul-Ploudalmézeau le 10 avril (absent par la suite) pourrait témoigner d'un passage à cette date ?

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*), les nicheurs locaux arrivent sur leurs lieux habituels de reproduction dans la dernière décade de mars : 24 mars à l'Ile-aux-Moines/Golfe (56), 31 mars à St-Renan et Ti-Colo (29N) etc...

La construction de nids est observée le 10 avril à St-Renan et le 21 avril à St-Marc/Brest. Des adultes abecquent le 9 mai à St-Renan. 1 nid contient 4 oeufs au Curnic le 23 mai, 1 autre couvée de 4 oeufs le 10 juin sur Beniget/Archipel de Molène. Des juvéniles dans une bande de 25 linottes le 30 juin à St-Renan. A noter que des bandes de 4 à 90 oiseaux sont notés dans le nord-Finistère pendant toute la période de reproduction, et notamment de façon très régulière dans les dunes de Lampaul-Ploudalmézeau (10 avril-25 mai).

SERIN CINI (*Serinus serinus*), le 24 mars, le chant est entendu à Auray et en deux endroits de Vannes (56). Ce même jour, l'effectif est déjà normal à l'Ile-aux-Moines/Golfe (56).
Liste des localités : 56 Ste Anne: 1 le 26 mars.

Larmor-Plage : 1 chanteur le 8 avril.

Le Perello/Ploemeur: 2 chanteurs le 13 avril
Berder : très nombreux le 20 avril.

29 Pont de Plougastel : 1 le 27 avril.
St-Marc-Brest: 3 couples.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*), seulement deux observations: 30 à
Groix (56) le 11 avril et 15 au Cur-
nic/Guissény le 23 mai.

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), un nid contenant 4 oeufs
est observé dès le 7 avril
à Belle-Ile (56) alors que les couples du nord-Finistère en sont encore
à construire le 12 avril et même jusqu'au 25 avril où deux couples
transportent des matériaux en presqu'île de Crozon. ?

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*), une ponte précoce dans la région bresto-
ise puisqu'un nid contenait déjà 5 pull
le 16 mars alors que la plupart des autres nids du Finistère n'ont vu
leurs oeufs éclore que vers la fin du mois.

L'espèce est florissante dans le Finistère : 9 nouvelles aires
(occupées) découvertes dans la zone côtière en 1968. Dans le Morbihan,
une aire a été découverte à Groix. Une aire également dans les Côtes-
du-Nord.

CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone cornix*), 1 aux Sept-Iles (22) le 15
avril.

ERRATA

~~Un certain nombre d'erreurs se sont glissées dans les trois pre-
miers fascicules d'AR VRAN. Le lecteur en corrigera les plus criantes :~~

~~AR VRAN, TI, fasc.1, p.45 : supprimer "...du Finistère..." à la ligne 8
du chapitre Pipit maritime.~~

~~AR VRAN, TI, fasc.1, p.47 : la phrase "... passage nocturne à Quessant..
.. en nombre assez élevé." du chapitre Rougequeue noir est à attri-
buer au chapitre Rougequeue à front blanc.~~

~~AR VRAN, TI, fasc.2, p.87 : ligne 26, lire "dès la 3e décade..."~~

~~AR VRAN, TI, fasc.2, p.99 : inverser les noms latins du Pigeon biset et
du Pigeon colombine.~~

~~AR VRAN, TI, fasc.3, p.111: lire 153 au lieu de "53".~~