

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 15 NOVEMBRE 1968 AU 15 MARS 1969

par Jean-Pierre ANNEZO, Patrick DORVAL, Jean-Claude DREANO, Yvon GUERMEUR
Christian HAYS, Maurice KERVELLA, Maurice LE DEMEZET et Guy ROLLANDO

Les activités des ornithologues bretons au cours de l'hiver 1968-1969 ont, dans l'ensemble, été axées sur les recensements d'Anatidés. A cette occasion nous avons vu notre couverture géographique s'étendre sensiblement grâce au concours de nouveaux observateurs et surtout de MM. Michel BROSELIN et Francis ROUX qui ont pu survoler le littoral de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique.

Cette année encore nous déplorons l'absence de données sur les Côtes-du-Nord et insistons auprès de nos lecteurs de ce département pour qu'ils nous communiquent leurs observations, si anodines leur paraissent-elles. Des notes en provenance de nos correspondants de Loire-Atlantique nous seraient également très utiles.

Ont participé aux présentes actualités :

ANNEZO J.-P., ANTOINE B., ANTOINE L., BARON A.-N., BASQUIN J., BOZEC R., BRANELLEC D., BRAVE J.-L., BROSELIN M., CANEVET P., CONSTANT P., CORMIER J.-P., DE KERGARIOU E., DORVAL F., DORVAL J.-P., DORVAL M., DORVAL P., GUERMEUR, Y., JONIN M., LEBEURIER E., LE DEMEZET M., LE GARFF B., LE LANNIC J., LE PAPE L., LE PAPE M., LE TOCQUIN A., L'HER M., LOARER L., MAHEO R., MONNAT J.-Y., ONNO R., PETIT P., PILLET J., PRATZ J.-R., PRIEUR D., RECK K.-G., ROLLANDO G., ROUX F., THERY J., THOMAS A., THOMAS H.

De plus, comme pour les précédentes Actualités, nous avons eu recours aux informations parues dans le dernier fascicule d'AILES ET NATURE.

Les prochaines actualités ornithologiques porteront sur la période du 15 mars au 15 juillet 1969. Les observations qui y ont trait devront nous parvenir pour le 15 août au plus tard.

PLONGEONS (*Gavia sp.*), 47 observations concernant 274 ind dont : 4 en baie de Morlaix les 15 et 26 nov., 6 à Quiberon (56) le 24 déc., 95 dont un groupe de 72 en baie de Douarnenez (29S) le 20 janvier, 70 en baie de Douarnenez le 2 mars et 10 en rade de Brest le 8 mars.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*), l'espèce a été déterminée 42 fois au cours de la période considérée (96 ind) en 23 localités du Finistère et 4 du Morbihan. La plus forte bande a été observée le 22 déc. dans l'anse du Fret/rade de Brest : 15 ind. Les oiseaux se déplacent constamment et rapidement dans le nord-Finistère ce qui fait illusion sur leur abondance et leur répartition réelles : en fait, les effectifs globaux ne fluctuent guère pendant la période allant de décembre à mars. Signalons une observation sur eau douce : 1 ind sur l'étang de Kermelo/Lorient (56) le 31 déc.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*), 11 observations concernant 23 ind : 2 ind à la pointe de Kereon (29S) le 5 déc., 5 ind. à Quiberon et 5 ind à la pointe de Conguel/Quiberon (56) le 24 déc., 2 ind dans l'aber Ildut (29N) le 31 déc., 1 ind à St-Michel Plouguerneau (29N) le 1 janv., 1 ind à Trémazan et 2 ind à Treompan/Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 3 janv., 3 ind en baie de Douarnenez (29S) le 19 janv., 1 ind au Bandi/baie de Daoulas (29N) le 2 fév., 1 ind en rade de Brest le 8 mars, 1 ind en baie de Daoulas le 9 mars.

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*), première observation le 30 déc. : 1 ind à l'Aber/Crozon (29S); 1 ind en rade de Brest le 11 janv.; 2 dans l'Aber Benoit et son estuaire le 12 janv.; 6 en baie de Douarnenez le 19 janv.; 2 en rade de Brest le 8 mars; 2 en un point de la rade de Brest et 1 dans la baie du Poullmig en rade également le 9 mars.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*), comme l'an passé, hivernage surtout maritime avec prédominance des baies rades et estuaires.

FINISTERE	72 recensés en mer en décembre et janvier dont :
	baie de Morlaix 10 le 14 janv.
	région des abers 13 en déc.
	rade de Brest 26 le 11 janv.
	baie de Douarnenez 6 le 30 déc.
	rivière de Pont-l'Abbé 4 fin-déc.
	baie de La Forêt/Concarneau 7 le 28 déc.

MORBIHAN	93 recensés en mer en décembre et janvier dont :
	Erdeven 10 le 18 déc.
	Quiberon-Houat-Belle-Ile 24 fin-déc.
	St-Philibert 5 le 16 déc.
	rivière d'Auray 4 le 26 déc.
	Séné 6 déc.-janv.
	golfe 20 environ
	Suscínio 20 déc.-janv.

notons en outre 8 ind sur l'étang du Cranic/Brec'h le 25 déc.

ILLE-ET-VILAINE	10 oiseaux sur étang dont :
	étang de Sérigné/Liffré 6 le 11 janv.
	étang du Boulet/Feins 1 le 11 janv.

étang du Rouvre/Combours
étang de Baulon

1 le 27 déc.
2 le 18 janv.

Les éventuels mouvements sont encore plus difficiles à discerner cet hiver que l'an passé, les variations portant sur des effectifs moindres. Les véritables effectifs hivernants semblent atteints fin-novembre : par exemple 2 ind à partir du 31 nov. à l'île Tudy (29S) contre 7 le 18 nov. et 6 le 25 nov. Ils restent stables jusqu'à la fin du mois de janvier au moins, après quoi les observations sont trop dispersées pour que l'on puisse en tirer la moindre conclusion. Notons toutefois 1 ind à St-Renan (29N) les 2 et 13 fév., première observation de l'espèce en ce lieu.

Des Grèbes huppés en plumage nuptial sont observés dès le 16 fév. : 1 ind en plumage de noces incomplet en baie de Daoulas (29N); 3 ind en plumage nuptial incomplet le 20 fév. à St-Marc/Brest; 4 ind en plumage nuptial le 2 mars au Cranic/Brec'h (56); 1 couple parade sur l'étang du Boulet/Feins (35) le 8 mars.

GREBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*), 1 ind le 19 déc. à Ploumoguier (29N).

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*), 13 observations localisées au Finistère et aux Côtes-du-Nord, coïncidant pour la plupart avec les dates des recensements d'Anatidés. 2 à Port-Blanc/Penvénan (22) et 3 à Porscaff/Plougrescant (22) le 8 déc., 6 en baie de Douarnenez le 26 déc., 3 à St-Michel/Plouguerneau (29N) et 2 au Vougo/Guissény (29N) le 1 janv., 1 à Treompan/Lampaul-Ploudalmézeau (29N) les 3 et 9 janv., 2 seulement en rade de Brest le 12 janv., 3 pour toute la baie de Douarnenez le 19 janv., 9 à l'Aber/Crozon le 1 mars, 17 en deux points de la baie de Daoulas/rade de Brest le 8 mars et une vingtaine en baie du Poulmig/rade de Brest le 9 mars (contre 2 seulement le 12 janv. : passage ?).

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*), les effectifs de cette espèce ont été particulièrement bas au cours de l'hiver 1968-1969 : la rade de Brest qui constitue toujours son principal lieu d'hivernage en Bretagne n'en recelait que 79 le 12 janv. (contre 295 à la même époque l'année précédente et 466 en décembre 1967 !). Notons en outre : 2 en baie de Penzé/Carantec (29N) le 18 déc., 1 à Kerhornou/Ploumoguier (29N) le 19 déc., 1 à Beg Meil/Fouesnant (29S) le 26 déc., 1 en baie de Douarnenez (29S) le 19 janv., 19 entrant dans le golfe du Morbihan par le goulet de Kerpenhir en une demie-heure le 19 janv., 1 aux Pierres-Plates/Locmariaquer (56) le 20 janv., 2 en baie de St-Philibert (56) le 20 janv.


GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*), effectifs hivernants calculés pour décembre et janvier :

FINISTERE

151 dont :	
aber Benoit	8
étang de Kerjean/Le Conquet	10
étang de Kerhuon	10-15

	étang du Card/Plougastel	25-30
	étang de Kergwenn/Plovan (29S)	10
	rivière de Pont-l'Abbé	15
	Ile Tudy	10
	baie de Kerogan/Quimper	10
MORBIHAN	43 dont :	
	étang de Kermelo/Lorient	18
	rivière d'Etel	5
	étang du Duc/Vannes	12
COTES-DU-NORD	étang des Salles/Perret	8
	Loudéac	6

De très nombreuses observations, mais trop dispersées pour que l'on puisse dégager un schéma général de l'évolution des effectifs en Bretagne (138 données pour 53 localités). Le graphique suivant illustre cependant les variations enregistrées sur les deux étangs les mieux suivis du Léon : Kerjean/Le Conquet (15 données) et Kerhuon (13 données).



Au maximum de décembre dans le Léon correspondent les forts maxima de 40 ind le 8 et 50 ind le 30 déc. en rivière de Pont-l'Abbé (29S) (7 données).

Au maximum de février dans le Léon correspond le maximum de l'hiver sur l'étang de Kergwenn/Plovan (29S) (7 données) avec 18 ind les 15 et 16 fév. contre 4 le 31 déc. puis 12 le 23 fév.

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*), toutes les observations concernant des passages au large des côtes du Léon :

17 nov. Goulven	: 10 + 4 ind en 10' vers le sud-ouest
21 nov. Porspoder	: bandes en vol vers le sud-ouest
23 nov. Lampaul-Ploudalmézeau	: 1200 à 1'heure en bandes de qq à 50 ind pendant toute la matinée.
23 déc. Landunvez	: 15 ind en 10' vers le sud

09 fév. Lampaul-Ploudalmézeau : 20 vers le nord et quelques-uns vers le sud-ouest.

FOU DE BASSAN (*Sula bassana*), relevons : le 21 nov., fort passage vers le sud-ouest pendant toute la matinée à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) (environ 200 Fous/heure). Encore quelques passages à cet endroit en décembre : 20 ind en 10' le 23, dont 1 imm. premier hiver. Observations de Fous stationnaires ou pêchant : 12 à Quiberon (56) le 26 déc., 55 à Locudy (29S) le 28 déc. Nouveau passage à Lampaul-Ploudalmézeau le 16 janvier : nombreux adultes en direction du sud-ouest. Relevons aussi des " périodes creuses " : aucune observation dans la première quinzaine de décembre ni dans la deuxième quinzaine de janvier.

Comme chaque hiver, les adultes constituent la quasi-totalité des oiseaux qui passent ou stationnent au large des côtes du Finistère : en tout, 2 observations d'immatures (1 première année le 23 déc. au large de Lampaul-Ploudalmézeau; 1 deuxième année le 14 fév. au large d'Ouessant (29N)).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*), hiverne comme tous les ans sur les côtes du Finistère et du Morbihan, mais la zone d'hivernage par excellence demeure le golfe du Morbihan et ses abords immédiats : le 19 janv., 200 ind sont comptés à Locmariaquer alors qu'ils entrent dans le golfe au lever du jour. En effet, leur dortoir se trouve être l'ilot de Meaban et, chaque matin, une partie des effectifs rentre dans le golfe tandis qu'une minorité se répand sur le littoral allant de Lorient à la Vilaine. Ce phénomène de dortoir collectif n'a pas encore été observé dans le Finistère où les Grands Cormorans sont très dispersés aussi bien en mer ouverte qu'en estuaires et baies.

Comme l'année dernière, les étangs de Kerhuon (29N) et de Kerizan (56) ont été régulièrement fréquentés. A Kerhuon, 10 à 15 oiseaux du 15 nov. au 7 déc., 5 à 10 du 13 déc. au 14 mars. A Kerizan, 3 le 19 nov. et le 16 janv. L'étang de Trenvel/Treogat (29S) n'est peuplé que pendant le mois de novembre : 20 le 23 nov. et 30 le 25 nov.

Il convient de noter les observations de la forme *sinensis* qui constitue certainement une part non négligeable des hivernants du Finistère. Ces observations se situent toutes en février-mars pour la raison très simple que ce n'est qu'à cette époque que les deux formes deviennent discernables :

Balaneg/Molène (29N), 2/3 de *sinensis* le 14 fév. Port de commerce de Brest, 11 *sinensis* sur 15 ind le 24 fév. et 25 *sinensis* pour 1 seul *carbo* du 10 au 15 mars (toute la rade explorée). Ar Gern/Crozon (29S), 1 *sinensis* sur 3 ind. Etang de Kerhuon, 1 *sinensis* le 5 puis le 13 mars.

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*), dès le mois de janvier, des adultes sont installés sur leurs lieux de reproduction : le 1 janv., 21 ind à la réserve Michel-Hervé JULIEN dont 2 commençant à construire; le 22 janv., plusieurs adultes installés à Ar Gern/Crozon (29S).

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*), parmi les 67 observations qui nous sont parvenues de 36 localités, les seules utilisables sont celles du Finistère. Effectifs hivernants (décembre et janvier) calculés pour le Finistère : 152 ind dont : 34 en baie de Morlaix, 13 de Plouescat à Goulven, 4 au Vougo/Guissény, 10 dans la région des Abers, 1 sur l'étang de Kerjean/Le Conquet, 15 sur l'Elorn, 5 sur l'Aulne, 40 en rivière de Pont-l'Abbé, 8 en baie de Kerogan/Quimper, 2 à Port-Manech/Nevez.

Ces chiffres font ressortir la prédominance des estuaires et rivières "à vasières" (100 ind) sur les côtes basses rocheuses ou sablonneuses (50 ind) et les étangs (1 ind) pour l'hivernage du Héron cendré.

L'absence de données suivies sur des secteurs-témoins rend difficile l'interprétation des variations d'effectifs. Nous remarquerons tout au plus une augmentation en différents points du Finistère entre le 22 déc. et le 5 janv. : en rivière de Pont-l'Abbé (8 données) 12 ind le 14 déc., 23 le 22 déc., 40 le 26 déc., 12 le 26 janv. ; sur l'Elorn (5 données) 4 ind le 7 déc., 15 le 5 janv., 3 le 21 janv. ; à Goulven, 1 le 17 nov., 10 le 1 janv., 1 le 16 janv. ; à Lampaul-Ploudalmézeau, 3 ind le 21 nov., 7 le 3 janv. etc...

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*), l'oiseau observé à partir du 12 nov. en rivière de Pont-l'Abbé y séjourne jusqu'au 1 déc.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*), les trois ind observés en rivière de Pont-l'Abbé depuis le 20 oct. sont revus le 16 nov. Il en demeure 2 le 18 nov. puis 1 le 25 nov., dernière observation.

CYGNE SP. "A BEC JAUNE" (*Cygnus sp.*), 4 observations pour 8 ind : 1 dans le port de Carantec (29N) le 1 déc., 3 au pont de la Corde/Henvic (29N) le 20 déc., 3 à l'île Chevalier/Pont-l'Abbé (29S) le 29 déc., 1 ad. au lac de Grandlieu (44) le 14 janv.

CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*), 16 ind pour 8 localités dont 4 où des Cygnes ont séjourné quelque temps : 1 imm. à Kerjean/Le Conquet (29N) du 17 nov. au 19 déc. ; 1 ind en baie de Guissény (29N) les 24 nov. et 26 déc. ; 3 à l'étang de Lannenc/Ploemeur (56) le 31 nov. ; 3 en baie de Sieg/Sibiril (29N) le 8 déc. ; 1 sur l'étang de Priziac (56) du 30 déc. au 5 mars ; 3 ad à St-Renan (29N) du 31 déc. au 13 fév. ; 1 ad. à Goulven (29N) le 1 janv. ; 3 à Trenvel/Treogat (29S) le 2 janv.

CYGNE DE BEWICK (*Cygnus bewickii*), 3 à Trenvel/Treogat (29S) le 30 déc. et quelques-uns en baie du Mont St-Michel (35) le 10 janv. ; 3 les 1 et 2 mars sur l'étang du Cranic/Brec'h (56).

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*), de 37 ind le 19 déc., les effectifs de la

baie du Mont St-Michel (35) passent à 850 le 10 janv. 45 ind dans l'estuaire de la Loire (44) le 18 janv. Le 19 fév., 137 ind tournoient au-dessus de Bain (35) et repartent vers le nord après une brève tentative pour se poser.

OIE CENDREE (*Anser anser*), 6 ind dans l'estuaire de la Loire (44) le 18 déc. et 2 à l'étang du Pas-du-Houx/Paimpont (35) le 12 janv.

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*), les 2 ind observés à Trenvel/Treogat (29S) à partir du 5 nov. sont vus jusqu'au 23 nov., date à laquelle 1 ind est tué par un chasseur. 6 en baie du Mont St-Michel (35) le 10 janv.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*), résultats des recensements :


		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	baie de Morlaix	6	20
	Goulven	55	70
	Ste-Marguerite/Landeda	10	?
	entrée de l'Aber Benoit	?	13
	Beg Meil/Fouesnant	5	?
	Trevignon/Tregunc	1	?
	<u>Total Finistère</u>	<u>77</u>	<u>103</u>
MORBIHAN	baie de Quiberon	40	
	Locmariaquer		18
	golfe	3050	2000
	Penvins	100	
	estuaire de la Vilaine	30	130
	<u>Total Morbihan</u>	<u>3220</u>	<u>2148</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	presqu'île de Guérande	410	575
	estuaire de la Loire		1
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>410</u>	<u>576</u>
ILLE-ET-VILAINE	baie du Mont St-Michel	<u>128</u>	<u>250</u>
	TOTAL BRETAGNE	3835	3077


Donc diminution sensible entre les deux recensements dans le golfe du Morbihan alors que tous les autres secteurs voient leurs effectifs augmenter (sans toutefois compenser la diminution des effectifs du golfe).

Les hivernants continuent d'arriver en fin-novembre : à Goulven, 17 le 11 nov., 28 le 17 nov., 58 le 30 nov. (pas de variations en décembre).

Nouvelle arrivée notée à Goulven vers le 1 janv. où les effectifs passent à 76 ind. Cette arrivée se traduit par une augmentation en baie du Mont St-Michel (35), en rivièrre de Morlaix, cependant que le golfe du Morbihan perd un millier d'hivernants entre les deux recensements.

Le 12 fév., les 2000 hivernants du golfe sont encore notés, mais nous





Cygnes de Bewick sur l'étang de Curric en Guisény (29N)
en janvier 1968 Photo Max JONIN.

manquons de données utilisables pour la période du 15 fév. au 15 mars.

De forts passages sont notés à Goulven le 16 fév. (175 ind contre 75 hivernants) et le 26 fév. (120 ind) alors que les hivernants sont encore là le 9 mars (79 ind).

Notons 5 ind de la sous-espèce à ventre pâle (*Branta bernicla hrota*) ←
parmi les 175 oiseaux du 16 fév. à Goulven (29N).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*), résultats des recensements :


		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	estuaire de la Penzé/Carantec	3	5
	Goulven	8	
	St-Renan	14	
	Elorn	35	20
	Aulne		20
	baie de Douarnenez	4	
	rivière de Pont-l'Abbé	45-50	42
	<u>Total Finistère</u>	<u>109-114</u>	<u>87</u>
MORBIHAN	golfe	48	8
	rade de Peneferf + estuaire Vilaine	120	200
	<u>Total Morbihan</u>	<u>168</u>	<u>208</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	presqu'île de Guérande	45	50
	estuaire de la Loire	280	400
	lac de Grandlieu	6	
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>331</u>	<u>450</u>
ILLE-ET-VILAINE	baie du Mont-St-Michel	<u>570</u>	<u>350</u>
COTES-DU-NORD	Loudéac		<u>1</u>
	TOTAL BRETAGNE	1178	1096

Compte tenu de l'imprécision imputable aux recensements, l'effectif est resté stable entre décembre et janvier.

En fin novembre, arrivée (d'abord lente) des hivernants. Il faut attendre le 28 nov. pour que les effectifs de la rivière de Pont-l'Abbé passent à 4 ind (contre 1 depuis le 9 nov.). A cette époque, des Tadorne sont notés à Porspoder (29N) (4 le 16 nov.), Trenvel/Treogat (29S) (1 le 19, 2 le 23 nov.) ainsi qu'à Goulven à partir du 17 nov., sur l'Elorn à partir du 21 nov. (43 ind dont il ne reste plus que 23 le 25 nov.), en baie de Morlaix à partir du 26 déc. Ces passages se poursuivent en décembre et les hivernants finissent d'arriver (14 aux étangs de St-Renan le 22 déc.).

Le maximum est atteint à fin-décembre en rivière de Pont-l'Abbé (45 environ), le 30 déc. sur l'Elorn et se poursuit jusqu'à la fin du mois de janvier.

Le départ des hivernants commence dès le début-février en rivière de Pont-l'Abbé (30 le 9 fév. contre 42 le 26 janv., puis 15 le 26 fév. et 18 le 9 mars). Les lieux de reproduction se peuplent : Elorn, aber-Be-noit dès le 6 fév. (2 ind; puis 10 le 28 fév.). 1 ind séjourne les 25 et 26 fév. à St-Renan.



CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*), résultat des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	étang de Kerjean/Le Conquet	10	
	St-Renan	140	65
	Kerhuon	82	
	rade de Brest		42
	Yeun Elez/Brennilis	200	150
	<u>Total Finistère</u>	<u>450</u>	<u>274</u>
MORBIHAN	étang de Pont-Callec/Kernascléden	20	40
	golfe	500	250
	Penerf et estuaire de la Vilaine	205	1100
	<u>Total Morbihan</u>	<u>732</u>	<u>1421</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	presqu'île de Guérande	90	90
	estuaire de la Loire	270	1500
	lac de Grandlieu	3200	1700
	réservoir de Vioreau	40	
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>3600</u>	<u>3420</u>
ILLE-ET-VILAINE	baie du Mont-St-Michel	2800	6500
	étangs de la région de Rennes (N.E.)	176	105
	étangs de la région de Rennes (S.O.)	172	274
	étang de la forêt de Paimpont	585	310
	<u>Total Ile-et-Vilaine</u>	<u>3733</u>	<u>7189</u>
COTES-DU-NORD	étang du Coroncq/Glommel	15	30
	étang des Salles/Perret	4	100
	<u>Total Côtes-du-Nord</u>	<u>19</u>	<u>132</u>
	TOTAL BRETAGNE	8534	12446

Il ressort de ces chiffres que seuls deux départements (Ile-et-Vilaine et Loire-Atlantique) recèlent des effectifs importants de Colverts hivernants, les départements les plus défavorisés à cet égard étant le Finistère et les Côtes-du-Nord.

La forte augmentation globale des effectifs entre décembre et janvier surtout ressentie en Ile-et-Vilaine (baie du Mont St-Michel), dans le Morbihan (estuaire de la Vilaine) et à l'étang des Salles dans les Côtes-du-Nord va à l'encontre des mouvements décelés sur les deux étangs les mieux suivis du Léon, à savoir St-Renan et Kerhuon dont les schémas se superposent bien :

Après avoir oscillé entre 30 et 40 ind jusqu'à la troisième décade de novembre, les effectifs de St-Renan montent à 85-90 ind le 15 déc., 100 le 21 déc., et 140 le 22 déc. (maximum de 82 à Kerhuon le même jour) pour redescendre à 90 le 26 et osciller à nouveau entre 40 et 65 pendant tout le mois de janvier. Les effectifs continuent de décroître un peu partout en février (15 ind le 20 à St-Renan, 3 ind le 16 à Kerhuon) pour remonter à nouveau à la fin du mois (en relation avec une petite vague de froid ?) : 55 à St-Renan le 26 fév., 25 à Kerhuon le 28 fév. et 49 le 4 mars, 1500 à la même époque dans le golfe du Morbihan (contre 250 en janv.).





Schéma d'évolution des effectifs de Colverts sur deux étangs du Léon

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*), résultats des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	Le Vougo/Guissény		110
	St-Renan	120	135
	Yeun-Elez/Brennilis	360	
	rade de Brest	231	507/
	pays bigouden (29S)	280	
	<u>Total Finistère</u>	<u>1021</u>	<u>769</u>
MORBIHAN	étang de Pont-Callec/Kernascleden	30	
	étang de St-Jean/Mendon		400
	étang de Kerizan/Crac'h	500	300
	golfe	850	300
	Penerf & estuaire de la Vilaine	3500	
	étang du Rocher/St-Dolay		50
	<u>Total Morbihan</u>	<u>4887</u>	<u>1090</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	estuaire de la Loire	1500	2000
	lac de Grandlieu	360	1900
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>1878</u>	<u>3940</u>
ILLE-ET-VILAINE	étang de la Musse/Baulon	60	30
	étang du Pré/Paimpont	30	80
	baie du Mont St-Michel	150	250
	<u>Total Ile-et-Vilaine</u>	<u>257</u>	<u>397</u>
COTES-DU-NORD	étang du Fourneau	15	

étang des Salles/Perret	15	100
étang du Coroncq/Glomel		42
<u>Total Côtes-du-Nord</u>	<u>30</u>	<u>144</u>
TOTAL BRETAGNE	8073	6340


La grande instabilité des effectifs de cette espèce interdit toute interprétation des éventuels mouvements. Voir ci-dessous l'évolution des effectifs à St-Renan où pourtant les causes de variations sont réduites du fait de l'interdiction de la chasse.



CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*), 11 observations dont 10 entre le 16 déc. et le 14 janvier (6 localités). 75 ind au Lac de Grandlieu (44) et 8 au réservoir de Vioreau (44) le 16 déc.; 1 ind au Yeun Elez/Brennilis (29) le 21 déc.; 1 ♂ et 2 ♀♀ à St-Renan le 22 déc., mais seulement 2 ♀♀ à cet endroit le 27 déc.; 1 ♂ et 2 ♀♀ sur l'étang de Lannec/Ploemeur (56) le 31 déc.; 3 sur l'étang de Trenvel/Treogat (29S) le 2 janv.; 3 sur l'étang du Coroncq/Glomel (22) le 3 janv.; 2 dans le Yeun Elez le 4 janv. L'effectif de Grandlieu est tombé à 2 oiseaux le 14 janv. Encore 1 ♂ à St-Renan le 20 fév.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*), résultat des recensements

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	baie de Morlaix	270-300	292
	baie de Goulven	60	100
	rade de Brest		461
	estuaire de la r. de Pont-l'Abé	150	500
	<u>Total Finistère</u>	<u>510-550</u>	<u>1413</u>



MORBIHAN	estuaire du Blavet	100	100
	Gâvres		200
	Erdeven	500	500
	Etang de St-Jean/Mendon	1500	5000
	baie de Quiberon	500	1000
	golfe du Morbihan	15000	7350
	étang de Kerizan		166
	Penerf et estuaire de la Vilaine	4000	200
	<u>Total Morbihan</u>	<u>21600</u>	<u>14516</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	étang d'Aumée		30
	réservoir du Vioreau		1850
	lac de Grandlieu	600	
	estuaire de la Loire	420	500
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>1026</u>	<u>2380</u>
ILLE-ET-VILAINE	baie du Mont St-Michel	550	200
	estuaire de la Rance		40
	<u>Total Ille-et-Vilaine</u>	<u>550</u>	<u>265</u>
COTES-DU-NORD		<u>8</u>	<u>7</u>
TOTAL BRETAGNE		23694	18581

A la mi-novembre, les lieux bien suivis ont fait le plein de leurs hivernants : 500 à Erdeven (56) le 21 nov. (effectif hivernant de décembre et janvier), 150 à l'Ile Tudy (29S) le 19 nov. (effectif de décembre), 200 en baie de Morlaix (29N) le 22 nov.

La carte ci-contre met en évidence la répartition des hivernants en Bretagne, c'est à dire la prédominance de la côte sud, du pays bigouden à l'estuaire de la Loire. Notons qu'en décembre la rade de Brest ne contenait pas de Siffleurs ou très peu.

De petits passages ont été décelés à partir du 14-15 déc. dans le Nord-Finistère, avec en particulier 15-20 ind à St-Renan le 15, 3 à St-Marc/Brest les 22 et 23.

Début-janvier, une arrivée se produit, au moins dans le Finistère : les effectifs de Goulven (29N) passent de 60 à 110 le 2 janv.; 30 ind stationnent sur l'étang du Coroncq/Glommel (22) le 3 janv. (5 le 5); fait remarquable, 1850 oiseaux sont observés le 14 janv. sur le réservoir du Vioreau (44) alors que ce plan d'eau n'en abritait que 10 habituellement; les effectifs de l'Ile Tudy passent de 150 à 500 le 16 janv. et ceux de l'étang de St-Jean/Mendon (56) atteignent 5000 ind le 16.

Néanmoins, les effectifs bretons passent de 24000 en décembre à 18600 en janvier par suite de la forte diminution enregistrée dans le Morbihan (de 22000 à 14000 en gros). Cette baisse n'affecte guère le Finistère ni la Loire-Atlantique dont les petits effectifs augmentent à cette époque malgré l'abandon (?) du lac de Grandlieu (44).

Fin-janvier-début-février, les effectifs décroissent (40 à Goulven (29N) le 2 fév. contre 100-110 en janvier), 100 à Erdeven (56) le 12 fév. (contre 500 hivernants), 7 à Gâvres (56) le 12 fév. etc... Cependant, encore 250 à l'Ile Tudy le 25 fév. Nous manquons de données suivies en mars : 50 ind à Erdeven le 15 mars et 3 en rade de Brest le même jour.

CANARD PILET (*Anas acuta*), résultat des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	Le Curnic/Guisseny	2	
	St-Renan	4	
	rade de Brest		38
	rivière de Pont l'Abbé	4	30
	<u>Total Finistère</u>	<u>10</u>	<u>68</u>
MORBIHAN	étang de St-Jean/Mendon	3	
	golfe	600	600
	Penerf & estuaire de la Vilaine	2400	3500-4000
	<u>Total Morbihan</u>	<u>3003</u>	<u>4100-4600</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	estuaire de la Loire	360	2500
	lac de Grandlieu	9	420
	réservoir du Vioreau	2	
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>371</u>	<u>2920</u>
	TOTAL BRETAGNE	3384	7088-7588

L'hivernage a été régulier en rivière de Pont-l'Abbé (29S) où de 3 ou 4 oiseaux le 27 nov. les effectifs passent à 33 ind le 27 déc. et 30 le 2 janv. pour retomber par la suite; dernière observation en ce point le 24 fév. (5 ind). Notons également qu'après le maximum de 3500-4000 dans l'estuaire de la Vilaine (56) le 9 janvier il ne reste que 700 Pilets le 18 janv.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*), premier retour noté le 9 mars : 4 oiseaux dont 3 œ dans les marais de Meneham/Kerlouan (29N).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*), résultats du recensement :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	St-Renan	12	10
	Trenvel/Treogat	100	
	Kerity/Penmarc'h	50	
	<u>Total Finistère</u>	<u>164</u>	<u>11</u>
MORBIHAN	étang de Kerizan/Crac'h	5	
	golfe	15	
	Penerf & estuaire de la Vilaine	20	
	<u>Total Morbihan</u>	<u>41</u>	
LOIRE ATLANTIQUE	étang d'Aumée	40	10
	estuaire de la Loire	50	400
	lac de Grandlieu	600	810
	réservoir du Vioreau	10	
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>707</u>	<u>1220</u>
ILLE-ET-VILAINE	étang de la Musse/Baulon	4	10
COTES-DU-NORD	étang des Salles/Perret	3	
	TOTAL BRETAGNE	919	1241

Comme dans le cas du Colvert, forte prédominance de l'hivernage en Loire-Atlantique et opposition entre l'augmentation de janvier dans ce département et la régression enregistrée dans le le Finistère et le Morbihan à la même époque.


Deux plans d'eau seulement ont été bien suivis : St-Renan (29N) et Trenvel/Treogat (29S). Tous deux montrent une forte arrivée de Souchets du 14 au 19 déc. A Trenvel, les effectifs qui ont varié entre 6 et 16 ind depuis le 15 nov. montent brutalement à 75 ind le 14 déc. et à 100 le 19 pour retomber à 30 le 22 et 20 le 27 déc. Même évolution à St-Renan, mais portant sur des chiffres moindres : 0 le 15 nov. et jusqu'au 14 déc. où apparaissent 4 ind; 12 ind le 19 déc. (maximum de l'hiver) puis 6 seulement les 22 et 24 déc. Au même moment, l'effectif de Kerity/Penmarc'h passe de 15 oiseaux le 9 déc. à 50 le 14 déc. A noter les fortes proportions de ♂ enregistrées au cours de ce passage : 45 ♂ pour 75 ind (60%) le 14 déc. et 65 pour 100 ind (65%) le 19 déc. à Trenvel; 10 sur 15 ind (66%) le 9 déc. et 35 sur 50 ind (70%) le 14 déc. à Kerity.

Par la suite, seul St-Renan est régulièrement suivi : les effectifs y oscillent entre 3 et 10 ind jusqu'au 11 mars sans qu'il soit possible de déceler le moindre mouvement.

Signalons pour terminer l'observation de 2 couples à St-Colombier (56) le 8 mars et d'1 couple en parade au même endroit le lendemain.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*), résultats des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	Kerjean/Le Conquet		7
	St-Renan	30	7-12
	Kerhuon	60-70	100
	Yeun Elez/Brennilis	11	80
	Kergwenn/Plovan	35	
	Trenvel/Treogat	70	
	<u>Total Finistère</u>	<u>206-216</u>	<u>194-199</u>
MORBIHAN	étang du Fourneau/Ste Brigitte	45	
	étang de Priziac	16	18
	étang du Moulin-Bégasse/Meslan	4	2
	étang du Cranic/Brec'h	5	700
	étang de Kerizan/Crac'h	20	
	golfe	28	
	Penerf et estuaire de la Vilaine	3500	450
	<u>Total Morbihan</u>	<u>3620</u>	<u>1170</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	estuaire de la Loire	100	
	lac de Grandlieu	2500	2650
	réservoir du Vioreau	30	111
	étang de la Provostière	34	15
	étang de la Poitevinière		7
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>2664</u>	<u>2783</u>
COTES-DU-NORD	étang des Salles	<u>120</u>	<u>220</u>



ILLE-ET-VILAINE	étang de Baulon	30	40
	étang de la Musse/Baulon	15	
	étang de Belouze/Baulon		6
	étang du Pas-du-Houx/Paimpont	130	67
	étang du Pont-Dom-Jean/Paimpont	150	
	étang du Boulet/Feins		23
	baie du Mont St-Michel		15
	<u>Total Ille-et-Vilaine</u>	<u>325</u>	<u>151</u>
	TOTAL BRETAGNE	6935	4518

Les chiffres ci-dessus montrent que si les Milouins préfèrent s'installer sur les lacs et les étangs, ils n'en dédaignent pas pour autant les estuaires. Les contingents les plus élevés se situent en Loire-Atlantique et jusqu'à la limite sud du Morbihan.


Alors que, comme d'habitude, l'étang de Kerhuon (29N) a des effectifs remarquablement stables (50-60) du 11 nov. au 18 janv., tous les autres plans d'eau voient leurs effectifs fluctuer avec plus ou moins de concordance :

+ passages notés à St-Renan (29N) à mi-novembre, à Trenvel/Treogat (29S) du 15 au 23 nov. (100 ind, puis 31 le 25 nov.) et arrivée à cette époque à Kerjean/Le Conquet (29N) : 3 ind à partir du 23 nov. Gros chiffre à l'étang des Salles/Perret (22) le 24 nov. : 261 ind.

++ après forte diminution à Trenvel et St-Renan en fin-novembre-début-décembre (20 à Trenvel le 1 déc.), on note un passage en plusieurs endroits à partir du 10 déc. : à Priziac (56), de 3 ind, les Milouins passent à 16 le 11 déc. pour retomber à 10 le lendemain et jusqu'à la fin du mois. A St-Renan, de 5 ind le 12 déc., on passe à 30 le 14 pour retomber à 7 le 15 puis à 14 le 26 et 6 le 31 déc. A Trenvel, 100 ind sont observés le 22 déc. mais il n'en demeure que 50 à la fin du mois (27 et 30 déc.) etc... Cette période est d'ailleurs celle du recensement de décembre où l'on enregistre un maximum global sans doute faussé par le fait que tous les Milouins recensés ne sont pas à proprement parler des hivernants. Ajoutons qu'à cette époque de petits groupes sont notés en des lieux d'où ils étaient absents pendant le reste de l'hiver.

+++ en fin-décembre-début-janvier, on constate une arrivée dans le Yeun Elez (80 le 5 janv.) et à Kerjean/Le Conquet où le maximum (7ind) est noté le 16 janv. Notons le peuplement soudain du Cranic (56) qui recèle 700 ind le 16 janv. (les précédentes visites avaient été négatives, ou presque), alors que quelques grands stationnements fondent : des 3500 de décembre dans l'estuaire de la Vilaine, il ne reste que 450 ind le 18 janv.; l'estuaire de la Loire est déserté, Trenvel est abandonné, les effectifs des étangs d'Ille-et-Vilaine diminuent de moitié. Seuls les étangs des Salles (22) et de Kerhuon voient leurs effectifs augmenter (100 à Kerhuon le 25).

**** par la suite, chute progressive à Kerhuon avec quelques paliers: le 14 mars, il en reste 7. Mais depuis le 9 fév. déjà à Trenvel on observe une remontée qui se traduit également à Priziac par un maximum de 18 le 12 fév., à St-Renan par 7-10 oiseaux et à Trenvel par un maximum de 15 à 20 du 23 fév. au 2 mars. Très peu après le 10 mars (Trenvel, Kerhuon).



FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*), résultats des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	St Renan		10
	Yeun Elez		15
	Loc'h Kergaran/Plovan	30	
	Trenvel	168	
	Ile Tudy	150	
	<u>Total Finistère</u>	<u>405</u>	<u>25</u>
MORBIHAN	étang du Cranic/Brec'h		300
	étang de St-Jean/Mendon		20
	<u>Total Morbihan</u>	<u>40</u>	<u>333</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	lac de Grandlieu	380	160
	<u>Total Loire-Atlantique</u>	<u>396</u>	<u>160</u>
ILLE-ET-VILAINE	baie du Mont St-Michel		20
	<u>Total Ile-et-Vilaine</u>		<u>45</u>
COTES-DU-NORD	étang des Salles/Perret	30	40
	<u>Total Côtes-du-Nord</u>	<u>35</u>	<u>47</u>
	TOTAL BRETAGNE	876	613

En décembre, l'estimation des effectifs est bonne, les secteurs essentiels ayant été visités (pays bigouden (29S) avec 350 ind et lac de Grandlieu (44) avec 380 ind). Notons les chiffres relativement forts du Finistère, ceux anormalement bas du Morbihan.

En janvier, le pays bigouden n'a pas été recensé et Grandlieu a perdu la moitié de ses effectifs. Quant à l'augmentation dans le Morbihan, elle fausse le schéma car les rassemblements observés au Cranic ne sont que de passage.

+ A partir du 15 nov., arrivées et passages importants notés à : Trenvel/Treogat (29S) (36 le 15 nov., 50 le 17, 150 le 23, 37 le 25...) Priziac (56) (15 le 15 nov. contre 5 le 8 nov.), St-Renan (29N) (7 le 21 nov. contre 2 auparavant), l'Ile Tudy (29S) (50 à partir du 15 nov.). Passage à Goulven (29N) fin-novembre-début-décembre.

++ maximum dans la deuxième quinzaine de décembre : 14 et 15 déc. à St-Renan, 20 déc. à début-janvier au Conquet (29N), 11 et 30 déc. à Priziac, 16 déc. à l'Ile Tudy, 19 déc. à Kerléguer/Bohars (29N), du 14 au 30 déc. à Trenvel (200 ind), le 25 déc. à St-Jean/Mendon (56) (80 ind). Certains lieux ne seront occupés que durant cette période : Penmarc'h (29S), Ploemeur, Kergwenn/Plovan...

+++ l'étang de Priziac marque un " creux " vers le 9 janv. Les étangs morbihannais du Cranic et de St-Jean se peuplent à mi-janvier, totalisent 320 ind le 16, une centaine seulement le 18 et rien ensuite. Abandon des lieux d'hivernage bretons dans leur ensemble en mi-janvier à l'exception de petits plans d'eau comme Le Conquet, St-Renan, Kerléguer... cet abandon étant confirmé par la diminution observée à Grandlieu.

**** Fin-janvier : départ de quelques hivernants et début de dationnement en quelques points : Priziac à partir du 26... Le passage

est très sensible en février, surtout le 12 à Priziac et à partir du 12 à Trenvel. Il se généralise fin-février-début-mars : maximum à l'Ile Tudy le 26 fév., à St-Renan le 27 fév., à Priziac le 5 mars et à Kerhuon le 8 mars. De plus, 150 ind sont observés le 2 mars à Trévignon/Tregunc (29S) où l'hivernage ne semble pas avoir eu lieu.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*). 1 ♀ le 25 nov. à Trenvel où l'espèce (1 ♀ aussi) avait été observée le 8 nov. 2 sur l'étang de la Musse/Baulon (35) le 15 déc., 1 ♂ à Ker-jean/Le Conquet (29N) le 31 déc. Seul lieu d'hivernage, l'estuaire de la Vilaine et la rade de Penerf (56) : 1350 ind le 18 déc. et 1200 le 18 janv.

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*), quelques observations isolées dans le Finistère et le Morbihan : 1 ♀ le 15 déc. dans l'Aber Benoit (29N); 1 ♂ imm. et 2 ♀♀ le 3 janv. aux grèves de Tréompan/Lampaul-Ploudalmézeau (29N); 1 ♀ du 23 nov. au 22 déc. dans le port du Conquet (29N); 2 ♀♀ le 19 janv. en baie de Douarnenez (29S) le 19 janv.; 4 ♀♀ le 16 déc. à l'Ile Tudy (29S); 1 ♀ le 26 déc. à Moustierlin/Fouesnant (29S); 1 ♀ le 15 déc. au Cap Coz/La Forêt-Fouesnant (29S); 5 ind dont 1 ♂ le 8 déc. de Raguénez à Trévignon/Tregunc (29S); 2 ind du 29 déc. au 2 janv. au Loc'h/Guidel (56).

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*), résultats des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	rade de Brest	21	33
	baie de Douarnenez	589	698
	baie de la Forêt/Concarneau	1	
	<u>Total Finistère</u>	<u>611</u>	<u>750</u>
MORBIHAN	Quiberon-Belle-Ile	27	
	littoral de Suscinio		200
	golfe	80	100
	estuaire de la Vilaine	200	250
	<u>Total Morbihan</u>	<u>310</u>	<u>550</u>
LOIRE ATLANTIQUE	presqu'île de Guérande	<u>116</u>	<u>120</u>
ILLE-ET-VILAINE	baie du Mont St-Michel	<u>4450</u>	<u>3200</u>
	TOTAL BRETAGNE	5487	4620

Notons en outre 100 ind à Gâvres (56) le 16 fév. et encore 200 à 300 (comptage partiel) en baie de Douarnenez (29S) le 2 mars.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*), seulement dans le Finistère : arrivée d'un fort contingent (150-200) devant l'Ile Tudy (29S) le 18 nov. Dès le lendemain les effectifs tombent à 10 ind et varieront entre 15 et 6 ind jusqu'à la dernière observation, le 15 déc. 3 à Penzé (29N) le 22 nov., 3 au Cap Coz/La Forêt-Fouesnant (29S) le 8 déc., 30 à Kerity/Penmarc'h (29S) le 9 déc., 3 en baie de Douarnenez le 19 janv., 1 au Conquet le 5 mars.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*), résultats des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	baie de Morlaix	4	
	estuaire de la Penzé/Carantec		6
	aber Benoit	4	4
	rade de Brest		5
	Kerity/Penmarc'h	20	
	rivière de Pont-l'Abbé	8	
	<u>Total Finistère</u>	<u>36</u>	<u>15</u>
MORBIHAN	rivière d'Etel		13
	Locmariaquer	50	
	golfe	465	200
	rade de Penerf	10	
	<u>Total Morbihan</u>	<u>525</u>	<u>213</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	réservoir du Vioreau	3	
	TOTAL BRETAGNE	564	228

Sur les 17 localités ayant abrité des Garrots cet hiver, 7 à 10 seulement ont été régulièrement fréquentées par l'espèce. Les secteurs les mieux suivis montrent que les effectifs hivernants sont atteints courant-décembre : en baie de Morlaix (29N), 1 le 18 nov., 4 le 8 déc.; dans l'aber Benoit (29N) les 2 premiers sont notés le 28 nov. puis 4 le 12 déc.; en rivière de Pont-l'Abbé (29S), premier le 22 nov. puis 8 le 10 déc.; dans le golfe du Morbihan, 465 le 12 déc. contre 11 le 8 nov.

Fin-décembre-début-janvier voit une brusque augmentation des effectifs dans le Finistère (6 le 1 janvier en baie de Morlaix, 25 le 29 déc. puis 12 le 30 déc. en rivière de Pont-l'Abbé) ainsi que de faibles chutes sur des plans d'eau non fréquentés jusqu'alors par les Garrots : 1 ♂ à Priziac (56) le 30 déc., 2 à Goulven (29N) le 1 janv. et 1 à St-Marc/Brest le même jour.

Les effectifs restent à peu près stables en janvier puis décroissent rapidement en février-mars : encore 200 dans les baies de l'île d'Arz (56) pendant tout le mois de janvier, seulement 40 au même endroit le 9 févr. Les Garrots ne sont plus notés en baie de Morlaix et dans l'aber Benoit à partir du 12 janv., en rivière de Pont-l'Abbé après le 26 janv. Enfin, il ne reste plus que 26 ind dans le golfe (56) le 8 mars dont 18 dans les baies de l'île d'Arz.

5 observations de ♂ pendant cette période : 1 le 10 déc. en rivière de Pont-l'Abbé; 1 le 27 déc. au même endroit; 4 le 25 fév. dans le Yeun Elez/Brennilis (29N); 1 le 27 fév. en rade de Brest et 1 le 8 mars à l'île d'Arz.

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*), 1 ♂ à Trenvel/Treogat (29S) le 24 nov.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*), résultats des recensements :

		DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE	baie de Morlaix & Penzé	25	43

	baie de Goulven	12	8
	aber Wrac'h	10	
	aber Benoit	21	
	rade de Brest	(100)	759
	de Penmarc'h à l'Ile Tudy	60	40
	de Moustierlin à Trevignon	10	
	<u>Total Finistère</u>	<u>288</u>	<u>851</u>
MORBIHAN	Carnac	40	
	Locmariaquer	100	
	golfe	50	230
	Suscínio		20
	Penerf & estuaire de la Vilaine	32	
	<u>Total Morbihan</u>	<u>222</u>	<u>250</u>
LOIRE-ATLANTIQUE	lac de Grandlieu	4	
COTES-DU-NORD	Perros-Guirec	10	
	Port-Blanc/Penvenan	15	
	Porz-Hir/Plougrescant	2	
	<u>Total Côtes-du-Nord</u>	<u>27</u>	
	TOTAL BRETAGNE	541	1101

Le chiffre étonnamment bas de décembre provient du fait que la rade de Brest n'a été que très partiellement recensée : en fait la baie de Roscanvel correctement dénombrée lors de ce premier recensement fournit le même chiffre qu'en janvier. Il est permis de penser qu'il en est de même pour le reste de la rade et que les effectifs du Harle huppé n'ont guère varié entre les deux périodes de recensement.

Signalons en outre l'arrivée d'un fort contingent à l'île Tudy le 18 nov. : 100 ind, chiffre qui tombe à 50 dès le lendemain !

En mars, les Harles occupent encore leurs lieux d'hivernage : un recensement partiel effectué en rade de Brest le 9 mars donne un total de 420 ind (contre 518 pour le même secteur en janvier); le même jour, 22 ind sont notés en baie de Morlaix et seulement (?) 27 pour le golfe du Morbihan.

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*), 1 ♂ sur la plage de St-Michel-en-Grèves à Pont ar Yar/Treduder (22) le 14 déc. et 1 ♂ sur l'étang du Beffou/Plougras (22) le 3 fév.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*), 6 à 8 ind observés dans la région de Poul-laouen (29N) le 26 déc. 8 ind pour 6 localités en Ille-et-Vilaine durant l'hiver. 1 couple en forêt de Rennes et 1 ind à Chasné (35) le 8 mars.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*), 1 ind à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) le 9 mars.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*), 2 ♀♀ à l'étang de Calzac/Sarzeau (56) le 17 nov.

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*), 1 ♂ le 2 janv. à St-Vio/Treguenec (29S) et 1 ♂ dans le Yeun Elez/Brennilis (29N) le 4 janv.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*), 1 adulte le long de l'Aulne près de Terenez/Le Faou (29N) le 15 déc. et 1 ind, sans doute ♂ imm. au Menhir/Crozon (29S) le 2 mars.

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*), résultats des recensements :

	DECEMBRE	JANVIER
FINISTERE		
eau douce		
étang de Goulven	150	
étang du Pont/Kerlouan		152
étang de Kerjean/Le Conquet	150	80
St-RENAN	250	200
Kerhuon	110	110
Yeun Elez/Brennilis	106	40
Kergwenn/Plovan	400	300
Trenvel/Treogat	2000	?
estuaires, rias, baies		
baie de Morlaix	160	100
aber Benoit	40	50
rivière de Pont-l'Abbé	60	150
baie de Kerogan/Quimper	600	?
<u>Total Finistere</u>	<u>4026</u>	<u>1182</u>

Rappelons l'absence d'observations sur Trenvel et Kerogan en janvier.

MORBIHAN		
eau douce		
Priziac	250	250
Le Moulin Bégasse/Meslan	15	
Le Fourneau/Ste Brigitte	40	40
Pont-Callec/Kernascleden	10	20
Cranic/Brec'h	215	240
St-Jean/Mendon	500	500
Kerizan/Crac'h	67	143
estuaires		
estuaire du Blavet	500	500
<u>Total Morbihan</u>	<u>1597</u>	<u>1693</u>

Notons l'absence de données pour le golfe dans la période des recensements; l'espèce a du échapper aux observateurs car un dénombrement effectué le 13 fév. donnait 6300 oiseaux pour l'ensemble et qu'il y en avait 3-4000 à Truscot/Sarzeau le 20 fév. !

LOIRE ATLANTIQUE	étang d'Aumée	<u>300</u>	<u>300</u>
ILLE-ET-VILAINE	étang de la Musse/Baulon	200	150
	étang du Pas-du-Houx/Paimpont	150	
	étang d'Andouillé-Neuville		230
	étang de Bélurant-Beaufort		200
	<u>Total Ille-et-Vilaine</u>	<u>400</u>	<u>650</u>

COTES-DU-NORD	étang des Salles/Perret	250	200
	étang du Coroncq/Glomet		80
	<u>Total Côtes-du-Nord</u>	<u>250</u>	<u>280</u>
TOTAL BRETAGNE		6573	4105

Fin-novembre-début-décembre, l'arrivée des hivernants se poursuit : 2000 à Trenvel le 19 nov., 30 en rivière de Pont-l'Abbé le 28 nov., 300 en baie de Kerogan le 1 déc. contre 60-70 le 10 nov.

Dans la deuxième quinzaine de décembre on assiste à un maximum très sensible : 275 à St-Renan le 15 déc. puis 130-150 le 30 déc.; 40 le 5 déc., 74 le 14 déc., 110 le 19 déc. à Kerhuon; 82 le 7 déc., 175 le 22 et 120 le 30 déc. à Kerjean; 30 le 9, 150 le 15 et 25 le 30 déc. à Goulven; 550-600 le 15 déc. à Kerogan etc... Cette vague laisse des effectifs importants en quelques endroits : Kerhuon, 110 ind en janvier; rivière de Pont-l'Abbé, 164 le 26 déc., cependant qu'ailleurs les effectifs redeviennent ce qu'ils étaient dans la première quinzaine du mois.

A Kerhuon (le plan d'eau le mieux suivi), le nombre de Foulques diminue en février et le départ s'accroît début-mars : 87 le 14 fév., et le 4 mars, 40 le 14 mars. A Trenvel, il ne reste plus que 800-1000 ind le 23 fév. et 450 à 500 le 3 mars. A St-Jean/Mendon, 100 le 2 mars....

(à suivre)

En raison de la place très importante prise par les recensements hivernaux d'Anatidés, nous sommes contraints de reporter la suite des Actualités ornithologiques du 15 novembre 1968 au 15 mars 1969 au prochain fascicule d'AR VRAN.