

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 15 NOVEMBRE 1968 AU 15 MARS 1969

(suite et fin)

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*), nous ne retenons que les données concernant l'hivernage, surtout en dehors de la zone recensée l'hiver dernier (1967-1968).

Nord-Finistère : La baie de Morlaix recensée le 18 déc. contenait 1100 ind., soit plus de deux fois ce que nous avons estimé, mais nous

n'avons pas de données pour janvier. La rade de Brest, peu fréquentée par l'espèce les années précédentes en comptait 30 en janvier. En outre, les effectifs de la baie de Goulven n'ont pas excédé 200 oiseaux.

Sud-Finistère : Seulement 172 en baie de Douarnenez le 19 janvier (soit plus de deux fois moins que l'an dernier). Le reste des côtes est relativement peu riche en Huitriers : 100 à Morgat le 30 déc., 40 en baie d'Audierne à mi-janvier, 50 en rivière de Pont-l'Abbé et 50 à Larvor/Lesconil en fin-décembre, 60-70 au moins de Moustierlin/Fouesnant à Port-Manech en décembre. En admettant que ces oiseaux soient des hivernants, cela nous donnerait un minimum de 550 à 600 ind. pour le Sud-Finistère.

Morbihan : Données très partielles parmi lesquelles nous relevons : 100 à l'île Meaban/Locmariaquer le 19 déc., 125 à Penthievre le 31 déc., 50-60 à Plouharnel les 25 déc. et le 5 janv. et des groupes n'excédant pas 15 ind. en quelques autres points.

Loire-Atlantique : A Penbé/Asserac, 500 le 8 déc., de 800 à 1000 le 5 janv.

Il nous manque des données essentielles en provenance de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*), plus de 200 données nous sont parvenues :

+ le passage se poursuit en novembre et début-décembre dans le Finistère et le Morbihan (300 à Kerizan/Crac'h (56) le 24 nov. contre 30 auparavant; 100 le 24 nov. puis 200 le 1 déc. à Trenvel/Treogat (29S) contre 30-35 auparavant; 120 en vol le 5 déc. au-dessus de l'Aber Benoit (29N), etc...). C'est à cette époque que se situent l'arrivée et l'installation des premiers hivernants dans le Leon (Guilers, Ti Kolo, Ploudalmézeau le 21 nov.). Le 30 nov., 500 sont notés sur les polders de la baie du Mont-St-Michel (35).

+ en Ille-et-Vilaine, les premiers apparaissent le 11 déc. (70-80 en

vol vers le sud à St-Briac) et les stationnements commencent dès le 13 déc. Des mouvements sont notés de manière concordante dans la région de Vannes (56) du 13 au 21 déc.

+ l'hivernage est beaucoup plus fort et plus uniforme que l'hiver dernier dans tous les départements (signalons de plus 200 ind. à Belle-Ile (56) le 27 déc.).

+ fin-décembre (à partir du 26 environ) et jusqu'au 16 janvier, de forts passages accompagnés de grands stationnements sont notés un peu partout dans le Finistère. Par exemple : 250 à Poullaouen les 26 et 28 déc., forte migration vers le sud dans toute la région brestoise (Brest, Bohars, Plougonvelin, Le Conquet...) ainsi qu'en d'autres secteurs (Le Faou, l'Hopital-Campfroust) le 30 déc., passages vers le sud dans tout le Leon le 1 janv., gros stationnements dans la région de Lesneven le 4 janv. (700 à Kernilis, 600 à Lannarvili), 400 à Ti Kolo/St-Renan le 9 janv. (100 hivernants en ce lieu). En outre, 500 à 600 à Séné (56) le 12 janvier.

+ creux très net ensuite jusqu'à la fin de janvier (3 observations en 15 jours) avec cependant 500 ind. au Loc'h/Guidel (56) (hivernants).

+ du 8 au 18 février environ (mais surtout du 14 au 18), forte migration vers le sud, notée partout (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère). Outre des passages visibles vers le sud à Pont-l'Abbé (29S) le 9 fév., en Ille-et-Vilaine les 14-15-16 fév., dans la région brestoise (du Conquet à Kerhuon) et à Groix (56) les 16-17-18 fév., nous relevons de grands stationnements autour de Rennes : 1000-1200 le 12 fév., 3500-4000 le 18 fév.; de plus, 300 à Etel (56) le 16 fév. La migration au-dessus de la mer a été fréquemment observée au cours de ces passages (du Conquet vers la presqu'île de Crozon et le Cap Sizun, de Groix vers Etel, etc...).

+ Dès le 19 fév., les Vanneaux rassemblés autour de Rennes se dispersent et la remontée commence; elle se poursuit en mars : près de 1000 ind. le 2 mars dans le secteur des étangs de la baie d'Audierne, encore 400-500 au Loc'h/Guidel (56) le même jour. 115 près de Bollé (35) le 10 mars.

+ le 26 fév., vol nuptial à Goulven (29N); le 2 mars, les nicheurs sont installés parmi les hivernants du Loc'h/Guidel ainsi qu'à Trevignon/Tregunc (29S); le 9 mars, couples installés à Séné (56) et dans l'anse du Kernic (29N); le 13 mars, vol nuptial au Vougo/Guissény (29N).

PLIVIER DORE (*Pluvialis apricaria*), nous disposons de 49 observations (dont 46 pour le Finistère, 39 dans la partie nord et 7 dans le sud du département).

+ alors qu'un gros passage vient de se produire à Trenvel/Treogat (29S), (1000-1500 ind. le 11 nov.), il ne demeure plus que 30 ind. le 24 nov. (aucun le 19) au même endroit. Dans le Léon, de petites bandes n'excédant pas 25 ind. sont notées dans la deuxième quinzaine de novembre (Porspoder, Plouider, Guisseny, Lampaul-Ploudalmézeau...). Seules exceptions, 80 à Goulven le 30 nov. et 200 sur les polders de la baie du Mont-St-Michel (35) le même jour.

+ Passages sur la côte nord du Finistère à mi-décembre (75 + 125 au vol à l'Aber Wrac'h le 12, 35 à Guisseny le 14...) sans concordance avec

des mouvements de Vanneaux dans cette région (par contre, c'est à cette époque que ces mouvements sont enregistrés en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan).

+ C'est à partir de la dernière décade de décembre que les hivernants véritables s'installent dans l'intérieur du Leon (Guilers, St-Renan, Ploudalmézeau) : premiers le 22 déc. à Guilers et le 23 à Lanrivour. Un passage se superpose à cette arrivée et permet des observations sur les côtes sud du Finistère et du Morbihan ainsi que dans le Nord-Finistère où l'on note 45 ind. à Guilers le 27 déc., 40-50 près de Lannarville le 4 janv., 200 près de Ploudalmézeau le 9 janv. (contre 50 à 80 hivernants en permanence). Encore 40 au Vougo/Guissény (29N) et 32 à Lannilis le 19 janv.

+ Creux très net ensuite jusqu'à la fin-janvier (comme pour le Vanneau) les 20 ind du Loc'h/Guidel (56) le 26 janv. sont peut-être des hivernants.

+ Du 2 au 18 fév., nouveaux passages vers le sud dans le Nord-Finistère : 50 en vol vers le sud à Kerhuon le 2 fév., 200-250 à Kersaint le 8 fév., 80 à Goulven le 16, passages dans toute la région brestoise les 16 et 17 fév. etc...

+ La remontée peut coïncider avec celle des Vanneaux : 25 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 19 fév., 50 à Trenvel/Treogat (29S) le 23 fév., mais elle est peu caractérisée. Notons quelques ind. à Guilers et 1 au Kernic (29N) le 6 mars, et surtout 300 à Trenvel le 13 mars.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squarata*), nous ne conservons que les données nouvelles concernant l'hivernage.

Nord-Finistère : 50 en baie de Morlaix le 18 déc.; 3 à Molène le 25 janv.; 50 (effectif stable) en baie de Goulven.

Sud-Finistère : 25 en rivière de Pont-l'Abbé le 27 déc., seule donnée reçue pour ce secteur.

Morbihan : 1000 ind. sur les vasières de Truscat (golfe) le 2 fév.; 50 à Plouharnel, 35 à Penven-Suscinio, 20 à Penvins, 20 à Meaban, 25 à Penthievre et 10 dans l'anse de Brillac (golfe, peut-être une partie de ceux de Truscat ?).

Aucune donnée pouvant concerner d'éventuels mouvements dans la période considérée.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*), le passage, devenu très faible depuis la mi-octobre, ne semble pas durer au-delà du 25 nov. environ.

En janvier, nouveaux passages et nouvel apport d'hivernants, jusque vers le 25 : les 40 ind. observés au Vougo/Guissény (29N) le 1 janv. n'hivernent pas en totalité; 40 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) contre 10 ou 15 habituellement; 50 au Trez-Hir/Plougonvelin (29N) le 19 janv. alors que le nombre d'hivernants n'excède pas la dizaine; 14 le 25 janv. à St-Marc/Brest où l'espèce n'hiverné pas.

En ce qui concerne l'hivernage proprement dit, pas de données nouvelles pour le Nord-Finistère. Pour les côtes sud, quelques notes épar-

ses semblent indiquer que les effectifs hivernants sont relativement peu importants : 30 à Moustierlin/Fouesnant le 27 déc. (contre 70 le 15 déc.), 30 à Loctudy (29S) le 27 déc., 35-40 au Conguel/Quiberon (56) le 30 déc., 9 au Loc'h/Guidel (56) le 26 janv., 100 à Gâvres (56) le 16 fév.

Le départ des hivernants commence sans-doute en fin-février (3 à St-Marc/Brest le 16 fév.), mais les données sont peu significatives, même début-mars. Notons cependant qu'en Loire-Atlantique l'espèce est revue en nombre à partir du 9 mars.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*), le premier est observé à St-Marc/Brest (lieu de reproduction) le 13 mars.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*), trois observations hivernales à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) : 2 ind. le 27 déc. et le 16 janv., puis 1 le 20 fév. Dans le Morbihan, des Gravelots de cette espèce ont été notés au Conguel/Quiberon le 30 déc., mais en nombre non précisé.
+ Premier retour le 9 mars : 1 ind. dans l'anse du Kernic/Plouescat (29N) d'où il était absent le 6. Rien ailleurs avant le 15 mars.

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*), les données reçues sont très nettement insuffisantes pour permettre une étude, même sommaire, des mouvements de cette espèce dans la période considérée.

Quelques données hivernales :

Nord-Finistère : Notons seulement : 32 dans l'Aber du Conquet en décembre; 15 au Trez Hir/Plougonvelin le 24 déc.; 52 sur la côte de Landunvez le 12 janv.; 22 à Porz Doun/Ouessant le 24 fév.

Sud-Finistère : 30 ind. de Port Manech à Beg Meil/Fouesnant en décembre; 40 à Moustierlin/Fouesnant le 15 déc.; 10 à St-Fiacre/Crozon le 21 déc.

Morbihan : 15 à Locmariaquer le 16 fév. (plus deux données concernant 5 ind.).

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*), nous recevons enfin quelques données sur cette espèce : 1 ind à Ste-Anne-d'Auray (56) le 21 nov.; notée à St-Aubin-du-Cormier (35) le 15 déc.; 1 ind. à Trenvel/Treogat (29S) le 17 déc.

Le 22 déc., une arrivée est notée dans le Nord-Finistère : 4 ind. levés au matin sur 100m de haies à Guipavas; arrivée à Lannéannou (Monts d'Arrée) et 1 ind. à l'Ile Chevalier/Pont-l'Abbé (29S) le même jour.

1 ind. à Belle-Ile (56) le 29 déc.; notée à Liffré (35) le 23 janv.; 1 ind. au Menez Querve/Cast (29S) le 9 fév.; 1 ind à St-Thurial (35) et 1 à Brengall/Pont-l'Abbé le 16 fév.. Enfin 1 ind à Ste-Anne-d'Auray le 15 mars.

Gravelot à collier interrompu, individu mâle sur l'île Tavorc'h
(Finistère Nord)

Photo Max Zorin

BECASSINE DES MARAIS (*Capella gallinago*), nous manquons de données suivies et comparables sur des secteurs importants.

- + Notons des passages dans la deuxième quinzaine de novembre (surtout vers le 23) dans le Nord-Finistère et dans le Morbihan.
- + Passages sensibles un peu partout du 25 déc. au 5 janv. environ.
- + Rassemblement remarquable de 100 ind. sur une seule prairie le 6 fév. à Brengall/Pont-l'Abbé (29S).
- + La migration de retour, sans doute amorcée depuis le 25 fév. environ, n'est ressentie, localement, que vers la mi-mars : Trenvel/Treogat (29S) le 13 mars, Ste-Anne-d'Auray (56) le 15 mars.
- + Le 13 mars, les nicheuses sont cantonnées au Vougo/Guissény (29N) où 3 ind. chevrotent et chantent au vol et au sol.

BECASSINE SOURDE (*Limnocryptes minimus*), 5 observations en décembre :
 1 le 12 déc. près de Rennes
 (35), 1 les 12 et 22 déc. à St-Renan (29N), 1 le 28 déc. au Loc'h/Guidel (56), 1 le 29 déc. à Guipavas (29N).
 1 ind. le 9 mars sur les prés salés de l'anse du Kernic/Plouescat (29N)

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*), + Le passage (les stationnements) se poursuit jusque vers le 25 nov., peut-être même jusqu'au début-décembre (80-100 à la pointe de Corsen/Plouarzel (29N) le 1 déc.). On note en particulier 100-150 ind. à Goulven (29N) le 17 nov., 160-190 ind. à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 21 nov. (contre 30 le 1 déc.), 400 en baie de Morlaix le 22 nov. Les 200-300 hivernants de la rivière de Pont-l'Abbé (29S) sont déjà là.
 + De forts stationnements sont notés en quelques localités entre la fin-décembre et le 20 janvier, mais ne durent guère : 400-450 au Pouldon/rivière de Pont-l'Abbé le 26 déc., 160 à Lampaul-Ploudalmézeau le 9 janv., 40 au Curnic/Guissény (29N) le 19 janv. et 40-50 au Vougo/Guissény le même jour.

Hivernage :

Nord-Finistère : La population de la radé de Brest (doit être assez importante d'après les données partielles dont nous disposons : 40 en baie de Daoulas le 8 déc., 50 dans une anse de la rivière du Faou le 12 janv., 48 sur l'Elorn le 25 janv., 150-200 à Kervez/rivière du Faou le 16 fév. (mais à cette date il devient déjà difficile de parler d'hivernants). A part cela, relevons : 100 hivernants à Goulven et 50 environ à Lampaul-Ploudalmézeau, le reste des côtes n'ayant fourni que des données trop partielles.

Sud-Finistère : 300 hivernants notés régulièrement en rivière de pont-l'Abbé, seulement 33 pour toute la baie de Douarnenez le 19 janv., 1 seul de Port-Manech à Beg-Meil le 8 déc.

Morbihan : 100 sur Méaban le 19 déc., 85 à Plouharnel le 25 déc., 20 au Loc'h/Guidel tout l'hiver, 12 à Belle-Ile le 28 déc., 20 à Erdeven le 6 janv., 15 (?) en rivière d'Etel le 24 déc., 20 le 19 janv. et 50 le 16 fév. à Locmariaquer, 10 à St-Philibert le 16 déc.. Quelques petits groupes notés dans le golfe dont le recensement reste à faire (255 à

Séné le 22 fév.)

- + Les hivernants partent en fin-février et début-mars (il en reste moins de 15 à Lampaul-Ploudalmézeau le 11 mars, 2 dans l'Elorn le 15 mars). Des passages sont aussi notés à cette époque (Lampaul-Ploudalmézeau le 27 fév.). Il faut peut-être y rattacher les 255 ind. de Séné le 22 fév. et les 150-200 de Kervez le 16 fév. ? (voir plus haut).
- + Des isolés ont été notés dans l'intérieur du Leon : 1 le 5 déc. à Loc-Brévalaire, 3 le 27 déc. entre Ploudalmézeau et Lanrivoaré, 1 le 24 fév. à Plouguin.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*), quelques-uns le 19 janvier[†] à St-Philibert (56).

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*), 1 le 7 fév. entre Trignac et St-Nazaire (44) dans un grand rassemblement de Combattants. 1 le 23 fév. près de Nantes (44).

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*), les lieux d'hivernage connus n'ont pas été prospectés.

2 ind au Trez Hir/Plougonvelin (29N) le 8 déc., 3 le 15 déc.; 1 au Trait de Penbé/Asserac (44) le 8 déc.; notée dans l'Aber Benoit (29N) le 15 déc.; 70 en baie de Morlaix (29N) le 18 déc.; 1 à Plouharnel (56) le 27 déc.; 5 à l'Ile Chevalier/rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 30 déc. et notée à Goulven (29N) le 1 janv.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*), 5 observations cet hiver : 1 ind. à Ste-Anne-d'Auray (56) le 17 nov. et 1 au même endroit le 20 déc. Les trois autres observations se situent après la mi-février : 1 ind tué à Plouzané (29N) le 18 fév., 1 à Kerbois/Crac'h (56) le 28 fév. et 1 à Noyal-sur-Vilaine (35) le 13 mars.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*), 5 observations cet hiver : 3 ind. à Kerizan/Crac'h (56) le 19 nov., 1 ind. à l'Aber Wrac'h (29N) le 8 déc., 4 à l'étang du Curnic/Guissény (29N) le 28 déc., 1 le 1 janv. puis 3 le 28 fév. à cet endroit (très bien suivi).

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*), le passage semble terminé à mi-novembre bien que des hivernants continuent peut-être d'arriver jusqu'au début-janvier (Aber du Conquet).

- + Pas de données d'ensemble sur l'hivernage :

Nord-Finistère : rien de nouveau si ce n'est quelques indications pour la rade de Brest : 30 à Terenez le 17 nov., 40 sur l'Elorn le 7 déc., 18 à Tibidi le 2 fév., 50 à Kervez/rivière du Faou le 16 fév. et quelques petits groupes ici et là. Dans les secteurs importants, rien de

systématique n'a été fait. Notons seulement 80 hivernants dans l'Aber du Conquet, 100 à Goulven et 4 sur une grève d'Ouessant...

+ Les données sont insuffisantes pour situer le départ des hivernants et les premiers passages : notons cependant que l'espèce est observée au Curnic/Guissény (29N) à partir du 22 fév. et que 50-100 ind sont notés à Tibidi/rade de Brest le 9 mars.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*), encore 70 le 19 nov. en rivièrè de Pont-l'Abbé (29S) (où 3 (?) ind. seulement sont notés le 30 déc.). 1 à l'Île-Tudy (29S) le 22 nov., 1 à Guissény (29N) le 24 nov., 4 à Port-Blanc/Penvenan (22) et 1 à Plougrescant (22) le 8 déc., noté à Ste-Marguerite (29N) le 15 déc., 1 ind. à Kerizan/Crac'h (56) le 26 déc., 1 à Tardic/Aber Benoit le 28 déc., 2 au Curnic/Guissény (29N) le 19 janv., 1 à l'Aber Ildut (29N) le 9 fév., 1 à Plouneour Trez (29N) le 26 fév., enfin à Goulven (29N), 7 le 1 déc., 9 le 8 déc. et 5-10 le 2 janv.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*), plus de 30 observations dans la période considérée :

Ille-et-Vilaine : 1 ind. à l'étang du Boulet/Feins le 11 janv.
Nord-Finistère : 2 hivernants sur l'Elorn de début-décembre à mi-mars, 1 hivernant à Moulin-Mer/Logonna-Daoulas du 24 nov. au 9 mars, 1 hivernant au Conquet de début-décembre à fin-février (2 ind. le 16 fév.), 2 dans l'Aber Ildut en février, 1 à St-Marc/Brest du 15 au 28 fév. (non-hivernant), 2 au Curnic le 9 mars (non-hivernants).
Sud-Finistère : 1 sur le Goyen/Audierne le 21 déc., 1 à Concarneau et 1 au Cap-Coz/La Forêt-Fouesnant le 8 déc., 1 à Moelan-sur-Mer le 2 mars.
Morbihan : 1 à Kerizan/Crac'h le 19 nov., 1 à l'Île d'Arz/golfe le 22 déc., 1 à l'Île-aux-Moines/golfe à partir du 5 janv., 1 à Arradon/golfe le 25 fév.

La seule donnée concernant à coup sûr des oiseaux en migration est celle du 9 mars au Curnic.

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*), Les hivernants sont très localisés. Une observation intéressante dans le Morbihan : 1500 ind. dans l'anse de Truscat/golfe en février. Dans le Nord-Finistère, 100 hivernants en Penzé, 6 à Ouessant le 14 janv., un vol de 300 à Ste-Marguerite le 25 déc. En outre, 8 ind au Curnic/Guissény (29N) le 8 déc. (non hivernants). Dans les Côtes-du-Nord, 100 ont été notés le 8 déc. à St-Michel-en-Grèves.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*), 2 le 17 déc. à Trenvel/Treogat .

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*), observé uniquement dans le Morbihan. La côte proche de Lorient constitue un secteur d'hivernage régulier : 4 à Port-Vil/Ploemeur le 28 déc., 4 à Kerbiscan et au moins 2 à Kerpape le 29 déc., 3 au moins au Perello/Ploemeur le 30 déc. et à Porz Fol le 1 janv. et 2 à Kerpape

le 28 fév. Plus au sud, 1 ind. a été observé le 13 janv. au Vivier sur la côte sauvage de Quiberon.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*), pas de passages notables après le 15 nov., mais très probablement

un apport d'hivernants en décembre.

Morbihan : Les vasières de Truscat/golfe recelaient "quelques dizaines de milliers" de Bécasseaux variables le 20 fév. Dans le golfe toujours, 3000 sur les vasières de l'île Bailleron en fin-décembre. Notons encore 1000 à Plouharnel le 31 déc., 1000 à Penvins le 27 janv., 300 à Penven-Suscinio le 12 janv., 100 à Kerizan/Crac'h en décembre et 100 à l'île d'Arz/golfe le 27 janv.

Sud-Finistère : Quelques données partielles : 500 à la Forêt-Fouesnant le 8 déc., 100 notés pour l'ensemble de la baie d'Audierne, 70-80 à Loctudy le 28 déc., 50-60 à Moustierlin le 29 déc., 50 à l'île Tudy le 24 déc.

Nord-Finistère : Les effectifs de la baie de Morlaix s'élevaient à 3000 en décembre, ceux de l'ensemble baie de Goulven-Keremma-Kernic, non recensé complètement, étaient supérieurs à 6000. A part cela, notons 350 en baie de Guissény le 14 déc., 385 au Moulin Blanc/Brest le 2 janv., 200-250 à Kervez/rivière du Faou le 16 fév. Dans l'Elorn, partiellement prospecté, plus de 1000 ind. ont été notés. Signalons aussi la présence de quelques Bécasseaux variables à St-Renan (localité intérieure) pendant tout l'hiver.

+ Des mouvements se produisent à partir du 15 fév., par exemple à St-Marc/Brest (29N) où 90-100 ind. apparaissent le 15, au Curnic où 250 ind. sont observés le 16 (pas ou peu d'hivernants), à St-Renan où 5 ind sont notés le 16, 7 le 20 et 6 le 25 fév. (1 ou 2 hivernants). Il en va de même en mars : 160 au Curnic le 9, 100 à St-Marc/Brest le 15 etc... Il est difficile de préciser dans quelle mesure il s'agit de premiers passages ou de déplacements à petite échelle précédant le départ des hivernants.

+ La tache noire ventrale du plumage nuptial a été notée dès le 6 fév. sur un ind. à St-Renan.

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*), il y a tout lieu de croire que l'hivernage est insignifiant en Bretagne (seulement 16 observations en 12 points du Finistère).

Encore 40 à St-Vio/baie d'Audierne et 4 à Trenvel/Treogat (29S) le 17 nov. et 5 à Guissény (29N) le 24 nov. Ensuite, du 8 déc. au 16 janv., de petits groupes sont notés en plusieurs localités : 3 au Trez Hir/Plougonvelin (29N) les 8 et 15 déc., 20 en baie de Douarnenez le 15 déc., 2 à Trevignon/Tregunc (29S) le 8 déc., 15 au Vougo/Guissény (29N) le 1 janv. En ces lieux, les observations ne sont pas renouvelées. A Lampaul-Ploudalmézeau (29N), 30-35 ind. le 16 janv. contre 1 ou 2 auparavant et aucun ensuite. A Moustierlin/Fouesnant (29S), 15 ind le 29 déc. contre 40 le 15 déc. Aucune observation après le 16 janv. si ce n'est 1 ind. à Neiz Vran/Kerlouan (29N) le 16 fév.

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*), entre Trignac et St-Nazaire (44), 50 ind. le 2 fév. et un rassemblement de 3000-5000 le 7 fév. ! A Trenvel/Treogat (29S), les premiers, 16 ind., sont notés le 13 mars.

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*), 2 ind. sur l'étang du Curnic/Guissény le 1 janv., 2 ind. à Treglonou/Aber Benoit (29N) le 12 janv.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*), signalons la présence à St-Renan (29N) le 25 fév. d'un adulte aberrant à pattes couleur chair parmi 7 ad. normaux.

GOELAND CENDRE (*Larus canus*), peu noté avant le 15-20 déc. avec cependant 100 en baie de Goulven (29N) le 17 nov.

Ensuite les données proviennent de l'ensemble des côtes morbihannaises et finistériennes. A côté d'observations d'isolés ou de petits groupes, nous relevons : nombreux à Belle-Ile (56) en fin-décembre, 25 au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) le 30 déc., 50 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) les 9 et 16 janv., 29 à l'Aber/Crozon (29S) et 50 à Guissény (29N) le 19 janv., 400 minimum dans l'anse de Truscat/golfe (56) le 2 fév. Les lieux bien suivis montrent nettement une arrivée à fin-décembre. C'est à cette époque que des oiseaux apparaissent aux étangs intérieurs de St-Renan (29N) (1 le 24 déc., 4 ad. et 3 imm. le 31 déc.).

Le passage pourrait commencer dès la mi-février : à St-Renan, 1 ind. le 13, 4-5 le 16, puis 28 le 20, 6 le 25 et 14 le 27 fév. En mars, le passage est noté à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) : 50 le 10 mars et 70 le 11 mars (contre 15-20 auparavant). 100 à l'île d'Arz/golfe le 9 mars.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*), signalons seulement de forts passages vers le sud le 21 nov. sur la côte ouest du Leon : à Lampaul-Ploudalmézeau, 600 par heure pendant la matinée, en bandes de 40 et plus. A Porspoder, des centaines passent sans interruption dans l'après-midi.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*), l'espèce a été observée assez régulièrement à Brest de fin-décembre à mi-mars au moins, soit sur les lagunes de St-Marc, soit pêchant au-dessus des hauts-fonds de la rade : 28 déc., 2 ad. et 3 imm. sur la rade en face de St-Marc; 28 fév., 1 ad. et 3 imm. sur les lagunes de St-Marc; 13 mars, 1 imm. à St-Marc; 14 mars, 3 imm. à St-Marc; 15 mars, 1 ad. et 4 imm. à St-Marc. En outre, 1 ind à Penfeld le 19 fév. Le 27 déc., 3 ad. en vol vers le S.S.E. au Conguel/Quiberon (56).

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*), 6 observations seulement! : abondante à St-Mathieu (29N) le 23 nov., 10 à Quiberon le 25 déc., 1 imm. à Belle-Ile les 27 et 30 déc., 1

100
imm. à la pointe st-Mathieu (29N) le 16 janv. Le 16 janv., très fort passage vers le SW à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) : environ 1000 en une demie heure.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*), 5 observations hivernales dans le Morbihan et le Nord-Finistère :

2 le 31 déc. à Penthièvre et 2 le 3 janv. sur la côte sauvage de Quiberon (56) (les mêmes ?).

3 le 3 janv., 1 le 9 janv. à Lampaul-Ploudalmézeau (29N).

Le 13 fév., 2 ind. notés en vol vers le nord à l'embouchure de l'Aber-Ildut sont revus quelques minutes plus tard posés dans le port de Melon/Porspoder (29N).

Retour certain dès le 15 mars : 1 ind dans l'anse de St-Marc/Brest.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*), une cinquantaine d'observations entre Belle-Ile (56) et Brignogan (29N) pour la période considérée. En rade de Brest, 55 ind. lors du recensement Anatidae de janvier. En baie de Douarnenez, 123 dont une bande de 98 le 19 janv.; à la pointe St-Mathieu (29N), 15 ind le 16 janv.; 8 observations entre Ouessant et le Conquet le 14 fév.; une dizaine d'isolés pour le reste des côtes léonardes en janvier. Dans le Morbihan, c'est du secteur Belle-Ile-Quiberon que sont signalés les seuls groupes importants : 23 entre Quiberon et Belle-Ile le 27 déc.; fréquent autour de Belle-Ile en fin-décembre; 50 en vol vers le sud entre Quiberon et Belle-Ile le 29 déc.; 10 cadavres mazoutés sur 20 kilomètres de plage le 16 fév.; 4 isolés par ailleurs dont 2 dans le golfe (18 déc. et 19 janv.).

MERGULE NAIN (*Plautus alle*), 1 ind le 2 fév. dans le port du Croisic. (44).

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*), 3 observations seulement, en février : 2 ind. à l'entrée de la rade de Brest le 15 fév.; 3 cadavres mazoutés sur 20 km de plages dans le Morbihan (de Gâvres à Penthièvre) le 16 fév.; 2-3 au Trez Hir/Plougonvelin (29N) le 25 fév.

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*), entendu à l'Ile aux Moines (golfe) le 9 mars.!

PIC CENDRE (*Picus canus*), chant à l'étang du Boulet/Feins (35) le 9 mars.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*), seulement dans le Morbihan : 10 à Ste-Anne-d'Auray (56) le 26 déc., 9 à l'anse du Po/Plouharnel le 31 déc. Premier chant à Kerbois/Crac'h le 26 fév.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*), début du chant le 13 fév. à St-Renan (29N) (régulièrement ensuite en ce lieu.)

Le passage de printemps commence peut-être dès le 20 fév. (augmentation à partir de cette date à Lampaul-Ploudalmézeau (29N)). Il est évident dans la première quinzaine de mars : migration visible dans la matinée du 6 mars dans tout le Leon, gros stationnements sur le littoral : Lampaul-Ploudalmézeau le 9 mars, Vougo/Guissény (29N) le 13 mars etc... Les hivernantes partent le 7 ou le 8 mars de l'anse du Kernic/Plouescat (29N), à la même époque de St-Marc/Brest.

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*), 1 ind. à Goulven (29N) le 30 nov.;
2 ind. en baie de Sieg/Santec
(29N) le 8 déc.; 1 ind. à Trevignon/Tregunc (29S) le même jour.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*), 2 observations très précoces réalisées par deux observateurs indépendants avec une concordance qui exclut tout doute : 1 ind signalé deux fois de Goulven (29N) le 16 fév.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*), le passage est terminé en novembre et les effectifs tombent en flèche un peu partout, sauf en des lieux comme l'anse de St-Marc/Brest où les hivernants sont nombreux (40-50).

Petits apports constatés en décembre à Lampaul-Ploudalmézeau (29N), (1 déc.) et St-Renan (12 déc.).

Parade nuptiale dès le 6 fév. à St-Renan.

A partir du 25 fév., des retours sont notés sur les lieux de reproduction (Lampaul-Ploudalmézeau, St-Renan...). Les premiers chants sont entendus le 26 fév. au Curnic/Guissény (29N) et à Goulven (29N), un peu plus tard sur la côte sud : 2 mars au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) et Trevignon/Tregunc (29S). Les chants se généralisent dans la première quinzaine de mars.

Le départ des hivernants se situe généralement en fin-février (seulement 17 à St-Marc le 28 fév.).

Le passage de printemps est fortement ressenti dans le Nord-Finistère à partir du 6 mars (mouvements visibles à Landunvez le 6 mars, 35 sur un seul bassin à St-Renan, forte augmentation à Lampaul-Ploudalmézeau le 9 mars, très forte densité au Vougo/Guissény et 40 à St-Marc le 13 mars.

PIPIT SPIONCELLE ALPIN (*Anthus s. spinoletta*), 50 observations dans la période considérée, la plupart dans le Nord-Finistère (où la sous-espèce a été recherchée). Si l'on excepte le Yeun Elez/Brennilis, St-Renan et Bohars, toutes les localités signalées se situent dans une étroite bande littorale. Ces observations seront traitées plus en détail quant aux milieux fréquentés, au comportement des oiseaux etc... dans une publication ultérieure.

Relevons seulement les dates et localités de séjour :

Localités intérieures : St-Renan (29N), 14 observations de 1 à 3 ind. du 21 nov. au 11 mars. Bohars (29N), 1 ind le 12 janv. Penfeld (29N), 1 ind le 18 fév. (sans doute le même). Yeun Elez/Brennilis (29N), probable en décembre et janvier, 1 ind le 25 fév.

Localités côtières : Anse de St-Marc/Brest (29N), 3 observations de 1 à 3 ind. du 17 nov. au 28 déc. Kerhuon (29N), 4 observations du 2 janv. au 13 mars. Lampaul-Ploudalmézeau (29N), 4 observations de 1 ind. du 21 nov. au 9 mars. Curnic/Guissény (29N), 1 ind le 23 déc. et 2 observations fin-Février (1 et 2 ind.). Vougo/Guissény (29N), 3 ind. le 13 mars (pas de visites antérieures). Goulven (2 points distincts), 5 observations de 1-2 ind. du 2 fév. au 9 mars. Anse de Kernic/Plouescat (29N), 1 ind le 9 mars. Quimper (29S), 2 ind. le 8 déc. (pas d'autres visites). Cap-Coz/La Forêt-Fouesnant (29S), 1 ind. le 15 déc. Le Loc'h/Guidel (56), 6 à 10 le 28 déc., 7 le 26 janv., noté le 2 mars.

Malgré le grand nombre des observations en fin-février et mars il est encore difficile de dégager les mouvements de l'espèce. Mais cet oiseau doit être systématiquement recherché pendant l'hiver 1969-1970.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla a. alba* & *Motacilla a. yarellii*), pour l'ensemble de la période considérée, la proportion des deux races s'établit à 35% de *yarellii* et 65% de *alba*, mais dans les villes du Finistère, la proportion de *yarellii* est au moins de 50%. Remarquons de plus que la race *yarellii* n'a été observée qu'une seule fois au sud de Lorient (56) : 1 ind à Vannes le 4 mars.

Le passage de printemps débute tôt, vers le 13 fév. à St-Renan où un premier maximum est noté le 16, un second le 9 mars (race type). Les *yarellii* commencent à passer en petit nombre le 28 fév. (St-Marc/Brest et Kerhuon (29N)).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*), les hivernantes de St-Marc/Brest (7 ou 8) s'en vont début-mars. Passage presque insensible dans la première quinzaine de mars.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*), encore 1 à l'Ile Tudy (29S) le 22 nov.

Premier retour le 11 mars : 1 ♂ à Lampaul-Ploudalmézeau (29N).

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*), 17 observations dans la période considérée.

Ille-et-Vilaine : 1 en plaine de Baud/Rennes le 16 janv.

Nord-Finistère : A St-Marc/Brest, 1 ♂ le 21 nov., 1 ♀ le 10 déc., 1 ♂ les 16 et 28 fév., dernière observation. Lanrédec/Brest, 1 ind. le 28 nov. et 1 ind. le 22 fév. Au Trez Hir/Plougonvelin, 1 ♀ le 15 déc. A Lampaul-Ploudalmézeau, 1 ♀ les 27 déc. et 16 janv. Au Vougo/Guissény

1 ind le 16 fév. Meneham/Kerlouan, 1 le 2 janv.

Sud-Finistère : 1 à Tal-ar-Grib/Plomodiern, le 2 mars.

Morbihan : 1 à Ste-Anne-d'Auray le 17 nov., 2 au Conguel/Quiberon le 25 déc. et 2 à Belle-Ile le 28 déc.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*), l'hiver 1968-69 n'a fourni que peu d'observations et surtout des effectifs très faibles : deux bandes seulement dépassaient 30 ind. !

- + Dans la deuxième quinzaine de novembre, absente du Nord-Finistère; quelques isolées dans le Morbihan (les 19 et 23 nov.)
- + Le 30 nov., notée sur les polders de la baie du Mont-St-Michel (35). Du 1 au 5 déc., petit passage dans le Leon: 60 à Plouguin le 1 déc. Petit passage à Ste-Anne-d'Auray (56) le 7 déc. et quelques-unes à Quimper (29S) le 8 déc.
- + Pas observée ensuite jusqu'au 26 déc. Du 26 au 29 déc., quelques petits groupes dans le sud-Finistère et le Morbihan, nombreuses dans la région de Poullaouen (centre-Finistère). Elle reparait dans le Leon à partir du 2 janv., en très petit nombre (jusqu'au 19 janv. environ).
- + Rien ensuite jusqu'au 4 fév. où elle est notée dans le Morbihan. Très nombreuses à Plouray (56) le 5 fév., petits groupes dans le Leon.
- + La remontée commence, faiblement, le 20 fév. dans le Nord-Finistère et se poursuit en mars (Nord-Finistère et Morbihan).

GRIVE MAUVIS (*Turdus musicus*), dans la deuxième quinzaine de novembre, le Nord-Finistère ne fournit que 2 observations d'isolés (le 17 nov.). Dans le Morbihan, les Mauvis sont abondantes les 22 et 23 nov. autour de Ste-Anne-d'Auray.

- + Apparition en nombres importants à partir du 1 déc. dans le Leon : des milliers dans le secteur de Plouguin-Coat Méal. Dans le Morbihan, notée seulement du 26 au 31 déc. alors que de gros effectifs sont à nouveau notés dans le Nord-Finistère du 30 déc. au 10 janv.
- + Très peu ensuite jusqu'au 5 fév.
- + Arrivées fortement ressenties dans le Leon à partir du 9 fév. et passages importants jusqu'à la fin du mois. Le passage est noté dans le Morbihan et le Sud-Finistère les 1 et 2 mars. Dans le Nord-Finistère, il s'arrête vers le 9 mars.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*), peu observée :

Leon : 1 couple à Loc-Brévalaire le 5 déc.; 1 ind. à St-Frégant le 26 déc.; 1 à l'étang du Pont/Kerlouan le 6 fév.; 1 couple à Lampaul-Ploudalmézeau le 9 mars. Il s'agit d'oiseaux très probablement locaux, mais la distribution de la Draine est peu connue dans le Nord-Finistère.
Sud-Finistère : 2 observations d'isolés.
Morbihan : Le chant est entendu à partir du 28 janv. (2 groupes de 3

ind.) à Ste-Anne-d'Auray où un nid est achevé le 12 mars. 1 couple à Brec'h le 2 mars. Migration visible à Vannes les 1 et 2 fév. (16-20 ind.).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*), cette espèce est présente tout l'hiver à St-Renan (29N) (1 ind. jusqu'au 13 fév.) et à l'étang de Kerhuon (29N) (1 ind. jusqu'au 5 mars). Un chanteur le 1 janv. à Goulven (29N) où l'espèce avait été précédemment notée. De plus, des chanteurs pendant tout l'hiver sur les lieux de reproduction connus de la région de Lorient : Lannec, Fort-Bloqué etc..

FAUVETTE ORPHEE (*Sylvia hortensis*), 1 ♀ ad. capturée le 1 janv. à Quiberon (56). Voir à ce sujet la note de A. LE TOCQUIN dans Ailes et Nature, 1968, n°8 : p.30.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*), 1 ind. à Pont-Blanc/Lesneven (29N) le 9 mars.

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*), observée tout l'hiver à Vannes où l'espèce hiverne régulièrement en petit nombre. 1 ♂ au Trez Hir/Plougonvelin (29N) le 16 janv.; 1 ♂ chanteur le 7 fév. à Roc'h Du/Kerhuon (29N). A Vannes, le premier chant est entendu le 13 mars.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*), notée sur ses lieux de nidification, en particulier dans les landes de l'intérieur du Finistère (Menez Querve/Cast, Argol, Eraspars, Yeun-Elez etc...). Elle semble bien répandue à Belle-Ile (56) et 1 ind. est observé au Perello/Ploemeur (56) le 1 janv. 1 ind. sur les pelouses de la Faculté des Sciences de Brest le 17 déc. à la suite d'un coup de froid; 1 ind. à St-Renan (29N) le 3 janv., assez loin de tout lieu de reproduction connu.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*), hivernage sensiblement identique à celui de l'hiver 1968-1969 (cf. AR VRAN, I, (2)). Les mêmes problèmes se posent, c'est à dire que la présence des hivernants rend très difficile l'appréciation de l'arrivée des migrateurs et nicheurs. Toutefois, on peut estimer que cette arrivée intervient dans la première quinzaine de mars où l'espèce est notée dans des lieux où elle n'est pas connue comme hivernante. On assiste simultanément au départ des hivernants, en particulier à St-Marc où, de 40-50 pendant tout l'hiver et jusqu'au 28 fév., l'effectif tombe à 1 chanteur le 13 mars. A cette époque, le chant se généralise (mais 1 chanteur le 31 janv. en Ille-et-Vilaine).

1 donnée hivernale dans les Côtes-du-Nord : 1 ind. le 8 déc. à Ste-Anne-Trégastel.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*), 4 le 20 nov. à Ste-Anne-d'Auray (56);
1 le 1 fév. au Conquet (29N); 2 à Keranflech/Milizac (29N) le 20 fév.; 1 couple dont le ♂ chante à Plouguin (29N) le 25 fév. et deux chanteurs le même jour en forêt du Cranou (29S). Dans le Morbihan, le premier chant est entendu le 12 mars à Ste-Anne-d'Auray.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*), hivernants notés partout. Chant le 3 mars à St-Marc/Brest. Parades le 13 mars au bord de l'étang de Kerhuon (29N).

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*), notée tout l'hiver ici et là par bandes de 4 à 20 ind. dans le Finistère. Peu d'observations dans le Morbihan : 2 à Brec'h le 1 mars, 1 couple installé à Ste-Anne-d'Auray le 14 mars. En Ille-et-Vilaine, 1 ind à l'étang du Boulet/Feins le 9 mars. Un couple construit le 8 mars au Faouet (56).

MESANGE NOIRE (*Parus ater*), 1 le 20 fév. à Keranflech/Milizac (29N), 2 ou 3 notées en forêt du Cranou (29S) le 25 fév.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*), 1 chant le 25 janv. sur les bords de l'Elorn.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*), 1 chanteur entre Raguenez et Trevignon/Tregunc (29S) le 8 déc. 1 ind. dans un groupe de Pinsons et de Linottes le 16 fév. à Goulven (29N). 1 chanteur à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 9 mars.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*), de petites bandes de 4 à 40 ind. sont observées dans le Finistère et le Morbihan jusqu'à fin-février puis, très occasionnellement, début-mars : 10 à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) le 8 mars. Les couples se forment vers cette époque et le chant devient de plus en plus fréquent.

Une ponte de 5 oeufs très précoce est trouvée le 8 mars à Bertheaume/Plougonvelin (29N).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirulus*), assez nombreuses observations durant cette période, tant dans le Finistère que dans le Morbihan : retenons simplement une bande de 10 ind. près du Loc'h/Guidel (56) le 1 janv.

Premier chant le 22 fév. à Kerhuon (29N). Début-mars, l'espèce est notée assez fréquemment et dans des lieux inusités : 1 ♂ chanteur sur les pelouses de la Faculté des Sciences de Brest les 4 et 5 mars, 1 ♂ dans un jardin de Brest le 4 mars, 1 ♂ dans les dunes de Goulven (29N)

le 2 mars, 1 à l'Aber/Crozon (29S) le 1 mars, 1 sur les prés salés de l'anse du Kernic/Plouescat (29N) le 26 fév. (indices de passage ?).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*), il n'est pas possible, même avec les données des sec-teurs-témoins de St-Renan (29N) et du parc de Ste-Anne-d'Auray (56) d'établir un schéma précis des mouvements de cette espèce dans la période considérée. On peut tout au plus affirmer que les effectifs, stables jusqu'au 15 fév., augmentent ensuite jusqu'au 15 mars, date à laquelle des couples nicheurs de ces secteurs sont cantonnés. Simultanément, l'arrivée de l'espèce est notée dans des lieux où elle n'hiverné pas : 2 ♀♀ et 2 ♂♂ dont 1 chanteur au Curnic/Guissény (29N), 1 chanteur à Goulven (29N) le 26 fév.

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*), après le gros passage d'octobre-début-novembre, on note encore 20 ind à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 17 nov. Il en est revu 3 au même endroit en janvier. A Goulven (29N), 48 ind. sont toujours là le 30 nov. et 19 le 1 déc.

Au cours de l'hiver, quelques individus sont observés en plusieurs localités : Keremma/Treflez (29N), Lampaul-Ploudalmézeau, Kernic/Plouescat (29N). Relevons par ailleurs : 25 à Trenvel/Treogat (29S) le 17 nov. 15 à Meaban/Locmariaquer (56) le 11 déc., 30 dans l'embouchure du ruisseau de Poulbé/Erdeven (56) le 2 mars (18 ♂♂ et 12 ♀♀).

BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*), 1 ♂ et 1 ♀ le 6 mars sur les prés salés de l'anse du Kernic/Plouescat (29N).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*), augmentation très nette des effectifs dans la deuxième quinzaine de décembre à St-Renan (29N) : 1000-1200 le 26 déc. contre 300-400 le 12 déc. et seulement 100 le 12 janv. A St-Marc/Brest, autre secteur-témoin pour l'hivernage de cet oiseau, l'occupation s'est faite à partir de fin-novembre : 1400-1500 le 28 nov. et le 28 déc.

Le départ s'effectue à partir du 15 fév. Premiers chants le 8 fév. à Rennes (35) et le 4 mars à Ste-Anne-d'Auray (56).

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*), 200 à 300 sur les maïs du Kornigell/Quimper (29S) le 1 déc. contre seulement 10 le 15 déc. au même endroit. 4 aux environs de Noyal-Pontivy (56) le 3 janv. 3 à Goulven (29N) le 16 fév. et 1 à St-Marc/Brest le 20 fév.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*), hivernage régulier par petites bandes en Ille-et-Vilaine. Ces oiseaux

sont concentrés le long de la Vilaine et de ses affluents, particulièrement le long du Canut de Vitré à Redon. Par ailleurs : 55 le 28 nov. à St-Marc/Brest, 3 à Port-Manech (29S) le 8 déc. et 1 à l'Ile Grande (22) le même jour, 1 au vol au Loc'h/Guidel (56) le 26 janv.

SERIN CINI (*Serinus serinus*), hivernant "banal" en Ille-et-Vilaine.

Quelques observations dans le Morbihan :
3 à Vannes le 30 janv., 1 au même endroit le 3 fév., puis 1 chanteur le 16 fév. et 6 le 4 mars toujours à Vannes; à l'Ile-aux-Moines, 3 ind dont 1 chanteur le 9 mars. Seule observation pour le Finistère, 2 chanteurs le 28 fév. à St-Marc/Brest.

SIZERIN FLAMME (*Carduelis flammea*), 1 ind. dans une bande de 32 Tarins le 29 déc. à Cesson (35).

BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*), 2 ♂♂ sur les prés salés du Conquet ((29N) (à proximité de pins) le 26 janv.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*), 4 ou 5 à St-Marc/Brest le 28 nov.,
1 à Kercavez/Larmor-Plage (56) le 27 déc., 3-4 à Goulven (29N) le 1 janv., 40 à St-Renan (29N) le 12 janv., 50 minimum près de Kerlouan (29N) le 6 fév., 1 à Vannes le 6 mars.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*), retenons seulement que dans le Morbihan, trois dortoirs ont été repérés : un à Ste-Anne-d'Auray, un à Reguigny (non dénombrés) et un à Bel-le-Ile (150 ind. environ).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*), parades nuptiales dès la mi-décembre.
Certains couples construisent vers la mi-janvier; les premières pontes sont déposées fin-février (observation constante d'une vingtaine de couples).

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*), 1 ind. très peu farouche le 16 nov. en presqu'île St-Laurent/Porspoder (29N).

+++++

Depuis la parution du dernier fascicule d'AR VRAN, nous avons reçu les données de deux nouveaux observateurs (MM. BOISSEL (29N) et DUPONT J.-L. (44)). Nous les avons utilisées dans les présentes actualités.