

BIBLIOGRAPHIE ORNITHOLOGIQUE BRETONNE

VOISIN, C., 1968.- Les Bernaches (*Branta b. bernicla*) du Golfe du Morbihan. *L'Oiseau et RFO*, 38 : 151-174 & 225-248.

Article de près de 50 pages qui vise à faire le point sur la biologie et le comportement des Bernaches cravant sur un de leurs principaux lieux d'hivernage.

Ayant passé l'hiver 1964-1965 à la Station de Biologie marine de l'île Bailleron (golfe du Morbihan) au moment même où l'auteur menait son travail de terrain, nous avons eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises et de constater qu'elle ne ménageait pas sa peine. Mais si la somme de travail et d'observations effectuées est importante, on ne peut pas dire que la publication qui en résulte en soit un reflet fidèle : l'ensemble reste anecdotique, confus, sans idées directrices et sans conclusions sérieuses.

Plus grave, des chapitres entiers sont dépourvus de tout lien apparent avec le reste de l'article. Nous pensons en particulier au passage qui concerne les Zostères et qui eût pu être très intéressant lorsque l'on sait la place importante qu'occupe cette plante dans le régime hivernal de *Branta bernicla* : on recherchera en vain la moindre corrélation entre le paragraphe que leur consacre l'auteur et les Bernaches. Quant aux chiffres, d'ailleurs très contestables, qui sont fournis sous le titre "Importance des Zostères dans le Golfe", l'auteur n'en tire aucune conclusion.

Et ainsi de suite... si bien qu'au terme des cinquante pages, après nous être perdus dans une foule de détails, nous n'avons rien appris de neuf sur le sujet.

Regrettons que l'exploitation des données ne soit pas à la mesure de l'effort fourni sur le terrain.

J.-Y. M.

VIELLARD, J., 1968.- *Streptopelia decaocto* (Frivalsky) à Pornic. *Alauda*, 36 : 123.

L'auteur relate en 13 lignes l'observation d'une Tourterelle turque à Pornic (44) en septembre 1965. Disons simplement qu'une publication plus spontanée de cette donnée eût fourni un meilleur jalon

Y. G.

KOWALSKY, S., 1968.- Evolution dans la population de l'avifaune de l'île Dumet. *Alauda*, 36 : 126-127.

Note de 35 lignes où l'auteur fait état des fluctuations d'effectifs des colonies de Laridae de l'île Dumet (44) depuis 1962.

Le schéma est assez classique : forte augmentation de la population de Goélands argentés; installation en 1963 puis augmentation rapide du Goéland brun. Les Sternes (*S. hirundo*, *dougallii* et *sandvicensis*) ne semblent pas encore régresser devant cette invasion encore modeste puisque Goélands argentés et Goélands bruns ne totalisent que 400 couples en 1967.

Y. G.

BURNIER, J., E. & F., 1969.- Observations de juillet à Belle-Ile-en-mer. *Alauda*, 37 : 1-14.

Article de 14 pages où les auteurs ont rassemblé les observations qu'ils ont recueilli sur la grande île morbihannaise au cours des mois de juillet de huit années étalées de 1952 à 1961.

Pas de sélection d'espèces, "tout y est" du Moineau domestique au Milan noir égaré. Les données brutes s'ajoutent aux petites synthèses, sans fioritures ni extrapolations. Cet article constitue donc une très bonne base de référence pour l'avifaune de l'île. Outre les espèces nicheuses toujours observables à cette époque et dont la liste est à peu près complète, les premiers migrateurs sont également notés, communs ou exceptionnels. Autre point intéressant, les auteurs fournissent de bons renseignements sur l'évolution de populations aussi précieuses que celles du Busard cendré et de la Mouette tridactyle. Nous notons aussi que cet article confirme les données antérieures sur l'absence du Bruant jaune remplacé ici par le Bruant zizi. Bien sûr, la liste des migrateurs est largement extensible (voir à ce sujet l'article de MOREAU, *Alauda* 1949...); quant aux oiseaux nicheurs, il ne reste qu'à en préciser le statut et à confirmer, ou rechercher, quelques nidifications.

Voici un grand pas de fait dans la connaissance d'une avifaune sur laquelle rien de bien systématique n'avait encore été publié.

Y. G.

DE BRICHAMBAUT, J., 1969.- Hibernation d'Avocettes dans la région de Saint-Nazaire. *Alauda*, 37 : 80.

C'est d'hivernage qu'il s'agit ici bien entendu. Se basant sur deux observations, l'une personnelle (dont il a perdu l'année exacte) l'autre d'un chasseur, l'auteur pense qu'un groupe d'Avocettes hiverne dans l'embouchure de la Loire, tout près de Saint-Nazaire (44). Le groupe en question pourrait être important puisque en mars 1964 (?) il y avait là plusieurs centaines d'oiseaux. Mais avant de pouvoir parler d'hivernage il eût quand-même fallu réunir plus d'une donnée par hiver... (15 lignes).

J.-Y. M.

DE BRICHAMBAUT, J., 1969.- Nidification de la Barge à queue noire et présence d'Aigrettes garzettes en baie d'Audierne. *Alauda*, 37 : 80-81.

Note de 38 lignes où l'auteur relate une visite qu'il a faite aux marais de la baie d'Audierne (29S) le 8 juillet 1968. Nous y relevons entre autres :

"Un couple de Barges à queue noire alarmait... Ce comportement permet de supposer la nidification..." Rappelons qu'AR VRAN (I,3 : septembre 1968) a consacré un article à la nidification de cette espèce et précisément dans les marais qu'a visités Monsieur DE BRICHAMBAUT. On peut donc s'étonner que ce dernier n'ait pas eu connaissance de cette référence et, surtout, ne se soit pas adressé aux ornithologues bretons (dont les observations sur ces lieux lui étaient connues par la lecture des deux premiers fascicules d'AR VRAN) afin de leur faire part de ses observations et, éventuellement, de confirmer ses présomptions. Rappelons encore qu'à la même époque c'étaient 4 ou 5 couples de Barges (et non un seul) qui étaient présents à Trenvel même.

"La Faune ornithologique était composée aussi de Vanneaux très nombreux et nidificateurs... (une coquille d'oeuf identifiée) "...

! Nous reconnaissons là l'oeil du maître oologiste, mais la nidification du Vanneau huppé est régulière en baie d'Audierne et connue comme telle depuis bien longtemps, plusieurs articles en font foi.

De plus, il faut beaucoup de bonne volonté pour n'observer qu'un seul Gravelot à collier interrompu et aucun Petit Gravelot à Trenvel où, en juillet, les deux espèces nichent encore et sont alors particulièrement abondantes et évidentes en raison de la présence de nombreux juvéniles.

Passons sur l'énumération d'espèces qui flanque ces exemples : elle ne traduit aucunement la véritable richesse ornithologique de l'endroit et, de toute manière, n'a rien à faire dans ALAUDA. Disons-le tout net : il est grand temps que les ornithologues dits sérieux cessent de publier ce type de notes-poubelles qui présentent une avifaune déplacée de son contexte (dans le temps et l'espace), et ceci dans leur propre intérêt, celui de la réputation de nos revues internationales et pour le plus grand bien de l'ornithologie régionale.

J.-Y. M.

DE BRICHAMBAUT, J., 1969.- Tourterelle turque à Beg Meil 1967. *Alauda*, 37 : 81.

Notule de 9 lignes quelque peu dépassée où l'auteur fait part de sa rencontre avec la Tourterelle turque à Beg Meil/Fouesnant (29S) en 1967 et 1968 alors qu'il ne l'y avait pas vue en 1964.

J.-Y. M.

ATELIER OFFSET DE LA FACULTE DES SCIENCES DE BREST - 3ème TRIMESTRE 1969

