

Ar Vran, 1970, III (2).

QUINZE ANS DE BAGUAGE A OUESSANT

Introduction

par Pierre NICOLAU-GUILLAUMET

En 1955, sur l'initiative de Michel-Hervé JULIEN, se tenaient à l'île d'Ouessant les premiers camps de baguage d'oiseaux dont le succès allait très rapidement dépasser toute espérance. Le Centre de Recherches sur les Migrations des Mammifères et des Oiseaux, le Cercle naturaliste du Finistère et le Groupe des Jeunes Ornithologistes s'étaient associés pour apporter leur concours à cette entreprise et permettre d'assurer son existence dans les années suivantes. Pour la première fois en France, des ornithologues allaient se rassembler régulièrement chaque automne pour étudier le déroulement de la migration postnuptiale des oiseaux dans un lieu privilégié.

Nous ne nous étendrons pas sur les modalités du travail effectué ; le lecteur aura le loisir d'en connaître tous les détails en consultant les articles cités dans la bibliographie, en fin d'article. Depuis le début, les méthodes utilisées n'ont guère changé. L'observation de la migration visible tient une place importante, mais la capture et le baguage systématique des oiseaux sédentaires ou migrateurs gardent encore aujourd'hui la part prépondérante dans le travail des camps. Les dates choisies ne permettant pratiquement plus le baguage de poussins au nid ou de jeunes non-volants, les captures s'effectuent essentiellement à l'aide de filets verticaux, accessoirement de nasses en grillage. Des veilles sur la galerie au pied de la lanterne du phare de Creac'h apportent un heureux complément tant sur le plan de la capture que sur celui de l'observation des migrateurs nocturnes.

Jusqu'à 1966, les moyens matériels disponibles ne permettaient guère aux participants que de marquer les oiseaux capturés. Toutefois, grâce aux scores réalisés, beaucoup de reprises particulièrement dignes d'intérêt ont été obtenues et de très nombreux contrôles sur place ont été portés sur fiches.

En 1967, la responsabilité des stages nous a été confiée et nous avions au même moment le plaisir de nous voir attribuer un "minibus Volkswagen" aménagé en laboratoire dont l'arrivée sur l'île permettait d'enblée de modifier l'esprit et le travail des camps : tous les oiseaux capturés pouvaient désormais être examinés par deux spécialistes au moins, être mesurés par une seule et même personne.

Dans une première partie, nous publions les données brutes de baguage des années 1955 à 1969, sous forme de tableaux. Initialement, nous n'avions l'intention d'y faire figurer que les résultats des camps automnaux. En fait, pour les années 1959 à 1963, nous n'avons pu obtenir que les totaux obtenus pendant toute l'année sur Ouessant et dans l'archipel de Molène.

La seconde partie de l'article, à paraître dans un prochain fascicule d'Ar Vran, sera consacrée à l'exploitation des résultats, espèce par espèce.

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	TOTAL
Grèbe castagneux (<i>Podiceps nigricollis</i>)											1					1
*Pétrel tempête (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	2			1	53	33	4	3	1	3		2	1		2	105
*Pétrel oû blanc (<i>Oceanodroma leucorhoa</i>)				1		1	1							1		4
Puffin des Anglais (<i>Puffinus puffinus</i>)					8	5	1	4	6		1	7				27
*Puffin majeur (<i>Puffinus gravis</i>)											1					1
*Puffin fuligineux (<i>Puffinus griseus</i>)	1			1												2
Fou de Bassan (<i>Sula bassana</i>)																2
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)			1	1							1					3
Cormoran huppé (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)					10			1							1	18
Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>)								1								1
Casard siffleur (<i>Anas penelope</i>)												1				1
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)										1						1
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)								1								1
Bondrée apivore (<i>Fernis apivora</i>)											1					1
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)						1										1
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)				1				2							2	8
Canille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)						3										3
Râle d'eau (<i>Rallus aquatilis</i>)	3		2	8	33	18	35	13	9	22	11	26	14	19	5	218
Marouette ponctuée (<i>Parus parus</i>)								2				2	2			6
Râle de genêts (<i>Crocyz oryx</i>)		1			2			1								4
Poule d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>)													1	1	13	15
Huîtrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>)					24	4	1		1	1						31
Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)								34								34
Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>)							1	4								5
Pluvier fauve (<i>Pluvialis dominica</i>)												1				1
Grand Gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>)	9	5	12	12		5	3	8	2	8	3		4	7	10	88
Gravelot à collier interrompu (<i>Charadrius alexandrinus</i>)						2										2
*Pluvier guignard (<i>Charadrius morinellus</i>)						3		2								6
Tournepierre à collier (<i>Arenaria interpres</i>)	30	24	41	33		7	3	22	19	48	10	37	24	1	7	305
Bécassine des marais (<i>Capella gallinago</i>)			1	1	8	44	46	21	21	1	4	6	6	3	5	167
*Bécassine sourde (<i>Lymnecryptes minor</i>)						1	1	5	5							12
Bécasse des bois (<i>Scolopax rusticola</i>)								1	2							3
Courlis cendré (<i>Nemotus arquata</i>)											1		1			2
Courlis corlieu (<i>Nemotus phaeopus</i>)				2	5			2	1	3	2		1		1	17
Berge rousse (<i>Limosa lapponica</i>)										1		11		3		15
Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>)					1											1
Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)	3		1	2						1	4	10	1		3	25
Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)											3			1		4
Chevalier oû blanc (<i>Tringa ochropus</i>)				1				1			3					5
Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)							1									1
Chevalier guigette (<i>Tringa hypoleucos</i>)	17	3	15	17	7	2	1	3	10	17	8	6	2			108
*Chevalier solitaire (<i>Tringa solitaria</i>)							1								1	2
Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>)	3	5	1	2	2	3		4	6	1	6	1	2	2		40
Bécasseau minute (<i>Calidris minuta</i>)	2					1				1						4
*Bécasseau tacheté (<i>Calidris melanotos</i>)					1						1					2
Bécasseau violet (<i>Calidris maritima</i>)			1													1
Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)		45	18	24	6	11	12	2	11	17	4	18	9	4	2	103
Bécasseau cocorli (<i>Calidris ferruginea</i>)		3			3					1		1				8
Bécasseau sanderling (<i>Calidris alba</i>)	2	1	2	2	4		2	1			2		2	4		22
*Bécasseau roussel (<i>Tryngites subruficollis</i>)			1													2
combattant (<i>Philomachus macrurus</i>)							1					1		1		3

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	TOTAL
→ Phalarope à bec large (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	1		4			17	11		1			2				36
→ Labbe parasite (<i>Stercorarius parasiticus</i>)		1								1						2
Goéland marin (<i>Larus marinus</i>)		1			11	2			1							15
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	11	4			150	75	2		1							243
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	1	1			457	158		1		1	1	1	2	1	1	625
Gulfette noire (<i>Calidarius niger</i>)												4				4
Sterne pierregarin (<i>Sterna hiemalis</i>)					36	16		1			1		2	2		58
→ Sterne arctique (<i>Sterna paradisaea</i>)					20	4										24
→ Sterne de Dougall (<i>Sterna dougallii</i>)					76	19										95
Sterne naine (<i>Sterna albifrons</i>)						1										1
Sterne saugek (<i>Sterna sandvicensis</i>)					38	37										75
Pinguin torda (<i>Alca torda</i>)						1										1
Guillemot de Troil (<i>Uria aegle</i>)						2										2
Mecareux moine (<i>Pratensis arctica</i>)					13	7			1							21
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)						1										1
Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)		4		10	6	18	33	9	24	8	3	7	2	6	5	135
Tourterelle turque (<i>Streptopelia decaocto</i>)															1	1
Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)				2	2	4		4	4		1				1	18
→ Hibou des marais (<i>Bubo flammeus</i>)									1							1
→ Hibou petit-duc (<i>Otus scops</i>)												1	1			2
Chouette hulotte (<i>Strix aluco</i>)								1								1
Chouette effraie (<i>Tyto alba</i>)								1								1
Engoulevent d'Europe (<i>Caprimulgus europaeus</i>)			1		1	2		1	1	1		1				8
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)		1				1		1								3
Martin-pêcheur (<i>Alcedo atthis</i>)	1	1	5	7	25	26	45	26		5	17	6	20	12	33	229
Huppe d'Europe (<i>Upupa epops</i>)			2	1		1	1			1		1			1	6
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)			2						1	1			1			5
Troscart tourmiller (<i>Syns torquilla</i>)				8		1	10	3	5	1	1	2	1	2		34
→ Alouette calandrelle (<i>Calandrella brachydactyla</i>)				1												1
Alouette des champs (<i>Alouetta arvensis</i>)	2		1	1	1			15	4	1		1		4		30
Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>)			3	1	3	3	9	5	1	2	5	10	3	6	3	54
Hirondelle de cheminée (<i>Hirundo rustica</i>)	5		76	71	91	84	230	323	294	102	63	132	76	84	82	1518
Hirondelle de fenêtre (<i>Delichon urbica</i>)					1	1	1			2	4	11		3	4	27
→ Pipit de Richard (<i>Anthus novaeseelandica</i>)													1			1
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	1	3	15	37	19	34	89	53	65	37	7	22	6	23	12	417
Pipit farlouze (<i>Anthus pratensis</i>)	38		38	85	208	125	315	222	109	49	73	85	82	42	33	1483
Pipit maritime (<i>Anthus spinoletta petrosus</i>)	5	37	53	34	72	46	30	80	51	98	52	55	32	4	20	649
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	6	44	43	155	70	33	145	27	73	82	28	39	4	77	14	834
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)		1	3	4	1	14	9	5	4			3	5	4		53
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	2	24	27	86	30	47	73	81	51	48	12	18	10	19	4	544
Pie-grièche écorcheur (<i>Lanius collurio</i>)			2	2	7	1	6			1		2				21
→ Pie-grièche à tête rousse (<i>Lanius senator</i>)				3	7		3								1	9
Troglodyte (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	1	5	10	15	25	18	53	63	67	39	17	53	118	115	122	721
Accesteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	15	4	45	50	99	78	151	97	104	99	49	87	57	63	81	1079
Traquet tairier (<i>Saxicola rubetra</i>)	4	4	3	65	101	46	99	47	22	68	3	28	51	56	74	673
Traquet pâtre (<i>Saxicola torquata</i>)	9	6	10	39	108	130	279	95	21	48	18	17	13	28	4	826
Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	10	5	9	34	19	34	46	52	59	6	14	11	10	18	27	354
Rougequeue noir (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)				2		2	2	1	1		1					9
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	1	1	5	15	11	30	38	29	49	13	6	21	19	19	11	268
Rougegorge (<i>Erithacus rubecula</i>)	4	7	153	117	114	405	340	229	213	166	129	220	140	166	197	2600
Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)		1	8	12	5	9	11	20	5	7	2	9	3	3	11	106

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	TOTAL
• Gorgebleue (<i>Luscinia svecica</i>)		2	4	4	1	7	9	6	13	6	2	6	6	7	9	82
Grive litorale (<i>Turdus pilaris</i>)						1	3	4	4							12
Merle à plastron (<i>Turdus torquatus</i>)					1	2	3	2	2	1	1			1		13
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	20	36	76	147	248	210	425	284	280	206	147	240	121	127	190	2732
Grive mauve (<i>Turdus iliacus</i>)						34	30	67	166							292
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	6	7	33	66	164	144	282	240	143	98	94	174	70	115	97	1733
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)								1								1
Locustelle luscinioïde (<i>Locustella tusculeoides</i>)		1			3	1			1							6
Locustelle fluviale (<i>Locustella fluviatilis</i>)								1								1
Locustelle tachetée (<i>Locustella naevia</i>)	1	2			1	4	1	2	2			2		6	7	28
Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	10	33	62	236	145	102	336	154	342	138	105	85	251	265	120	2384
• Phragmite aquatique (<i>Acrocephalus paludicola</i>)		1		1	1		3	2	2	1			2	1	1	15
Bousserolle verderolle (<i>Acrocephalus palustris</i>)							5	2		1		4				12
Bousserolle effarvée (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	5	8	68	28	27	96	58	64	28	4	43	20	63	24		536
Bousserolle turdoïde (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)					2											2
• Hypolaïs icterine (<i>Hippolaïs icterina</i>)				1	2	7	6	8		3		6	1	2		37
Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolaïs polyglotta</i>)			2	6	8	2	23	12	1	7		6	1	5	4	74
• Fauvette éperlière (<i>Sylvia nisoria</i>)							1	1	1	1				1		5
• Fauvette orphée (<i>Sylvia hortensis</i>)						1		1								2
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	1	5	33	97	57	105	103	69	241	77	17	93	41	120	69	1128
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)			4	2	6	24	46	25	25	3		3	17	3		167
Fauvette babillarde (<i>Sylvia curvica</i>)									1				1	1	2	5
Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)	12	30	43	92	205	94	177	139	167	28	43	85	97	213	21	1446
Fauvette pitchou (<i>Sylvia undata</i>)								1	1						1	5
Fauvette passerinette (<i>Sylvia cantillana</i>)													1			1
Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		7	22	57	90	84	98	123	99	64	22	57	106	300	274	1253
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	2	2	25	9	57	70	104	100	78	20	6	37	18	41	31	600
Pouillot de Bonelli (<i>Phylloscopus bonelli</i>)					1		4	1	1						1	8
Pouillot siffleur (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)		1	1		2	1		2	7	2		2		6	3	27
Roitelet huppé (<i>Regulus regulus</i>)			4		1	5	12	38				1	5			66
Roitelet triple-bandeau (<i>Regulus ignicapillus</i>)			2		4	25	4	13	1	1	9	1	1			61
Gobemouche noir (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	17	37	92	200	207	276	905	951	312	403	66	298	222	374	114	4459
• Gobemouche nain (<i>Ficedula parva</i>)					1		4			1		1		2		9
• Gobemouche gris (<i>Monticola striata</i>)	2	9	45	104	100	76	164	106	166	62	89	100	82	142	246	1493
Mésange à longue queue (<i>Agithales caudata</i>)						5										5
• Mésange rémiz (<i>Remia pendulinus</i>)									3							3
Mésange noire (<i>Parus ater</i>)						1	2									3
Mésange bleue (<i>Parus caeruleus</i>)			56			2	16	3	28			1				106
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)			2	1	2	2	5		11			8	11	14		67
Crimpeveau des jardins (<i>Certhia brachyotyla</i>)						3										3
Bruant proyer (<i>Emberiza calandra</i>)				4	3		4	4	4	2	1	1				23
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	42	3	40	93	115	88	136	93	80	38	20	16	7	11	13	795
Bruant zizi (<i>Emberiza ciris</i>)				1			2									3
Bruant ortolan (<i>Emberiza hortulana</i>)				1	1		2	2						2	2	10
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)						4	4	14	8							30
• Bruant à tête rousse (<i>Emberiza bruniceps</i>)									1						1	2
• Bruant léon (<i>Calcarius lapponicus</i>)									1							2
• Sylvette des ruisseaux (<i>Seturus noveboracensis</i>)	1													1		1
• Sylvette flamboyante (<i>Setophaga ruticilla</i>)							1									1
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)						15	4	112	33							164

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	TOTAL
Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>)					1			4								5
Verdier (<i>Carduelis chloris</i>)			2		2	9	7	7	4							31
Chardonneret (<i>Carduelis carduelis</i>)						4	8	4			2	3	2	5	51	79
Tarin des saules (<i>Carduelis spinus</i>)			3				1	3								7
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	164	31	50	186	262	121	405	210	180	59	542	103	58	141	77	2569
Beccroisé des sapins (<i>Larix curvirostris</i>)					3			1				2				6
Roselin creusois (<i>Carpodacus erythrinus</i>)							1									1
Bouvreuil pivote (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)		1	7	11	28	82	123	56	77	58	53	82	76	70	128	852
Gros-bec (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)												1				1
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	43	52	95	25	40	15	34	31	208	73	155	36				807
Stourneau sansonnet (<i>Sturna vulgaris</i>)					4	3	15	77	16	4	1	22	2	33	17	194
Loriot d'Europe (<i>Oriolus oriolus</i>)						2										2
Nombre d'espèces capturées	35	49	57	65	86	93	86	93	81	71	62	75	64	66	63	
Total annuel des captures	446	494	1290	2391	3849	3343	5760	4463	4084	2370	1971	2512	1921	2785	2231	39910