

REMARQUES A PROPOS DE L'OBSERVATION ESTIVALE
DE MOUETTES PYGMEES (*LARUS MINUTUS*) IMMATURES
SUR LE LITTORAL DU FINISTERE

par Lucien KERAUTRET

Depuis 5 ans nous passons régulièrement le mois de juillet sur le littoral du Nord-Finistère et nous y avons rencontré à 2 reprises une Mouette pygmée immature.

- le 27 juillet 1969, un individu est posé parmi d'autres laridés sur le sable de la baie de Kernic/Plouescat. A notre approche, il s'envole et disparaît.

- le 17 juillet 1971, un individu est remarqué en vol à l'embouchure d'un ruisseau, au lieu-dit Port-Neuf en Sibiril. Il se pose quelques instants, reprend son vol puis quitte les lieux.

Nous avons trouvé dans la littérature récente deux autres observations d'immatures de cette espèce, en juillet, sur le littoral Nord du Finistère.

- le 10 juillet 1960, J.J. Guillou et J.P. L'Hardy observent un individu à l'étang de Curnic/Guissény. (Oiseaux de France n°30, p40).

- le 5 juillet 1968, un exemplaire est noté à Curnic/Guissény (faisant suite à des observations les 5 et 13 juin au même lieu) (Ar Vran 1968 n°4).

On peut donc considérer cette espèce comme pratiquement régulière en juillet en Bretagne.

La seconde remarque concerne le plumage. En effet les oiseaux observés en juillet ont un plumage qui ne correspond à aucune des figures des guides classiques. Il s'agit d'oiseaux âgés d'un an, donc des immatures, et en mue. Leur aspect est déconcertant, et peut conduire un observateur sur la pente dangereuse de la recherche de l'Oiseau rare ou l'amener à abandonner la détermination.


Si l'oiseau observé par Guillou et L'Hardy possédait encore les deux rectrices externes tachées de noir à l'extrémité, les deux individus que nous avons vus avaient la queue entièrement blanche. Celui du 17 juillet 71, vu de près et longuement, avait des rectrices de diverses longueurs donnant à la queue un aspect échancré. Le dessous sombre des

ailes, qui caractérise bien les adultes, a un aspect variable aussi et les deux individus que nous avons vus étaient différents à cet égard. De même, la tête est diversement marquée de noir.

Nous voulons profiter de cette note pour souligner la nécessité d'employer correctement les termes juvénile et immature en été et en automne.

Dans AR VRAN tome III (1970) n°1, nous relevons deux observations de juvéniles les 19 août et 11 septembre 1969. Là, le terme juvénile paraît correctement employé, c'est à dire désigne des individus nés au printemps 1969. Par contre lorsque nous lisons dans AR VRAN 1968 tome III n°1 plusieurs observations d'immatures du 17 août au 19 septembre, nous pensons qu'il s'agit en réalité de juvéniles dans la majorité des cas.

Le même genre de remarque pourrait être fait au sujet des Busards par exemple, mais cela nous entraînerait trop loin ...



KERNIC / PLOUESCAT
27-7-69



SIBIRIL
17-7-71

Mouettes Pygmées immatures en plumage de mue.