

**SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
BRETONNES
ENTRE LES 16/07/1986 ET 15/07/1988**

Par Guillaume GELINAUD

0006

De juillet 86 à juillet 88, la Centrale Ornithologique Bretonne a connu une nouvelle crise de fonctionnement. Les observations se sont poursuivies mais leur publication s'est trouvée très réduite (bulletins de liaison) ou a emprunté d'autres réseaux à couverture spatio-temporelle plus restreinte (groupe départementaux, réseau des réserves de la S.E.P.N.B. enquêtes B.I.R.O.E....). Il nous a donc semblé important de réunir cette masse d'observations pour fournir un témoignage plus global de la situation de l'avifaune au cours de cette période en Bretagne.

Nous avons tenté de rassembler le maximum d'informations publiées (cf. Bibliographie) mais cela reste malheureusement incomplet. En effet, certains articles ont pu nous échapper. A ce jour, la synthèse du recensement des Anatidés en janvier 87 n'a toujours pas été diffusée, les actualités ornithologiques concernant l'Ille et Vilaine s'achèvent fin 87 et celles concernant la Loire-Atlantique en février 88. De plus, pour la période considérée, le Finistère et le Morbihan ne fournissent que des données fragmentaires ; dans ce cas nous avons parfois utilisé des observations inédites (J.P. ANNEZO, J. MAOUT, fichiers des observations de l'Île d'Hoëdic (56)).

La liste des espèces traitées pourra surprendre. Les choix ont, peut-être, été parfois arbitraires et les critiques seront les bienvenues, mais nous avons essayé de traiter en priorité les espèces présentant une modification ou une amélioration de la connaissance que nous avons de leur statut concernant les effectifs, la répartition, les migrations...

Au cours des printemps 87 et 88, un important travail a été réalisé en liaison avec la S.E.P.N.B. : le recensement des oiseaux marins nicheurs de Bretagne. Les résultats feront prochainement l'objet d'une publication détaillée, aussi ne citons nous que les effectifs totaux et les tendances numériques.

Rappel des événements météorologiques majeurs.

- en janvier 87, une sévère vague de froid touche la région, du 10 jusqu'à la fin du mois. En février et mars, les températures demeurent légèrement inférieures à la normale.

- la deuxième quinzaine d'avril est marquée par une situation anticyclonique, très favorable à la migration.

- au contraire, juin subit un temps frais et humide.

- de l'automne 87, nous retiendrons la première quinzaine d'octobre très perturbée, avec un maximum de violence des vents les 15 et 16 lors du passage de l'"ouragan" qui est resté dans toutes les mémoires. Les jours qui suivent, un anticyclone s'installe sur le Nord-Ouest de l'Europe, jusqu'à début novembre.

- malgré deux épisodes plus froids (fin novembre et mi-décembre) l'hiver 87-88 est marqué par l'influence océanique notamment en janvier qui apparaît très venté

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

Deux zones principales d'observations :

- Le Morbraz (56-44) fournit 12 données concernant 1 à 5 individus, réparties entre début octobre et mi-avril.

- la Baie de St-Brieuc où 38-43 Grèbes jougris sont comptés le 8 mars 88 lors d'une sortie en mer.

Ailleurs, 1 le 5 septembre 86 à Sucé (44), 1 le 10 janvier 87 à Tréoupan (29N) 1 le 11 janvier à Béganne (56), 1 le 5 février 87 en rade de Brest (29N), 1 le 8 février en Baie du Mont St-Michel (35), 1 le 22 mars à Erbrée (35) et 1 le 14 septembre à la Chapelle-Erbrée (35) ; 1 le 27 octobre 87 à Tréogat (29S) et 1 le 9 mai 88 à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22).

PETREL FULMAR *Fulmarus glacialis*

152 à 219 couples en Bretagne en 87 et 88.

PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea*

Les observations se font rares et sont réalisées principalement à Ouessant (29N). 2 le 7 août et 1 le 27 septembre 86 ; 4 données pour 7 ind. entre le 23 août et le 23 septembre puis 1 le 20 octobre 87.

Ailleurs, 1 le 2 septembre 86 en Mer Celtique ; 4 le 23 août et 1 le 9 octobre 87 à Hoëdic (56).

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

2 le 23 et 1 le 25 octobre 87 à Ouessant (29N).

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus*

Ouessant (29N) nous donne le cadre général des observations dans la région.

- 1 seule observation au printemps : 1 le 17 juin 87 ;

- passage régulier mais en faible nombre du 6 août au 25 octobre 86 et du 3 août au 22 octobre avec encore 1 le 3 novembre 87.

Pour le reste, les données sont très disparates mais s'intègrent dans ce schéma :

- 2 le 26 août à Erdeven (56), 1 le 14 septembre au large de Fouesnant (29S) et 2 le 26 octobre 86 à Cancale (35) ;

- 2 le 23 et 1 le 26 août, 2 le 30 septembre et 1 le 7 octobre à Hoëdic (56), 3 le 5 septembre à Préfaïles (44) ; 1 le 16 octobre et 1 le 23 octobre 87 à Bréhat (22).

PETIT PUFFIN *Puffinus assimilis*

Cette espèce apparaît maintenant annuellement à Ouessant (29N), au printemps surtout, 1 le 20 mars et 1 le 26 mars 87, puis 1 le 26 septembre 87.

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus*

La population bretonne est estimée à 94-108 couples en 87 et 88 contre 44 en 81. Cette augmentation résulte en partie d'une amélioration des méthodes de prospection.

OCEANITE TEMPETE *Hydrobates pelagicus*

42 données recueillies dont :

- 24 dans le Sud-Est de la région, de l'estuaire Loire (44) à Quiberon (56) qui constitue une importante zone de stationnement à l'automne, de la mi-août à fin octobre. Citons, entre autre, 20+ le 26 août 86 à Quiberon, 128 le 1er septembre 86 entre Noirmoutier (85) et le banc de Guérande (44) ; 100 en septembre 87 à Préfailles (44) ...25 le 4 octobre,... 16 le 7, ; 106 le 8 ... 16 le 16 octobre à Hoëdic (56).

- 13 à Ouessant (29N) où l'espèce apparaît régulièrement à l'automne mais en nombre réduit. 4 observations en 86 entre le 7 août et le 22 octobre, maxi 18 ind. 9 observations en 87 entre le 20 août et le 20 novembre, maxi 3.

Ailleurs, les rares observations sont réalisées principalement à l'occasion de l'ouragan les 15 et 16 octobre 87 : 1 à Bréhat (22) et 3 en rade de Brest (29N) le 16 ; 1 le 21 en Baie de St-Brieuc (22) ; 1 le 1er juin 88 à St-Mathieu (29N). En 87 et 88, la population nicheuse bretonne est estimée à 238-251 couples, toujours pour l'essentiel dans l'archipel de Molène (29N). L'Ile de Keller/Ouessant (29N), non recensée, semble pourtant accueillir une importante population.

OCEANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa*

Seulement deux observations à l'automne 86 : 1 le 24 août au large de Quiberon (56) et 1 le 22 octobre à Ouessant (29N). L'automne et l'hiver 87-88, plus venteux s'avèrent plus propices aux observations : 1 le 16 août à Montoir (44) ; 1 les 24 septembre et 21 octobre à Ouessant ; 1 les 16 et 17 octobre en rade de Brest (29N) et en janvier 1 cadavre découvert le 13 à l'étang de Chatillon en Vendelais (35) à plus de 50 km du littoral ! et 1 cadavre à St-Herblain (44), ce pétrel ayant été bagué dans le New Brunswick, au Canada.

OCEANITE DE CASTRO *Oceanodroma castro*

1 le 15 octobre 87 à Hoëdic (56), 1ère observation bretonne de cette espèce dont les plus proches points de nidification sont Madère et les Iles Canaries

FOU DE BASSAN *Sula bassana*

6 000 à 6 100 couples aux Sept-Iles/Perros Guirec (22) en 87-88.

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

L'augmentation des effectifs nicheurs se poursuit : 393 couples en 87-88 (195 en 81) de plus on signale 2 nouveaux sites de nidification dans les Côtes d'Armor en 88 : 1 nid au Grand Mez de Goëlo/Paimpol (22) et 1 nid au Héaux de Bréhat

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total
Nombre de couples	290	54	29	00	20	393

CORMORAN HUPPE *Phalacrocorax aristotelis*

3 710 à 3 820 couples en Bretagne en 87-88 donc toujours à la hausse (2 649 en 81).

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*

Au moins 15 données dont 8 sont liées à la vague de froid de janvier 87 qui donne lieu à des regroupements et à des observations dans des sites inhabituels jusqu'à la mi-mars. En particulier retenons : 1 le 18 janvier à Guérande (44) ; 1 le 19 à Trébeurden (22) ; 1 le 1er février au marais de Goulaine (44) ; 1 le 14 février au Relecq-Kerhuon (29N) ; 5 le 21 à Tréogat (29S) ; 1 le 5 mars à Ploermel (56) ; 1 le 14 mars à Locoal-Mendon (56). Durant le printemps 87, 2 chanteurs à Trenvel/Tréogat (29S) ; 1 chanteur à Kervran/Plouhnec (56) et 1 chanteur en Brière (44). Maximum de 3 le 18 janvier 88 à Tréogat et 1 le 14 février à Clegreuc (44).

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*

1 le 10 mai 87 à Ouessant (29N) ; 1 pendant la majeure partie de ce mois à Belle-Ile (56) ; 1 le 27 mai puis 1 femelle capturée le 31 août 87 à Trenvel Tréogat (29N). La reproduction est observée dans le Nord de l'Ille et Vilaine en 87 : 1 couple avec 2 juv. le 1er juillet à Pleurtuit (35).

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*

1 le 29 et 30 octobre 86 à Ouessant (29N) ; 1 observation très précoce dès le 4 mars 87 à Tréogat (29S) et 1 le 24 avril à Gosné (35). Peut-être un nouveau site de nidification en Loire Atlantique : 2 du 24 mai au 12 août à Clisson et 11 imm. le 3 août sur la commune voisine de Gétigné. 1 donnée post-nuptiale : 1 le 15 août à Sarzeau (56). Au printemps 88, 4 dès le 28 mars à Tréogat jusqu'au 10 avril, encore 2 le 21 mai ; 2 migrants les 2 et 3 puis 1 jusqu'au 6 avril à Hoëdic (56) et 1 le 5 mai dans les gravières de Bruz (35).

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

Malgré les pertes subies lors des hivers froids, l'expansion en Bretagne se poursuit. Sur la côte Sud, les données chiffrées en période internuptiale font défaut. En période de nidification 50-100 couples dans le Golfe du Morbihan et 25-30 couples en rivière d'Etel (56) en 88. Diminution à Guérande (12 couples en 88) mais développement d'une autre colonie à Mesquer (44) (55 couples en 88). Sur la côte Nord, la fréquentation s'intensifie. Des arrivées sont notées à

partir de fin juin-début juillet : le 30 juin 87 en Rance (35) et le 7 juillet 88. Les dernières sont signalées entre la mi-avril et la mi-mai : le 16 avril 87 et le 21 avril 88 en Côtes d'Armor, les 12 et 13 mai 88 en Finistère Nord. Les effectifs culminent à la fin de l'été : 17 le 11 août, 28 le 28 septembre sur la Rance (35). L'hivernage est maintenant observé dans la plupart des baies et estuaires et concerne au moins 20 ind. en 88 dont 8 sur le Trieux pour les Côtes d'Armor (5 en 87), 5-10 ind. en rade de Brest (29N), 1 le 22 février 88 à Guissery (29N)... 10 le 24 janvier en Baie de Goulven (29N).
Espèce à suivre..

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*

1 le 10 juin à Le Tour du Parc (56) et 1 le 10 juillet 88 à La Chèze/St-Thurial (35).

GRANDE AIGRETTE *Egretta alba*

Hivernage maintenant classique en Loire-Atlantique : 1 dès le 25 septembre 86 puis 1 le 7 janvier 87 à Grandlieu ; 1 du 7 décembre 86 au 12 février 87 à la Blissière/Juigné des Moutiers ; 1 le 1er novembre 87 au Moutiers en Retz.

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

Deux nouveaux sites de nidification en Loire Atlantique en 87 : 1-2 couples à Clégreuc et 3 couples à Sion Les Mines.

HERON POURPRE *Ardea purpurea*

Une observation hâtive : 1 le 24 mars 87 à St-Méen-Le-Grand (35).
Arrivée fin avril-début mai : en 87, 1 le 24 à Grandlieu (44), 2 le 29 à Tréogat (29S) et 1 le 7 mai à Ouessant (29N). En 88, 2 le 22 à Tréogat, 1 le 30 à Hoëdic (56) et 1 le 8 mai au Bodéo (22). La reproduction est suspectée en 87 et 88 à Trenvel/Tréogat où 2 ind. sont régulièrement observés au printemps ainsi qu'1 ad. et 1 juv. durant l'été 87.
La dispersion et le passage post-nuptial interviennent rapidement en été : 2 le 6 août 86 à Yffiniac (22) ; 1 le 20 juillet 87 à Morieux (22) et même 1 le 12 juillet 88 à Penvenan (22), et se poursuit jusqu'à fin août : 1 le 31 à Asserac (44) en 86.

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

Signalée uniquement en Loire Atlantique en 86 : 3 en août en Brière, 2 à Mesquer et 1-2 à Anez/loire durant la deuxième quinzaine de ce mois puis 1 le 8 octobre à Oudon.
Passage exceptionnel à l'automne 87 : 16 données ; 1 dès le 5 août à Tréogat (29S) puis arrivée groupée autour de la mi-août : 1 le 12 à Le Tour du Parc (56) 3 le 18 et 1 le 19 à Yffiniac (22) ; 1 le 19 à Séné (56), 5 le 21 à Guérande (44) (3 du 23 au 11 et 1 le 13 septembre). Encore deux en septembre, le 4 à Ambon (56) et du 4 au 30 à St-Lunaire (35). Enfin 1 retardataire du 25 au 30 octobre à Séné (56).

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

12 données avec une prépondérance des observations printanières entre la mi-avril et la fin-mai ; dans l'Est de la région, 2 du 19 au 22 avril à Goméné (22) ; 1 le 12 mai à Rennes (35) ; 1 le 20 avril 88 à Vigneux de Bretagne (44) ; 2 du 7 au 11 mai à Louvigné du Désert (35) et 1 le 14 mai 88 en forêt de Rennes (35). Une seule observation par automne : 1 le 20 septembre 86 à Guérande (44) et 2 le 1er septembre 87 à Herbignac (44). Enfin 1 du 23 décembre 87 au 7 janvier 88 à St-Nazaire (44).

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

Série d'observations exceptionnelle pendant l'automne 86 : 2 le 5 septembre puis 1 jusqu'au 26 à Sougeal (35) ; 1 le 21 septembre à Guérande (44) et surtout 6 du 2 au 6 octobre à Le Tour du Parc (56).

CYGNE SIFFLEUR *Cygnus columbianus*

La vague de froid de janvier 87 amène quelques oiseaux dans la région : 1 du 7 au 21 puis 7 du 25 au 28 février dans les marais de Grée/Ancenis (44) et 1 le 14 février en Baie du Mont St-Michel (35).

Observations en nombre inhabituel en automne-hiver 87-88 : 3 le 13 octobre à Ouessant (29N) ; 4 les 16 et 20 puis 3 jusqu'au 30 à Trenvel/Tréogat (29S) ; 1 le 2 novembre dans le golfe du Morbihan (56). 2 les 5 et 6 décembre à Marcillé-Robert (35). 1 ad. hiverne dans les marais de Grée : signalé du 29 décembre au 27 mars 88.

CYGNE DE BEWICK *Cygnus bewickii*

Observé en compagnie de l'espèce précédente :

1 du 25 au 28 février aux marais de Grée/Ancenis (44) et 4 les 17 janvier et 14 février 87 en baie du Mont-St-Michel (35). Toujours dans le marais de Grée, 1 imm. du 29 décembre 87, s'attarde jusqu'au 16 avril 88 !

OIE CENDREE *Anser anser*

Automne 86 : passage noté à la mi-octobre puis début décembre dans les Côtes d'Armor et en Loire Atlantique.

Petite arrivée pendant la vague de froid de janvier 87 : 2 du 4 janvier au 15 février à Chatillon en Vendelais (35) ; 15 en vol le 16 janvier à Tréogat (29S) ; 4 le 17 et 13 le 29 janvier en baie de Mont St-Michel (35) et 11 du 21 au 31 janvier à l'étang du Vioreau (44). Remontée prénuptiale maximale du 1er au 20 mars 87 en Loire Atlantique.

A l'automne 87, 2 observations dès la mi-septembre : 9 le 14 à Orvault (44) et 1 le 17 à Marcillé-Robert (35) puis passage en deux vagues à l'automne 87 : fin octobre-début novembre avec des observations dans les Côtes d'Armor, en Finistère et Loire Atlantique puis en décembre dans toute la région sauf le Finistère.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

Peu de déplacements pendant la vague de froid de janvier 87 : 2 le 13 et 1 le 14 à Tréogat (29S), seulement 3 à la mi-janvier et 2, le 22 en Baie du Mont St-Michel (35). 11 du 12 décembre 87 au 3 janvier 88 à Chatillon en Vendelais (35).

OIE A BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

1 le 17 janvier 87 à Varades (44).

OIE RIEUSE *Anser albifrons*

1 le 16 mai 87 dans l'anse d'Yffiniac (22) ! 2 le 20 décembre 87 à Chatillon en Vendelais (35) et 1 le 16 février 88 à Rieux (56).

OIE DES NEIGES *anser caerulescens*

2 le 22 janvier 87 en Baie du Mont St-Michel (35) ; 2 le 18 avril 87 à Tréogat (29S) et 1 en vol W le 18 octobre 87 à Brignogan (29N).

Mais quelle est l'origine de ces oiseaux, particulièrement ceux d'avril ?

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis*

1 le 18 juillet 86 à la Varenne (44) et 1 le 29 septembre 87 à Tréogat (29S) très probablement des échappés de captivité.

BERNACHE NONETTE *Branta leucopsis*

Le statut de cette espèce en Bretagne présente une certaine évolution. Les apparitions sont plus régulières et surtout interviennent également hors du contexte des vagues de froid.

2 le 16 décembre 86 à Grandlieu (44) ; 4 les 16 et 17 et 3 le 18 janvier à Tréogat (29S) ; 4 du 17 au 19 janvier à Séné (56) ; 1 le 26 avril en Baie du Mont St-Michel (35)

4 le 18 septembre mais plus que 3 le 27 à Tréogat (29S), 1 le 30 octobre dans le Golfe du Morbihan ; 20 le 11 décembre en Baie du Mont St-Michel (35) ; 19 (le même groupe ?) le 9 janvier 88 à Chatillon en Vendelais où un cadavre est trouvé le 13 janvier.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Hiver 86-87 : 23 735 en décembre en Bretagne pour 67 000 en France. Malgré une stabilité des effectifs régionaux au cours de l'hiver (23 670 en novembre, 20 060 en janvier) on observe encore un décalage des pics de stationnement selon les sites : novembre dans le Golfe du Morbihan, décembre pour le reste de la côte Sud, et janvier ou février pour la côte Nord. En 87-88, on observe une augmentation des effectifs : 27 820 en décembre pour 76 200 en France. Les pics de fréquentation des différents sites

apparaissent plus synchronisés (en décembre ou janvier) la douceur de l'hiver permettant des départs précoces : 17 200 en janvier, 13 440 en février.

BERNACHE CRAVANT DU PACIFIQUE *Branta bernicla nigricans*

Première observation de cette sous-espèce originaire d'Alaska : 1 ad. les 14 et 31 décembre 87 à Paimpol (22), revue le 2 mars au Sillon du Lenn (22).

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements >>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	4123	675	559	2482	1556	9395	31

Malgré la clémence de l'hiver 87-88, les effectifs se maintiennent à un niveau élevé, avec les principales concentrations en Baie du Mont St-Michel (35), dans le golfe du Morbihan, et au traict du Croisic (44).

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

Les informations recueillies concernant la vague de froid de janvier 87, demeurent trop partielles pour apprécier son impact sur les stationnements. Il apparaît néanmoins évident que le Nord et l'Ouest de la Bretagne (de la Baie du Mont St-Michel (35) à la rade de Lorient (56)) ont reçu de forts contingents de siffleurs, alors qu'en Loire Atlantique, l'espèce est signalée avec des effectifs inférieurs à ceux de janvier 85.

- Ille et Vilaine (35) : près de 5 000 en janvier dont 3 500 en Baie du Mont St-Michel et 1 000 en Rance.
- Côtes d'Armor (22) : 2 292 à la mi-janvier
- Finistère (29) : au-moins 15 000 en janvier dont 3 300 en Baie de Goulven le 25, 2 590 en rade de Brest le 17, 1 000 à Tréogat à la mi-janvier et plus de 4 000 en rivière de Pont Labbé le 24.
- Morbihan (56) : 2 140 en rade de Lorient le 18, 410 en rivière d'Etel le 22.
- Loire Atlantique (44) : Les observations concernent principalement un passage au début (dont 1 200 le 11 janvier sur la Loire en amont de Nantes) et à la fin de la vague de froid.

En janvier 88, les effectifs dénombrés apparaissent bien bas, tant au niveau régional que national, proche de ceux de 86.

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements >>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	370	235	2370	4643	1146	8764	32

Les principales concentrations se situent dans le Golfe du Morbihan (4 350), en rade de Brest (1 330), en rivière de Pont L'Abbé (29S) (650), au lac de Grandlieu (44) (520) et en Baie de Goulven (29N) (320).

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

Augmentation sensible des stationnements, au moins dans l'Ouest de la Bretagne, suite à la vague de froid de janvier 87, des effectifs importants étant signalés jusqu'à fin février :

- 47 à la mi-janvier en Côtes d'Armor (22)

- 3 le 17 janvier à Erdeven (56), 6 le 19 à Baden (56), 40 à Tréogat (29S) et 15 en baie du Mont-St-Michel (35) le 25 ; 10 le 24, 21 le 7 février, 47 le 14, 85 le 28 et 25-30 le 1er mars en rade de Brest (29N), 7 le 31 janvier au Lac de Guerlédan (22) ; 13 le 18 à Chatillon en Vendelais (35), 25-30 à Guisseny (29N) le 22 février.

Près de 200 en Bretagne en janvier 88, principalement en Morbihan et Loire Atlantique mais dans les Côtes d'Armor, les effectifs semblent avoir été supérieurs en novembre-décembre : 70 le 12 décembre 87 à Yffiniac.

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	2	22	8	105	56	193	1

En période de reproduction : 1 couple le 20 juin 87 au Vioreau/Joué sur Erdre (44) ; 7-10 couples en Baie d'Audierne (29S) en 87-88 et 1 couple avec 7 pulli de 2-3 semaines le 5 juillet 88 au Boulet/Feins, ce qui constitue la première preuve de reproduction en Ile et Vilaine.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

Situation contrastée en janvier 87 : fuite partielle des hivernants en Côtes d'Armor (443 à la mi-janvier) et afflux important en Finistère : plus de 3 000 dont 1 130 en rade de Brest le 17 janvier, 800 en rivière de Pont L'Abbé le 24, 1 000 en Baie de Goulven le 25... Pas d'informations précises pour les autres départements

Retour à la normale en janvier 88 avec près de 14 000, principalement en Basse Loire (7 910), Golfe du Morbihan (1 850) et Baie de Goulven (1 150).

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	352	465	1907	2153	8921	13828	28

SARCELLE D'HIVER AMERICAINE *Anas crecca carolinensis*

1 mâle le 17 janvier 87 à Commana (29N), peut-être l'individu déjà observé à l'automne 85.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

Tassement sensible des effectifs dénombrés en janvier 88 avec 23 000 ind. en Bretagne (30 000 environ en 85 et 86). Cette tendance se retrouve au niveau national, ce qui peut être lié à une répartition plus nordique, une remontée pré-nuptiale dès janvier, en raison des conditions météorologiques clémentes ou à une forte mortalité au cours des hivers précédents.

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	6867	1580	3488	3994	7337	23266	16

CANARD PILET *Anas acuta*

Cette espèce présente une réaction à la vague de froid de janvier 87 proche de la Sarcelle d'hiver. Légère diminution en Côtes d'Armor : 500 le 17 dans l'Anse d'Yffiniac (569 en 84, 2 000 en 85, 821 en 86). Augmentation en Finistère 210 le 24 janvier en rivière de Pont Labbé, 150-200 le 25 en Baie de Goulven... 55 le 26 février en rivière du Faou.

Hivernage classique en 88 avec les points forts dans l'Anse d'Yffiniac (22) et le Golfe du Morbihan (56).

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	54	618	70	2000	237	2979	30

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

1 couple dès le 16 février 87 en Brière (44)... Nidification prouvée au marais de Goulaine (44) en 87, probable aux brosses de Poscé/Feins (35) en 88 et 4 couples en Baie d'Audierne (29S) en 88.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

Pas de grosse nouveauté en reproduction : 1 couple accompagné de 5 pulli le 25 juin 87 à l'étang des Minaudières/St-Aubin Les Châteaux (44) (nouvelle localité) et seulement 2 couples en Baie d'Audierne (29S) en 88.

Au cours de l'hiver 87-88, le Souchet ne retrouve pas encore les effectifs antérieurs aux hivers froids (5 - 6 000 ind. en Bretagne).

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	16	0	13	513	3957	4199	34

L'hivernage apparaît toujours marginal en dehors de l'estuaire Loire (3 000) et du Lac de Grandlieu (940) en Loire Atlantique, et du Golfe du Morbihan (510).

NETTE ROUSSE *Netta rufina*

Un afflux semble évident en automne 86 et pendant l'hiver suivant, notamment en janvier pendant la vague de froid.

Des isolées à la Poitevinière/Riaillé à le Pin et Machecoul (44) entre le 30 août et le 10 décembre 86. 2 ind. entre le 11 novembre 86 et le 18 janvier 87 à Tréogat et Plonéour-Lanvern (29S) ; 5 le 20 janvier et 1 le 4 février à Pont Croix (29S), 2 les 22 et 23 janvier puis 1 jusqu'au 13 février à St-Jacques de la Lande (35) et 1 le 7 février 87 à Plougasnou (29N) ; 1 femelle le 2 août 87 à l'étang de Beffou (22) ; 1 mâle les 16 et 19 décembre 87 à St-Jacut (22) et 1 mâle + 2 femelles le 20 février 88 au marais de Grée/Ancenis (44).

FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina*

L'espèce apparaît avec des effectifs et dans des localités inhabituels (milieu maritime et rares plans d'eau non gelés) pendant la vague de froid de janvier 87 : 400 en rade de Lorient (56) le 18 janvier, 800 devant les plages de St-Nazaire (44) le 22, 700+ le 24 et 1 200 le 2 février à l'Etang de Kerhuon (29N), 700 au Lac de Guerlédan (22) le 31 janvier...

Reproduction importante en 87 en Loire Atlantique : 1 couple à l'Etang de Bourlière/La Chapelle-Glain, 3 couples à l'Etang de la Grande Fonderie/Sion-Les Mines et surtout 19 couples à l'Etang du Pin.

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% France
	904	108	462	1140	3354	5968	9

Situation à la mi-janvier typique d'un hiver doux :

- 2 concentrations principales : le Lac de Grandlieu (44) avec 3 100 et l'Etang du Duc/Vannes (56) avec 970.
- des effectifs réduits en raison d'un hivernage plus continental et de départs des hivernants dès janvier.

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris*

1 mâle le 28 mai 87 à St-Pierre de Plesguen (35) ; 1 mâle le 20 décembre à Plonéour-Lanvern (29S) ; revu du 12 janvier au 26 mars 88 à Tréogat (29S).

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

1 femelle tuée à la chasse le 24 décembre 86 à Ancenis (44), 1 femelle le 17 janvier 87 à Concarneau (29S) ; 1 mâle le 14 mars à Bruz (35) ; 1 mâle les 27 septembre et 16 octobre à Erbrée (35). 1 mâle en PN le 22 novembre 87 dans l'Anse d'Yffiniac (22).

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

Les données fragmentaires dont nous disposons indiquent néanmoins une arrivée importante consécutive à la vague de froid. Au moins 1 500 en janvier 87 : 650 à Quimper (29S) le 13, 165 en rade de Lorient (56) le 18, 279 dans les Côtes d'Armor dont 150 au Lac de Guerlédan le 31, 150 à St-Nazaire (44) le 22, 200-220 à l'Etang de Kerhuon (29N)... et probablement plus en février si l'on en juge d'après l'évolution des effectifs sur ce site et en rade de Brest : 4-500 jusqu'à la fin du mois.

Retour à la normale en janvier 88, c'est à dire rôle très marginal de la Bretagne pour l'hivernage de cette espèce.

RECENSEMENT BIRCE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% France
	191	66	219	103	205	787	1

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

Premiers le 2 novembre 86, maximum en janvier (1 745 le 25) et février 87 (1700 le 22) en estuaire de la Vilaine (56)

Seulement 1 090 en janvier 88 dans l'estuaire de la Vilaine mais 535 le 27 février aux Moutiers en Retz (44).

EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

En période de reproduction, toujours signalé dans le Mor Braz : 3 nids en 87, 1 couple en 88 à Houat (56) ; 1 oeuf cassé en 87 et 1 nid en 88 (échec de la reproduction) à la Pierre Percée/Pornichet (44) ; présence en 88 à l'île Bacchus/Penestin (56). La nouveauté vient des Côtes d'Armor (22) : 1 nid contenant 5 oeufs le 23 mai 88 à Lézardrieux. Effectifs réduits semble-t-il pendant l'hiver 86-87 : maxi : 17 le 23 décembre à Fort-Lalatte (22) et 40 le 8 mars à Yffiniac (22). 200 à la mi-janvier 88 en Loire Atlantique.

HARELDE DE MIQUELON *Clangula hyemalis*

Retour à la normale après l'abondance de l'hiver 85-86 : 2 dont 1 mâle hivernent en estuaire de la Vilaine (56), 1 mâle du 21 février au 14 mars 87 à Ploumoguer (29N) ; 1 mâle le 28 octobre 87 dans l'estuaire de la Vilaine ; 1 femelle imm. les 7 et 9 novembre en baie de la Fresnaye (22) et 2 le 20 décembre à Plonevez-Porzay (29S).

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula*

Une des espèces d'Anatidés ayant le plus réagit lors du froid de janvier 87, elle apparaît en nombre et souvent dans des localités inhabituelles : au moins 290 Garrots durant la deuxième quinzaine de janvier en Bretagne, hors Golfe du Morbihan (d'après les rares données disponibles) contre une centaine l'année suivante.

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1988

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 87 partiel	52	48	54	53	87	294	?
Janvier 88	73	2	19	578	4	676	22

HARLE PIETTE *Mergus albellus*

1 seule observation avant la vague de froid : 1 mâle du 14 au 21 décembre 86 à Chatillon en Vendelais (35). Le froid de janvier 87 amène son cortège habituel d'observations. Nous pouvons formuler les remarques suivantes :

- effectif moindre qu'en janvier 85 : maxi 20.
- arrivée dès le début du froid : 1 mâle le 10 à Riaillé (44) mais maximum deuxième quinzaine de janvier. Diminution rapide en février.
- prépondérance de l'Est de la Bretagne.

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1987

Décades >>>	Janv1	Janv2	Janv3	Fevr1	Fevr2	Fevr3	Mars1	Mars2
Nombre >>>	1	101	102	64	22	14	3	2

Départements>>>	29	22	56	35	44
Effectif cumulé	24	35	55	98	108

11 le 13 décembre 87 à Chatillon en Vendelais (35) ; 1 mâle les 13 décembre et 13 février 88 à Riaillé (44) et 1 femelle le 8 février 88 à Joué sur Erdre (44).

HARLE HUPPE *Mergus serrator*

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1987

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
	130	74	785	1390	24	2403	75

Effectifs et localités habituels : Golfe du Morbihan : 1 130, rade de Brest (29N) 605, Baie de Quiberon (56) : 205...

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

Avant la vague de froid : 2 le 19 décembre 86 à La Chapelle-Erbrée (35), 1 le 21 au 28 décembre à Chatillon en Vendelais (35) et 1 le 30 à Riaillé (44).

RECENSEMENT BIROE JANVIER 1987

Décades >>>>	Janv1	Janv2	Janv3	fevr1	fevr2	fevr3	Mars1	Mars2
Nombre >>>>	0	126	179	175	16	9	0	7

Dès le début du froid, l'espèce est observée dans toute la région en petits groupes. Un maximum est atteint fin janvier mais avec une concentration en Loire Atlantique : 93 et à Guerlédan (22) : 70.

En février, les données concernent principalement la Loire Atlantique qui enregistre son maximum au début du mois : 149 ind. Encore 1 mâle le 22 avril à Marcellé-Robert (35).

L'hiver suivant : 1 le 13 décembre 87 à Missillac (44) et 3 le 9 janvier 88 à Erbrée (35).

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis*

1 du 28 novembre au 5 décembre 86 à Tréogat (29S) ; 4 le 14 décembre 86 à Grandlieu (44) ; 1 femelle imm. le 7 novembre 87 à St-Suliac (35) et 1 femelle le 20 décembre à Plonéour-Lanvern (29S).

ERISMATURE A TETE BLANCHE *Oxyura leucocephala*

1 femelle imm. du 8 janvier au 4 février 88 à Ty Colo/St-Renan (29N).

MILAN NOIR *Milvus migrans*

Entre autres, 1 donnée tardive : 1 le 13 décembre 87 à St-Thégonnec (29N).

MILAN ROYAL *Milvus milvus*

Au moins 13 données. Il ne se dégage pas de schéma quant à la répartition spatiale (observé dans tous les départements). Dans le temps, les données concernent tous les mois de septembre à février, avec un maximum en novembre (4 données).

1 attardé est observé à plusieurs reprises en mai 87 à Plouagat (22).

CIRCAETE JEAN LE BLANC *Circaetus gallicus*

1 le 25 juillet 86 à Séné (56).

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

Des mouvements sont mis en évidence à Ouessant (29N) : 1 du 16 au 18 septembre puis 1 le 22 octobre 87. Sur le continent l'espèce est signalée :
 - en période de reproduction (février à juin) : en forêt de Coetquen (22), en forêt de Lanouée (56), en forêt du Vioreau (44) et curieusement en juin à Goulien (29S).
 - de juillet à janvier : à Pléchatel (35), à Miniac-Morvan (35) et à Pont-Scorff (56).

AIGLE CRIARD *Aquila clanga*

2 imm. du 21 décembre 87 au 26 mars 88 en Brière (44).

AIGLE BOTTE *Hieraaetus pennatus*

1 phase sombre le 23 août 87 à Séné (56) et 1 phase claire le 17 octobre 87 à Trégunc (29S).

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

Hormis 1 dès le 18 juillet 86 à la Varenne (44), les 24 données recueillies concernent des dates (de fin août à mi-octobre) et des localités (majorité en Loire Atlantique) classiques du passage post-nuptial.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

1 imm. du 22 au 31 mai 88 à Cléden-Cap-Sizun (29S).

FAUCON D'ELEANORE *Falco eleonora*

1 les 27 et 29 mai 88 à Ouessant (29N), première apparition de cette espèce méditerranéenne en Bretagne.

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

Au moins 109 données recueillies, se répartissant dans le temps de la façon suivante :

MOIS	07/08	09	10	11	12	01	02	03	04	05/06
	4	2	18	21	16	14	15	9	6	4

Le Faucon pèlerin est observé toute l'année en Bretagne mais avec un net maximum d'octobre à février. Le départ des hivernants se situe essentiellement en mars.

Les sites fréquentés sont les îles : Ouessant (29N), Belle-Ile et Hoëdic (56), les estuaires et les marais-étangs.

Aucune information transmise ne permet encore d'envisager une reproduction dans la région, les 4 données de mai-juin concernant un hivernant s'attardant jusqu'à début mai 87 et 88 en Baie de Morlaix, un migrateur à Ouessant le 4 mai 87 et 1 le 26 juin 87 à Rennes (35).

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana*

Notée uniquement à Hoëdic (56) au printemps : 1 cadavre découvert sur une dune le 23 avril 87 et 1 le 8 avril 88. Une seule (?) observation durant l'automne 86 ; 1 le 4 novembre à Ouessant (29N). Passage mieux ressenti en 87, étalé du 5 août (1 à Seven-Léhart (22)) au 3 novembre (1 à Ouessant) mais principalement en octobre (6 données/10).

MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla*

1 le 11 mai 88 à Suscinio/Sarzeau

RALE DE GENETS *Crex crex*

Hors des zones de reproduction de Loire Atlantique, 1 le 15 septembre 86 à Erdeven (56) et 1 chanteur le 4 mai 88 à St-Armel (56). En Loire Atlantique, la présence de l'espèce est signalée du 31 mars au 6 septembre 87.

GRUE CENDREE *Grus grus*

1 le 5 novembre 87 à Trenvel/Tréogat (29S) et 3 le 3 décembre 87 à Moustérian Séné (56).

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

RECENSEMENT BIROE

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 87	15433	12733	3100	2015	1506	37823	40
Janvier 88	11687	3805	3420	1749	1363	22024	56

La vague de froid de janvier 87 entraîne un mouvement de fuite sans précédent des populations hivernant en mer du Nord, qui trouvent refuge le long des côtes de la Manche ; près de 40 000 Huitriers en Bretagne, ce qui correspond à l'effectif hivernant habituellement en France. Seules l'Ille et Vilaine et les Côtes d'Armor sont concernées par ce phénomène et principalement les Baies du Mont St-Michel (35) et de St-Brieuc (22). En janvier 88, le recensement montre un retour des effectifs hivernants à la normale : 22 000 en Bretagne soit 56% de la population française.

AVOCETTE *Recurvirostra avosetta*

RECENSEMENT BIROE

Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% France
Janvier 87	14	4	70	1013	1527	2648	57
Janvier 88	0	1	68	1370	1820	3259	25

Trois hivers froids successifs auront eu des impacts très différents sur l'hivernage de l'Avocette en Bretagne. En janvier 85 le froid avait entraîné une diminution sensible des hivernants, de façon généralisée sur tout le littoral français : 11 000 ind. contre 15 à 20 000 les années précédentes et 4 650 en Bretagne contre 5 à 6 000. En 1986, alors que l'effectif national retrouve un niveau normal (16 600 ind.) la Bretagne enregistre un déclin important (1 780 ind.). Janvier 87 révèle une nouvelle situation ; une fuite des hivernants devant le froid (2 650 ind.) mais les quartiers d'hivernage bretons apparaissent nettement moins touchés que le reste du littoral français (57% de l'effectif national). De même, l'exode est plus important en Loire Atlantique qu'en Morbihan.

- Pendant le printemps 1987, 27 couples nichent dans les marais de Séné (56).
- La migration post-nuptiale donne lieu à des observations insolites : 76 le 29 août en Baie de St-Jacut (22) puis 85 le 16 septembre, et 3 le 20 octobre.
- en janvier 88, les effectifs augmentent mais ne retrouvent pas le niveau du début de la décennie et montrent une situation contrastée. En Morbihan, l'augmentation amorcée de 1980 à 1984 se poursuit alors que l'estuaire de la Loire atteint son niveau le plus bas (1 040 contre 3 à 4 000 auparavant). Les hivers froids pourraient avoir profondément modifié la dynamique des populations hivernantes.
- au printemps 88, on note une nouvelle augmentation des nicheurs à Séné (56) environ 50 couples.

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

Signalons 3 observations de migrants : 1 le 13 août 86 à Ouessant (29N).
1 le 8 mai 87 à Beuzec Cap-Sizun (29S) et 1 le 20 mai 87 à Guer (56) ; les deux dans des labours.
Dans l'Est de la Loire-Atlantique, des nicheurs potentiels sont détectés en deux sites à la Rouxière en 87.
2 au printemps 88 à Plevenon (22).

GLAREOLE A COLIER *Glareola pratincola*

87 et 88 fournissent 3 observations de cette espèce méditerranéenne, exceptionnelle en Bretagne : à Trenvel/Tréogat (29S) 1 le 28 mai et 1 le 27 août 87, à Falguérec/Séné (56), 1 le 26 mai 88.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

Lors de la migration post-nuptiale, le littoral breton accueille des effectifs importants de Grand gravelot, particulièrement la côte Nord qui joue un rôle de première importance pour cette espèce. Retenons les maxima de quelques sites :

- en 1986, 300 le 24 août à Hillion (22) ; 700 le 7 septembre à Guérande (44) 600 le 13 en baie de Lancieux (22) ; 350 le 14 en baie de la Fresnaye (22) ; 1200 le 14 et 2000 le 29 en baie de Goulven (29N) ; 360 le 7 octobre à Paimpol (22)...
- en 1987, 5-6 000 les 6 et 13 septembre en Baie de Goulven (29N), 500 le 28 à Landunvez (29N), 430 le 18 octobre sur le Jaudy (22), 500 le 25 octobre en rivière de Daoulas (29N)...

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>>	35	22	29	56	44	Total	% France
Janvier 1987		156	741	2587	1240	79	5103	81
Janvier 1988		231	1888	3975	1156	150	7400	78

En janvier 87, les effectifs de Grand gravelot hivernant en Bretagne fléchissent sensiblement, notamment dans les Côtes d'Armor, où une désertion de certains estuaires est observée pendant la vague de froid.

Au contraire, en janvier 88, un niveau record est atteint, en raison d'une augmentation sur la côte Nord de la Bretagne, dans le Trégor (22), la baie de Goulven (29N), la rade de BREST (29N)...

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

Importants stationnements postnuptiaux en baie de Goulven : maxi 200 le 14 septembre 86 et 500 le 6 septembre 87.

PLUVIER GUIGNARD *Eudromias morinellus*

Les observations demeurent principalement finistériennes et automnales.

- printemps : 1 le 16 et 8 le 17 avril 87 à Ouessant (29N).
2 le 8 mai à Plomeur (29S) et 1 le 23 mai 88 à Houat (56).
- automne : 2 le 8 août 86 à Plomeur, 2 les 2 et 9 septembre à Ouessant
1 le 13 septembre à Landunvez (29N)
5 ind. du 25 août au 27 septembre 87 à Ouessant, 1 le 26 septembre et 15 octobre à Tréogat (29S).

PLUVIER DOMINICAIN *Pluvialis dominica*

1 à Ouessant (29N) du 9 décembre 86 au 9 janvier 87. Petit afflux à l'automne hiver 87-88 : 2 à Trenvel/Tréogat (29S) le 27 septembre ; 1 le 28 octobre à Ouessant et 1 dans le marais de Basse Vilaine (56) le 16 février.

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 1987	3222	1701	2163	2721	212	10092	58
Janvier 1988	2865	733	1848	1776	435	7657	41

En 1987, le Pluvier argenté maintient un fort hivernage en Bretagne, comme en janvier 86 : plus de 10 000. En janvier 88, au contraire, la population retrouve le niveau du début de la décennie où l'effectif oscillait entre 6 et 8 000. La diminution est ressentie sur tout le littoral mais de façon plus accusée dans les Côtes d'Armor et le Morbihan, excepté la Loire Atlantique qui reste marginale. L'effectif français variant peu pendant cette période (86 à 88), il s'agit peut-être d'une redistribution au sein de l'aire d'hivernage.

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

Un mouvement de fuite devant le froid, de grande ampleur, est observé du 10 au 15 janvier 87 dans toute la région. L'espèce est peu observée pendant la vague de froid mais revient à partir de début février.

BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 1987	5181	2493	120	90	0	7884	57
Janvier 1988	3000	2116	88	165	0	5369	37

Au cours de ces deux hivers, la population française s'est stabilisée autour de 14 000 ind. La diminution enregistrée sur les 3 sites majeurs de la Côte Nord (Baie du Mont St-Michel (35), de St-Brieuc (22) et de Lannion (22) traduit peut-être des échanges avec les sites d'hivernage de Vendée et Charente Maritime.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 1987	0	251	3127	151	20	3555	93
Janvier 1988	0	422	1866	160	0	2468	70

En 1987, la Bretagne, mais surtout le Finistère, accueillent un nombre élevé de Bécasseau sanderling et concentre l'essentiel des hivernants français. Ce phénomène résulte de la conjonction de la vague de froid et d'une prospection accrue.

En 1988, le Bécasseau sanderling apparaît mieux réparti sur le littoral français (70% en Bretagne). L'effectif compté marque également un déclin, sans doute peu significatif. En effet, les sites de référence ne montrent pas cette tendance (1850 ind. en 87 contre 1727 en 88).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

2 le 26 août 86 à Le Tour du Parc (56). L'espèce est observée plus régulièrement au printemps.

- en 1987 : 3 les 23 et 24 avril et 1 le 28 à Séné (56), et 4 le 28 avril à Tréogat (29S).

- en 1988 : 2 le 16 mai à Séné ; 1 le 20 mai et 2 le 26 à Brest (29N).

BECASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis*

1 le 22 mai 88 à Assérac (44), date tout à fait insolite pour une observation de limicole américain.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

2 le 02 octobre 87 à Tréogat (29S).

1 juvénile le 06 octobre 87 à Ouessant (29N).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

Contrairement à l'automne 85, ceux de 86 et 87 ne fournissent pas de passage important de Cocorli :

- En 86, les observations s'étalent de fin juillet (1 ad à Séné (56) le 27) au 15 octobre (1 à Batz/mer (44)) et l'effectif maximum concerne 13 ind le 14 septembre à Hillion (22).

- En 87, la migration commence début août à Séné où l'on note un petit passage d'adultes pendant tout le mois (maxi 5). Dans le reste de la région, les observations commencent fin août et s'achèvent le 18 octobre avec 3 à Languieux (22) et 1 à Goulven (29N). Max :10 le 23 septembre à Hillion (22).

- Au printemps, les données restent confinées aux marais du sud-est de la région : - Séné (56) avec un passage de mi-avril à début mai 87 (max 6) et de mi-avril à mi-mai 88 (max 2).

- Guérande (44) : 2 le 23 mai 87.

BECASSEAU VIOLET *Calidris maritima*

Espèce peu présente en Bretagne au cours des deux années considérées : 109 en 87 et 100+ en 88, dénombrés lors des recensements de janvier contre 350 en 83, 335 en 84, 212 en 85 et 530 en 86.

BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% France
Janvier 1987	42060	15230	29185	33210	4605	124290	58
Janvier 1988	24685	16035	30185	35320	7200	113455	53

Mise à part la Baie du Mont saint-Michel qui perd près de 20 000 oiseaux, les effectifs de bécasseau hivernant montrent une grande stabilité en Bretagne, et en France, à un niveau des plus bas.

BECASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus*

1 le 1er septembre 86 à Cherrueix (35)

BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

1 les 6 et 7 septembre à la Pointe de la Torche/St Guénolé (29S), 1 du 23 au 26, 2 le 27 septembre puis 1 jusqu'au 10 octobre à Trenvel/Tréogat (29S).

BECASSINE SOURDE *Lymnocyrtus minimus*

Seulement 17 observations en 2 ans pour cette espèce discrète. Elles concernent le Finistère (5), les Côtes d'Armor (4) et la Loire Atlantique (8), et se répartissent de septembre à mars en 86-87, d'août (1 le 19 à Tréogat (29S)) à mai en 87-88 (1 le 1er à Ouessant (29N)). Janvier fournit le plus de données (6) mais décembre détient le record d'effectif : 21 le 14 et 9 le 20 décembre 86 dans les marais de Grée/Ancenis (44).

BATRAMIE A LONGUE QUEUE *Bartramia longicauda*

1 le 21 septembre 87 à Ouessant (29N). Il s'agit de la deuxième observation en Bretagne de cette espèce Nord Américaine.

BECASSINE DOUBLE *Gallinago media*

1 le 31 octobre 86 à Ouessant (29N).

LIMNODROME A LONG BEC *Limnodromus scolopaceus*

1 du 19 au 22 octobre 86 à Ouessant (29N)

1 le 18 septembre 87 à Trenvel/Tréogat (29S).

LIMNODROME SP *Limnodromus species*

1 le 8 mars 87 à Bonabri Hillion (22).

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 1987	1500	133	70	0	0	1703	42
Janvier 1988	1240	0	43	0	240	1523	28

L'hivernage de la Barge à queue noire ne présente pas de modification importante au cours de ces deux hivers, la Baie du Mont St-Michel (35) accueille toujours plus de 80% de l'effectif breton. Dans le détail on note cependant en janvier 87 un petit afflux, probablement lié au froid, sur la côte Nord : 129 dans le Trégor (22) ; 40 en Baie de Morlaix (29N) ; 25 en Baie de Goulven (29N)... En janvier 88, on observe un hivernage conséquent en estuaire Loire (44) avec 240 ind. En reproduction, 4 couples sont signalés dans le marais de Séné (56) et 5-6 en baie d'Audierne (29S) au printemps 88.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 1987	2485	1194	1131	115	49	4964	74
Janvier 1988	320	687	634	28	47	1716	50

Alors que janvier 87 reste dans la lignée des hivers précédents avec près de 5 000 Barge rousse en Bretagne, fréquentant essentiellement la côte Nord (Baie du Mont St-Michel 35), de St-Brieuc (22), estuaire de la Penze (29N) et baie de Goulven (29N), janvier 88 révèle un tassement sensible des effectifs sur l'ensemble des sites français et un effondrement sur le principal : 320 ind. seulement en Baie du Mont St-Michel.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

Toujours 2-3 hivernants en rade de Brest (rivière de Daoulas et Ste-Anne du Portzic) en 87 et 88.

1 le 6 janvier 87 à ST-Jouan des Guérêts (35).

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 1987	6085	2281	1819	1013	668	11866	34
Janvier 1988	2332	877	1456	775	670	6110	40

Comme pour l'Huitrier pie, nombre de Courlis cendré hivernants en Mer du Nord, fuient devant la vague de froid, ce qui donne lieu à une augmentation considérable (doublement) des effectifs en janvier 87 sur le littoral français. Cette augmentation touche principalement les côtes de la Manche. Ainsi en Ille et Vilaine et dans les Côtes d'Armor les effectifs ont presque triplé. Au contraire, l'afflux de Courlis cendré est beaucoup plus modeste en Finistère et Morbihan (quelques centaines d'individus) et la Loire Atlantique reste en marge du phénomène.

En janvier 88, on observe un retour à la normale (15 100 en France dont 6 100 en Bretagne) avec les principales concentrations en Baies du Mont St-Michel (35), de St-Brieuc (22) et de Morlaix (29N), dans les estuaires de la Penzé (29N), de la Vilaine (56) et de la Loire (44)

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

Augmentation sensible de l'hivernage en Bretagne : 64 ind. en janvier 88 contre 10-15 les années passées. Signalons 35 dans le Golfe du Morbihan et 15 en Baie de Goulven (29N).

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

RECENSEMENT BIROE

	Départements>>> 35	22	29	56	44	Total	% france
Janvier 1987	80	554	1409	488	25	2556	71
Janvier 1988	40	478	1330	559	30	2437	61

Le statut hivernal du Chevalier gambette en Bretagne ne présente pas de modification au cours de ces deux dernières années, d'un point de vue quantitatif ou répartition. Cette espèce est en effet répartie en petits groupes sur l'ensemble du littoral avec des points forts, en Trégor (22), en Baie de Morlaix (29N), en Penzé (29N), en Baie de Goulven (29N), rivière de Pont Labbé (29S), dans le golfe du Morbihan et l'estuaire de la Vilaine (56).

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

- 1 du 23 avril au 1er mai 87 à Séné (56) ;
1 du 2 au 13 août 87 à la Chapelle-Erbrée (35)

BARGETTE DE TERECK *Xenus cinereus*

- 1 du 7 au 11 septembre 87 en baie de Goulven (29N).

CHEVALIER SOLITAIRE *Tringa solitaria*

- 1 du 14 au 19 septembre 86 à Ouessant (29N)

CHEVALIER GRIVELE *Actitis macularia*

- 1 du 24 septembre jusqu'au 7 novembre 87 à Lespoul/Pont-Croix (29S)
Première observation française de cette espèce américaine.

TOURNEPIERRE A COLIER *Arenaria interpres*

- 4 250 Tournepierre en Bretagne en janvier 87 et 3 950 en janvier 88.

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor*

- 1 du 24 au 26 septembre 86 dans le marais de Sougeal (35) , 1 le 27 août 87 en Baie de Goulven (29N).

PHALAROPE A BEC MINCE *Phalaropus lobatus*

- 1 dans le marais de Sougeal (35) le 20 et 1 au Pont/Kerlouan (29N) le 21 septembre 86.
3 le 29 août 87 à Batz/Mer (44) et 2 observations à l'occasion des tempêtes d'octobre : 1 le 11 à la Turballe (44) et 1 le 16 en rade de Brest (29N).
Enfin, 1 observation pendant la tempête de début janvier 88 : 1 le 2 à Clédén Cap Sizun (29S).

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

- 1 seule donnée pour l'automne 86 : 1 cadavre au phare de Ouessant (29N) le 13 novembre.
En 87, la série de tempêtes de la première quinzaine d'octobre est à l'origine d'une belle série d'observations : 2 le 8 à Batz/Mer (44), 1 le 10 à Bréhat (22), 3 à Guérande (44) et 1 en Baie de Brière (44) ; encore 1 le 11 à Guérande, 2 le 16 et 6 le 17 en rade Brest (29N).
Curieusement, à Ouessant (29N), l'espèce n'est pas observée durant cette période mais avant : 1 les 23 et 24 septembre et après : 21 en 12 h les 20, 21 et 22 puis 7 le 29 octobre.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*

Toujours rare au printemps : 1 les 10 mai et 24 juin à Ouessant (29N) et 1 le 13 mai 88 à l'Ile Grande (22).

En automne 86, l'essentiel des observations est fourni par Ouessant (29N) où un passage diffus est noté du 20 août au 22 octobre.

En 87, le Labbe pomarin est signalé du 23 septembre au 22 novembre (18 données) avec un net regroupement en octobre pendant et après les tempêtes (17 données du 8 au 25).

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*

Nombre de données	>>> 35	22	20	56	44
1986/1987	1	6	16	1	11
1987/1988	1	14	9	4	11

La mouette mélanocéphale apparaît toujours plus rare ou moins recherchée en Ile et Vilaine et en Morbihan.

Mois	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Nombre de données	1	5	14	3	3	7	3	8	3	1	3	2

Le passage post-nuptial débute fin août, culmine en octobre et concerne tout le littoral.

L'hivernage est noté en Baie de Douarnenez (29S), (27 le 4 janvier 87), en Côtes d'Armor (22) où des stationnements importants sont découverts : à Binic : 2 le 22 décembre 86, maxi ; à Etables : 25 le 31 janvier 87, maxi ; 18 le 22 novembre 87 et 35 le 20 février 88. Le départ des hivernants se situe en mars dans les Côtes d'Armor.

La migration prénuptiale est maximale en mars. Très peu d'oiseaux en période de reproduction.

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*

En 86, 1 ad. dès le 4 août à Préfailles (44). A Ouessant (29N), un premier passage est observée du 21 août au 16 septembre : 6 données d'oiseaux isolés, puis 2 données fin octobre : 4 le 23 et 1 le 27.

En estuaire de la Vilaine (56), l'espèce est signalée du 14 au 26 septembre avec 44 ind. le dernier jour.

En 87, les observations débutent plutôt tardivement : 250 le 11 septembre en estuaire de la Vilaine, 5 données pour 8 ind. à Ouessant (29N) du 12 au 26 septembre.

Les coups de vents d'octobre sont à l'origine d'une affluence de Mouettes de sabbine qui commence le 9 dans le Morbihan, culmine du 16 au 21 sur tout le littoral. Ainsi, dans les parages d'Hoëdic (56) : 4 le 9, 15 le 11, 1 les 12 et 13, 4 le 15, 1 les 16 et 18, 2 le 16 en Baie de St-Brieuc (22), 1 au Dellec (29N) et 9 en presqu'île de Rhuys (56) ; le 17 : observée en estuaire de la Vilaine (56) et 2 en rade de Brest (29N), le 18 1 à Logonna-Daoulas (29N) ; reprise des

observations le 20 à Ouessant, 2 ind. et 5 le 21, toujours le 21 : 4-5 en Baie de St-Brieuc.

Par la suite, alors que le temps est calmé, des oiseaux s'attardent jusqu'à la mi-novembre dans les eaux côtières : 5 le 28 à Damgan (56), 1 le 30 à Quiberon, isolés les : 2,3,10 et 12 à Ouessant ; enfin 1 le 14 au Cap Fréhel (22). Une observation durant le printemps 88 : 3 le 24 mai à Ouessant.

MOUETTE DE BONAPARTE *Larus philadelphia*

La première observation bretonne de cette espèce américaine est réalisée le 22 octobre 87 à Ouessant (29N).

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*

1 ad. en automne, en 86 et 87 à Penestin (56) ; 1 ad. du 14 au 18 janvier 87 à Brest (29N) revu le 23 janvier au Relecq-Kerhuon (29N).

GOELAND CENDRE *Larus canus*

Encore des tentatives de reproduction dans les marais de Guérande (44) au printemps 87 : 1 couple plus un couple mixte Goéland cendré - Goéland argenté.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*

Les recensements effectués sur l'ensemble du littoral en 87 et 88 permettent de situer les effectifs nicheurs : 21 500 couples soit 70% d'augmentation par rapport à 1981.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Plus de 62 000 couples nicheurs en Bretagne en 87-88 soit 28% d'augmentation depuis 81.

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*

2-3 entre le 17 et le 30 décembre 86 à Ouessant (29N) l'un d'eux s'attarde jusqu'au 8 janvier 87 puis 1 observé le 30 mars. 1 le 23 décembre au Val-André (22) et 1 (le même ?) le lendemain à Binic (22). 1 le 1er mars 87 au marais de Grée/Ancenis (44).

Arrivée sensible en fin d'hiver 87/88 après les tempêtes. 1 du 18 janvier jusqu'en mars à Douanenez (29S) et 3 entre le 27 janvier et le 22 février à Ouessant (29N), 2 à 3 individus entre le 06/02 et le 24/03 à Tréogat (29S), 1 le 20 février à Kerarmel (29N), 1 le 11 mars en Baie de Morlaix.

GOELAND MARIN *Larus marinus*

Plus de 1 264 couples en Bretagne en 87-88, soit 58% d'augmentation depuis 81.

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoïdes*

1 (2^e hiver) le 4 décembre 86 à Ouessant (29N) ; 1 (2^e hiver) le 17 janvier 87 à Erdeven (56). Plusieurs observations consécutives aux tempêtes du début de l'année 1988 : 1 le 20 janvier 88 à Kerlaz (29S) ; 1 (1^{er} hiver) le 19/02 à Tréogat (29S), 1 (1^{er} été) le 05/03 à St-Michel chef chef (44), 1 (1^{ère} année) le 25 mars à St-Anne du Portzic (29N) ; 1 (1^{ère} année, le même ?) le 1^{er} avril à Brest (29N).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*

La population reproductrice bretonne compte 1 866 couples en 87-88 ce qui traduit une légère augmentation (8%) depuis 81. Les colonies connaissent cependant des fortunes diverses : pour 88, pas de reproduction à Groix (56) diminution à Fréhel (22) et Goulien (29S) ; augmentation à Belle Ile (56)...

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

4 observations finistériennes : 1 le 13 août 86 à Tréguennec, 1 le 31 août 87 à Ouessant et 1 les 18 et 19 juin 88 à Plovan.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

La population nichant en Bretagne se situe à 1 800 couples en 87 et 88. Les sites occupés sont maintenant traditionnels : La Colombière/St-Jacut (22), les îlots de la Baie de Morlaix (29N), l'île de la Croix/Landeda (29N), Trévorch/St-Pabu (29N) et les îlots de la rivière d'Etel (56). La baie de Morlaix renforce ses effectifs : 760 couples en 87, 850 en 88. La rivière d'Etel présente au contraire un déclin catastrophique : 178 couples en 86, 27 en 87 et 16 en 88. L'île de la Croix qui accueille près de 500 couples en 87, est abandonnée en cours de reproduction en 88 suite à un dérangement. Les nicheurs se replient partiellement sur Trévorch (250 couples) et peut-être également à la Colombière (250 couples) qui accueille également en juillet des oiseaux ayant abandonné la Baie de Morlaix après perturbation par un faucon pèlerin.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

Toujours aussi peu observée hors des sites de reproduction : 2 le 3 avril 87 à Buguéles/Penvenan (22) ; 4 le 18 septembre 87 à Brest (29N) ; 9 le 13 avril 88 à St-Michel en Grève (22) et 2 le 27 avril à Bréhat (22). 92 couples nicheurs en 87-88. La Colombière/St-Jacut (22) et les îlots de la rivière d'Etel (56) accueillent des couples isolés de Sterne de dougall. La Baie de Morlaix compte 60 couples en 88 et Trévorch/St-Pabu (29N) 10 + couples, originaires de l'île de la Croix/Landeda (29N).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

Situation stationnaire pour les nicheurs par rapport à 1981 : 1 100 couples en 87-88. Signalons une série d'observations hivernales : 1 ad les 23 et 24 décembre 86 à Binic (22) et 1 juv. le 10 janvier 87 à Plérin (22).

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea*

2 observations printanières en 88 : 2 le 27 avril à Bréhat (22) et 1 le 30 mai à Ouessant (29N). En 86, le passage post-nuptial est noté essentiellement fin août - début septembre (4 données) ; 1 seule observation ensuite : 2 le 21 octobre à Ouessant (29N). En 87, les observations débutent également fin août mais un maximum est sensible durant la deuxième moitié d'octobre (7 données) après le passage de l'ouragan : 2 le 16, 2 le 17, 1 le 18, 1 le 22 et dernière : 1 le 26 à Hoëdic (56).

STERNE NAIN *Sterna albifrons*

63 couples en Bretagne en 87-88.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

Excepté en Loire Atlantique, l'espèce demeure rare : 1 le 16 septembre 86 à St-Jouan des Guérets (35) ; 5 le 16 août 87 à Hillion (22) et 1 du 15 au 27 avril à Ouessant (29N).

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*

4 observations concentrées sur la deuxième moitié de septembre : 1 le 13 à Landunvez (29N) et 1 le 21 à Hillion (22) pour 1986. 1 le 27 à Tréogat (29S) et 1 le 28 à Noyal (56) pour 1987.

GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge*

331 à 358 couples en Bretagne en 87, effectif élevé comparé à celui de 81 (251 couples) dû à une augmentation ponctuelle au Cap Fréhel (22) : 220 couples. En 88, la situation est moins brillante : 95 couples à Fréhel et Goulien (29S) perd 9-10 couples. La marée noire de l'Amazzone n'y est peut-être pas étrangère.

PETIT PINGOUIN *Alca torda*

Depuis 81, les effectifs de Pingouin ont diminué de 41% en Bretagne. Il subsiste 39 à 43 couples ; 1-2 aux rochers de Camaret (29S) ; 19-21 couples aux Sept Iles (22) ; 17 au Cap Fréhel (22). Une nouveauté cependant, la découverte d'une petite population à l'île Cézembre/St-Malo (35) : 1 couple avec 1 poussin et 6 adultes dont 2 couples paradant le 4 juillet 87.

MERGULE NAIN *Alle alle*

Les forts vents de janvier 88 permettent quelques observations : 1 à Ploubazlanec (22) le 3 février 87, 1 le 13 janvier ; 1 le 27 ; 1 le 2 et 1 le 5 février à Ouessant (29N) ; 1 le 17 janvier à l'île Grande (22). 1 à Perros-Guirec (22) le 31 janvier 88. Un cadavre le 14 février à Santec (29N). 1 le 21 avril à Clédén-Cap-Sizun (29S).

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica*

La diminution se poursuit, 234 à 248 couples en 87-88 : 5 sur les îlots d'Ouessant (29N), 11-13 en Baie de Morlaix (29N) et 218-230 aux Sept-îles (22).

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*

1 le 14 septembre à Brest (29N), les égarés au nord de la Méditerranée sont généralement observés au printemps.

PETIT DUC SCOPS *Otus scops*

En 86, les chanteurs de la forêt de Rennes (35) sont début septembre (les 2 et 7), celui de de Belle-Ile (56) s'attarde jusqu'à la fin de ce mois. 1 chanteur à Tréogat (29S) du 26 au 31 mai 88.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

1 couple niche dans les Monts d'Arrée au printemps 87

MARTIN PECHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis*

Conséquence des hivers rigoureux, l'espèce n'est pas observée en 86 et seulement 2-3 ind. à l'automne 87 à Ouessant (29N).

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

1 le 14 septembre 86 à Trégunc (29S)
en 87, pour la première fois, le Guêpier niche avec succès en Bretagne : 6 couples en baie d'Audierne où l'on observe des groupes conséquents pendant l'été. 44 le 9 août, 28 le 10, 24 le 11, dernier : le 27 septembre. En 88, l'espèce niche à nouveau en baie d'Audierne et une tentative est observée (1 couple) à Esquibien dans le Cap (29S).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*

Au printemps, la migration n'est décelée que sur les îles
2 les 17 et 18 avril 87 à Hoëdic (56)
1 le 28 avril et 1 le 1er mai 88 à Ouessant (29), 1 le 28 avril à Hoëdic (56).
1 couple le 16 juin 87 à Ercée en Lamée : seule information relative à la reproduction. La migration post-nuptiale est observée du 4 septembre au 29 octobre 86 à Ouessant (29N) où un maximum est observé durant la deuxième moitié de septembre, ainsi qu'à Hoëdic (56).
En 87, le passage débute fin août (1 le 28 à Goulien (29S) et s'achève le 29 octobre (2 à Ouessant). De nouveau le maximum y est observé mi-septembre, ainsi qu'à Hoëdic (56) et sur le continent (3 données pour 5 ind. du 18 au 25).

PIC CENDRE *Picus canus*

Espèce très peu signalée pendant les deux années considérées.

Dans les Côtes d'Armor, 1 ch. à Langourla au printemps 87

Noté aux Chatelets/Ploufragan en 87 et 88, en forêt de Coetquen et au bois de la Coste/St Julien en 88.

Une observation à l'écart des zones habituelles de nidification, au Collet/Bourgneuf (44) durant l'hiver 87-88.

PIC NOIR *Dryocopus martius*

La colonisation de la Bretagne se poursuit. Elle se caractérise par l'occupation de nouveaux sites en Loire Atlantique (nidification en forêt de Juigné en 87) et en Ile et Vilaine (1 le 22 février à la Musse Baulon et 1 le 24 février 87 forêt de Montfort, nidification certaine au Voyer/Maure de Bretagne) et par une nouvelle expansion vers l'Ouest. En effet 3 observations sont réalisées dans le Morbihan pendant cette période : 1 à l'automne 86 à Monterrein, 1 le 22 février 87 en forêt de la Bourdonnaye/Carentoir et 1 le 5 décembre 87 en forêt de la Nouée.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calendrella brachydactyla*

L'espèce ne semble plus nicher à Hoëdic (56) : aucune observation aux printemps 87 et 88. La seule donnée de l'île concerne 5 ind. le 11 octobre 86. D'autre part, 1 du 20 au 22 octobre 87 à Ouessant (29 N).

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*

En Baie du Mont-St-Michel (35), 2 le 8 et 5 à 10 le 11 janvier, puis 1 le 28 novembre 87. 1 mâle ad. du 19 au 31 octobre 87 à Ouessant (29N)

HIRONDELLE ROUSSELINE *Hirundo daurica*

1 ou 2 entre le 19 et le 28 octobre 87 à Ouessant (29N)

PIPIT DE RICHARD *Anthus novaeseelandiae*

Observations maintenant classique à Ouessant (29N) : 1-2 du 16 au 19 octobre 1 le 29 octobre et le 19 novembre 86, 3 entre le 23 octobre et le 2 novembre 87.

La surprise vient de la baie d'Audierne (29N) où 1 ind. est signalé dès le 28 septembre 87 à Trenvel/Tréogat, puis 3 le 22 octobre, 2 le 2 et 1 le 15 novembre.

PIPIT A DOS OLIVE *Anthus hodgsoni*

Première observation française de cette espèce orientale à Ouessant (29N) : 1 le 31 octobre 87.

PIPIT DE LA PETCHORA *Anthus gustavi*

Première observation française, toujours à Ouessant, de cette espèce sibérienne mais à une date tout à fait surprenante : 1 le 28 avril 87.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

6 données automnales pour une espèce jusqu'à présent fort rare en Bretagne 1 le 27 septembre au Collet/Bourgneuf (44) et 1 le 8 octobre 86 à Ouessant (29N).

1 dès le 30 juillet à Trenvel/Tréogat (29S) ; 1 les 20 octobre et 1 novembre à Ouessant, 1 le 6 et 7 novembre 87 à Hoëdic (56)

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

1 le 25 octobre 87 à Ouessant (29N) : 1ère observation en Bretagne depuis 80 (1 en mai sur le Loch (56))

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris*

Deux observations à l'automne 87 : 1 le 1er novembre (observé jusqu'au 16 novembre) au Mont Gareau/St Suliac (35), et 1 le 2 novembre à la pointe St-Gildas/Préfaillies (44).

ROUGEGERGE FAMILIER *Erithacus rubecula*

En 86, la migration post-nuptiale est notée de début septembre à fin octobre à Ouessant (29N) et Hoëdic (56) avec un maximum début octobre. De même en 87, la migration s'amorce début septembre sur ces îles, mais le maximum est noté fin octobre avec un pic le 23 (3000 ind.) à Hoëdic. Diminution rapide début novembre.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*

1 le 8 et 18 septembre 86 à Ouessant (29N)

La migration prénuptiale est notée essentiellement à Hoëdic (56), du 17 au 26 avril (7 données pour 10 ind.) en 87, et 1 les 6 et 7 avril et 21 mai en 88.

1 seule donnée à Ouessant : 1 le 23 avril 87.

Le passage post-nuptial 87 est mieux ressenti :

- essentiellement du 18 août au 4 septembre, puis 1 les 14 et 15 septembre et 16 octobre à Ouessant.

- du 22 août au 22 septembre mais surtout du 14 au 18 à Hoëdic.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

La reproduction est signalée en forêt de Helgoat (29N) en 87, présence sur le site en 88, ainsi qu'en forêt du Beffou (22) en 88 : 3 mâles à la mi-mai, 1 couple avec 4 jeunes le 5 juin.

Migration :

- automne 86 : passage noté à Ouessant (29N) du 1er septembre au 25 octobre, maximal du 17 au 26 septembre ;
 - printemps 87 : passage noté à Ouessant (7 du 16 avril au 9 mai puis 1 le 10 juin) et à Hoëdic (56) du 17 au 10 mai (maxi 36+ le 17)
 - automne 87 : à Ouessant, l'espèce est observée du 20 août au 3 novembre avec 2 maxima, du 16 septembre au 3 octobre (1-3/jours sauf 5 le 30) puis du 19 au 21 octobre (6 le 19). A Hoëdic, le passage est noté du 21 août au 25 octobre avec un pic principal du 15 septembre au 11 octobre mais surtout du 29 au 3 (7-14/jour) et secondairement du 21 au 25 octobre (1-4/jour).
 - printemps 88 : 4 isolés du 12 avril au 21 mai à Ouessant.
- Les observations continentales de migrants, toujours sporadiques s'intègrent dans les maxima notés sur les îles.

TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina*

1 les 31 mai et 1er juin 88 à Ouessant.

TRAQUET DU DESERT *Oenanthe deserti*

1 mâle imm. du 23 au 31 octobre 87 à Ouessant (première observation en Bretagne).

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

4 sites occupés à Commara dans les Monts d'Arrée en 87.

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

Migration

- post-nuptiale 86 : du 26 septembre au 19 octobre à Hoëdic (56) maxi 7 le 11 et 3-4 le 18. Du 2 au 24 octobre (1 mâle T t. alpestrus) à Ouessant (29N) maxi 4 le 16 et 5 le 17.
- prénuptiale 87 : du 16 avril au 10 mai à Ouessant, maxi 9 les 16 et 18.
du 17 avril au 10 mai à Hoëdic, maxi 3 le 17 et 4 le 23.
- postnuptiale 87 : du 29 septembre au 8 novembre à Hoëdic avec 1-5/jour du 29 au 5, 2 le 11, 1 le 12, puis 1-3/jour du 22 au 8 novembre. 1 le 22 septembre, 2 le 1er octobre puis 1-5/jour du 16 au 4 novembre à Ouessant. Sur le continent, 1 le 3 octobre en Loire Atlantique et 4 données du 17 au 24 octobre.
- prénuptiale 88 : du 20 mars au 22 avril sur le continent dont 5 à Plogoff et 1 à Clédén-Cap-Sizun (29S) le 9, mais seulement du 11 au 20 dont 4 le 11 à Ouessant.

GRIVE OBSCURE *Turdus obscurus*

1 mâle imm. du 25 au 29 octobre 86 à Ouessant (29N)

GRIVE DOREE *Zoothera dauma*

1 du 19 au 22 octobre 87 à Ouessant (29N). La dernière observation en France concerne 1 ind. en février 1932 dans le Morbihan.

GRIVETTE A JOUES GRISES *Catharus minimus*

1 ad. du 22 au 25 octobre 86 à Ouessant (29N) : première observation en Bretagne de cette espèce nord-américaine.

GRIVETTE SP *Catharus sp*

1 le 25 septembre 87 à Ouessant (29N).

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

L'espèce semble s'être maintenue dans ses sites après les hivers froids mais les données quantitatives font défaut pour juger d'un éventuel impact.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*

Au printemps 86, l'espèce ne subsistait que dans les marais de Guérande (44), en Sud Finistère. Durant l'automne, 5 chanteurs sont signalés en août et septembre sur le littoral de la Loire Atlantique, à la Plaine/mer, à Bourgneuf en Retz et à Batz/mer. A partir du 18 octobre, 2 sont présents sur Hoëdic(56). Nouvelle vague de froid pendant l'hiver 86-87. Au printemps 87, 1 chanteur le 29 mars à la Turballe, 1 à Hoëdic, 1 chanteur les 4 et 5 juillet à Sarzeau (56) et une petite population se maintient en baie d'Audierne (29S). L'automne suivant, seuls 2 isolés sont observés à Hoëdic, le 2 octobre et le 6 novembre. 1 couple et 1 chanteur sont présents au printemps 88. Cette saison, la baie d'Audierne héberge 70 couples.

LOCUSTELLE LANCEOLEE *Locustella lanceolata*

1 chanteur les 15 et 16 août et 1 cadavre au phare le 11 septembre 86 à Ouessant (29N) (premières mentions françaises).

LOCUSTELLE DE PALLAS *Locustella certhiola*

1 le 31 août 87 à Ouessant (29N) (1ère française).

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

Une synthèse sur le statut de l'espèce devrait paraître prochainement

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*

Signalée uniquement à Ouessant (29N) 1 chanteur le 19 mai 87
En octobre 87, 8 ind. identifiés entre le 8 et le 23.

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

Toujours une spécialité ouessantine. En 1986, 1 le 20 août et le 1er septembre puis 7 entre le 13 et le 30 septembre, 3 entre le 18 et le 23 octobre. En 87, 2 le 17 août, 18 données en septembre dont 8 le 24, 3 le 25 et 5 le 30, 6 données en octobre dont 4 le 19 et dernier le 20.
Ailleurs, 1 le 30 septembre 86 à Hoëdic (56).

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*

Nidification prouvée à Quimper (29S) en 88 ce qui reporte très à l'Ouest la limite de répartition de cette espèce. Dans les Côtes d'Armor, les nicheurs les plus occidentaux sont signalés à Plouezec et à ST-Fiacre en 88.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

Mois	Avril 2	Mai 1	Mai 2	Juin 1	Juin 2	Juillet 1
Côte nord	4	9	9	2	2	2
Côte sud	1	1	0	1	0	0
Total données	5	10	9	3	2	2

Les babillardes atteignent la Bretagne fin avril (1er le 23 en 88 à Pleumeur Bodou (22). Le passage culmine durant la 1ère quinzaine de mai et s'achève début juin. Les migrateurs détectés sont essentiellement des mâles chanteurs. L'espèce est toujours rare sur la côte Sud : 1 le 3 mai 87 à Tréogat (29S), 1 le 24 avril 88 à Cleden-Cap-Sizun (29S) et 2 le 6 juin 88 à Belle Ile (56). Les données concernant probablement des nicheurs proviennent de : St-Lunaire (35), Lancieux, St-Jacut et Plouha (22) en 87., l'Ile Grande (22) et Ste-Anne du Portzic (29N) pour 88.

A l'automne, Ouessant (29N) fournit l'essentiel des observations. En 86, 1 le 19 août puis 9 isolés du 17 septembre au 13 novembre sans pic évident. En 87, 1 le 26 et 27 août, 1 le 7 octobre puis 17 données du 16 au 22 octobre. 1 le 21 septembre 86 à Quiberon (56), 2 le 23 août à St-Coulomb (35) et 1 le 29 septembre 87 à Hoëdic (56).

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans*

1 mâle le 18 avril 87 à Ouessant (29N), 1 mâle le 23 avril 87 à Hoëdic (56) et
1 mâle le 22 avril 88 à Ouessant.

FAUVETTE MELANOCEPHALE *Sylvia melanocephala*

1 mâle du 4 au 7 avril 88 à Hoëdic (56)

POUILLOT BOREAL *Phylloscopus borealis*

1 capturé le 16 septembre 87 à Ouessant (29N).

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*

1 les 6 et 7 novembre à Ouessant (29N).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*

A Ouessant : 24-27 individus en 86 dont 1 les 27 septembre et 7 octobre,
puis observations quasi quotidiennes du 13 au 7 novembre, maxi 5 les 26, 27
et le 5 novembre. Enfin 1 du 24 au 26 novembre.
Au moins 18 en 87 : 8 isolés du 1er au 16 octobre, 4 le 19, 5 le 20, 8 le 21,
7 le 22, 3 le 23 puis isolés les 1,2 et 20 novembre.
Ailleurs, toujours peu de données : 1 le 3 novembre 86 à Bréhat (22) où l'on
observe également 1 les 20 et 23 octobre 87, enfin 1 capturé le 20 octobre 87
à Baden (56).

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus*

Uniquement à Ouessant : 1 le 7 octobre 86, 5-6 entre le 22 octobre et le 6
novembre 87. 1 du 19 au 25 avril 88, probablement un oiseau ayant passé
l'hiver dans l'Ouest de l'Europe.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

Espèce rare en dehors des sites de nidification d'Ille et Vilaine et de Loire
Atlantique. 1 le 15 septembre à la Trinité/Mer (56), puis 1 les 17 et 22
septembre 86 à Ouessant (29N). 1 le 21 avril à ST-Malo (35), 1 chanteur le 24
avril 87 à St-Urnan/Kerpert (22). 1 les 16 et 24 septembre 87 à Ouessant.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva*

A Ouessant, passage plus faible que les 2 années passées : 8 en 86 du 17
septembre au 4 novembre, principalement du 24 au 27.
6 en 87 dont 1 mâle ad. entre le 19 septembre et le 23 octobre. Une seule
observation ailleurs, 2 juv. le 11 octobre 86 à Hoëdic (56)

MESANGE REMIZ *Remiz pendulinus*

Peu d'informations transmises pendant la période ; est-ce une réelle raréfaction ? 2 le 18 octobre à Hoëdic (56), 4 le 9 novembre puis 1 le 1er décembre à Sarzeau (56), 1 les 23 et 27 décembre 86 à Erdeven (56) où 2 ind. sont également notés du 25 au 29 mars 87. Seulement 3 données l'année suivante : notée à la mi-octobre à Erdeven, 3 le 21 à Hoëdic et 5 le 25 à Thouaré (44).

PIE GRIECHE ISABELLE *Lanius isabellinus*

1 du 16 au 19 août 86 et 1 du 14 au 16 septembre 87 à Ouessant (29N)

PIE GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

Une augmentation des nicheurs est signalée en Loire Atlantique en 87 : 15 mâles au Petit Mars contre 10 en 86. En 88, une petite population est découverte dans les Monts d'Arrée : 3 sites dont 2 avec reproduction. A l'automne, passage noté fin septembre en 86 à Erdeven (56), Séné (56) et Ouessant (29N), fin août/début septembre sur cette île en 87.

PIE GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

Quelques observations hivernales dans l'intérieur, surtout dans le S.E de la région 1 le 5 novembre à Hanvec (29N), 1 le 3 décembre 86 au Petit Mars (44) 1 du 9 décembre 87 au 16 février 88 à Fégréac (44), hivernage en 87-88 en forêt du Gavre (44).

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*

Au printemps, 1 les 18 avril et 30 mai 87 à Hoëdic (56), 1 les 7 mai et 7 juin 88 à Ouessant (29N). 7 données automnales dont 4 à Ouessant réparties du 15 août au 18 octobre.

MARTIN ROSELIN *Sturnus roseus*

1 imm. de fin octobre 87 au 27 février 88 à Tréogat (29S)

LINOTTE A BEC JAUNE *Carduelis flavirostris*

2 le 20 janvier 87 en baie du Mont St-Michel (35).
1 le 21 septembre 87 à Ouessant (29N)

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

1 le 1er octobre 86 à Ouessant, 1 le 25 décembre 86 à ST-Thélo (22), 8 pendant l'hiver à Rennes (35), hivernage autour de Rennes (35) : 4 à 6 du 24 décembre 86 au 4 janvier à Cesson-Sévigné, 8 le 7 mars et 5 le 17 dans des parcs rennais et à Orvault (44) où 2 femelles sont notées le 5 mars pour la

dernière fois. Enfin, 1 du 30 mars au 3 avril à La Chapelle sur Erdre (44) et 1 mâle à Ouessant (29N) le 10 mai !... De nouveau observé à Orvault (44) à l'automne : 2 femelles du 4 novembre jusqu'au 22 décembre.

SIZERIN BLANCHATRE *Carduelis hornemanni*

1 du 19 au 21 octobre 86 à Ouessant (25N) (2ème observation bretonne).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus*

1 imm. le 23 octobre 86 et 1 les 22 et 24 octobre 87 à Ouessant (29N).

BECCROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

L'invasion signalée dès la fin juin 86 se poursuit pendant l'été et l'automne (13 données dans toute la région).

Pendant l'hiver, l'espèce n'est observée qu'en Ile et Vilaine (forêt de Rennes) 2 et dans les Côtes d'Armor (Kerpert, Les Landes, La Poterie, Plésidy et Perret). Durant le printemps 87, des oiseaux s'attardent dans plusieurs massifs forestiers : forêt de Chevré (35), La Tourneraie/Goven (35), forêt de Rennes (35), forêt de Paimpont (35), de Montfort (35), du Gâvre (44), de Lorges (22) et même dans un parc urbain : 2 couples le 14 mars aux Gayeulles/Rennes.

Suite à une précédente invasion, pendant l'été 83, des Beccroisés étaient restés en nombre jusqu'au printemps suivant et des indices de reproduction avaient été notés dans le Morbihan (chant, parade, construction de nids). Cette année, un nouveau stade est atteint. En mars 87, un nid est localisé en forêt de Rennes, l'incubation est en cours. Malheureusement, la reproduction échoue, le nid tombant au sol lors d'un coup de vent à la fin du mois.

L'espèce fréquente encore cette forêt en avril-mai : 1 mâle le 7 avril, 1 femelle le 5 mai, 3 le 10 et 4 mâles et 1 juvénile le 13 ; d'autres couples ont peut-être eu plus de succès.

Deux observations sans suite début juillet 87 : le 09 en Nord Finistère et le 12 dans les Côtes d'Armor.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla*

2 entre le 20 octobre et le 7 novembre 86 puis 2 entre le 20 octobre et le 4 novembre 87 à Ouessant (29N). 1 mâle le 2 et 3 janvier 88 à Plouézoc'h (29N).

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica*

1 (probablement mâle) le 18 octobre et 1 juv. capturé le 19 octobre 86 à Hoëdic (56). 1 femelle le 8 mars 87 à Trégunc (29S).

SYLVETTE PARULA *Parula americana*

1 femelle du 17 au 27 octobre 87 à Ouessant (29N) (1ère donnée française).

GOGLU BOBOLINK *Dolichonyx oryzivorus*

1 les 15 et 16 octobre 87 à Ouessant (29N) (1ère donnée française).

BIBLIOGRAPHIE

BARGAIN, B et DREZEN, A. (1987).

Annales ornithologiques de la réserve biologique de Trenvel/Treogat (29).
Travaux des réserves, Tome 5/SEPNS : 51-74.

BARGAIN, B. DREZEN, A et HENRY, J. (1989).

Annales ornithologiques de la réserve biologique de Trenvel/Treogat (29).
Travaux des réserves, Tome 6/SEPNS : 1-26.

BREDIN, D et MAILLET, N. (1989).

Dénombrements d'anatidés et de Foulques hivernant en France : Janvier 1988.
Rapport secrétariat à l'environnement : DPN-UNAO-BIROE-LPO. 30 pg.

CHATEIGNER, J.L. (1990).

Nidification du Beccroisé en forêt de Rennes.
Le Grèbe (Publication du Groupe Ornithologique d'Ille et Vilaine)
n° 5 : 99

CHATEIGNER, J.L. et AL. 1990

Actualités Ornithologiques pour l'année 1987.
Le Grèbe n° 5 : 14-94

C.O.B. Bulletins de liaisons N° 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40.

CRUON, R. NICOLAU GUILLAUMET, P et YESOU, P. (1987).

Notes d'ornithologie française.
ALAUDA, 55 (4) : 356-381.

CUISIN, M. (1990)

La répartition du Pic noir (*Dryocopus martius* (L)) en France.
L'oiseau et R.F.O., 60(1) : 1-9.

DUBOIS, P. (1987).

Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1986.
ALAUDA, 55 (4) : 325-355.

DUBOIS, P. (1988).

Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1987.
ALAUDA, 56 (4) : 293-322.

DUBOIS, P. et le comité d'homologation national. (1989).

Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1988.
ALAUDA, 57 (4) : 263-294.

CAROCHE, J. (1989)

Espèces occasionnelles dans les Côtes du Nord, mise à jour N° 1
Bulletin de liaison ornithologique 22. N° 19 septembre 1989 : 32-51.

G.O.L.A. (1988).

Synthèse des observations : post-nuptial/hivernage. 1986/1987.
Bull n° 9 : 8-32.

G.O.L.A. (1989).

Actualités ornithologiques de la période pré-nuptiale, nidification et estivale (Février- Août)
1987.
Bull n° 10 : 1-30.

G.O.L.A. (1989).

Actualités ornithologiques de la période post-nuptiale et hivernale 1987.
Bull n° 10 : 39-70.

GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES COTES D'ARMOR

Résumé des observations
Bulletins de liaison N° 12/13/14/15/16 et 17

- GUERMEUR, Y. (1986).
Rapport ornithologique.
Bull centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 3 : 81 pg.
- GUERMEUR, Y. (1987).
Rapport ornithologique.
Bull centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 4 : 1-65.
- GUERMEUR, Y. (1988).
Rapport ornithologique.
Bull centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 5 : 62 pg.
- LEBAIL, J. (1989).
A propos des observations de Tichodrome, de l'Accenteur alpin, du Bruant fou et du Moineau
soulcie en Loire-Atlantique.
G.O.L.A. Bull n° 10 : 79-80.
- MAHEO, R. (1989).
Limicoles séjournant en France : Janvier 1987.
Rapport BIRGE-ONC. Université Rennes 1 : 31 pg.
- MAHEO, R. (à paraître).
Limicoles séjournant en France : Janvier 1988.
Rapport BIRGE-ONC. Université Rennes 1.
- RECORBET, B. (1987).
La Cisticole (*Cisticola juncidis*) en Loire Atlantique
avant et après la vague de froids de 1985 à 1986.
Bull. G.O.L.A. - N° 8 : 59-68.
- RIOLS, C. (1988).
Oies grises en France : hiver 86-87 (BIRGE/FRANCE : 5 Pg.
- RIOLS, C. (1989).
Oies grises en France : hiver 87-88 (BIRGE/FRANCE : 3 Pg.
- SEPNB. (1986).
Bulletin de la réserve biologique de Palguérec/Séné (56).
n° 4 : 43 pg.
- SEPNB. (1987).
Bulletin de la réserve biologique de Palguérec/Séné (56).
n° 5 : 52 pg.
- SEPNB. (1988).
Bulletin de la réserve biologique de Palguérec/Séné (56).
n° 6 : 40 pg.
- SEPNB. (1987).
Annuaire des réserves Bretonnes et Normandes SEPNB-GON : 53-75.
- SEPNB. (1988).
Annuaire des réserves Bretonnes et Normandes SEPNB-GON : 9-43.

REMERCIEMENTS :

De toute évidence, ce travail n'est pas personnel. Il repose en effet sur les nombreuses observations recueillies par les ornithologues ayant fréquenté la Bretagne au cours de ces deux années. Qu'ils soient tous vivement remerciés pour la contribution qu'ils ont apporté à la connaissance de notre avifaune.

NOVEMBRE 1990

Guillaume GELINAUD
3, rue LE HELLEC
56000 VANNES



Arthya pratenos
Pl. 88.