



AR VRAN

PUBLICATION ORNITHOLOGIQUE DU
LABORATOIRE DE ZOOLOGIE DE LA
FACULTE DES SCIENCES DE BREST

1972 - TOME V, fasc. 2

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES
DU 16 MARS AU 15 JUILLET 1972

BIBLIOGRAPHIE ORNITHOLOGIQUE
BRETONNE

SOMMAIRE

Actualités ornithologique du 16 mars au 15 juillet 1972

par J.-Y. MONNAT

J. LE LANNIC..... 39

Bibliographie ornithologique bretonne

..... 90

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 16 MARS AU 15 JUILLET 1972

par Jean - Yves MONNAT & Joseph LE LANNIC

Ont participé aux présentes actualités :

MM. Jean-Pierre ANNEZO, Loïc ANTOINE, Patrick BAILLEUL, Philippe BAILLEUL, Joseph BALC'H, Annie BARRE, Patrick BECHET, Henry BLANQUART, Yannick BOURGAUT, René BOZEC, Jean-Louis BRAVE, Yves BRIEN, Norbert BRIGANT, Paul CANEVET, Gilbert CAPP, Noël CAPP, Alain CHARRIER, Max CHASSAT, Michel CHAUCHEPRAT, Hervé CORRE, Pierre CRENN, P.Y DALINO, Martine DAVOUST, Pierre DAVOUST, Gilbert DECROIX, Jean DELAUNAY, Philippe DESMARS, Pierre DEWULF, Marc DORVAL, Patrick DORVAL, Jean-Loup DUPONT, Yves FERRAND, Denis FLOTE, Pierre FONQUERNIE, Alain GERARD, Michel GOASDOUE, Yvon GUERMEUR, Patrick HAMON, Jacques HENRY, Jean-Luc HERAUD, Max JONIN, Jean KAIGRE, Lucien KERAUTRET, Ewenn de KERGARIOU, Yvon KERSAUDY, M. de La JAILLE, Maurice LE DMEZET, Jean-Patrick LE DUC, Jacques LE FEVRE, Joseph LE LANNIC, Hervé LELIEVRE, Michel LE PAPE, Marcel LE PENNEC, Raymond LE PENUZIC, LE ROY, Roger MAHEO, Joseph MANAC'H, Jean-Yves MONNAT, Guy MOREL, Jérôme MOUTON, Gérard MOYSAN, Pierre NICOLAU-GUILLAUMET, René ONNO, Hubert PAUGAM, Charles PAVOT, R. PENNEC, René PERON, Joseph PERESSE, Jacques PETIT, Joseph PILLET, Gilles POUILLAUEC, Gérard POUZOUILLIC, Jean-Louis PRATZ, Michel QUANTENNE, Yves RAOUL, Roger REUSEAU, C. STEIN, Joël THERY, Alain THOMAS, Jean-Pierre TURPIN, l'équipe du Collège St-François Xavier de Vannes animée par René MANUAS et un groupe d'ornithologues belges de la Société AVES en excursion en Bretagne du 8 au 12 mai 1972.

PLONGEON SP. (*Gavia* sp.) 6 données

Dont 8 en baie de Morlaix (29N) le 17 mars
et 1 en ce lieu le 1er mai.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) 11 données

6 au Fret/Crozon (29S) le 27 mars,
1 en plumage nuptial à Kerenma/Treflez (29N) le 29 mars, 25 dont 10
→ en plumage nuptial à Penn Hir/Camaret (29S) le 31 mars, 5 en vol vers
le nord à Penwins/Sarzeau (56) le 7 avril et 1 à Beg ar Fom/Trédrez
(22) le 23 avril, dernière observation.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) 11 données

Observations d'isolés dans les Côtes-
du-Nord et le Finistère sauf 2 au Vou-
go/Guissény (29N) le 16 avril. Dernière observation : 1 à Beg ar Fom/
Trédrez (22) les 1er et 4 mai.

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) 2 données

1 en plumage nuptial à la pointe
du Croisic (44) le 19 mars et 1 le 5 avril à Kerenma/Treflez (29N).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*). 85 données.

Le départ des hivernants des localités maritimes se fait selon un schéma sensiblement identique à celui décrit en 1971. Dans le Golfe, localité bien suivie, on note : 110 le 17 mars, 40 le 21 mars, 20 le 12 avril, 40 le 15 avril, de 40 à 50 dans la seconde quinzaine d'avril, 35 le 3 et 30 le 4 mai ; cette localité ne fournit plus d'observations jusqu'au 2 juin, date où l'on retrouve 30 ind. sans doute estivants ; 40 ind. le 15 juin, puis 50 ind. les 4, 7, 10 et 14 juillet. Neuf observations en mer dans la seconde quinzaine de mars, dont : 4 à Trédrez (22) et 4 à Moustierlin/Fouesnant (29S) le 16, 3 à la pointe du Croisic (44) le 19, 2 à Trédrez le 23 ; les sept observations en mer dans la première quinzaine d'avril ne concernent, en dehors du Golfe, que des isolés ; sur les six observations marines de la seconde quinzaine d'avril cinq proviennent du Golfe et une de Penerf/Dangan (56) : 18 ind. le 22 ; seulement trois observations dans la première quinzaine de mai dont 3 en baie de Baussais/St-Jacut (22) le 10. Retours en mer dans la première quinzaine de juillet : dans le Golfe, on passe de 40 à 50 ind. ; 1 à 1/2 mille au large de la pointe du Croisic et 1 en baie de la Fresnaye (22) le 11 juillet.

Nidification.- Parades notées le 18 mars à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen (35) et le 19 au Vioreau (44). Construction du nid le 6 avril au Rouvre. Premières pontes notées le 8 mai au Rouvre : deux nids contiennent 4 oeufs, un nid 3 oeufs et un nid un oeuf. Premiers poussins le 3 juin au Cranic/Brec'h (56), le 5 juin au Rouvre, le 10 juin au Vioreau...

Ille-et-Vilaine.- 4 couples à l'étang du Rouvre et un minimum de 8 couples à l'étang du Boulet/Feins (8 nids trouvés le 19 mai, mais 19 adultes présents).

Côtes-du-Nord.- 2 ad. à l'étang des Salles/Perret le 30 avril et 2 couples minimum à l'étang de la Hardouinais le 1er mai.

Finistère.- Aucun recensement précis au Yeun Elez, seul lieu de reproduction de l'espèce dans ce département.

Morbihan.- A l'étang du Cranic, maximum de 21 ad. le 4 avril, mais seulement 5 couples et 1 adulte le 3 juin ; 1 couple à l'étang de Noyal ; 4 ad. à l'étang du Rocher/St Dolay le 14 juillet.

Loire-Atlantique.- 1 couple à l'étang du Gué-aux-Biches/St-Gildas-des-Bois le 30 avril ; 4 ad. à l'étang de la Roche-Hervé/Sévérac le 29 avril ; 2 couples au lac de Murin/Massérac ; maximum de 8 couples le 7 avril au Vioreau ; 4 ad. à Haute-Goulaine le 24 juin ; 4 ou 5 couples à St-Aignan-Grand-Lieu.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*). 2 données

5 ind. dont 2 en plumage nuptial
à Kergleuz/Landéda (29N) le 29 mars et 1 à Beg ar Forn/Tredrez (22) le 8 avril.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) 10 données

Dans le Golfe (56), 20 le 17 mars, 10 le 21 mars, 3 le 12 avril, 5 le 18 avril et aucun le 24 avril. Encore 6 à Keremma/Treflez (29N) le 29 mars, 2 à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 7 avril et 2 en Penzé (29N) le 16 avril.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*) 76 données

Observations en mer jusqu'au 7 avril. A Kerogan/Quimper (29S), 20 le 18 mars, 5 le 31 mars ; en Penzé (29N), 12 le 17 mars, 1 le 7 avril ; 2 en rivière d'Etel (56) et 1 au Len/Louannec (22) le 7 avril.

Nidification.- Chants à partir de la fin-mars : le 30 mars au lac de Murin/Massérac (44), le 6 avril à Bétahon/Ambon (56), le 9 avril au Vioreau (44)... Oeufs le 3 mai à Langonnet (56)... Premiers poussins le 20 mai à St-Renan (29N).

Très peu de nouvelles données concernant la répartition. Dans les Côtes-du-Nord, oiseaux présents à l'étang de Trébry. Dans le Finistère, oiseaux et couples présents à l'étang du Pont/Kerlouan, à Ménéham/Kerlouan, à Kergoadès/Brélès, à Trévignon/Trégung ; chants au Yeun Elez ; poussins à St-Renan. Dans le Morbihan, adultes présents aux marais de Bodaval/Le Tour-du-Parc ; chants à Kerzine/Flouhinec, Roc'h Du/Crac'h ; nids ou oeufs à Priziac et Langonnet ; familles à Keraveon/Erdeven. En Loire-Atlantique, oiseaux présents à Sucé ; chanteurs au Vioreau et à Murin/Massérac ; juvéniles à Thouaré-sur-Loire.

PETREL TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*) 6 données

En dehors des sites de reproduction, 1 le 23 mai au sud de Penmarc'h (29S), 15 autour d'un cadavre de cétacé le 30 mai entre Belle-Ile (56) et Yeu, 10 autour d'un cadavre de cétacé le 6 juin dans l'Iroise (29).

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*) 45 données

Essentiel des observations en juin-juillet. 10 en pêche au Croisic (44) le 17 mars, 2 au Conquet (29N) le 31 mars, 8 à Molène (29N) le 1er avril... Observations plus régulières dans la seconde quinzaine de mai ; relevons : 10 au Croisic le 31 mai. Les observations se multiplient à partir de la mi-juin. Au Croisic, 100 à 150 en vol vers le nord le 24 juin, 500 dont une bande de 150 à 200 le 30 juin, 50 en pêche le 2 juillet ; nombreuses observations au Cap Fréhel dont 12 le 10 juillet et 50 le 14 juillet.

9 données concernent la race des Baléares (*P. p. balearicus*) : 5 vers l'ouest à Brignogan (29N) le 2 mai, 2 vers le sud au Croisic le 7 mai, 9 au Croisic le 29 mai, 20 au Croisic le 31 mai, 1 à Fréhel le 21 juin, 3 au Croisic et 10 à Fréhel le 4 juillet.

FULMAR (*Fulmarus glacialis*) 22 données

Seulement deux observations hors des lieux de reproduction : 1 dans l'Iroise (29) le 23 mai et 1 en phase sombre entre Belle-Ile (56) et Yeu le 30 mai.

Nidification.- Au Cap Fréhel (22), une quinzaine d'observations du 27 mars (3 ind.) à la fin de la période, mais il ne semble pas y avoir eu de ponte ; maximum de 17 oiseaux le 14 mai ; encore de 1 à 6 ind. en juillet. 2 ind. en vol autour de Berniou Pez/Canaret (29S) le 31 mars. A la réserve Michel-Mervé Julien, maximum de 10 couples dans la falaise avec en plus 9 oiseaux en vol le 28 avril ; 3 pontes en 1972 et plusieurs couples sur Milinou Bras.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) 95 données

Des groupes importants de Cormorans sont notés jusqu'à la dernière décade d'avril. Dans le Golfe, passage probable dans la première quinzaine d'avril : 19 le 17 mars, 17 le 21 mars, 20 le 5 avril, 30 le 6 avril, 31 le 12 avril, 34 le 15 avril, 12 le 18 avril, 1 les 24 et 25 avril. A Tréboul (29S), décroissance régulière des effectifs qui passent de 16-19 à la mi-mars à quelques unités seulement en avril. En outre, 15-20 dans le port de Brest (29N) le 31 mars, 20 à Moustierlin/Fouesnant (29S) le 2 avril, 15 à l'Ile Longue/Loctmariaquer (56) et 60 à Méaban/Loctmariaquer le 7 avril, 30-35 à la pointe du Castelli (44) le 9 avril, 10 à Kerhuon (29N) le 15 avril, 25-30 au Castelli le 16 avril et 30-35 au même endroit le 23 avril...



Cormoran huppé au nid

photo Max JONIN

Peu d'oiseaux dans la première quinzaine de mai. Retenons : 1 imm. à l'étang de Gourveau/St-Gilles (22) le 1er mai, 9 à Tréboul le 6 mai, 8 au Castelli le 11 mai et 8 dans le Golfe le 15 mai. La plupart des observations suivantes ne concernent que des immatures, en petit nombre.

Nidification.- Nouvelle augmentation des effectifs à l'île des Landes (35) : 8 nids occupés le 21 mai et 10 à 12 nids le 15 juin.

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) 20 données
Premières pontes le 27 mars au Cap Fréhel (22).

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) 160 données
Les observations restent courantes en zone maritime jusqu'au 10 mai environ (18 données sur 29 dans la seconde quinzaine de mars et 15 données sur 26 dans la première quinzaine d'avril), mais ne concernent plus que de petites bandes, principalement sur les lieux d'hivernage. En rivière de Pont-l'Abbé (29S), 12 le 16 mars, 9 les 19 et 25 mars, 10 les 6 et 9 avril ; 6 à la Poitevineière (44) le 19 mars, 5 à Penn en Toull/Larmor-Baden (56) le 23 mars, 4 à Kerogan/Quimper le 31 mars, 4 à Billion/Ambon (56) le 7 avril...

Du 10 avril à la fin-juin, hors des sites de nidification, les données concernent surtout des oiseaux isolés, avec cependant : 6 en vol vers l'ouest à la Prévotais/St-Vincent sur-Oust (56) le 10 mai, 7 à l'étang de Noyalo (56) le 19, 3 à Lanroz/Quimper le 20 mai et le 10 juin, 3 à St-Renan (29N) le 2 juin...

Mais à partir du mois de juin on note déjà les premiers indices de dispersion avec l'apparition de juvéniles hors des lieux de reproduction : ainsi, 2 juv. à l'étang de St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 3 juin, 1 juv. à Goulven (29N) le 22 juin... Le retour devient évident fin-juin et surtout en juillet : 16 en rivière de Pont-l'Abbé le 30 juin, 11 ad. et juv. à Lanroz le 1er juillet, 17 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 2, 32 à St-Jean le 6, 17 à Lanroz le 8, 28 à Séné (56) et 46 à St-Jean le 9, 20 au Roc'h Du le 10, 43 à St-Jean le 12, 5 dans le Yeun Elez (29) et 15 en rivière de Pont-l'Abbé le 13, 6 à Perharidy/Santec (29N) le 15.

Nidification.- Dans une colonie de Brière (44), 40 à 50 nids contenant oeufs et poussins le 31 mars, nombreux poussins tombés du nid le 14 avril, quelques pontes fraîches le 28 avril. Les oiseaux observés sur les salines de Guérande (44) nichent à Ville-neuve/Guérande. 3 pontes pour 4 couples présents dans les marais de Suscinio/Sarzeau (56) le 8 avril, encore des poussins au nid le 19 mai.

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*). 5 données.

A Grand-Lieu (44), 2 le 26 mars, 5
les 20 mai et 9 juin, 2 le 18 juin, 3 dont 1 "inquiet" le 29 juin.
1 à Arradon (56) le 10 mai.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) 5 données

1 en vol le 1er mai au Vioureau
(44), 1 le 20 mai à Ste-Lumine-de-Grand-lieu (44), 3 le 21 mai entre
Machecoul et Bouin (44), 12 le 9 juillet dans les marais de Bourgneuf
(44) et 4 le 11 juillet dans les marais des Moutiers (44).

HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*) 2 à St-Aignan-Grand-Lieu (44)
le 18 juin.

GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*) 3 données

1 à St-Aignan-Grand-Lieu (44) le 23
mars, 1 à Brêlès (29N) le 18 avril et 1 à Trenchel/Treogat (29S) le
15 juillet.

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) 1 en mars-avril à Marta/Belle-Ile
(56).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) 5 données

1 dans les marais de Séné (56)
le 12 mai et 1 ad. à l'étang de St-Jean/Loceol-Mendon (56) les 6, 9
et 12 juillet.

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*). 1 imm. à Goulven (29N) le 28 mars.

OIE CENDREE (*Anser anser*) 2 données

1 le 6 avril dans les marais de Bétahon/
Ambon (56) et 1 le 8 avril à Goulven (29N).

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) 10 données

Dans le Golfe (56), encore 300 le
17 mars, 130 le 21 mars, 100 le 28 mars, aucune le 4 avril et 6 le 24
avril. A Goulven (29N), 50 le 23 mars, 14 le 28 mars et 7 le 29 mars.
A la Turballe (44), 16 le 26 mars.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) 113 données

A côté des couples nicheurs can-
tonnés on observe un peu partout des rassemblements plus ou moins
importants tout au long de la période : 50 dans le Golfe le 17 mars,

19 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 25 mars, 27 en baie de la Fresnaye (22) le 27 mars, 21 dans le Golfe le 5 avril, 60 au Vivier-sur-Mer (35) le 16 avril, 65-70 au Moustoir/Arzal (56) le 22 avril, 12 à la pointe de Castelli/Piriac (44), 11 à la Richardais (35) le 10 mai, 17 en baie de Beausais/St-Jacut (22) le 26 mai, 10 au Petit Traict du Croisic (44) le 28 mai, 10 à Keroullé/l'Hopital-Camfrout (29N) le 11 juin... 18 en vol à 3 milles au large du Croisic le 4 juillet.

Nidification.- Parades les 19 et 25 mars en rivière de Pont l'Abbé ; poussins le 11 mai à Dolan/Séné (56), le 22 mai en baie de l'Arguenon (22)... encore des poussins de moins d'une semaine le 14 juillet dans l'estuaire de la Vilaine (56).

Ille-et-Vilaine.- Noté à plusieurs reprises en baie du Mont-St-Michel (55 adultes et juvéniles de l'année le 5 juillet), à la Richardais dans la Rance et à l'île des Landes/Cancalle (12 le 21 mai).

Côtes-du-Nord.- Nidification établie en baie de Beausais/St-Jacut (5 couples nicheurs ; 6 poussins le 6 juin), en baie de l'Arguenon (6 poussins le 22 mai), dans l'anse d'Yffiniac (8 poussins le 16 juin) ; 1 couple au sillon du Len/Lousnnec et 1 ind. aux Sept-Iles.

Finistère.- Nidification établie dans l'Aulne (12 couples cantonnés le 25 mai, 4 familles minimum le 14 juin), à Trielen dans l'archipel de Molène (2 ad. et 9 juv. le 7 juillet) et en rivière de Pont-l'Abbé (3 familles le 13 juillet). Couples présents à Goulven, Aber Wrac'h, Aber Benoit, archipel de Molène, Elorn, rivières de l'Hopital-Camfrout et du Faou.

Morbihan.- Nidification établie à Dolan/Séné (3 couples et 10 poussins le 11 mai, 2 couples, 8 juvéniles et 6 poussins le 22 juin) et dans l'estuaire de la Vilaine (12 adultes, 9 juvéniles et 5 poussins le 14 juillet). Couples notés à Noyal, dans l'étier de Caden, à Ambon, à Arzal.

Loire-Atlantique.- Oiseaux et couples régulièrement notés à la pointe du Castelli et dans les salines de Guérande.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) 204 données

Aucun mouvement perceptible en fin d'hivernage.

Nidification.- Des oiseaux alarment le 6 avril à Lanroz/Quimper (29S) et le 7 avril à Lann Garzel/Trémaouézan (29N)... 10 oeufs le 20 avril à Guisriff (56)... Mais poussins dès le 17 avril au Vergier/Gestel (56), le 23 avril à l'étang de Montauban (35) et à Port la Roche/Machecoul (44), le 26 avril à Séné (56), etc...

Nidification prouvée ensuite à St-Renan (29N), à l'étang des Salles/

Perret (22), à Ménéham/Kerlouan (29N), à l'étang de Pleucadeuc (56), à St-Vic/Tréguennec (29S), à l'étang du Boulet/Feins (35) (3 pontes de 8, 9 et 10 oeufs et 6 poussins le 13 mai), à Kerjean/Trébabu (29N), au Vioreau (44), à Moulin Mer/Logonna-Daoulas (29N), à Trébeurden (22), à Priziac (56), à Brennilis (29N), à l'étang du Roz/Silfiac (56), à Larvor/Loctudy (29S), à Trenvel/Tréogat (29S), au Curnic/Guissény (29N), au lac de Grand-Lieu (44), dans les marais de Bourgneuf-en-Retz (44), à Kerascouet/Tréglonou (29N) (poussins le 9 juillet)... Premiers juvéniles volants notés le 8 juin à St-Renan, le 10 juin au Vioreau...

Comme les années précédentes, c'est en juillet que se forment les premières grosses bandes : 40 au Curnic le 1er, 150 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 6, 40 au bois du Mur/St-Evarzec (29S) le 7, 40 au Pont Neuf/le Tour-du-Parc (56) et 120 à St-Jean le 9, 66 à Ménéham le 11, 190 à St-Jean le 12, 65 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 13...

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) 29 données

Douze observations sur la fin de l'hivernage dans la seconde quinzaine de mars : A St-Renan (29N), 33 le 16 mars, 20-25 le 20 mars, 26 le 25 mars, 8 le 1er avril ; au Vioreau (44), 16-18 le 18 et 12 le 19 mars ; 26 à la Poitevineière (44) le 19 mars ; 5 au Curnic/Guissény (29N) et 3 à Goulven (29N) le 23 mars ; 1 couple au Boulet/Feins (35) le 25 mars.

Des dix données d'avril à fin-juin, une seule concerne certainement des oiseaux de passage : 30 dans le Golfe (56) le 30 avril.

La nidification n'a été vraiment établie cette année que dans le site classique du Yeun-Elez (29N). Par ailleurs, 1 couple à Menez Kamm/Spézet (29N) le 12 avril, 1 à Ménéham/Kerlouan (29N) le 16 avril, 1 ♀ à Priziac (56) le 3 mai, 1 à Roc'h Du/Crac'h (56) les 18 mai et 3 juin, 1 couple à Kerouriec/Erdeven (56) le 14 juin.

Six données en juillet : toujours au Roc'h Du, 3 le 10 et 8 le 13 ; 1 ♀ au Curnic/Guissény (29N) le 1er et 1 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 12.

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) 6 données

1 couple à Priziac (56) le 22 mars, 2 ♂ et 1 ♀ au lac de Murin/Massérac (44) le 31 mars, 1 couple à Trenvel/Tréogat (29S) le 1er mai, 1 couple à Roc'h Du/Crac'h (56) le 21 mai, 1 ♀ dans l'embouchure de l'Ognon au lac de Grand-Lieu (44) le 29 juin, les trois dernières observations étant particulièrement tardives pour la Bretagne.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*). 9 données


Dans le Golfe (56) 200 le 17 mars et 50 le 21 mars. 1 ♂ au Vioreau (44) le 18 mars ; 1 ♂ à l'île

Kerlouan (29N) et 3 en baie de Goulven (29N) le 28 mars. Retours en juillet : 1 ♂ à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 6, 1 ♂ à l'étang du Pont/Kerlouan le 8 et 1 ♀ à l'étang de Noyal (56) le 9.

CANARD PILET (*Anas acuta*) 16 données

Observations très groupées du 16 mars au 22 avril. A St-Renan (29N), 1 en mars, 3 ♂ le 15 avril. 30 dans le Golfe (56) le 17 mars, 1 couple à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 28 mars, 2 ♂ et 1 ♀ dans les marais de la Vilaine/Massérac (44) le 1er mai, 13 à Dolan/Séné (56) le 4 avril, 15 à Brouel/Séné le 6 avril, 1 couple à Ambon (56) le 7 avril, 1 au marais de Bodaval/le Tour-du-Parc (56) le 8 avril, 14 à Penerf/Dangan (56) le 22 avril.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) 73 données.



Il n'est guère possible étant donné la faiblesse des effectifs de limiter le passage avec précision. Il semble cependant que pour l'essentiel il se termine à la mi-avril. 3 couples à St-Renan (29N) le 16 mars, 2 couples à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 18 mars, 9 à St-Renan le 20 mars, 2 couples à Goulven (29N), 1 couple au Curnic/Guissény (29N) et 3 à la boire de Mauves (44) le 23 mars, date à laquelle le passage se généralise... 8 à Kerlouan (29N), 23 à St-Vio le 3 avril, 10 à St-Renan le 7 avril, 4 couples aux marais de Bodaval/Sarzeau (56) le 8 avril, 10 à St-Re-

nan le 15 avril... Après cette date les observations s'espacent et les "bandes" se réduisent encore. A partir de mai, toutes les données se rapportent sans doute aux sites de reproduction sauf, peut-être, 2 ♂ à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 2 mai et 1 couple à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 10 mai.

Nidification.- Elle n'a été établie avec certitude en aucun point de Bretagne cette année. Elle est cependant très probable à l'embouchure de l'Ognon dans le lac de Grand-Lieu (44), sur la prairie de Mauves (44) (♀ certainement couveuse le 2 juin), aux marais de Bodaval/Sarzeau (56) (♀ accompagnée de 2 juv. le 9 juillet), à l'étang de Kerzine/Plouhinec (56) (♀ alarmant le 3 juillet), et à St-Renan (2 couples présents tout au long de la période, ♀ alarmant le 15 juin). En outre, couples nombreux en baie d'Audierne, 2 couples à Ménéham/Kerlouan le 8 juin (où la nidification fut prouvée en 1971). Enfin, oiseaux présents au Curnic (2) le 22 juin, à l'étang du Pont (4 couples) le 7 juillet et à Bourgneuf (44) (8 ind. le 9 juillet).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) 34 données.

Le passage, très faible cette année, s'étale jusqu'à la fin avril, toutes les données de mai-juin ayant été recueillies dans les marais de la baie d'Audierne (29S), localité classique de nidification. 12 au Vioreau (44) et 7 à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen (35) le 18 mars, 1 à St-Renan (29N) le 25 mars, 4 au Rouvre le 28, 27 au lac de Murin/Massérac (44) le 30, 8 ♂ et 8 ♀ au Rouvre le 6 avril... 1 couple aux marais d'Ambon (56) le 22 avril, 1 ♀ et 2 ♂ à l'étang de Montauban (35) le 24, 7 à Suscinio/Sarzeau (56) le 27, 4 ♀ et 5 ♂ au lac de Murin le 29 avril.

Aucune estimation des effectifs nicheurs de la baie d'Audierne.

Seule donnée de juillet, 1 ♀ dans les marais de Bodaval/Sarzeau (56) le 9.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) 39 données

Les départs se poursuivent dans la seconde quinzaine de mars. Il s'y superpose peut-être un petit passage puisque l'on note 15 ind. le 18 en baie de Kerogan/Quimper (29S) contre 5 oiseaux seulement le 21 février... 13 à St-Renan (29N) le 20 mars et 17 dont 7 ♂ au Yeun-Elez (29N) le 26 mars. 12 à St-Renan le 28 avril alors que depuis le début du mois les effectifs de cette localité variaient entre 1 et 3 ind. 1 ♂ attardé au lac de Murin/Massérac (44) jusqu'au 30 avril au moins.

Cette année l'espèce a régulièrement fréquenté St-Renan (2 ♀ le 8 juin, 1 ♀ par la suite) et le Yeun-Elez (29N) (1 couple, 4 ♂ et 1 ♀ le 21 mai, 11 dont 3 ♂ le 9 juillet entre autres données). Elle a également été notée en baie d'Audierne (29S) : 2 ♀ au Moulin de Bondivy/Plonéour-Lanvern le 13 mai... à Kersine/Plouhinec (56) (1 ♂ très inquiet le 3 juillet) et aux marais de Bodaval/Sarzeau (56) (7 dont 4 ♂ le 9 juillet).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 42 données

Essentiel des données (22) jusqu'à la mi-avril, mais en 9 localités seulement : à St-Renan (29N), de 2 à 7 oiseaux, 12 à Kerogan/Quimper (29S) le 18 mars, 6 au Boulet/Feins (35) le 25 mars, 1 ♀ à Ménéham/Kerlouan (29N) le 28 mars, 2 au Cranic/Brec'h (56) le 31 mars, 7 au Yeun-Elez (29N) le 2 avril, 8 à Trévignon/Trégunc (29S) et 1 couple à l'étang du Pont/Kerlouan le 5 avril. De cette date à la fin-juin, observations régulières ou presque en 3 localités finistériennes. A St-Renan, 1 couple les 12 et 13 avril, 2 couples les 15 et 18 avril, 1 couple les 29 avril et 2 mai, 1 ♂ du 24 mai au 24 juin, 1 couple les 24 et 27 juin. Au Yeun-Elez, 4 ♂ le 1er mai, 1 couple et 1 ♂ le 17 mai. En baie d'Audierne (29S), 1 couple le 16 avril (St-Vio), 1 couple le 21 mai (Trenvel) et 4 le

2 juin (Trenvel) 12 en vol à la Poitevinière (44) le 28 mai. Enfin, en juillet, 1 ♂ à Goulven (29N) le 6 et 2 ♂ à l'étang du Pont le 7.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) 2 données

1 ♀ à Ménéham/Kerlouan (29N) le 29 mars, 3 ♂ et 12 ♀ à Bétahon/Ambon (56) le 4 avril.

EIDER (*Somateria mollissima*) 8 données

En baie de Morlaix (29N), 11 du 16 au 22 mars, 1 le 28 mars. En juillet, 1 ♀ à la pointe du Croisic (44) le 7, 2 ♀ en vol à cette même pointe et 2 ♀ en vol vers le nord 3 milles au nord-ouest de la pointe du Croisic le 14.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) 49 données.


De forts stationnements sont observés en mer jusqu'à la mi-avril : 1000 sur la côte sauvage du Croisic (44) le 17 mars, 300 au Ri/Kerlaz (29S) le 25 mars, 180 à Penerf/Damgan (56) le 7 avril, 300 à Etel (56) et 200 à la pointe du Croisic le 16 avril. Le 31 mars, 4 ind. en vol vers le nord entre le Conquet et Molène (29N). Seulement 4 observations du 16 avril à la mi-juin : à Penerf, 6 le 22 avril, à la pointe du Castelli/Piriac (44), 15 le 1er et 7 le 11 mai, 20 au vol entre Houat et Quiberon (56) le 29 mai. Puis rien de cette date au 24 juin, époque où débute une série d'observations à la pointe du Croisic : 16 vers le nord le 24 juin, 56 vers le nord le 30 juin, 18 vers le sud sur un parcours de 5 milles en mer au large du Croisic le 3 juillet, 10 vers le sud 1 mille au large et 43 vers le nord 1,5 mille au large le 4 juillet, enfin 10 à la pointe le 7 juillet. En outre, 9 à Erdeven (56) le 5 juillet et quatre observations au Cap Fréhel (22) à partir du 8, dont 5 vers le sud le 8 et 26 le 15.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*) 6 données

Dans le Golfe (56), 200 le 17 mars, 20 le 21 mars, 25 le 28 mars, aucun le 12 avril. 1 ♂ à Kergleuz/Landéda (29N) le 29 mars et 1 ♂ imm. à Roc'h Du/Crac'h (56) le 21 mai.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*) 51 données

Cinquante de ces observations sont très



groupées du 16 mars au 1er mai. Dans le Golfe (56) on enregistre l'évolution suivante : 120 le 17 mars, 80 le 21 mars, 110 le 28 mars, 120 le 12 avril, 90 le 15 avril, 55 le 18 avril, 75 le 24 avril, 100 le 25 avril, 40 le 27 avril, 25 le 28 avril et 1 le 1er mai. En Penzé (29N), 18 le 20 mars, dernier le 13 avril. En rivière de Pont-1'Abbé (29S), 11 le 17 mars, dernier le 22 avril. 10 de Concarneau à Beg Meil/Fouesnant (29S) le 5 avril. 7 dans l'archipel de Molène (29N) le 31 mars. 12 en rivière de Pénérif (56) le 22 avril...

→ Enfin des Harles huppés ont estivé dans le Golfe du Morbihan où 2 couples étaient observés épisodiquement de la fin-avril au 10 juillet.

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*) 1 ♀ le 3 juin au Cranic/Brec'h (56).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 86 données

Encore quelques groupes dans la seconde quinzaine de mars : 9 en forêt d'Ancenis (44) le 19, 7 au Temple/Pont-Scorff (56) le 20, 3 couples à Priziac (56) le 22, 5 à St-Aignan-Grand-Lieu (44) le 23, 3 aux landes de Lanfains (22) le 26 et 3 à l'étang du Rouvre (35) le 28.

Deux données peuvent se rapporter à des migrateurs : 4 ou 5 en vol vers le nord au Vioreau (44) le 5 avril et 1 en vol vers le nord-ouest à St-Nazaire (44) le 28 avril.

Nidification.- Parades notées le 18 mars au Vioreau (7 ind.) et le 19 mars à Trans-sur-Erdre (44). Deux pontes de deux oeufs le 4 avril à Plouray (56) ; 1 oeuf le 6 avril à Lanroz/Quimper (29S). 2 poussins le 17 mai à Plouray, 3 poussins le 18 avril à Lanroz...

Ille-et-Vilaine.- En forêt de Rennes, 1 le 14 avril ; à Beauvais/Painpont, 4 couples visibles d'un point d'observation le 25 mai ; à l'étang de Comper/Painpont, 1 le 25 mai ; au Pas-du-Houx/Painpont, 1 le 26 mai.

Côtes-du-Nord.- A la Cime de Kerchouan/Quintin, couveuse au nid le 16 avril ; à Hénanbihen, 1 le 24 avril ; en forêt de Quénécan, 10 dont 6 à l'étang des Salles/Perret le 30 avril ; à Ker Martail/Corlay, 1 le 1er mai ; 1 à Plouagat, 1 à Plougras et 1 en forêt de Lorges le 26 mai ; 1 à Loc-Envel le 26 juin et 1 à St-Michel-en-Grève le 12 juillet.

Finistère.- Nidification établie à : Cheffontaines/Clochers-Fouesnant (nid vide le 24 avril), à Lanroz/Quimper et en forêt du Cranou (2 poussins le 22 juin...). 1 transportant des matériaux en forêt de Landevennec le 25 mai. 1 à Lescoat/Plouigneau le 9 avril, 1 au sud de St-Rivoal le 24 avril, 1 à Tremazeuzan le 12 mai, 1 à Milizac le 24 mai, 1 à Kerninaouët/Tregunc le 21 mai, 1 à Dineault et 3 couples dans les Montagnes Noires le 25 mai, 1 au Ponthou le

28 mai, 1 couple à Hengoat/St-Cadou et 1 à Kernaven/St Rivoal le 30 mai, 1 couple à Berrien le 7 juin, 1 à St-Renan le 11 juin, 1 couple à Logonna-Quimerch le 14 juin, 1 au Yeun-Elez le 9 juillet et 1 à Brasparts le 11 juillet.

Morbihan.- Nidification établie à Plouray (2 nids), à Meslan, à Lanvénege (3 poussins dénichés le 22 juin), et au bois de Lezuis/le Heze (2 nids). 1 couple à l'étang de Noyalo le 13 avril, 1 à St-Molff le 9 avril, 1 à Malachappe/Plouray le 22 avril, 1 couple à Suscinio le 27 avril, 1 couple à le Tour-du-Parc le 19 mai, 2 à St-Méen/Ploermel le 14 juin, 1 couple en forêt de Meucon le 5 juillet, 1 au Faouët le 8 juillet.

Loire-Atlantique.- 2 couples au Vioreau le 5 avril, 3 ou 4 en forêt de l'Arche/la Meilleraye-de-Bretagne le 5 avril, 1 couple en plaine de Mazerolles/Sucé le 11 juin, 1 à St-Gildas-des-Bois le 29 avril, 2 à St-Lyphard le 1er mai, 1 transportant un serpent en forêt du Cellier le 16 mai, 6 couples entre St-Aignan-Grand-Lieu et St-Mars-de-Coutais le 20 mai, 1 en marais de Haute-Goulaine le 24 juin.

EPERVIER (*Accipiter nisus*) 18 données

Ille-et-Vilaine.- 1 en chasse le 18 mars à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen, 1 ♀ capturant un Bruant jaune à Marpiré le 25 mai.

Côtes-du-Nord.- 1 imm. tué par un chat à St-Michel-en-Grève le 4 juillet.

Morbihan.- A Lanvénege, trois oeufs le 7 mai. A le Saint, 4 oeufs le 10 mai, 4 poussins de 2 ou 3 jours le 16 juin, encore 4 poussins le 3 juillet. Au Faouët, 4 poussins de 2 ou 3 jours le 22 juin, toujours au nid le 3 juillet. A Meslan, 3 poussins le 30 juin, 3 juvéniles envolés le 3 juillet. 1 ♂ à St Armel le 17 mai et 1 ♂ à Suscinio/Sarzeau le 19 mai.

Loire-Atlantique.- Au Vioreau, 1 ♂ les 18 mars, 5 avril, 1er mai et 2 juillet. 1 au canal de Haute-Perche/Chauvé le 11 juillet.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*). 23 données en six localités de Loire-Atlantique.

A Grand-Lieu, 1 le 23 mars (St-Aignan), 5 le 26 mars, 8 le 11 mai, environ 10 couples le 20 mai, 6 le 9 juin (St-Aignan), 10 ad. le 29 juin (St-Aignan). En Brière, 2 à la Chapelle-des-Marais et 3 pour 25 km² le 31 mars, 4 pour 25 km² le 28 avril, 1 au canal de la Taillée le 30 avril, 2 à Mayun le 1er mai, 1 les 21 et 22 mai. Au Vioreau, 3 le 5 avril, 1 le 9 avril, 1 le 1er mai, 3 le 10 juin et 1 le 18 juin. Au lac de Murin/Massérac, 1 le 1er avril, 1 le 26 mai. En plaine de Mazerolles, 1 le 6 juin et

1 ou 2 le 11 juin. 1 en pêche à Port-Breton/la Chapelle-sur-Erdre le 8 juillet.

BONDREE (*Fernis apivorus*) 12 données

Première arrivée le 1er mai : 1 au Vioresau 44. 2 en migration vers l'ouest le 19 mai à St-Etienne-de-Montluc (44).

Nidification.- Deux oeufs le 10 juin, éclosion le 8 juillet à Lan-roz/Quimper (296).

Côtes-du-Nord.- 1 en forêt de Lorge le 28 mai.

Finistère.- Nidification établie près de Quimper (voir ci-dessus).

1 couple parade en forêt de Landevennec le 25 mai. 1 en forêt du Huelgoat le 7 juin.

Morbihan.- 1 à Cadoudal/Plumelec le 6 juillet.

Loire-Atlantique.- 1 au Vioresau le 10 juin ; 1 à St-Aignan-Grand-Lieu le 29 juin. A Mauves, 1 le 3 juillet, 1 autre le 11 juillet.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) 25 données

Une seule observation hors des sites habituels de reproduction : 1 ind., sans doute imm., sur la lande de Fréhel (22) le 12 mai.

Nidification.- Il faut noter que la présence d'immatures, souvent notés "q", ne permet pas d'apprécier le nombre réel de nicheurs.

Morbihan.- Presqu'île de Rhys : à Bodaval/le Tour-du-Parc, 2 le 6 avril et 1 "q" le 8 avril. à Suscinio/Sârzeau, 2 le 7 avril, 4 "qq" le 8 avril, 1 q le 26 avril, 1 couple et 1 "q" le 19 mai, 1 le 25 mai, 1 couple et 1 q le 13 juin, 1 couple, 2 juv. encore nourris et 1 q le 29 juin.

Loire-Atlantique.- Lac de Grand-Lieu : 3 à St-Aignan le 23 mars, 6 couples le 20 mai, 1 couple à St-Aignan le 9 juin et 3 à St-Aignan dont 1 q et 1 juv. le 29 juin. Brière : 4 notés sur une surface de 25 km² les 31 mars, 14 et 28 avril. Pays de Retz : 1 au Collet/Bourgneuf le 23 avril, 1 dans les marais de Bourgneuf le 9 juillet, 2 près du canal de Haute - Perche le 11 juillet et 1 imm. sur la vallée du Boivre/St-Père-en-Retz le 13 juillet.

BUSARD ST-MARTIN (*Circus cyaneus*) 1 q dans les monts d'Arrée (29N) le 10 mai et 1 couple à Séné (56) le 12 juillet.

BUSARD CENDRE (*Cyrus pygargus*) 51 données

Arrivée tardive, ou tardivement notée ?

1 ♂ au Collet/Bourgneuf-en-Retz (44) et 2 couples dans les polders de St-Séran (44) le 23 avril, 2 couples en plaine de Mazerolles (44) le 28 avril, 1 ♂ au bord du canal de la Taillée/Brière (44), 1 couple à St-Dolay (56) et 1 couple cantonné à Penmarc'h (29S) le 30 avril...

Nidification.- Nous ne retiendrons ici que les données les plus originales :

Côtes-du-Nord.- Dans les landes de Lanfains, 1 couple a encore niché cette année (4 poussins le 14 juillet).

Finistère.- 1 ♂ à Milizac (29N) le 5 juin. 1 à Guerlesquin (29N) le 27 juin. 2 couples nicheurs près de St-Goazec (Montagnes Noires). 2 nids dans les marais de Penmarc'h (29S)...

Loire-Atlantique.- Pays de Retz : outre les données mentionnées plus haut, 1 ♂ dans les marais des Moutiers le 11 juillet et 1 ♂ dans la vallée du Boivre/St-Père-en-Retz le 13 juillet. Marais de Guérande : observations régulières, dont un couple nourrissant le 25 juin. Brière (partie méridionale) : 1 ♂ transportant des matériaux au bord du canal de la Taillée le 30 avril. Marais de l'Erdre : 2 couples les 28 avril et 7 mai, 2 couples et 2 ♂ le 12 mai, 3 ♂ le 6 juin en plaine de Mazerolles.

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) 1 ind. chasse dans les Monts d'Arrée (29N) le 13 juillet.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) 1 relief typique de l'espèce (Etourneau) dans les marais de Bétahon/Billiers (56) le 6 avril.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) 12 données

Finistère.- 1 le 14 juin à Logonna-Quimerç'h (29N) et 1 le 24 juin à Porsmilin/Locmaria-Plouzané (29N).

Loire-Atlantique.- En plaine de Mazerolles, 1 le 23 avril, 7 mai et 6 juin et 2 le 12 juin. Dans la même région, 1 à la Chapelle-sur-Erdre le 15 mai. A St-Aignan-Grand-Lieu, 1 couple nourrissant le 20 mai, 1 ind. les 18 et 29 juin. A St-Lumine-de-Coutais, 1 le 20 mai. Sur le canal de Haute-Perche/Chauvé, 1 le 11 juillet.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) 2 données

1 au nord-est du Roc'h Trévélz (29N) le 26 mars et 1 (♀ ou imm.) à l'ouest du Roc'h Trévélz le 30 avril.

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) 178 données

Nous ne retiendrons que les données relatives à la biologie. Au cours du premier mois de la période on observe des migrateurs, des couples en parade, des accouplements... Les premières pontes ne sont notées qu'à partir de la fin avril, mais le 10 mai déjà, deux nids contiennent chacun des poussins. La couvaison se poursuit en mai et vers la fin du mois les éclosions se généralisent. La mi-juin voit l'envol des premiers juvéniles tandis que quelques poussins sont encore au nid le 8 juillet...

Une seule donnée concerne presque à coup sûr un migrateur puisque provenant d'un secteur où le Crécerelle n'est pas connu comme nicheur : 1 en vol vers le nord à Noyal-Pontivy le 9 avril.

Accouplements aux rochers de Mauves (44) et à la Poitevinière (44) (dans un arbre) le 19 mars, à Roc'h Net (29N) (au sol) le 26 mars... le 26 mars... Parades le 6 avril au réservoir du Vioreau (44), le 7 avril à Guengat (29S). Aires contrôlées :

Ille-et-Vilaine.- Nourrissage le 23 mai à Beauvais/Paimpont.

Finistère.- Sur cinq aires dans le Yeun-Elez (29N) : début de ponte à la fin avril (2 oeufs et 4 oeufs le 30 avril) ; quatre pontes complètes de 5 oeufs et une de 4 oeufs ; une éclosion au moins le 30 mai ; deux nids dénichés le 11 juin. A Penfrat/Gouesnac'h, 5 oeufs le 28 avril.

Morbihan.- A Priziac, 5 oeufs le 3 mai, 4 poussins le 24 mai. Au Faouët, une aire contient 6 poussins juste nés le 10 mai, 3 poussins le 27 mai ; une autre aire contient 6 oeufs le 13 mai et 5 poussins dont 3 morts le 16 juin ; une troisième, 3 poussins et 2 oeufs le 22 mai. A Meslan, 6 poussins le 10 mai, 2 seulement le 27 mai. A Roudouallec, 2 poussins et 2 oeufs le 22 juin, 3 poussins et 1 oeuf pourri le 8 juillet.

Loire-Atlantique.- A Maubreuil/Carquefou, un nid occupé dans un Pin noir d'Autriche le 6 mai. Sur trois aires occupées aux rochers de Mauves, 1 ♀ couve et 1 ♂ nourrit le 10 mai.

Parmi les très nombreuses données retenons encore celles-ci : 30 ind. notés par le même observateur dans le sud du Morbihan les 4, 5 et 6 juillet, et 26 ind. par un autre observateur dans le pays de Retz (44) du 5 au 13 juillet.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) 1 à Joué-sur-Erdre (44) le 3 juillet.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) 7 données

Le 16 mai, 1 chant près de la forêt du Cellier (44) ; le 24 mai, 1 ind. à Kerouriec/Erdeven (56) ; le 10 juin, 1 chant au Vioreau (44) ; le 13 juin, 2 chants à St-

Etienne-de-Montluc (44) ; le 6 juillet, 3 chants à St-Michel-Chef-Chef (44) ; le 11 juillet, 2 chants près du canal de Haute-Perche/Chauvé (44) ; le 13 juillet, 1 chant dans la vallée du Boivre/St-Père-en-Retz (44).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) 17 données

Comme l'an passé, nous retiendrons comme critères de nidification possible les observations effectuées entre le 10 mai et le 15 juillet, étant donné le nombre très faible des données sur cet oiseau :

2 à l'étang de Kerzine/Plouhinec (56) le 21 mai, 3 au moins à Pradel/Guérande (44) le 4 juin, 1 à l'étang du Bodéo (22) le 11 juin, chant au Lendu/Quimper (29S) le 13 juin, 1 à St-Renan (29N) le 24 juin, 1 à Guerlesquin (29N) le 27 juin, 1 nid contenant 7 oeufs sur la vieille rivière à Dinan (22) le 5 juillet, 3 chants à Ménéham/Kerlouan (29N) le 7 juillet, 1 à Penn-en-Toull/Larmor-Baden (56) le 11 juillet, 2 à St-Avoie sur la rivière du Bono (56) et 2 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 13 juillet, 1 dans les marais de Thouaré (44) le 15 juillet.

MARQUETTE DE BAILLON (*Porsana pusilla*) Chant et cris le 23 avril dans le marais Breton au Port la Roche/Machecoul (44).

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porsana porsana*). L'espèce nous est signalée comme nicheuse certaine sur la carte de St-Nazaire, dans les salines de Guérande.

RALE DE GENET (*Crex crex*) 9 données

1 cadavre frais à Bourgerelle/Arzal (56) le 22 avril. A l'île Arcouix/Mauves (44), 1 chant les 26 avril et 5 mai. Sur la prairie de Mauves-Thouaré (44), 1 chant le 5 mai, 2 le 10 mai et 3 le 2 juin. Sur l'île du Petit Carnet/Frossay (44), 8 dont 7 chanteurs le 7 juillet. A St-Etienne-de-Montluc (44) premiers chants le 14 avril, nombreux chants le 28 avril.

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) 71 données

Première période (fin mars - début avril : fin de l'hivernage)

A l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 110 le 28 mars et 75 le 5 avril (contre 15 nicheurs le 2 mai).

Seconde période (jusqu'à début mai : première couvée)

Construction à Brallac'h/Touesnant (29S) le 16 mars ; 3 oeufs à cet endroit le 1er avril ; 1 couple au barrage d'Ouessant (29N) le 4 avril ; 6 ad. et 1 nid/6 oeufs dans le marais de Trébeurden (22)

le 5 avril ; 2 nids/8 et 13 oeufs à Chateauneuf-du-Faou (29S) le 12 avril ; 1 nid/4 oeufs au marais de Trébeurden le 16 avril ; 1 ind. couve à l'étang de Noyal (56) le 18 avril ; 2 nids/1 et 7 oeufs au marais de Trébeurden le 23 avril ; 1 nid/5 oeufs à Cheffontaines/Clohars-Fouesnant (29S) le 18 avril ; 2 couples et 1 nid/8 oeufs à l'étang du Gué-aux-Biches/St-Gildas-des-Bois (44) le 29 avril ; 5 poussins à Moëlan (29S) le 1er mai ; 3 poussins à l'étang de Priziac (56) le 3 mai ; 7 poussins sur la Vilaine à Malon/Messac (35) du 5 au 10 mai...

Troisième période (*juvéniles de la 1ère couvée, et seconde couvée*)

1 nid/7 oeufs à l'étang de Pont Callec/Kernascléden (56) le 24 mai ; 20 poussins à Mauves-Thouaré (44) le 27 mai ; 1 nid/5 oeufs dans le marais de Loctudy (29S) le 3 juin ; 1 ad. et 4 juv. à Suscinio/Sarzeau (56) le 13 juin ; 2 poussins de 4-5 jours dans les marais de Pennarc'h (29S) le 19 juin ; 1 ad. et 1 poussin à Ploërmel (56) le 25 juin ; 1 nid/7 oeufs à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) le 26 juin ; 1 poussin de 5-6 jours dans le marais de Pennarc'h le 3 juillet ; 3 ad. et 4 juv. à l'étang de Loperhet/Erdeven (56) le 4 juillet... 20 ind. à l'étang du Pont/Kerlouan le 13 juillet...

FOULQUE (*Fulica atra*) 135 données

Le départ des hivernants se poursuit jusqu'à la mi avril, le maximum des départs se situant dans la dernière décade de mars. Quatre localités bien suivies montrent le même schéma évolutif. A St-Renan (29N), 70 le 16 mars, 55 le 19, 110 le 20, 40 le 26, puis 18-20 jusqu'au 13 avril et seulement 6 le 2 mai. A l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 85 le 28 mars, 15 le 5 avril, 12 le 2 mai. En baie de Kerogan/Quimper (29S), 80 le 20 mars, 16 le 28, 5 le 31. Au Sillon du Len/Louannec (22), 38 le 28 mars, 20 le 1er avril, 11 le 7, aucune le 22. Le Golfe du Morbihan présente le même phénomène avec des effectifs cinq fois plus importants et des fluctuations pouvant correspondre à des vagues migratoires : 500 le 15 mars, 100 le 21, 450 le 22, 70 le 4 avril, 100 le 5, aucune le 12, 30 le 15 et encore 40 le 24. Notons aussi des stationnements importants sur des plans d'eau mal suivis : 180 au Yeun-Elez (29N) le 26 mars, 80-100 à Trenvel/Tréogat (29S) le 29 mars, 30 à l'étang de Néal/Plouasné (22) le 23 avril...

Sur d'autres sites, l'effectif nicheur est atteint dès la fin mars : au Vioreau (44), 10 à 20 pendant toute la période ; au lac de Grand-Lieu (44), 30 ind. ; à l'étang de Goulven (29N), 10 à partir du 23 mars ; à Ménéham/Kerlouan, 20 le 28 mars ; à l'étang de Kerjean/Trébahu (29N), 3-5 couples le 20 mars ; à l'étang du Bodéo (22), 2 couples le 19 mars ; à Loc'h Gourined/Penhors (29S), 6 le 18 mars...

Nidification.-

Ille-et-Vilaine.- Nidification établie : à l'étang du Boulet/Feins (11 nids trouvés) et à l'étang de Combourg (1 ad. et 2 juv. le 15 juin). Notée à l'étang de Montauban.

Côtes-du-Nord.- Nidification établie : au marais de Trébeurden (3 couples minimum : 7 oeufs le 5 avril, 6 oeufs le 16 avril, 2 poussins dès le 16 avril), à l'étang du Bodéo (1 ad. avec poussins le 2 juin). Notée à l'étang du Fourneau/forêt de Quénécan (1 le 30 avril), à l'étang de Trébry (1 le 20 mai) et à l'étang de Merléac (6 le 14 juillet).

Finistère.- Nidification établie : à l'étang du Pont (4 familles le 2 juin, 40 ad. et juv. et de nombreux poussins le 7 juillet), à St-Renan (1 couveuse les 7 et 20 mai, plusieurs familles de juvéniles et poussins les 15 et 16 juin), au Yeun-Elez (2 nids contenant des oeufs le 17 mai), à St-Vio/Tréguennec (1 nid/9 oeufs le 1er avril, 20 ind. le 15 avril), à Trenvel/Tréogat (1 nid/8 oeufs le 1er mai, 19 ind. le 19 juin) et à l'étang de Trévignon/Trégunc (1 ad. et 4 poussins le 22 mai). Notée au moulin de Bondivy/Plonéour-Lanvern (3 le 13 mai), à Ménéham/Kerlouan (12 les 2 mai et 11 juillet) et au Curnic/Guissény (2 le 8 juin).

Morbihan.- Nidification établie : à l'étang de St-Jean/Locoal-Mendon (18 dont 2 juv. et 2 poussins le 6 juillet), au Roc'h Du/Crac'h (10 couples et 5 juv. le 21 mai), à l'étang de Calzac/Sarzeau (2 couples avec 5 et 6 poussins le 26 avril), à l'étang de Priziac (10 ind. le 8 avril, 1 nid/5 oeufs le 24 mai), aux étangs de Kerzine et Kervran/Plouhinec (4 couples et 3 juv. le 21 mai), à l'étang de Keraveon/Erdeven (1 ad. et 3 juv. le 4 juillet), à l'étang de Branduec/Ploerdut (3 couples avec des juvéniles le 24 juin). Notée à l'étang du Cranic/Brec'h (10 le 4 avril...), à l'étang de Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys (20 le 19 mai, 75 le 8 juillet), à l'étang de Loperbet/Erdeven (1 juv. le 4 juillet), au marais du Duer/Sarzeau (1 ad. et 1 juv. le 8 juillet), à Kervoyal/Dangan, à Ambon, à Suscinio/Sarzeau, à Noyalo, à St-Philibert, à le Tour-du-Parc.

Loire-Atlantique.- Nidification établie : au Vioreau (6 couples le 5 avril, nids le 16 avril). Notée au lac de Murin/Massérac (1 le 9 avril), aux marais de Haute-Goulaine (8 le 24 juin), sur l'Ognon au lac de Grand-Lieu (20 ad. et juv. le 29 juin) et dans les marais de Bourgneuf (12 avec des juvéniles le 9 juillet).

La Foulque est le type même d'oiseau dont il serait souhaitable (et facile !) de connaître les effectifs nicheurs pour l'ensemble de la Bretagne. Nos collaborateurs devraient s'efforcer de recenser le nombre de couples nicheurs pour chaque plan d'eau qu'ils visitent.

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) 91 données

Seule la rivière de Pont-l'Abbé

(29S) est bien suivie au cours de cette période puisqu'elle fournit 16 données ; mais la grande variabilité des effectifs qui y sont recensés ne permet de tirer aucune conclusion. Quelques groupes importants en fin d'hivernage et pendant l'époque des nids : 50 vers l'ouest à la réserve Michel-Hervé Julien/Goulien (29S) le 21 mars, une centaine en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 25 mars, 70 au même endroit le 9 avril, 100-150 sur la lagune de l'Epoids/Marais Breton (44) le 23 avril, 50 à St-Jacut (22) le 25 avril, 230 en baie d'Yffiniac (22) le 16 mai, 50 en rivière de Pont-l'Abbé le 22 mai, 150-200 à Ste-Anne/Cherrueix (35) le 3 juin, 80 en rivière de Pont l'Abbé les 12 et 19 juin, 100 aux traicts du Croisic (44) le 3 juillet, 150 en cet endroit le 10 juillet, 600 en baie d'Yffiniac le 13 juillet, 160 aux traicts du Croisic le 15 juillet. Des juvéniles sont notés dans les bandes dans cette première quinzaine de juillet : 13 juv. sur 21 oiseaux en baie de Plouharnel (56) le 5 et 27 juv. au moins sur 50 oiseaux le 14 juillet dans l'estuaire de la Vilaine (56).

Nidification.- Parades le 1er avril en deux points d'Ouessant (29N).

Pontes notées à partir du 17 juin ; une ponte de 6 oeufs sur Ar C'Haro (baie de Morlaix) le 11 juin. L'Huitrier est signalé nicheur probable à la pointe de Plouha. Un nouvel îlot de la baie de Morlaix (les Vernes) a été occupé par un couple (pontes trouvées les 21 mai et 24 juin). 110 couples dans l'archipel de Molène.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) 128 données

Au début de la période considérée, deux données seulement se rapportent à des migrateurs : 1 vers l'ouest au Vioreau (44) le 18 mars et 100 ind. à la réserve Michel-Hervé Julien/Goulien (29S) le 19 mars. Mis à part une donnée étonnante en mai (50 ind. à Lezelais/Grand-Fougeray (35) le 8), toutes les autres données, jusqu'en juin, concernent des oiseaux nicheurs.

Nidification.- Ebauches de nids à Dolan/Séné (56) le 16 mars, à Priez (56) et à Plouray (56) le 22 mars... Pontes complètes à Plouray le 8 avril, à Dolan le 20 avril... Poussins le 30 avril à la Baudais/Besnè (44), le 7 mai à Pleudihen (22) et à Languéro/Milizac (29N)... Encore une ponte complète non éclosée dans les marais de Guérande (44) le 9 juillet.

Couples présents sur les sites de nidification visités en 1972 :

Côtes-du-Nord

Lanfains	1
Pleudihen	5

Finistère

Kernic/Plouescat	4
Goulven	5

Brignogan	3
Vivier/Kerlouan	1
Ménéham/Kerlouan	3
Curnic/Guissény	1
Vougo/Guissény	4
Lann Garzel/Trémaouézan	2
Languéro/Milizac	3
→Trenvel + St-Vio	± 50
Trévignon/Trégunc	3

Morbihan

Loc'h/Guidel	4-5
Fort-Bloqué/Guidel	1
Magouer/Plouhinec	15 -20
Kerouriec/Erdeven	2
Poulbé/Erdeven	2
marais de Séné	10 ?
étang de Noyal	2
St-Colombier/Sarzeau	1
marais d'Ambon	14-15
Trily-Billion	6
Bétahon	4-5
Priziac	3
Plouray	1
Guiscriff	2
Poullou/Silfiac	2

Loire-Atlantique

Salines de Guérande	3
marais de Massérac	5
marais de Théhillac	1
plaine de Mazerolles	8-9
St-Lyphard	3
La Baudais/Besné	6
St-André-des-Eaux	2
St-Lumine-de-Coutais	5
route de St-Cyr au Collet	20-30

Dans l'ensemble, il faut considérer que l'effort de prospection au printemps 1972 a été inférieur aux autres années, notamment pour le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. L'essentiel des nouveautés nous vient de Loire-Atlantique, département qui reste cependant très sous-prospecté. Répétons une fois encore que nos tentatives d'évaluation des effectifs nicheurs resteront ridicules tant que nous n'aurons pas des données plus précises sur les populations des marais de Machecoul-Bourgneuf, de Grand-Lieu, de Brière et des marais de Montoir-Donges, ainsi que des polders du Mont-St-Michel... Notons aussi les petites colonies nouvelles de Languéro et du Poullou/Silfiac...

A partir de juin des Vanneaux apparaissent hors des sites de nidification : à St-Renan (29N), 5 le 7 juin, 10 le 10 juin, 13 le 16 juin, 26 le 28 juin ; 15 en vol vers l'est à Pont-Fol/Ploemel (56) le 13 juin ; 7 vers le nord à Locminé (56) le 3 juillet ; 4 à Kerguelin/Plouvorn (29N) le 4 juillet ; 10 juv. à Mauves (44) le 5 ; 30 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) et 2 vers l'ouest au Vioreau le 13 juillet.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*). 7 données

3 à Bétahon/Billiers (56) le 6 avril, 1 à Ambon (56) le 7 avril, 5 au Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril, 1 à Trenvel/Tréogat (29S) les 21 et 22 mai, 1 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 22 mai, 1 à St-Jacut (22) le 26 mai.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*) 29 données.

Départ des hivernants et passage se superposent jusqu'à la fin avril. En mai, les données ne concernent plus que des isolés ou de petits groupes, d'attardés sans doute.

Dans le Golfe (56), 300 le 17 mars, 100 le 22 mars, aucun le 4 avril, cris le 6 avril. 40 en Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 19 mars. En rivière de Pont-l'Abbé (29S), 14 le 19 mars, 4 le 29 mars, 2 le 9 avril. Encore 5 en rivière de Penerf (56) le 8 avril. Petit passage dans la dernière décade d'avril avec 10 en rivière de Pont l'Abbé le 20 puis 30 le 22 avril, 10 sur la vasière du Collet/Bourgneuf (44) le 23 et 20 en baie de Goulven (29N) le 28 avril. Par la suite, notons : 5 en rivière de Pont-l'Abbé le 7 mai, 5 à St-Jacut (22) le 10 mai, 4 dans les marais de Guérande (44) le 28 mai et enfin 3 à Kerlédan/Larmor-Baden (56) le 1er juin, dernière observation avant juillet.

Puis, 7 en baie de Plouharnel (56) le 5 juillet, 1 à Kemenez/Molène (29N) le 9, 6 à Goulven le 12 et 1 dans l'aber de Roscoff (29N) le 14 juillet.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) 51 données

Comme chaque année, le passage va crescendo jusqu'à la mi-mai et se termine début-juin.

Aucune donnée en mars ! En avril, notons : 20 à Trenvel/Tréogat (29S) le 15, 20 sur An Draeneg/Glenen (29S) le 16, 20 au Collet/Bourgneuf (44) le 23, 70 à Tréoupan/Lampaul-Ploaldmézeau (29N) les 24, 25 et 28 avril... La migration culmine dans la seconde décade de mai avec 20 au Curnic/Guissény (29N) le 7, 100 en baie de Beausais/St-Jacut (22) le 10, 20 à Trégionou (29N) le 11, 50 à Séné (56) le 12, 198 en baie d'Yffiniac (22) le 16, 30 à Gâvres (56) le 19, 20 à



Petit Gravelot et ses oeufs

photo Max JONIN.

Guérande (44) le 21. Puis 20 à Guérande le 28 mai et 40 à Tréoupan le 3 juin, deux données du 11 juin ne concernant que des isolés. Rien de cette date au 5 juillet.

(Premiers retours en juillet : 2 en baie de Plouharnel (56) le 5, 1 à Kerogan/Quimper (29S) le 6, 4 juv. et 2 ad. à Guérande le 7, 7 au Curnic le 9, 5 à Goulven (29N) le 12, 10 dont 4 juv. en baie d'Yffiniac (22) le 13, 3 dont 1 juv. à l'aber de Roscoff (29N) et 3 dont 1 juv. dans l'estuaire de la Vilaine (56) le 14, 15 dans les salines du Croisic (44) le 15.

Nidification.- Des poussins le 20 mai dans l'archipel de Molène (29N). Alarmer à Enez Du/Guissény et au Sillon de Talbert/Pleubian (22), endroit où des comportements de nicheurs avaient déjà été signalés en 1971. 53 couples recensés cette année dans l'archipel de Molène du 7 au 9 juillet ; à cette date, 22 nids contenaient encore des oeufs et quinze d'entre eux, 4 oeufs.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) 42 données

3 ind. dont 1 couple formé à St-Renan (29N) le 31 mars et 4 ind. paradant à Trenvel/Tréogat (29N) le 1er avril. Il faut attendre la seconde moitié d'avril pour avoir les données suivantes : 6 à Mauves (44) le 17, 1 au Pouldu/Guidel (56) et 2 au Roz/Logonna-Quimerch (29N) le 22... A la fin-avril, deux observations se rapportent très certainement à des migrateurs : 1 en vol vers le nord au-dessus de l'étang du Gué-aux-Biches/St-Gildas-des-Bois (44) le 29 et 1 ind., observation sans lendemain, au Yeum-Elez (29N) le 30.

Nidification.- Parades le 1er avril à Trenvel et le 22 avril au Roz... Pontes complètes le 26 avril à Séné (56), le 7 mai à Guisriff (56), le 19 mai au Petit-Mont/Arzon (56). Ponte de 5 oeufs le 16 juin à Mauves (44). Encore une ponte complète non éclose le 15 juillet au Roz.

Très peu de données nous sont parvenues concernant la répartition, aussi nous contenterons nous de citer les localités nouvelles. Anse du Roz/Logonna-Quimerch (29N) : 1 couple, nid/4 oeufs le 15 juillet. Ruisseau de Poulbéd/Erdeven (56) : 1 ind. alarmer le 5 juillet dans cette localité anciennement connue, mais non encore citée dans Ar Vran. Etang de St-Jean/Lochal-Mendon (56) : 1 couple alarmer le 12 juillet. Marais de Batz-sur-Mer (44) : 1 ind. alarmer le 12 juillet. Notons en outre que 6 ou 7 couples ont niché à Mauves (44) cette année (3 en 1971). 1 couple à Ti Colo/St-Renan le 18 juin, sur des gravières nouvellement mises en exploitation.

Enfin, 1 ind à Kerogan/Quimper (29S) le 31 mai, assez loin de tout site connu de nidification.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) 74 données

Peu d'arrivées en mars : 1 au Curnic/Guissény (29N) et 1 couple dans les sablières de

Goulven (29N) le 23. Les retours ne se généralisent que début-avril (St-Vio, Trévignon, Billiers, Fouesnant...). 3 ind. près du Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril : 1 ind. observé au printemps 1971 en cette localité avait été considéré comme migrateur probable ; faute de précisions la question reste encore posée en 1972 et il s'agirait là de la seule donnée de passage pour ce printemps, toutes les autres observations ayant été effectuées sur, ou au voisinage des sites de reproduction.

Nidification.- Aucune donnée sur les premières pontes. Premiers poussins le 11 mai à St-Vio/Tréguennec (29S), le 18 mai à Suscinio/Sarzeau (56)... Encore des oeufs en juin : 2 oeufs dans les salines de Guérande (44) le 10... et en juillet : 3 oeufs non éclos le 15 au Kernic/Plouescat (29N).

Peu de données originales en ce qui concerne la répartition et les effectifs :

Ille-et-Vilaine.- Nidification établie en deux points de la baie du Mont-St-Michel : au Vivier-sur-Mer, 5 ind. dont 1 couple accompagnant 3 poussins le 21 mai ; à Hirel, 9 ind. dont 1 couple accompagnant 3 juvéniles le 2 juillet. Il s'agit là des premières preuves de reproduction pour ce secteur.

Finistère.- 3 ind. dont 1 juv. à l'aber de Roscoff le 14 juillet. 20 couples au moins ont été recensés de Plougoulm à Kerlouan en juillet (voir KERAUTRET, Ar Vran, 5 (1) : p. 7) ; il convient d'y ajouter un minimum de 4 couples pour la commune de Kerlouan. L'espèce niche toujours sur l'île Trevoc'h/St-Pabu (4 couples minimum le 10 juin) mais elle a déserté Beniget dans l'archipel de Molène. En baie d'Audierne, 10 couples à Trenvel/Treogat le 22 mai, 6 couples à St-Vio le 16 avril et 10 couples à Beg an Dorchenn/Pennarc'h, ce qui donne le total jamais égalé encore de 26 couples pour cette portion de côtes. Enfin, 1 couple à Brallac'h/Fouesnant (alarmes le 8 juin), première donnée pour cette localité.

Morbihan.- 2 couples au Magouer/Plouhinec le 19 avril et 1 couple accompagnant 2 poussins dans les sablières du Vieux-Passage/Plouhinec le 14 juillet ; 9 ind. en baie de Gâvres le 19 avril. 3 couples à la lagune de Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys le 19 avril (site non recensé depuis plusieurs années). 1 couple au Croisty/Arzon le 19 avril.

Loire-Atlantique.- Nid contenant 2 oeufs les 10 et 18 juin dans les marais de Guérande ; 1 couple au Petit Traict du Croisic le 28 mai ; 4 ad. et 4 juv. à Sissable le 7 juillet.

TOURNEPIERRE (*Arenaria interpres*) 56 données

Passage à partir de la dernière décade d'avril et en mai, aucune bande n'atteignant 100 ind. cette année.


50 au Collet/Bourgneuf (44) et 50 au Castelli/Piriatic (44) le 23 avril, 20 dans les salines de Guérande (44) le 30 avril, 35 au Castelli

le 1er mai, 70 au Castelli le 11 mai, 35 au même endroit le 14 mai, 37 à Suscinio/Sarzeau (56) le 19 mai, après quoi le passage diminue fortement (encore 12-15 à Trémazan/Landunvez (29N) le 25 mai et 20-30 dans les salines de Guérande le 28) ne laissant que quelques attardés en juin : 6 au Castelli le 4 et 7 à Penvins/Sarzeau le 11 juin, seules données de ce mois.

Reprise des observations à partir du 5 juillet (8 données jusqu'au 15 juillet) : 3 à Erdeven (56) le 5, 3 à Kerlouan, 2 à Trielen/Molène et 10 à Kemenez/Molène (29N) le 8...

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) 59 données

Le passage est encore important en mars et, comme chaque année, s'interrompt brutalement début mai.



100 le 18 mars à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) ; à la réserve M.-H. Julien/Goulien (29S), nombreux cris à la tombée de la nuit les 18 et 19 mars, une centaine le 20 mars ; 20 à Bourg Blanc et 30 à Goulven (29N) le 23 mars ; 20 sur 3 km en Brière (44) le 31 mars. Passage faible en avril ; 16 données s'y rapportent dont aucune n'excède 10 oiseaux : 10 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 15 et 10 à Brélès (29N) le 22... Encore 1 à St-Renan (29N) le 6 mai. Après cette date, toutes les observations ont lieu sur des sites de nidification connus ou possibles.

Nidification.- Cette année, l'espèce n'a été notée que dans les communes de Plougourvest (29N), Kerlouan (29N) et Silfiac (56). A retenir 4 ind. sur la commune de Plouzané (29N) le 24 mai dans un site où la reproduction a été prouvée il y a quelques années, 2 ind. dans les marais de Larvor/Loctudy (29S) le 3 juin et 1 à Loguivy-Plougras (22) le 27 juin.

Les deux données de juillet peuvent concerner les premiers retours 1 à Séné (56) et 1 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 13 juillet.

BECASSINE SOURDE (*Limnocryptes minimus*) 3 données

1 à St-Renan (29N) le 16 mars, 4 à Brouël/Séné (56) le 6 avril et 1 à l'étang du Band/Henvic (29N) le 23 avril (notre donnée la plus tardive à ce jour).

BECASSE (*Scolopax rusticola*) 2 données

2 aux marais de Larvor/Loctudy (29S) le 25 mars et 2 à l'étang de Koulven (29N) le 8 avril.


COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 94 données

Passage pré-nuptial très peu ressenti au cours de cette période. L'évolution des effectifs dans la rivière de Pont-l'Abbé (29S) est intéressante : 30 le 17 mars, 50 le 26 mars, 20 le 9 avril, 40 le 22 avril, 20 les 7 et 22 mai, 120 les 12 et 19 juin... Par ailleurs, une seule bande atteint la centaine de Courlis : 100 à Brouël/Séné (56) le 21 mars, 33 en baie de la Fresnaye (22) et 37 en baie d'Yffiniac (22) le 27 mars, 20 à Ambon (56) le 7 avril, 60 à Penerf/Dangan (56) et 35 à Port Groix/Surzur (56) le 8 avril, 15 à Dolan/Séné le 20 avril et 13 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 30 avril. Du 1er mai à la dernière décade de juin, aucune donnée hormis celles de Pont-l'Abbé ne dépasse 7 oiseaux.

Il semble cette année que les retours s'amorcent assez tôt dans le mois de juin. Témoin les deux observations de 120 à Pont-l'Abbé ; 15 à Goulven (29N) le 23 juin, 77 en baie d'Yffiniac le 30 juin (7 le 16 mai). Ils sont en tous cas évidents en juillet : 78 en baie de Plouharnel (56) le 5, 150 dans les marais de Bourgneuf (44) le 9, 37 en Penzé (29N) et 18 en baie de la Fresnaye le 11 (8 en ce dernier point le 5), 200 en rivière de Pont-l'Abbé le 13, 220 dans l'estuaire de la Vilaine (56) le 14.

Nidification.- Sans doute entre 10 et 15 couples dans la cuvette du Yeun-Elez (29N). Localités nouvelles : 2 couples dans les landes de Plémy (22) le 20 mai. 1 couple à Kastell Rufel et 1 couple à Ti an Teurc, deux sites de la commune de St-Goazec (29S). En outre l'espèce nous a été signalée comme nicheuse certaine sur la carte de St-Nazaire dans les marais de Guérande (44).

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) 71 données



Le passage débute le 16 avril avec 10 à Locmariaquer (56). 12 à St-Gildas de Rhys (56) le 17... 20 à Séné (56) et 100 à Erdeven (56) le 26, 30 à Noyal (56) le 27... Observations intérieures à cette époque : 1 en vol en plaine de Mazerolles (44) le 28 et 17 vers le nord au-dessus de l'étang de la Roche-Hervé/Missillac (44) le 29, 10 vers le nord à Gouesnou (Léon intérieur) le 1er mai ; 15 à Pen-vins/Sarzeau (56) le 3 mai ; 15 à Lirey/Noyal (56) le 4 ; nombreux cris nocturnes au port de Brest (29N) le 6 ; plusieurs bandes de 25 à Porsall le 9 mai ; 2 à Trémaouezan (29N intérieur) et 10 dans les marais de Séné le 12 ; 14 à St-Gildas et 25 en baie de Gâvres (56) le 19 mai ; 22 à Erdeven le 22 mai... Aucune observation du 26 mai au 8 juin date où 5 oiseaux sont vus en baie de la Fresnaye (22).

Reprise en juillet : 10 en baie de Plouharnel (56) et 1 à Erdevén le 5 ; 8 à Trielen/Molène (29N) le 8 ; 150 à Kemenez/Molène le 9 ; 20 à Goulven (29N) le 12 ; 26 de Mindin à Paimboeuf (44) le 13 ; 40 sur les dunes du Vieux - Passage/Plouhinec (56) le 14 juillet.

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) 31 données.

Passage faible et dilué jusqu'au 12 mai.


1 à St-Renan (29N) le 18 mars, 4 à Brouël/Séné (56) le 21, 4 à Lampaul-Ploudalmézeau le 24 ; arrivée en baie d'Audierne (29S) à cette époque : 7 en un point le 25 et 9 ailleurs le 29 mars, 20 dans les marais de la Vilaine/Massérac (44) le 3 avril, 40-50 à Dolan/Séné (56) le 4 avril, 40 au Vivier-sur-Mer (35) le 16 avril, 16 à Brallac'h/Fouesnant (29S) le 26 avril, 10 à Brouël le 2 mai, 10 dans les marais de Noyal (56) le 11 mai, 2 en rivière de Pont-L'Abbé (29S) le 12 mai.

Deux observations dans les marais de Guérande (44) en juin : 3 le 18 et 2 le 25. Amorce du retour dans la seconde semaine de juillet : 4 au marais du Pont Neuf/le Tour-du-Parc (56) et 1 aux marais de Bourg-neuf (44) le 9, 1 à Gouven (29N) le 12 et 2 en baie de la Fresnaye (22) le 13 juillet.

L'espèce niche toujours en baie d'Audierne.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) 46 données

Le passage pré-nuptial a été notablement plus accentué ce printemps que les quatre années précédentes.



Observations clairessemées de la mi-mars à la mi-avril : 18 en rivière de Pont-L'Abbé (29S) le 16 mars (l'espèce a hiverné en petit nombre en ce lieu où l'on a vraisemblablement eu un petit passage en février), 2 au Curnic/Guissény (29N) le 28 mars, 4 vers le sud au Vioreau (44) le 4 avril et 2 en rade de Penherf (56) le 8 avril.

Le gros du passage a lieu du 16 avril au 16 mai et culmine dans la troisième décade d'avril. 18 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 16 avril, 21 en Penzé (29N) et 56 au Fort-Bloqué/Guidel (56) le 21 avril, 70-100 à Penwins/Sarzeau (56) le 22, 80-100 sur la vasière de la Coupelasse/ (44), 320 au Collet/Bourgneuf (44) et 67 en Penzé le 23, 100-120 à Tréoump/Lampaul-Ploudalmézeau (29N) les 24 et 25, 70 à St-Jacut (22) le 25, 40 à Séné (56) le 26, 20 à Suscinio/Sarzeau le 27, toujours une centaine à Tréoump le 28, 83 à Dolan/Séné le 29, 12 au Len/Louannec (22) le 30, 50 à Brouël/Séné le 2 mai et 40 en Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 3 mai. La migration décroît nettement ensuite, mais reste cependant forte jusqu'au 16 mai : 20 au

Vougo/Guissény le 9 mai, 10 en baie Baussais/St-Jacut le 10, 10 dans les marais de Noyal (56) le 11, 14 dans les marais de Séné le 12, 20 en Penzé le 13, 11 à St-Jacut le 15, 40 en baie d'Yffiniac (22) le 16. A partir de cette date les données ne concernent que des isolés sauf une vingtaine en Penzé les 30 mai et 14 juin (attardés ?).

3 le 30 juin en rivière de Pont-l'Abbé. Les trois données de (juillet sont l'indice du retour : 1000-1200 en baie du Mont-St-Michel (35) le 5, et, en baie d'Yffiniac, 6 le 11 et 200 le 14 juillet.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) 17 données

Passage pré-nuptial faible et dilué : 1 au Curnic/Guissény (29N) le 23 mars, 9 à Dolan/Séné (56) le 4 avril, 15 à Ambon (56) et 1 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 7 avril, 1 au Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril, 20 à Séné (56) le 26 avril, 1 à la Baudais/Besné (44) le 30 avril. Puis 1 à Séné le 12 mai et 1 au Curnic le 1er juin.

2 ad. en plumage nuptial le 25 juin dans les marais de Guérande (44). Retours certains en juillet : 7 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 6 juillet, 1 dans les marais de Bourgneuf, 6 dans les marais d'Ambon, 5 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56), 4 à Séné et 30 à St-Jean le 9, 14 à St-Jean le 12.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) 82 données

La plupart des observations d'avril à juin a été effectuée sur les sites de reproduction aussi est-il impossible de dégager un schéma du passage. Des 500 ind. encore notés dans le Golfe le 17 mars, il n'en reste aucun le 4 avril. 17 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 19 mars, 40 en Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 23 mars, 12 en rade de Penerf/Dangan (56) le 8 avril, 15 en baie d'Yffiniac le 27 avril. Seulement deux observations hors des sites de nidification de cette date à la dernière décade de juin : 1 en baie de Gâvres (56) le 19 mai et 2 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 4 juin.

6 sur les paluds de Goulven (29N) le 22 juin et 25 ind. en plus des nicheurs dans les marais de Guérande (44) le 26 juin. Retours évidents en juillet : 15 au Curnic/Guissény (29N) le 2 juillet, 10 en rivière d'Auray (56) le 4, 40 en baie de Plouharnel (56) le 5, 20 à Goulven le 7, 43 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56), 60 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) et 40 à Guérande le 9, 26 au Curnic le 11, 115 à St-Jean et 100 à Goulven le 12, 350 en rivière de Pont-l'Abbé le 13, 106 dans l'estuaire de la Vilaine (56) et 122 dans l'aber de Roscoff (29N) le 14...

Nidification.- Nos connaissances sur la répartition de cet oiseau se précisent. Aucune ponte, aucun poussin, mais chants et parades : aux marais de Séné (56) et de Noyal (56) ou la nidification est établie depuis longtemps, mais aussi au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc où 1 couple paraît le 19 mai, au Petit Traict du Croisic (44) ou des

chants et des parades sont notés les 21 et 28 mai, 10 et 25 juin (2 couples au moins), au Collet/Bourgneuf (44) ou 10 couples au moins chantent et paracent le 23 avril, à Port-le-Roche/Machecoul (44) où 5 à 10 couples chantent et paracent le 23 avril. Mais, comme pour le Vanneau, le recensement des vastes marais situés entre les Moutiers, Bourgneuf et Machecoul reste à faire.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) 23 données

Passage prénuptial insignifiant : 7 dans l'anse de Baden (56) le 23 mars. Puis, 3 au Collet (44) le 23 avril, 3 à Mazerolles (44) le 28 avril, 2 à Pradel/Guérande (44) le 30 avril, 1 à Tardic/Lannilis (29N) le 11 mai, 1 à Séné (56) le 12 mai et 2 au Petit Traict du Croisic (44) le 20 mai.

Rien ensuite jusqu'à la première moitié de juillet pour laquelle on enregistre 14 observations : 1 à St-Renan (29N) le 4 juillet, 6 à St-Jean/Loceal-Mendon (56) le 9, 7 au Roc'h Du/Crac'h (56) et 5 dans les marais de Guérande le 10, 4 en Penzé (29N) le 11, 34 à St-Jean et 10 à Goulven (29N) le 12, etc...

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) 20 données.

Passage prénuptial presque nul : 6 observations d'isolés en 4 localités du 30 mars au 24 avril : dans les marais de la Vilaine/Massérac (44) du 30 mars au 3 avril, à Dolan/Séné (56) le 4 avril, à Ambon (56) le 7 avril et à Len Du/Quimper (29S) le 24 avril.

Retour à partir de la mi-juin, mais surtout dans la seconde semaine de juillet : 1 à Terly/Ambon le 15 juin, 2 à Pradel/Guérande (44) le 18 juin ; à St-Renan (29N), 1 le 24 et 2 le 29 juin ; 1 à la Noë/Sucé (44) le 1er juillet. Puis 18 à Ambon, 14 à Séné (56), 2 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56), 1 à St-Jean/Loceal-Mendon (56) et 1 à Bourgneuf (44) le 9 juillet, 6 à St-Jean le 12, 5 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 13...

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) 77 données

L'allure de l'histogramme du nombre de données par quinzaine est absolument identique à celle de 1971.

3 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 19 mars, 1 à cet endroit et 1 dans l'anse du Pouldon/Fouesnant (29S) le 25 mars. Les données deviennent régulières dès les premiers jours d'avril (10 données de 1 ou 2 ind.). Le passage forcé après la mi-avril : 4 à Mauves (44) le 17, 4 à Kervégant/Quéven (56) le 18, 15 en Penzé (29N) le 21, 5 à la lagune de l'Epoids (44) et 1 à l'étang de Néel (22 intérieur) le 23, 15 à Kerogan/Quimper (29S) le 24, 9 à St-Renan (29N) le 28, 3 à l'étang du Gué-aux-Riches/St-Gildas-des-bois et 8 à l'étang de la Roche-Hervé/

Missillac (plans d'eau de l'intérieur de la Loire-Atlantique) le 29, 19 en rivière de Pont-l'Abbé le 30, 6 au Vioreau (44) le 1er mai, passages nocturnes à Nantes et à Rennes le 5 mai, mais l'essentiel du passage est pour lors terminé ; encore 4 à Pont-l'Abbé le 7 mai puis quatre observations d'isolés jusqu'au 21 mai, dont 1 à l'étang de Trébry (22 intérieur) le 20 et 1 au Curnic/Guissény (29N) le 21.

Reprise des observations à la fin-juin (1 à Guérande (44) et 1 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 25) et surtout en juillet : 1 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 5, 4 aux Gatineaux/St-Michel-Chef-Chef (44) et 6 à Kerogan le 6, 4 à Ambon (56) et 6 à Séné (56) le 9, 4 à Bailleron/Séné le 10, 6 à Goulven le 12, 8 à Pont l'Abbé le 13, passage nocturne au Vioreau et 7 dans les salines du Croisic (44) le 15...

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*) 11 données

Passage jusqu'à fin mai : 40 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 19 mars (l'espèce n'y a pas hiverné) ; 15 à Bon Abri/Hillion (22) le 20 avril, 2 à Lirey/Noyalo (56) le 4 mai, 6 au Curnic/Guissény (29N) le 8 mai, 10 en baie d'Yffiniac (22) le 16 mai, 5 en baie de Gâvres (56) le 19 mai, toujours 6 au Curnic le 22 mai, dont il ne reste qu'1 les 24 mai et 2 juin.

1 à Goulven (29N) le 12 juillet et 1 au Cap Coz/Fouesnant (29S) le 15 juillet.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 3 données

1 à Trenvel/Tréogat (29S) le 15 avril, 1 à Penvins/Sarzeau (56) le 11 juin et 1 dans les sablières du Vougo/Guissény (29N) le 17 juin.

BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*) 2 données

1 le 20 mai dans les salines de Kervillen/la Trinité-sur-Mer (56) et 1 au Vioreau (44) le 15 juillet.

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) 5 données

6 à Beg an Dorc'henn/Ploneur (29S) le 24 mars, 3 à Kadoran/Guessant (29N) le 1er avril, 1 en baie de St-Jacut (22) le 9 avril, 6 à la pointe de Trémazan/Landunvez (29N) le 7 mai et 15 à Trevoc'h/St-Pabu (29N) le 17 mai.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) 77 données

Des 20.000 hivernants encore notés dans le Golfe (56) le 17 mars, il ne reste plus que 1000 oiseaux le 22 mars et 300 le 6 avril. Des vagues de passage se produisent en outre jusque vers le 20 mai : 200 à St-Efflam (22) le 19 mars (100 le 16), 410 en rivière de Pont l'Abbé (29S) le même jour, 100 en rade de Penarf (56) le 8 avril, 400 au Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril, 160 à Lirey/Noyalo (56) le 4 mai, 400 en rivière de Pont-l'Abbé et 80 au Curnic/

Guissény (29N) le 8 mai, 279 en baie d'Yffiniac (22) le 16 mai, 110 à Gâvres le 19 mai, encore 60 à Trenvel/Tréogat (29S) le 22 mai. Le passage est alors pratiquement terminé et l'on n'observe plus que des troupes squelettiques atteignant rarement 10 ind. (5 fois pour 15 données en juin) : 15 au Curnic le 17 juin, 30 à Goulven (29N) le 22 juin.

Le retour n'est évident que dans la seconde semaine de juillet : 45 au Curnic le 9, 50 dans les marais de Guérande (44) le 10, 100 à Goulven et 100 au Kernic/Plouescat (29N) le 12, 50 au Curnic le 15...

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) 13 données

Les données, dérisoirement peu nombreuses, se groupent en deux périodes. Dans la dernière décade d'avril : 2 à Bon Abri/Hillion (22) le 20 ; à Brallac'h/Fouesnant (29S), 33 le 24 et 5 le 27 ; à Tréoupan/Lampaul-Ploudalmézeau (29N), 80 à 100 du 24 au 28. Après la mi-mai : 10 au Magouer/Plouhinec (56) et 95 à Gâvre (56) le 19, 2 à la Trinité (56) le 20, 24 à Suscinio/Sarzeau (56) le 25 mai. 5 à Penvins/Sarzeau le 11 juin.

1 au Kernic/Plouescat (29N) le 12 juillet et 2 à Trenvel/Tréogat (29S) le 15 juillet.

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) 11 données

(Du 30 mars au 23 avril). 2-4 ind. dans les marais de la Vilaine à Massérac (44) du 30 mars au 3 avril, 3 à Dolan/Séné (56) le 4 avril, 4 à Ambon (56) le 7 avril, 40 en rivière de Pont-l'Abbé (29S), 1 ♀ à St-Vio/Tréguennec (29S) le 16.

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) 9 données

Nidification.- Les Echasses ont fréquenté cinq localités bretonnes au printemps dernier : 1 à Dolan/Séné (56) le 22 juin (site de reproduction en 1969 et 1971) ; à Ambon (56), ponte de 4 oeufs le 19 mai, 1 couple et 2 poussins le 15 juin, 1 couple et 2 jeunes volants le 9 juillet ; 1 ind. alarmant aux salines de Mesquer (44) le 13 mai ; 1 couple alarmant dans les salines de Guérande (44) le 28 mai, présent le 18 juin ; dans les marais de Bourgneuf (44), plusieurs ind. le 23 avril, 6 ind. dont 1 couple alarmant et 1 juvénile le 9 juillet.

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) 3 données

2 à Séné (56) le 26 avril, 1 à Trenvel/Tréogat (29S) les 1er et 22 mai.

O'DICNEME CRIARD (*Burhinus oedionemus*) 3 données

Nidification.- 2 couples au moins sur la commune de Plouhinec (56) le 22 mai. L'espèce nous est signalée comme nicheuse certaine de la carte de St-Nazaire, dans les marais de Guérande (44).

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) 4 données

1 vers le nord à Kervoyal/Dangan (56)
le 8 avril, 2 ad. dans l'embouchure de la Loire, 2 milles à l'ouest
du phare du Pilier le 22 mai, 1 entre Belle-Ile (56) et Yeu le 30 mai,
1 au Cap Fréhel (22) le 11 juillet.

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) 1 ad. à Erdeven (56) le 5 juillet.

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) 3 ind. en phase sombre vers
le nord le 24 juin à la
pointe du Croisic (44).

LABBE SP. (*Stercorarius pomarinus/parasiticus*) 1 cadavre le 25 juin à
Erdeven (56).

LABBE A LONGUE QUEUE (*Stercorarius longicaudus*) Notre première donnée
sur cet oiseau : 1
ad. se fait houspiller par 2 ou 3 Sternes caugek le 30 juin à la pointe
du Croisic (44).

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) 52 données

Nous retiendrons surtout les données de
l'intérieur de la Bretagne : 1 au Vioreau (44) le 19 mars, 25 vers le
nord à Lostmarc'h/Crozon (29S) le 28 mars, 2 ad. et 1 imm. au Vioreau
le 6 avril, 5 vers le nord à Noyal-Pontivy (56) le 23 avril, 22 vers
le nord en plusieurs bandes à l'étang de la Roche-Hervé/Missillac
(44) et 7 ind. dont 5 imm. à Besné (44) le 29 avril... 2 sur le lac de
Murin/Massérac (44) le 26 mai, 4 imm. en vol vers l'ouest à Beaulieu/
Rennes (35) le 3 juin, 1 ad. vers le nord à cet endroit le 9 juin,
1 ad. en plaine de Baud/Rennes le 25 juin.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) 57 données

→ 3 adultes à pieds jaunes au lac de
Murin/Massérac (44) le 23 mai : méditerranéens ou nordiques ?

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) 19 données

Hivernants (et migrants ?) jusqu'au
26 avril. Dans le Golfe (56), 460 le 17 mars, 180 le 22, 140 le 4
avril, 18 le 12 avril, 15 le 15 avril, aucun le 25 avril. 20 au Cur-
nic/Guissény (29N) le 23 mars, 10 à Goulven (29N) et 30 au Vougo/Guis-
sény le 28 mars, 10 à Keremma/Tréflex (29N) le 29 mars, 18 en riviè-
re d'Auray (56) le 7 avril et 19 au Pont Neuf/le Tour-du-Parc (56) le
8, enfin 1 à Mauves (44) le 26 avril.

Rien ensuite jusqu'en juillet : 1 dans le Golfe le 4, 2 ad. à

à Plouharnel (56) le 5, 1 en baie de la Fresnaye (22) le 13 et 1 ad. dans l'estuaire de la Vilaine (56) le 14 juillet.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) 91 données

Des bandes importantes séjournent jusqu'à fin avril au moins : 140 en rivièrre de Pont-l'Abbé (29S) le 19 mars, 500 à Trenvel/Treogat (29S) le 25 mars, 100 à Kerogan/Quimper (29S) le 31, 150 en baie de Loqueltas/Larmor-Baden (56) et 120 à Penn en Toull/Larmor-Baden le 7 avril, 400 dans les marais de Bodaval/le Tour-du-Parc (56) le 8, 350 à Kerogan le 24, 100 dans le Goyen/Audierne le 27 avril. Puis 50 à Bornière/Bain-de-Bretagne (35) le 3 mai, 25 à Séné (56) et plusieurs dizaines dans l'Elorn (29N) le 12 mai. Depuis le début d'avril les décomptes précis font apparaître une proportion croissante d'immatures dans les bandes : 40 imm. pour 43 oiseaux le 7 avril à Auray, une bande de 17 imm. en rivièrre de Pont-l'Abbé (29S) le 9 avril....

→ Après le 12 mai, les observations portent presque exclusivement sur des immatures : une centaine à Thouaré-Mauves (44) en majorité immatures de 2ème année ; 50 imm. à Noyal (56) le 20 mai, 5 imm. au Vougo/Guissény (29N) et 14 imm. au Curnic/Guissény le 25 mai, 1 ad. et 3 imm. au Vougo et 1 ad. avec 1 imm. au Curnic le 1er juin, 12 imm. au Curnic et 1 ad. avec 5 imm. au Vougo le 8 juin, 2 imm. au Vougo et 22 imm au Curnic le 20 juin.

Mais, depuis la mi-juin, des juvéniles apparaissent montrant que la dispersion est amorcée : 1 juv. au Curnic le 17 juin, 1 juv. en Penzé (29N) le 21 juin, 2 juv. (avec 31 imm. et 5 ad.) au Curnic et 1 juv. (avec 1 ad. et 3 imm.) à Gouven le 22. Les adultes apparaissent également en nombre : une cinquantaine à Goulven le 22 juin... Retour massif dès les premiers jours de juillet, avec une majorité écrasante d'adultes : 106 dont 2 juv. à Plouharnel (56) le 5 juillet, 400 entre les rivières Yar et Roscoat (22) et 120 dans l'estuaire de la Penzé le 6, 200 à Séné, 200 à Bodaval et 34 (2 juv.) au Curnic le 9 juillet, 220 ad. et 4 juv. à St-Jean/Lochal-Mendon (56) le 12, 107 ad. aux traicts du Croisic, 333 ad. en baie du Croisic, 400 dont 3 juv. dans l'estuaire de la Vilaine (56) et 200 au barrage d'Arzal (56) le 14 juillet.

Nidification.- Au lac de Murin/Massérac, 50 ad. le 9 avril, 25 couples le 29 avril, 40 ad. le 19 mai et 100 couples (tous nicheurs ?) le 26 mai. 6 ad. ont été notés le 19 mai dans un petit marais entre Murin et Grand-Fougeray (35). A Guérande, 1 ou 2 nids les 21 et 28 mai, colonie abandonnée le 11 juin.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) 42 données

Nombre exceptionnel de données en 5 localités.

17 observations en avril provenant toutes des abords du Golfe du Morbihan, l'essentiel du 4 au 11 avril. Le 4, 2 ad. et 1 imm. à Dolan/Séné. Le 6, 120 à Bodaval/le Tour-du-Parc et des mouvements

d'oiseaux venants de la côte (10 + 2 + 10 + 1...). Le 7, 10 vers le nord à Locmariaquer, 20 ad. et imm. au Roc'h Du/Crac'h, 1 imm. vers l'ouest à Pénérif/Dangan, 12 à Kervoyal/Dangan et 4 en vol vers l'ouest à cet endroit. Le 8, 70 dans les marais de Bodaval, 1 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc, 5 vers l'ouest à l'étang de Noyalo, 1 ad. et 1 imm. vers le nord à Dangan ; le 11, 13 à Dolan. Encore 2 ad. et 16 imm. à Pénvins/Sarzeau le 22, 1 imm. à Séné le 26, 1 imm. à Suscinio le 27, 1 imm. à Dolan le 28, 17 à Kervoyal le 30. Après ce passage, des Mouettes pygmées seront notées dans le secteur pendant tout le reste de la période : le 9 mai, 3 à Dolan, le 19 mai, 21 imm. à Bodaval, le 3 juin, 1 imm. au Roc'h Du, le 9 juillet, 5 dont 1 ad. à Bodaval et 4 imm. au Pont-Neuf. Sur la commune de Guissény (Curnic et Vougo) (29N), 15 observations de 1 à 3 immatures entre le 7 mai et le 15 juillet (2 imm. le 18 mai, 3 imm. le 22 juin, 2 imm. les 2 et 15 juillet). Dans les marais de Guérande (44), 2 imm. le 11 juin et 1 imm. le 25 juin. A l'île Arrouix/Mauves-sur-Loire (44), 14 le 20 juin, 8 le 21 juin, 2 le 2 juillet, 1 le 11 juillet. Au barrage d'Arzal (56), 1 imm. le 14 juillet.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) 15 données

Hors du voisinage des sites de reproduction : 1 ad. à la Turballe (44) le 16 mars, 1 en baie de la Forest/Concarneau (29S) le 26 mars, 9 ad. en vol vers le sud en 5 minutes à Landunvez (29N) le 25 mai, 1 imm. à Hoad (56) le 29 mai, 2 imm. entre Belle-Ile (56) et Yeu le 30 mai.

Nidification. Nouvelle progression des colonies du Cap Sizun (29S) avec 350 à 380 couples cette année. Etat stationnaire au Cap Fréhel (22) avec 170 nids occupés.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) 18 données

Deux données précoces : 1 au lac de Murin/Massérac (44) le 1er avril et 1 à Dolan/Séné (56) le 11 avril.


La plupart des données autour des sites de nidification, sauf : 1 au Collet (44) le 23 avril, 5 à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen (35) le 8 mai, 2 à Arzal (56) le 13 mai... et 1 à Trenvel/Tréogat Tréogat (29S) le 15 juillet.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) 2 données

1 en plumage nuptial au Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril et 2 à St-Aignan-Grand-Lieu (44) le 20 mai.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirsundo*) 119 données

Première de la période au Vougo/Guissény (29N) le 28 mars. Arrivée bien suivie à Tréboul (29S) : 1 les 30 et 31 mars, 2 le 4 avril, 3 les 5 et 7 avril, 4 les 12 et 18 avril, 5 les 19 et 24 avril, 150 le 26 avril... Par ailleurs, 1 au Vioreau (44) le 4 avril, 10 à Crozon (29S) le 15 avril et surtout : 30 au Collet/Bourgneuf (44) et 4 à l'étang de Montauban (35 intérieur) le 23



Terne pierregarin

photo Max JONIN

avril, 10 de passage à la Roche-Hervé/Missillac (44 intérieur) le 29 avril, etc... Le gros passage a donc eu lieu dans la dernière décade d'avril.

Nidification.- 1 couple alarme dès le 26 avril à Mauves (44) où les premiers oiseaux se sont installés depuis le 13. Premières pontes à la Colombière/St-Jacut (22) le 15 mai et des pontes fraîches à Trevoc'h/St-Pabu (29N) le 17 mai...

Côtes-du-Nord.- 54 nids à la Colombière le 5 juin

Finistère.- Couples alarmant sur deux plans d'eau de l'intérieur du Léon : à l'étang du Pont/Kerlouan le 2 juin et à St-Renan le 20 mai. En baie de Morlaix, 2 pontes sur Enez Wenn le 21 mai (échec certainement dû aux rats), 14 pontes sur Toull-Louarn le 11 juin (échec dû aux rats), sur les Vernes, 7 pontes le 24 juin, 20 pontes sur Enez an an Trez le 11 juin. 65 nids sur Enez Kerlouan le 8 juillet.

Morbihan.- 1 couple à Rohellan/Erdeven le 14 juin, 12 nids aux Salines de Legenes/Carnac le 2 juin, 2 nids à Kervillen/la Trinité-sur-Mer le 2 juillet. Au moins un couple alarmant sur l'étang de St-Jean/Locoal-Mendon le 12 juillet, 1 couple sur l'îlot artificiel de Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys (poussins le 9 juillet), 1 couple alarmant au Flessis-Ker/Auray le 4 juillet.

Loire-Atlantique.- 4 petites colonies de 20, 2, 3 et 4 ou 5 couples dans les marais de Guérende, 1 couple au moins à Mauves.

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*) 3 données
3 ou 4 au Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril.

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougallii*) 6 données
1 à Tréboul (29S) le 13 avril, 5 ad. en vol vers le sud à Penwins/Sarzeau (56) le 22 avril, 5-6 à la lagune de l'Epoids/Bourgneuf (44) le 23 avril, 1 au Croisic (44) le 18 juin, 15 en pêche à Beg Meil/Fouesnant (29S) le 1er juillet.

STERNE NAIN (*Sterna albifrons*) 28 données
Hors des sites de reproduction et de leur voisinage : 1 en rivière d'Auray (56) le 7 avril, 11 en Penzé (29N), 7 au Collet/Bourgneuf (44) et 15 à la lagune de l'Epoids/Bourgneuf le 23 avril, 4 à St-Jacut (22) le 25 avril, 2 à Brouel/Séné (56) le 2 mai et 1 dans les marais de Noyal (56) le 11 mai. De cette date à juillet, toutes les données proviennent des sites de reproduction (bancs de sable de la Loire, entrée de l'Aber Benoit (29N) et grèves de Guissény (29N) ...). Puis, 3 à Nantes (44) le 4 juillet, 12 à Préfaillies (44) le 5 juillet, 3 en Penzé le 6 juillet, 5 à Paimboeuf (44) le 7 juillet, 4 à Préfaillies le 8, 1 au Cap Coz/Fouesnant (29S) le 9,

20 à Goulven (29N) le 12... Les oiseaux de l'embouchure de la Loire (Nantes, Préfailles, Painboeuf) pourraient venir d'une colonie non connue dans ce secteur.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) 65 données

3-5 à St-Marc/Brest (29N) le 18 mars. La véritable arrivée ne se produit que le 24 mars : 1 à Beg an Dorchenn/Plomeur (29S) et 4 en Penzé (29N), puis 3 à Bénodet (29N) le 25, 7 au Fret/Crozon (29S) le 27... 14 à Treflex (29N) le 29, 50 au Croisic (44) le 30 mars, 13 à Ambon (56) le 6 avril, 10 à Penerf et 16 à Kervoyal/Dangan (56) le 7, 45 à Penwins/Sarzeau (56) le 8... 50 à Tréboul (29S) le 26, 13 à St-Michel-en-Grève (22) le 27...

Nidification.- Première pontes à la Colombière/St-Jacut (22) le 15 mai, éclosions le 5 juin... En baie de Morlaix, 4 nids sur ar C'Haro et 4 nids sur Enez Wenn le 21 mai, 21 pontes sur Enez an Trez le 11 juin. Légère augmentation sur la Colombière avec 387 nids le 5 juin.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*) 68 données

Très nombreuses données hors des lieux de reproduction jusqu'au 7 mai, mais la plupart (un tiers) ne concernent que des isolés : 10 à la pointe du Croisic (44) le 19 mars, 15 au Croisic le 31 mars, 9 en baie de la Forest/Concarneau (29S) le 3 avril, 7 à Tréboul (29S) le 4 avril (de 1 à 4 jusqu'alors), 20 au Croisic le 7 avril, 200 sur un banc de poissons à Tréboul le 26 avril, 10 à St-Michel-en-Grève (22) le 30 avril, 30 à Tréboul le 3 mai et 40 au Croisic le 7 mai.


*Rien de cette date à juillet : 1 en baie de la Forest le 1er juillet, 1 à Préfailles (44) le 8 juillet, 1 à Beg Rohu/St-Pierre (56) le 14 et 1 entre le Croisic et Belle-Ile (56) le 15.

Nidification.- Quelques oiseaux présents sur les sites de reproduction à la fin-mars : 2 au Milinou/Goulien (29S) le 29 et 3 aux Berniou/Pez/Camaret (29S) le 31.

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*) 21 données

1 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 17 mars, 2 aux îles de Glenen (29S) le 16 avril, 1 à Trédrez (22) le 23 avril, 5 en baie de St-Michel-en-Grève (22) les 27 et 30 avril. Puis, 3 en baie de Quiberon (56) le 27 mai, 1 en baie de Morlaix (29N) et 1 au nord de l'île d'Yeu le 31 mai. Enfin, 17, surtout des juvéniles, à la pointe du Croisic (44) le 7 juillet.

Nidification.- 64 ind. installés sur ar Benn C'Hlaz/Camaret (29S) le 31 mars.



Macareux moine au nid

photo Daniel PRIEUR

MACAREUX (*Fratercula arctica*) 10 données

Nidification.- 10 à Ar Youc'h/Quessant (29N) le 1er avril. 2 ou 3 couples sur Ar Milinou/Goulien (29S) le 10 mai. 14 à Banneg/Molène (29N) le 6 juillet. Au Cap Fréhel (22), 1 le 7 juillet, 1 couple au bec souillé de terre le 9 juillet. 13 à 15 terriers seulement semblent avoir été occupés à Enez Wragez/baie de Morlaix (29N).

PIGEON BISEY (*Columba livia*) 6 données

Retenons deux données provenant de fa-
laises marines où l'espèce pourrait nicher : 3 ind. "très pure" à
Camaret (29S) le 15 avril et 1 au Cap Fréhel (22) le 3 juillet.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) 13 données

Côtes-du-Nord.- Chants à St-Brandan les 29 mars et 30 avril, dans le
parc de la baie d'Yffiniac le 13 juillet.

Finistère.- 1 à Goulien le 26 avril, 1 poussin à Lanroz/Quimper le 28
mai.

Morbihan.- Chants au Faouët le 22 mai.

Loire-Atlantique.- 2 à St-Aignan-Grand-Lieu le 18 juin ; 2 à Mauves
le 17 juin ; 1 à Suoë le 15 mai ; 1 à Joué-sur-
Erdre le 11 juillet ; 5 observations dans la région du Vioreau du 5 mai
au 10 juin.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) 46 données

Quelques bandes : 30 à Trébahu (29N)
le 21 mars, 35 à Croëz Person/Noyal-Pontivy (56) le 9 avril, 12 à Pont-
l'Abbé (29S) le 22 avril, 33 à Croëz Person le 23 avril, 15 à Goulven
(29N) le 25 mai...

Trois nids contiennent déjà 2 oeufs au Gallec/Lorient (56) le
31 mars ; 2 oeufs le 5 avril à Messac. Pontes le 20 avril à Tréboul
(29S), le 26 avril à St-Evarzec (29S). Ecllosion le 29 avril à St-Gil-
das-des-Bois (44)... A signaler un nid contenant 2 oeufs à 2 m d'un
nid de crécerelle le 22 juin à Roudouallec (56).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) 71 données

Un migrateur précoce le 8
avril au-dessus de Brest (29N). Il faut attendre la troisième décade
d'avril pour voir les suivantes. 1 chanteur à Beslé (35) le 22 avril,
1 à Noyal-Pontivy (56) et 1 à la pointe du Castelli/Piriac (44) le 23 ;
1 chant en forêt de Rennes (35) et 1 à Moëlan (29S) le 28 ; 1 aux Mor-
tiers/St-Gildas-des-Bois (44), 1 à Ploufragan (22), 3 dont 2 chanteurs
à Noyal-Pontivy et 2 à Ti Bleiz/Monts d'Arrée (29N) le 30 avril... Fort
passage en mai, avec quelques rassemblements importants : 100 en plaine
de Mazerolles (44) le 12, 125 à Dinéault (29S) le 25, 34 à Ploneis (29S)
le 28... Mais on observe encore des rassemblements en juin et même en

juillet. Ainsi, 40 à Kerdallé/Trégunc (29S) le 14 juin, 90 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 13 juillet...

Nidification.- Première ponte le 18 mai au Len Du/Quimper (29S) alors qu'un couple construit au Faouët (56) le même jour.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) 56 données

Nous ne retenons que les données originales (localités non encore signalées ou dans lesquelles la nidification se confirme ou progresse) :

Ille-et-Vilaine.- Guipry (parade le 30 mars) ; Messac (chants réguliers en juillet).

Côtes-du-Nord.- Erquy (1 chant le 16 juin) ; parc de la baie d'Yffiniac (1 couple le 25 juin) ; Perros-Guirec (très commune, 3 nids trouvés) ; Lannion (très commune) ; Trédrez (2 le 13 juillet) ; St-Michel-en-Grève (plusieurs couples, chants...) ; Tréduder (1 à deux reprises) ; Plouguernével (1 couple parade le 30 avril).

Finistère.- Kerlouan (1 couple à la Digue le 2 mai) ; Locmaria-Plouzané (1 à Porsmilin le 7 mai) ; Plougastel (1 couple chante au Passage le 10 juillet) ; Tréboul (10 couples chantent et parquent le 16 mars) ; Pont-l'Abbé (1 le 7 mai, 30 le 13 juillet) ; Quimperlé (1 couple parade le 28 avril) ; Chateaulin (3 couples parquent le 10 mai) ; Îles de Glénen (1 couple le 16 avril).

Morbihan.- Le Faouët (au moins 10 couples, 2 oeufs le 18 mai) ; Noyal-Pontivy (2 chanteurs le 28 juin).

Loire-Atlantique.- Nicheuse à Paimboeuf, St-Michel-Chef-Chef, Préfailles, Pornic.

Nid en construction à Perros-Guirec le 19 mars ; déjà des juvéniles volants à St-Nazaire le 12 avril...

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) 127 données

Deux données simultanées à une date particulièrement précoce : 2 chants à Péaule (56) et 1 chant à Trévoyen/Plougastel-St-Germain (29S) le 17 mars. Ensuite, 1 chant au Temple/Pont-Scorff (56) le 27. Les arrivées se multiplient dans les deux derniers jours du mois sans que l'on puisse véritablement dégager de décalage entre le sud et le nord : chant à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) et à Beslé (35) le 30, à Noyal-Pontivy (56), au Stang/Plougourvest (29N) et en Brière (44) le 30. Dans les Côtes-du-Nord, premier chant à St-Brendan le 9 avril et à Ploufragan le 10 avril...

Une seule observation de femelle "hépatique" : 1 au Cellier (44) le 16 juin. Poussin nourri par un Pipit farlouse le 5 juillet à Grandchamp (56). Dernier chant le 9 juin à Messac (35), mais des chanteurs sont encore entendus jusqu'au 29 juin à la Halbrandière (44), jusqu'au 30 juin à Ploemel (56), le 5 juillet à Grandchamp et le 8 juillet à

Port Breton sur l'Erdre (44).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) 3 données

1 au Vioreau (44) le 1er mai, 1 juvénile écrasé à Botmeur (29N) le 10 juillet et 1 ind. dans les marais de Séné (56) le 12 juillet.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) 2 données

Toutes deux du pays de Retz (44) : 1 au Port-la-Roche/Machecoul le 23 avril et 1 ind. en chasse harcelé par des Vanneaux à Préfailles le 9 juillet.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) 18 données

Ponte de 2 oeufs le 19 mars à Ploumanac'h (22) ; 2 poussins à Trémobian/Guipronvel (29N) dès le 26 mars ; 2 poussins et 1 oeuf dans un nid à Pleuven (29S) le 7 avril ; 1 poussin et 1 oeuf à Ploumanac'h le 9 avril (le nid sera déniché ensuite) ; 2 poussins à Meslan (56) le 2 mai.

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) 8 données

4 poussins au Stang/Plougourvest (29N) le 17 juin ; 3 oeufs pourris au Faouët (56) le 22 juin ; 6 oeufs le 10 juillet à Plougastel (29N).

ENCOULEVENT (*Caprimulgus europaeus*) 17 données

Ille-et-Vilaine.- 2 chanteurs à Beauvais/Paimpont les 24 et 25 mai.

Côtes-du-Nord.- 1 chanteur régulièrement entendu à St-Brandan.

Finistère.- 1 chanteur à Merhoant/Daoulas le 10 mai ; 1 couple à Roc'h Klegier/St-Rivoal le 20 juin ; 5 entendus à Run Du/Loqueffret le 15 juin ; chanteurs à Kerogan et Toulven/Quimper à partir du 22 mai.

Morbihan.- Chant à St-Avé le 3 avril et à Ste-Anne-d'Auray le 3 juillet.

Loire-Atlantique.- 3 chanteurs à St-Etienne-de-Montluc le 8 juin ; 2 ind. à Maubreuil/Carquefou le 8 juin ; 1 ind. au Croisic le 15 juillet.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) 110 données

Avant la troisième décade d'avril, 7 données précoces en Loire-Atlantique, Morbihan et Ille-et-Vilaine : le 7 avril, 1 au Vioreau (44) ; le 14 avril, 1 à Nantes (44) et 2 à Vannes (56) ; le 15, 5 à Nantes ; les 18 et 19, 1 à Nantes ; le 20, 1 vers le nord à Beaulieu/Rennes (35).

Les arrivées se généralisent à partir du 24 : 1 au Len Du/Quimper (29S) et 1 cantonné à Nantes. Le 25 : 25-30 à Nantes, 1 à St-Nazaire, 2 à Noyal (56), passage toute la journée à Bailleron/Séné (56), 5-6 au Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen (35), premiers au Faouët (56)... 1 à St-Marc/Brest le 26... 5 à Messac (35), 9 à Plogastel-St-Germain (29S) et 1 à Lorient le 27... Oiseaux cantonnés à Hennebont (56), Vannes (56) et Maurepas/Rennes (35) le 28. Les observations ne deviennent régulières dans le Léon que dans les tous derniers jours d'avril (Milizac, Brest, Lesneven, le Folgoët...). Premiers dans les Côtes-du-Nord le 30 avril : 10 à l'étang des Salles/Perret et premiers à Gouarec le 30, puis 12 à l'étang de Gourveau/St-Martin-des-Prés le 1er mai. Le 2 mai, 30 à St-Renan (29N), 44 à St-Nazaire et forte arrivée à Brest. Le 3 mai, l'espèce est présente partout sur le trajet Brest-Morlaix-Guingamp-Rennes...

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*) 40 données

Les rares données du début de la période peuvent toutes concerner des nicheurs.

1 couple à Bel Air dans l'Aber-Ildut (29N) le 16 avril ; 1 couple à l'étang du Rocher/Théhillac (56) le 30 avril ; 1 couple à l'étang de Montauban (35) et poussins au nid à Toulven/Quimper (29S) le 1er mai ; nid occupé à l'île Chevalier/Pont-l'Abbé (29S) le 5 mai ; 6 (1 famille ?) à Moulin-Mer/Logonna-Daoulas (29N), nourrissages à l'anse du Roz/Logonna-Deaulas, à Terenez/Rosnoën (29S) et à Brengall/Pont-l'Abbé le 22 mai ; poussins dans le nid de l'île Chevalier le 11 juin ; 1 ind. transporte un poisson au canal de Haute-Perche (44) le 11 juillet...

Reapparitions en mer dans la seconde semaine de juillet : 1 à la pointe du Croisic (44) les 11 et 13 juillet, 1 à St-Michel-en-Grève (22) et 13 juillet...

HUPPE (*Upupa epops*) 48 données

Deux données précoces : 1 à la pointe du Croisic (44) et 1 chant au Vioreau (44) le 19 mars. Rien de cette date à la première quinzaine d'avril. Nous soulignons les localités nouvelles.

Ille-et-Vilaine.- Beslé (notée), Messac (notée à Tréguiilly et chants à la Roussière).

Côtes-du-Nord.- Pléhérel (3 à Sables-d'Or en juillet)

Finistère.- Plouneour-Lanvern (1 le 31 mai), Fouesnant (1 à Brallac'h le 15 avril), Trégunc (2 à Pendruc le 17 juin).

Morbihan.- Quéven (chant le 8 avril à Kervégant), Erdeven (dans un nid, à Kerouriec, 4 poussins et 3 oeufs pourris le 24 mai, 1 adulte bagué le 15 juin : s'agit-il d'une seconde ponte en préparation ? Des huppes ont été notées à deux reprises au Poulbé un autre

point de la commune), Loccal-Mendon (1 à St-Jean le 6 juillet), Ploemel (chants à Pont-Fol), Auray (chant à Kerplour), Plouharnel (2 au Bego le 5 juillet), Larmor-Baden (1 le 8 juin), Péaule (notée à Kermoué).

Loire-Atlantique.- la Turballe (nourrissage à Pen Bron en juillet), le Croisic (chants), St-Michel-Chef-Chef (3 le 10 juillet), Préfaillies (1 les 5 et 8 juillet), St-Mars-de-Coutais (1 le 20 mai), Haute-Goulaine (1 le 24 juin), St-Julien-de-Concelles (1 le 1er juillet), Thouaré (1 à Bellevue le 1er juillet), Mauves (chants), Mouzeil (1 le 31 mai) et Vioreau (chants).

De nombreuses localités nouvelles, mais qui s'inscrivent très bien dans ce que nous connaissons déjà de la répartition de l'espèce. Toujours aucune preuve pour le Finistère.

PIC VERT (*Picus viridis*) 84 données

6 poussins à Meslan (56) le 27 mai, encore des oeufs à Ergué-Gabéric (29S) le 10 juin, poussins à Mahalon (29S) le 27 juin, poussins à Kerletu/Lorient (56) le 2 juillet.

PIC CENDRE (*Picus canus*) 20 données

en provenance de 8 localités, parmi lesquelles 6 sont nouvelles : Dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, 2 couples à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen le 25 avril ; en Loire-Atlantique, chants et tambourinages (1 couple) au Vioreau, et 2 chants au moins en forêt du Gâvre le 29 avril. Les trois autres localités témoignent sans doute d'une poussée vers l'ouest : à St-Brandan dans la région de Quintin (22) nid dans un chêne têtard le 21 mai, éclosion de 4 poussins au moins le 11 juin, envol le 14 juillet ; en forêt de Quénécan, 1 chant le 7 mai, 1 chant à l'étang des Forges/Ste-Brigitte (56) et 1 ou 2 ind. à l'étang des Salles/Perret (22) le 30 avril ; au Faouët, dans le sud-ouest du Morbihan, nid en construction le 10 mai, 3 oeufs le 18 mai, 7 oeufs le 22 mai et 6 poussins le 17 juin. Par ailleurs des chanteurs ont été entendus dans les forêts de Paimpont et de Rennes.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) 35 données

Au Faouët (56) un nid en construction le 1er mai contient 5 oeufs le 10 mai. Poussins prêts à l'envol le 6 juin à Kérogan/Quimper (29S). Juvéniles dans les marais de Haute-Goulaine (44) le 24 juin, à Messac (35) le 6 juillet.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) 4 données

En forêt du Gâvre (44), 1 ind. répond à la repasse le 2 avril et 3 ind. alarmant le 29 avril ; en forêt de Vioreau, 1 ind. alarme les 1er mai et 10 juin.

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) 23 données

Données originales : chants ou

tambourinages à Quimper (29S), 1'Aber Ildut (29N), Plumeret (56), Vannes (56), au Duer/Sarzeau (56). Noté à Beaulieu et aux Gayeulles/Rennes (35), à Ploufragan (22), St-Brandan (22), St-Gilles-Vieux-Marché (22), la Forest-Landerneau (29N), Mahalon (29S), Pont-l'Abbé (29S), Préfaillies (44).

TORCOL (*Jynx torquilla*) 13 données.

Première donnée : 1 chanteur à Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) le 9 avril. Un migrateur certain : 1 à Portez/Locmaria-Plouzané (29N) le 7 mai.

Ille-et-Vilaine.- Vieux-Vy-sur-Couesnon : 1 chanteur le 9 avril, 1 le 15 avril. Beauvais/Painpont : poussins au nid dans un pommier le 25 mai.

Morbihan.- Baden : 1 ad. et 1 juvénile le 15 juillet à l'étang du Moulin-Nauf. St-Armel : chant le 3 mai. La Lande/Péaule : 1 le 7 mai.

Loire-Atlantique.- Préfaillies : 1 le 11 juillet. St-Etienne-de-Montluc : 3 chanteurs se répondent le 28 avril, 1 le 30 juin. Vioreau : 1 chanteur le 30 avril. Plaine de Mazerolles/Sucé : 1 le 7 mai. Forêt du Cellier : 1 le 16 mai.

Parmi toutes ces localités seul le Vioreau avait déjà été cité.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) 3 données

Une nouvelle localité a été découverte, sur la côte guérandaise cette fois : 1 chanteur dans les dunes de Pen Bron/la Turballe (44) le 25 juin. Dans les localités classiques : 1 chanteur au Magouer/Plouhinec (56) le 19 mai et 1 chanteur à Kerouriec/Erdeven (56) le 5 juillet.

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) 17 données

Les seules données originales proviennent du littoral bigouden (29S) : plusieurs couples régulièrement notés de Penmarc'h à Pouldreuzic, notamment à Loc'h Gourined/Pouldreuzic, Kergaran/Plovan, Trenvel/Tréogat, St-Vio/Tréguennec. Régulièrement notée en divers points de St-Nazaire (44) et à la gare de St-Brieuc (22). Au moins deux couples sur la commune de Cléder (29N) en juillet, dont un nourrit des poussins hors du nid le 10. 2 ou 3 couples dont 1 nourrit au Vieux-Passage/Plouhinec (56) le 14 juillet.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) 22 données

Données originales : Beslé-sur-Vilaine (35) (nids), Maurepas/Rennes (35) (chant), Beauvais/Painpont (35) (chant), lisière de la forêt de Lorges (22) (chant), St-Brandan (22) (notée), Erdeven (56) (nid), Ploemel (56) (chant), Fetenio/Brandivy (56) (notée), les Mortiers/St-Gildas-des-Bois (44) (4-5 chanteurs),

la Madeleine/Pontchâteau (44) (nourrissage), Vioreau (44) (nourrissage), Thouaré (44) (chant)...

Nidification.- Nid en construction le 16 avril à Kerouriec/Erdeven, 4 poussins à Beslé le 24 avril, nourrissage à la Madeleine/Pontchâteau le 30 avril, 4 poussins à Beslé le 12 juin, nourrissage au Vioreau le 14 juillet.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) 70 données

Encore des bandes jusqu'en début-avril : 50 à Dolan/Séné (56) le 21 mars, 20 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 28 mars, 10 à Porz Korred/Ouessant le 2 avril...

Nidification.- Pontes le 25 avril à Moyalo (56), le 30 avril dans le Yeun-Elez (29N), le 4 juin à Pont-Scorff (56), le 12 juillet à Cléder (29N)... Poussins et nourrissages le 29 avril à Dref-féac (44), le 13 mai à Tréogat (29S), le 30 mai à St-Rivoal (29N), le 1er juin à Plabennec (29N), le 24 juin à St-Renan (29N), le 6 juillet à Brandivy (56), le 10 juillet à Plouhinec (56), le 15 juillet à Beille-Ile. Juvéniles à peine volants le 1er mai à Perros-Guirec (22).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) 120 données

Premières dans le Léon : 1 à St-Renan le 19 mars, 2 à St-Renan le 25 mars, 2 vers le nord à Ménéham/Kerlouan le 28 mars et 1 à Ménéham le 29 mars. Le passage devient fort dès les derniers jours de mars et atteint rapidement les autres départements : très nombreuses à Murin/Massérac (44) le 30, quelques-unes en Brière (44), 50 à St-Renan et premières à Priziac (56) le 31 mars... La migration reste très importante dans les deux premières décades d'avril et se poursuit, de façon plus diffuse, jusqu'à la seconde décade de mai : 100-150 au Vioreau (44) le 1er avril, 150-200 au Vioreau le 4 avril, 80 à l'étang du Pont/Kerlouan et 250 au Vioreau le 5, 500 au Vioreau le 6, 300 au Vioreau, 100 au Roc'h Du/Crac'h (56) et 200 au Moustoir/Baden (56) le 7, 200-300 au Vioreau, 1000 dans les marais de Guérande et 100-120 à St-Renan le 9... 100 à Ménéham, 700 à l'étang du Pont et 300 au Curnic/Guissény (29N) le 16, 150 à St-Renan le 19... Ensuite, 100-150 dans les polders de Bourgneuf (44) le 23 avril, 100 à l'étang du Pont le 2 mai, 300 au Conquet (29N) le 4 mai... 200 au Curnic le 18 mai.

Nidification.- Nids en construction le 15 avril à St-Vio/Tréguennec (29S), le 6 mai à Tromeur/Bohars (29N)...

Colonies signalées.- 1-10 nids : St-Jacut (22), Bon Abri/Million (22), St-Connan (22), Lambazellec/Brest (29N), St-Vio/Treguennec (29S), Silfiac (56).

11-50 nids : la Guimorais (35), Porz Milin/Lommaria-Plouzané (29N), Tromeur/Bohars (29N), Kergavalan/Quéven (56), Erdeven (56), Moustoirac (56).

51-100 nids : Port-la-Roche/Langon (35), St-Jouan-des-Guârets (35).

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*) 120 données

1 à Kérinou/Brest (29N) le 20 mars, une semaine avant les premières observations dans le reste de la Bretagne. Ce printemps, on n'enregistre pratiquement pas de décalage entre les arrivées dans les divers départements bretons :

Ille-et-Vilaine.- 28 mars (St-Pierre-de-Plesguen), 31 mars (Messac)...

Côtes-du-Nord.- 3 avril (St-Brandan), 11 avril (Perros-Guirec)...

Finistère.- 20 mars (Brest), 30 mars (Crozon), 1er avril (Tréguennec, Fouesnant, Carhaix)...

Morbihan.- 31 mars (Langonnet), 4 avril (Vannes, Séné), 5 avril (Noyal-Pontivy)...

Loire-Atlantique.- 27 mars (Vioreau), 28 mars (Thouaré), 30 mars (Marsac).

Alors que certains couples se cantonnent et chantent déjà dans les premiers jours d'avril (2 couples à Joué-sur-Erdre (44) le 1er et 2 à Noyal-Muzillac (56) le 6, 4 à St-Renan (29N) le 9), le gros passage débute vers le 4 avril : 15 au Vioreau le 1er avril, 10 à Trémoihan/Coat-Méal (29N) le 2, 150-200 au Vioreau le 4, 150 au Vioreau et 50 à Roc'h Du/Crac'h (56) le 7, 100 au Vioreau les 8 et 9. La migration se poursuit de façon assez diffuse jusqu'à la mi-mai : 100-150 dans les marais de Bourgneuf (44) le 23, 50 au Yeun-Elez (29N), 3 vers le nord à Noyal-Pontivy (56) et plusieurs vers le nord-ouest à Perret (22) le 30 avril, 50 à Goulven (29N), 30 à Ménéham/Kerlouan (29N)... le 2 mai, 100 au Curnic/Guissény (29N) le 18 mai.

Nidification.- Juvéniles nourris hors du nid à St-Nazaire (44) les 9 et 10 juin, à Lorient (56) le 25 juin...

HIRONDELLE ROUSSELIN (*Hirundo daurica*). 1 au Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril.

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon rubica*) 61 données

Donnée très précoce : 2 à St-

Marc/Brest (29N) le 16 mars.

Mais ce n'est que fin-mars et début avril que se produit la véritable arrivée : plusieurs dizaines sur un petit plan d'eau à la Chapelle-des-Marais (44) le 31 mars, 2 à Trenvel/Tréogat (29S), 4 à St-Vio/Tréguennec (29S), 1 à Brallac'h/Fouesnant (29S) le 1er avril, première à Beslé (35) le 2 avril, 2 au Vioreau (44) le 5... 1 à Hénanbihen (22) le 9, premières à Perros-Guirec (22) le 15 et à Lannion (22) le 20... Des oiseaux sont cantonnés dès le 8 avril à Remouillé (44), le 23 avril à Pleumeleuc (35)...

PIPIIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) 1 au Collet/Bourgneuf (44) le 23 avril.

PIPIIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) 52 données

Bien qu'apparemment répandue dans toute la Bretagne, cette espèce est certainement plus localisée et moins abondante au fur et à mesure que l'on s'avance vers l'ouest. Dans le Finistère, et le Léon en particulier, les observations restent ponctuelles alors que l'espèce semble commune dans les régions lorientaise, vannetaise, rennaise, et en Loire-Atlantique. Localités nouvelles et données originales :

Ille-et-Vilaine.- Les Gayeulles/Rennes, forêt de Rennes (7 chanteurs pour 10 km de forêt), Paimpont.

Côtes-du-Nord.- St-Laumeuc, St-Brandan, Plougras (1 chanteur chaque fois).

Finistère.- Pleuven (nid).

Morbihan.- St-Thuriau, Brandivy, Ste-Anne -d'Auray, Arzal.

Loire-Atlantique.- St-Gildas-des-Bois (8 chanteurs en deux points), Pontchâteau (3 chanteurs en un point), Besné (plusieurs chanteurs), Sucé (2 chanteurs en un point), la Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Thouaré (1 chanteur plus 10 sur la route de St-Mars-du-Désert à Thouaré), St-Michel-Chef-Chef, Vioreau (8 chanteurs les 5 et 6 avril).

Nidification.- Aucune donnée de migration. Chanteur cantonnés d'emblée, à partir du 4 avril au Vioreau, du 5 avril à Noyal-Pontivy (56), du 7 avril à Ambon, du 8 avril dans la région de Vannes-Auray, etc... Nid contenant 3 poussins à Pleuven (29S) le 15 mai.

PIPIIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) 63 données

Si sur le littoral, le Farlouse paraît susceptible d'habiter divers milieux, dans l'intérieur il semble se cantonner essentiellement aux landes rases, sèches ou humides (Côtes-du-Nord et Morbihan). C'est pratiquement la seule espèce nicheuse sur les landes entre le Roc'h Trédudon/Plounéour-Menez (29N) et les Cragou/le Cloître-St-Thégonnec (29N).

Morbihan.- Le Faouët, Plouhinec, Locoal-Mendon, Erdeven, Plouharnel, la Trinité, Crac'h, Brandivy, Grandchamp, Moustoir-Ac, Meucon, Plumelec, Arzon, Sarzeau, le Tour-du-Parc, Ambon...

Loire-Atlantique.- le Croisic (nourrissage). Au sud de la Loire, 3 ou 4 chanteurs entre Mindin/St-Brévin et Paimboeuf le 13 juillet et 2 chanteurs à Préfailles le 6 juillet.

Nidification.- Nid en construction au Faouët le 8 avril, 4 oeufs à Quéven (56) le 8 avril, 5 poussins à Fouesnant (29S) le 26 avril, juvéniles volants nourris à Brest (29N) le 1er mai, 5 oeufs au Faouët le 1er avril, 4 poussins à Quimper (29S) le 8 mai, nourrissages à Crac'h et à Locoal-Mendon le 3 juin, nourrissage à St-Renan (29N) le 24 juin, au Croisic le 14 juillet.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta spinoletta*) 9 données

Toutes en mars : au Vioreau (44), 3 les 18 et 26 mars ; 1 à Lampaul-Ploudalnézeau le 18 mars ; 2 en plumage nuptial à Bourg-Blanc (29N), 1 au Vougo/Guissény (29N), 1 au Curnic/Guissény, 5-6 à Goulven (29N) le 23 mars ; 1 en plumage nuptial à St-Renan (29N) le 31 mars.

PIPIT MARITIME (*Anthus spinoletta petrosus*) 35 données.

L'observation de grosses bandes à Ouessant (29N) au début d'avril montre que la migration n'est pas terminée à cette époque : le 2 avril, 30 à Port Din, 50 au moins à Yuzin et 30 à Pern.

Nidification.- 4 oeufs à Kerouriec/Erdeven (56) le 26 avril, 2 poussins à St-Pierre-Quiberon (56) le 20 mai, pontes de 3 et 5 oeufs à Rohellan/Erdeven le 14 juin, nourrissages le 24 juin en baie d'Yffiniac (22), 10 couples pour 500m. de falaises au Cap Fréhel (22), nourrissages à Rohellan et Kerouriec le 5 juillet. Chanteurs à Préfailles, au sud de la Loire, en juillet.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE 72 données.

Motacilla flava flava : 2 à Séné (56) le 4 avril, 1 à Brouel/Séné le 6, 5 à Penn-en-Toull/Larmor-Baden (56) le 7, 1 au Pont Neuf/Le Tour-du-Parc (56) le 8, 2 à Mauves (44) le 17...

Motacilla flava flavissima : Les premiers oiseaux sont notés assez tardivement, les deux premiers hors de leur zone de reproduction. 1 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 7 avril, 1 à Mauves et 1 en baie d'Yffiniac (22) le 17, 1 au Collet/Bourgneuf (44) (passage) le 23 et 1 à Brest (29N) le 24 avril.

Nidification.-

Motacilla flava flava : parades au Pont-Vert/Vannes (56) le 18 avril et au bord du canal de la Taillée/Besné (44) le 30 avril, nid en construction à Séné le 26 avril. Nourrissages dans le Morbihan jusqu'à la fin de la période (9 et 12 juillet). Quelques localités nouvelles : dans le Morbihan, Erdeven, Plouharnel (3 couples), Carnac, la Trinité, St-Gildas-de-Rhuys, Ambon ; en Loire-Atlantique, Bats-sur-Mer, bords du canal de la Taillée/Besné (10 couples), plaine de Mazerolles/Sucé (50-100), prairie de Mauves et Île Aroux/Mauves (35 ind.), bords de la Loire de Mindin à Paimboeuf, Île du Petit-Carnet/

Frossay, canal de Haute-Perche/Chauvè, marais des Moutiers, le Collet/Bourgneuf. De la fin-mai au 15 juin, 2 couples ont tenté de se reproduire à Beaulieu/Rennes (35) où un nid (non signalé) avait été trouvé en 1971. Enfin 1 couple était présent le 10 mai en baie de Beausseis/St-Jacut (22) localité située dans la zone de reproduction des *flavissim*.

Motacilla flava flavissima : parades en Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 3 mai, 5 poussins au Len/Louannec (22) le 19 juin... Localités nouvelles : Pont-L'Abbé (1 couple), prés salés de l'Aulne à Dinéault et Logonna-Quimerch, Kernic/Plouescat (2 couples), Len/Louannec (1 nid), baie d'Yffiniac, baie de Beausseis/St-Jacut.

Couple mixte : le 6 juin un couple formé d'1 ♂ *flava* et d'1 ♀ *flavissima* accompagne 1 juv. à Kerogan/Quimper (29S).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) 29 données.

Nidification.- Nid en construction au Stang/Plougourvest (29N) le 29 mars. Pontes de 3 oeufs le 3 avril à Tremobian/Guipronvel (29N), de 3 oeufs le 4 avril à St-Avé (56), de 6 oeufs le 8 avril au Stang. Secondes couvées le 13 avril au Stang (4 et 1 oeuf). Nid de remplacement le 28 avril au Stang.

Il semble que l'espèce, de rencontre courante sur la plupart des ruisseaux et rivières de Basse-Bretagne, ait tendance à se raréfier à mesure que l'on avance vers l'est.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) 63 données.

Aucune *M. a. yarellii* n'a été observée au cours de cette période.

Nidification.- Chant à Bourg-Blanc (29N) le 23 mars. Juvéniles volants à proximité du nid le 7 mai en plaine de Mazerolles/Sucé (44). Poussins au nid le 10 mai au Faouët (56), le 17 mai à Quimper (29S), le 30 mai au Mont St-Michel-de-Brasparts (29N), le 8 juillet à Roudouallec (56). Les observations de juvéniles se multiplient à partir de la mi-juin.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*) 2 données

2 ♂ et 1 ♀ le 13 juin à St-Etienne-de-Montluc (44) et 2 le 7 juillet à l'île du Petit Carnet/Frossay (44).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*) l'espèce nous est signalée comme nicheuse possible sur la carte de Grand-Lieu (44).

cependant que les données originales : 8 chanteurs sur 10 km en forêt de Rennes (35) ; 1 chanteur à St-Aignan-Grand-Lieu (44) le 29 juillet ; 1 couple nicheur au parc de Procé/Nantes (44) ; 1 ♂ à Mazerolles/Sucé (44) le 28 avril ; 1 chanteur en Forêt de Montauban (35) le 23 avril ; 1 ♂ cantonné à St-Brandan (22) le 19 mai.

ROUGEGERGE (*Erithacus rubecula*) 28 données

Nidification.- Nid garni à Guengat (29S) le 1er avril ; juvéniles nourris hors du nid à Auray (56) le 8 avril ; poussins au nid le 29 avril à Guenrouet (44), le 10 mai à Kerhuon (29N) ; nourrissages le 28 mai au Beffou/Plougras (22) et le 30 mai à Ploujean (29N). Encore 4 poussins au nid le 7 juillet à Roscoff (29N). 71 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes (35).

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*) 18 données.

Première observation (chant incomplet) le 5 avril au Vioreau (44).

Loire-Atlantique.- Au Vioreau, 14 chanteurs le 30 avril, 3 le 1er mai, 1 le 10 juin ; le 5 mai dans la région de Mauves-sur-Loire : 20 chanteurs sur les bords de Loire et la route de Mauves, 2 chanteurs sur la route de Bellevue, 2 chanteurs aux rochers de Mauves, 1 chanteur à Aroux ; 4 chanteurs aux Mortiers/St-Gildas-des-Bois le 30 avril ; 1 à Chauvé le 11 juillet.

Côtes-du-Nord.- 1 chanteur à Ploufragan, comme l'an passé, les 4 mai et 5 juin.

GORGELEUE (*Luscinia svecica*) 7 données

Aucune nouveauté. 3 chanteurs dès le 19 mars dans les marais de Guérande (44). Nourrissages dans les marais de Guérande les 3 et 15 juillet.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) 5 données

10 à Priziac (56) le 22 mars, 70-80 le 26 mars au Yeun-Elez (29N), 8 au vol à St-Brandan (22) le 2 avril, 14 de passage le 3 avril à cet endroit, 45 à Lanfains (22) le 11 avril.

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*) 11 données

Pour ce qui est de la reproduction dans les Monts d'Arrée (29N), voir MOYSAN (*Ar. Fran.*, 5 (1) : 1-4). Un ♂ observé dans la région de Gouarec (22) le 30 avril pourrait être un nicheur. Aucune observation de migration prénuptiale sur le littoral.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) 49 données

Trois pontes au Gaillec/Lorient (56) le 31 → p 89

CINCLE (*Cinclus cinclus*) 3 à TrégUILY/Messac le 3 avril.

TROGLODYTE (*Troglodytes troglodytes*) 41 données

Nidification.- nid en construction aux Gayeulles/Rennes (35) le 16 mars. 65 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes. Un nid a été trouvé à Kemenez, petit île de l'archipel de Molène le 8 juillet.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) 37 données

En un point, à St-Renan (29N), 7 captures le 16 mars et 3 autres le lendemain.

Nidification.- 4 oeufs à Messac (35) le 14 mars, ponte à Pleuven (29S) le 20 mars, 5 oeufs à Hennebont (56) le 23 mars, 4 pontes près de Lorient le 29 mars, 4 oeufs à Pésaule (56) le 2 avril, 3 oeufs à Kerhuon (29N) le 3 avril, 8 pontes au Temple/Pont-Scorff (56) le 9 avril. Seulement 5 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes (35).

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*) 14 données

Toutes les données peuvent se rapporter à des nicheurs.

Nidification.- Mauves (44) : 1 ♂ chanteur le 13 avril, 2 ou 3 couples avec juvéniles le 17 juin, 10 juvéniles au moins le 20 juin (20-30 pendant toute la période). St-Etienne-de-Montluc (44) : 2 couples, 2 ♂ et 1 ♀ le 14 avril. Plaine de Mazerolles/Sucé (44) : 50-100 tout au long de la période. Canal de la Taillée/Besné (44) : 1 ♂ silencieux le 30 avril. Sur la vallée de la Vilaine, 1 chanteur à Massérac (44) le 22 avril et 1 ♂ à Théhillac (56) le 30 avril. 1 à l'étang de Montauban (35) le 1er mai. Par ailleurs quelques observations dans les monts d'Arrée.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*) 60 données

Nidification.- 5 poussins à Brallac'h/Fouesnant (29S) et 5 oeufs à Toulven/Quimper (29S) le 26 avril ; nourrissage à Dréfféac (44) le 29 avril ; juvéniles volants à St-Gildas-des-Bois (44) le 30 avril ; nourrissages le 2 mai à Kerhallet/Brest (29N), le 4 mai à Trédrez, le 9 mai à St-Marzin/Plougonvelin (29N)...

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) 59 données

Deux fois moins de données que les années passées. Le passage se poursuit jusqu'à fin-avril et début-mai. 4 ♂ et 2 ♀ au Croisic (44) le 17 mars, 1 à Trenvel/Tréogat (29S), 1 ♂ au Croisic et 1 ♂ à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) le 19 mars. Puis il faut attendre la fin du mois pour voir les observations devenir régulières : 2 couples à Goulien (29S), 15 à la Mer Blanche/Fouesnant (29S), 2 à Lampaul-Plouarzel (29N), 1 à Kerurus/Ploumécour-Trez (29N) le

28 mars... 1 ♀ de passage à Ploufragan (22) le 8 avril, 1 à Beaulieu/Rennes (35) les 18, 19 et 21 avril, 1 chanteur à Mazerolles/Sucé (44) le 28 avril (non revu ensuite), 1 ♂ à Dréfféac (44) le 29 avril, 1 ♀ au Vioreau (44) et 1 ♀ à Ti Bleiz/Brasparts (29N) le 30 avril. 1 ind. reste à Beaulieu/Rennes jusqu'au 14 mai, visitant même des cavités le 7 mai.

Nidification.- Premiers chants à Penn Hir/Camaret (29S) et au Toulin-guet/Camaret le 31 mars, parades à Ouessant (29N) le 2 avril ; deux pontes (1 et 7 oeufs) le 22 avril à Kerouriec/Erdeven (56) ; premiers juvéniles le 22 mai au Kernic/Plouescat (29N)...

Jusqu'à ce jour nous n'avons encore rien dit sur la répartition de cette espèce dont il ne serait guère difficile pourtant d'établir le statut, voire de connaître les effectifs reproducteurs en Bretagne. Localités signalées : baie de Beussais/St-Jacut et Sillon du Len/Louannec dans les Côtes-du-Nord ; Terenez/Plouezoc'h, Kernic/Plouescat, Cumic/Guissény, Landunvez, Ouessant et St-Mathieu/Plougonvelin dans le Finistère-nord ; Camaret, Goulien, Tréogat et Plomeur dans le Finistère-sud ; Plouhinec et Erdeven dans le Morbihan ; la Turballe et la Croisic en Loire-Atlantique.

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*) 1 ♂ à Pen Bron/la Turballe (44) le 25 juin.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) 41 données
Une seule donnée concerne avec certitude le passage prénuptial : 1 ♂ à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 18 mars.

Nidification.- Chants notés dès le 17 mars à Nantes, le 21 mars à Rennes, le 31 mars à Camaret (29S). Poussins au nid le 24 mai à Paimpont (35) et le 29 mai à Dinan (22).

Ille-et-Vilaine.- Diminution de la densité sur le campus universitaire de Beaulieu/Rennes : 7 couples pour 60 hectares ; 2 chanteurs à la gare de Redon le 19 mai ; 3 couples à Beauvais/Paimpont ; 1 couple à Dinard le 10 avril ; 1 à Pléchatel le 4 juillet.

Côtes-du-Nord.- 5 ou 6 couples de la pointe du Jas à la pointe de la Teignouse/Fréhel ; 1 chanteur à Erquy le 16 juin.

Finistère.- 2 chanteurs le 31 mars à Camaret.

Morbihan.- 1 ♀ à Penhouet/Floemel le 12 juin ; nourrissage à Bellevue/Guer le 25 juin.

Loire-Atlantique.- 1 chanteur à St-Gildas-des-Bois le 29 avril.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) 7 données
Nos renseignements sur cet oiseau sont de plus en plus squelettiques. Nous ne retiendrons

Mauve Noire mars ; éclosion à Trénobian/Guipronvel (29N) le 10 avril. 28 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes (35).

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) 4 données

2 à Kerogan/Quimper (29S) le 18 mars, 10 à Thouaré (44) le 19 mars, 3 à St-Brandan (22) le 23 mars et 5 à Noyal-Pontivy (56) le 25 mars.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) 53 données

Nid en construction à Pont-l'Abbé (29S) le 18 mars ; pontes de 5 oeufs à Lorient (56) le 31 mars et de 4 oeufs à Guipronvel (29N) le 3 avril ; juvéniles hors du nid à Brest le 13 avril, à St-Nazaire (44) le 18 avril. 17 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes (35).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) 61 données

4 oeufs à Pleuven (29S) le 31 mars, 3 oeufs à Pleuven également et nourrissage d'une couveuse à St-Nazaire (44) le 1er avril, nid en construction au Faouët (56) le 8 avril ; déjà des juvéniles à St-Avé (56) le 4 avril ; poussins au nid à Gouesnac'h (29S) le 27 avril...

Localités léonardes : Breignou Koz/Bourg Blanc, Trémazan/Landunvez (1 ind. le 7 mai), Landunvez (1 le 7 mai), Quéliverzan/Brest (nourrissages les 17 et 23 juin).

De belles bandes surtout composées de juvéniles sont observées dans le Morbihan à partir de la mi-juin : dans la région de Ploemel, 22 au Moustoir le 17 juin, 21 sur un pré à Pont Fol le 20, 25 en cet endroit le 26, 20 à St-Méen le 28 et 22 à Kerplat le 29 ; 11 sur un champ au Gaillec/Lorient le 2 juillet.

A suivre

BIBLIOGRAPHIE ORNITHOLOGIQUE BRETONNE

BAUDOUIN-BODIN, J., 1970.- Statut actuel des oiseaux marins nicheurs de Bretagne. Loire-Atlantique. *Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest Fr.*, 67 : 47-50.

Reprise intégrale de l'article paru en 1968 dans *Ar Vran* (I (4) : 162-172).

BOZEC, R., 1969 a.- Le Lorient (*Oriolus oriolus*) en Nidification de quelques oiseaux rares dans le Morbihan. *Penn ar Bed* n° 56 : 55.

Début juin 1967, un mâle et une femelle de cette espèce ont été observés à plusieurs reprises près d'Arzal (56). Les chants et les comportements font présumer la nidification en cette localité. (7 lignes).

J.-Y. M

BOZEC, R., 1969 b.- Oiseaux des dunes de Plouhinec-Erdeven-Plouharnel. *Penn ar Bed* n° 57 : 114-120.

Dans cet article de présentation, René Bozec fait le point sur ce qu'il sait de l'avifaune nidificatrice, migratrice et hivernante du plus grand ensemble dunaire de Bretagne. Rien ou presque qui ne soit déjà connu, ou déjà publié par l'auteur, mais une mise au point claire et de lecture agréable. L'Oedicnème et l'Alouette calandrelle, les deux "spécialités" d'Erdeven, sont traités un peu plus longuement.

J.-Y. M

BRICHAMBAUT, J. de, 1969 a.- Mésange à moustaches *P. biarmicus* (en Brière). *Aulauda*, 37 : 77.

Notule de 5 lignes où l'auteur fait part de l'observation d'un couple de Mésanges à moustaches en Brière (44) le 31 mars 1968. Selon lui, l'espèce était peu abondante sur l'ensemble du marais à cette époque.

J.-Y. M

BRICHAMBAUT, J. de. 1969 b.- Nidification possible d'Echasse et de Barge à queue noire dans l'estuaire de la Loire. *Alauda*, 37 :

Cette courte notule ne vaudrait pas la peine qu'on s'y attarde si elle n'était un exemple de ce qu'on fait de plus mauvais dans le genre. !!

Peut-on parler de nidification, même en prenant le soin d'ajouter "possible", à partir des observations relatées ? Les "jeunes" Echasses tuées le 14 juillet volaient-elles ou non ? Ne connaissant pas de sens précis, biologiquement parlant, à l'adjectif "jeune", nous ne pouvons en décider. Notons cependant qu'en 1965 (ou 1966, car une fois de plus l'auteur a égaré la date) l'Echasse a niché en plusieurs localités nouvelles de la côte atlantique, ce qui rend plausible l'hypothèse d'une nidification dans les marais de Trignac.

Quoi qu'il en soit, la phrase suivante est inadmissible : "il est d'ailleurs possible que nichent également des Barges à queue noire". C'est là admettre implicitement la nidification de l'Echasse, et ce en employant le présent dit d'habitude.

Quant aux Barges à queue noire, absolument rien dans les 7 lignes de cette notule ne permet d'émettre l'hypothèse d'une nidification. Le 31 mars, date fournie par l'auteur, les Barges à queue noire sont encore en migration pré-nuptiale, et deux oiseaux ne constituent pas obligatoirement un couple. De plus, les oiseaux observés ont peu de chances d'être "cantonnés" à une date aussi précoce en un lieu où la nidification n'est ni régulière ni abondante. Il nous semble en tout cas que la colonisation de nouveaux milieux par une espèce aussi intéressante que la Barge à queue noire est un événement qui vaut bien qu'on prenne la peine de le contrôler ou de la faire contrôler par les ornithologues de la région.

Ce petit travail supplémentaire aurait évité à l'auteur de publier dans une revue internationale un tissu d'imprécisions inutilisable. Reprochons à la rédaction de cette revue d'avoir accepté de publier cette relation courant-d'air. De plus, faut-il attendre trois (ou quatre) ans pour ne rien pouvoir affirmer ?

Y.G.

BURNIER, E., 1970.- Une observation d'automne de la mouette de Sabine (*Xema sabini*) sur la côte bretonne. *Alauda*, 38 : 159.

Dans cette notule, BURNIER relate l'observation de 5 Mouettes de Sabine adultes volant vers le sud entre Belle-Ile et Quiberon (56), le 23 septembre 1969. Rappelons que le Mor-Braz et plus particulièrement les parages d'Houat-Hoëdic sont le seul point connu des côtes européennes où la migration post-nuptiale de l'espèce soit régulièrement observée. Ce fait est connu depuis la fin du siècle dernier et a déjà fait l'objet de plusieurs publications dont la plus complète est celle de N. MAYAUD (*Alauda*, 29 : 165-174.).

J.-Y. M

CHAUCHEPRAT, M. & MAHEU, R., 1970.- Observations ornithologiques. *Ailes et Nature* n° 9 : 9-12.

Ce rapport concerne les observations effectuées dans la région vannetaise entre octobre 1969 et septembre 1970. Les observations hivernales portent presque exclusivement sur les recensements d'Anatidés effectués par MAHEU dans la partie orientale du Golfe du Morbihan et déjà publiés dans *Ar Vreiz*. Les données du printemps et de l'été 1970 concernent 15 espèces dont le statut dans le Vannetais est plus ou moins précisé. Retenons :

Topcol : Il existe trois points de nidification dans la région concernée.

Freux : la corbeautière de Calzac/St-Gildas-de-Rhuys est estimée à 100 nids.

Serin cini : Selon l'auteur, on assiste à une stabilisation voire à une diminution des effectifs en des localités où le cini abondait au moment de l'implantation. Mais simultanément, elle colonise l'intérieur et le bocage alors qu'à l'origine elle était plutôt cantonnée à la bande côtière.


J.-Y. M

CONSTANT, P., 1970.- Introduction à l'écologie des oiseaux de la Grande Brière (Loire-Atlantique). *Nos oiseaux*, 30 : 241-251.

Aussi étonnant que cela paraisse, aucun article d'ensemble n'avait jusqu'alors été consacré à l'Ornithologie de la Brière. Cette publication de Pierre CONSTANT comble donc une importante lacune.

L'étude porte sur près de 2000 hectares de marais dans le secteur limité par le canal de Camerun au nord, le canal du Nord à l'ouest, le canal de Rosé au sud et la route Camerun-St-Joachim-Montoir-de-Bretagne à l'est. A une présentation rapide du milieu (climat, hydrologie sommaire, esquisse botanique), fait suite la partie ornithologique proprement dite. L'auteur y résume le résultat de dix années d'observations (1958-1967) en regroupant les espèces par milieux : le marais, essentiellement constitué par des phragmitaies denses semées de bouquets de saules ; les piardes, anciennes zones d'extraction de la tourbe, actuellement couvertes de 20 à 50 cm d'eau à la saison de reproduction ; les buttes, secteurs surélevés, progressivement envahis par les roseaux ; enfin les étangs, plans d'eau atteignant plusieurs dizaines d'hectares chacun.

Les deux Grèbes, huppé et castagneux, semblent présents dans les quatre habitats. Parmi les Ardeidés, seul le Blongios est cité pour tous les milieux ; le Héron cendré, le Héron pourpré et le Grand Butor semblent confinés à la phragmitaie dense. Les trois canards de surface, Colvert, Souchet et Sarcelle d'été, ne nichent que sur les buttes, mais le nid du Milouin a été trouvé en 1965 et 1967 dans la phragmitaie dense. C'est dans ce milieu qu'il faut rechercher le nid du Busard des roseaux alors que le Busard cendré niche sur les buttes. La famille des Rallidés est très bien représentée puisque l'au-



Poussin de Héron cendré

photo Yves BRIEN.

teur mentionne six espèces : la Poule d'eau, la Foulque et le Râle d'eau, bien sûr, présents partout, mais aussi la Marouette ponctuée citée dans les phragmitaies et les piardes, la Marouette de Baillon, notée dans la phragmitaie dense et en bordure des étangs, la Marouette poussin citée pour les piardes. Les trois limicoles, Vanneau, Bécassine et Chevalier gambette, ne se reproduisent que sur les buttes. Les trois Laridés, eux (Mouette rieuse, Guifettes noire et moustac), ne fréquentent que les piardes. L'Alouette des champs et trois Motacillidés (Pipit farlouse, Bergeronniettes grise et printanière) sont nicheurs sur les buttes exclusivement, de même que les Traquets motteux, pâle et tarier. La Gorgebleue habite les piardes. Des six fauvettes aquatiques énumérées, trois ne sont notées que dans la phragmitaie dense : il s'agit des deux Locustelles et de la Bouscarle ; la Rousserolle turdoïde niche dans les phragmitaies du marais et des bords d'étangs ; Rousserolle effarvate et Phragmite des joncs se rencontrent partout. Depuis 1966, quelques couples de Mésanges à moustaches se reproduisent en Brière, autour des piardes probablement. Le Bruant des roseaux est noté dans le marais, les piardes et les phragmitaies des buttes...

En résumé une bonne présentation de l'avifaune briéronne, et des éléments intéressants : des nouveautés (Milouin, des précisions sur le statut de la Mésange à moustaches ; confirmation de la nidification du Grand Butor, du Busard cendré, des Marouettes ponctuée et de Baillon, du Chevalier gambette, de la Locustelle tachetée... ; disparition en tant que nicheurs du Gravelot à collier interrompu, de la Barge à queue noire, du Combattant et de la Sterne pierregarin (ces disparitions, ainsi que la diminution du Gambette et du Vanneau, sont attribuées au développement croissant de la roselière). Notons quand-même que nous avons été surpris par le laconisme des références à la Gorgebleue et à la Marouette poussin. Dans le premier cas, l'intérêt de la trouvaille tient au fait qu'aucun auteur n'avait encore observé la nidification de la Gorgebleue en Brière. MAYAUD (1958) allait même jusqu'à tirer argument de cette absence pour confirmer sa thèse selon laquelle les Gorgebleues de la population atlantique seraient inféodées à un milieu subissant l'influence salée de la mer. Pour lui, la Brière était un marais d'eau douce. Or, on sait depuis (MAILLARD & GRUET, 1972) que les eaux de la Brière sont souvent saumâtres et qu'en certains points de la Grande Brière le sol est parfois fortement salé. Il y avait là, comme on le voit, matière à un intéressant développement écologique. Quant à la Marouette poussin, c'est une espèce orientale dont la reproduction en France est extrêmement localisée : elle a été signalée en Côte d'Or et en Brenne (MAYAUD, 1936 et 1953), soupçonnée en Camargue en 1954 (SIMMS d'après MAYAUD, 1957) et a été confirmée en Brenne en 1958 et 1960 (GUICHARD in MAYAUD, 1960). Disons encore que si le travail semble très complet du point de vue qualitatif, il nous laisse un peu sur notre faim ; nous aurions aimé quelques précisions chiffrées. Mais, soyons justes, il ne s'agit que d'une introduction, et l'auteur affirme au début de l'article que "des recherches actuellement en cours préciseront les densités des populations aviennes".

CONSTANT, P., 1972.- L'avifaune de la Grande Brière. *Penn ar Bed* n° 69 : 296-303.

Cet article reprend en partie le précédent en supprimant la présentation du milieu, en simplifiant la partie consacrée aux oiseaux nicheurs, en ajoutant un paragraphe sur la migration et l'hivernage ainsi que quelques réflexions sur la sauvegarde de la Brière.

Quelques modifications concernant l'avifaune nicheuse, depuis l'article de 1970 : la Marouette poussin n'est plus mentionnée, la reproduction du Milouin est qualifiée de sporadique au lieu d'accidentelle ; de plus, l'auteur nous apprend que la Mésange à moustaches a connu une augmentation importante en 1971 et que la nidification du Râle des genêts (non cité en 1970) a été constatée à plusieurs reprises sur les buttes.

En période d'hivernage, les piardes constituent d'excellentes zones de gagnage nocturne pour les canards du Golfe et des estuaires de la Loire et de la Vilaine ; mais elles sont en grande partie désertées avant même le lever du jour, ce qui suffit à expliquer la faiblesses des effectifs briérons lors des recensements internationaux d'Anatidés.

J.-Y. M

DORVAL, P., 1969.- Avifaune des marais de la Baie d'Audierne. *Penn ar Bed* n° 59 : 182-190.

Le n° 59 de *Penn ar Bed* est entièrement consacré aux dunes et marais de la baie d'Audierne (29S) et à leur protection. L'article de Patrick DORVAL est une présentation de leur avifaune, à l'usage d'un public sensibilisé à la protection de la nature. Il fait le point de nos connaissances actuelles sur le sujet, grâce à ses observations personnelles, aux données d'Ar Vran et aux rares articles parus sur l'ornithologie de la région, puis il fait quelques suggestions pour la protection de ce site exceptionnel.

J.-Y. M

DREANO, J.-C., 1969.- Le Torcol (*Jynx torquilla*) in Nidification de quelques oiseaux rares dans le Morbihan. *Penn ar Bed* n° 56 : 54-55.

Notule de 10 lignes relatant des observations de Torcols chanteurs à Grandchamp et Plumelec, puis la découverte d'un nid dans un pommier à Bignan (56) le 5 juillet 1968.

J.-Y. M

GUILLOU, J.-J., 1969.- Différences écologiques entre *Larus a. argentatus* et *Larus fuscus grisei* en hivernage dans des milieux "naturels". *Alauda*, 37 : 338-345.

La grande diversité des formes chez les Goélands du groupe brun-argenté (*Larus fuscus* et *Larus argentatus*) pose aux biologistes de nombreux problèmes théoriques, parmi lesquels celui qui est abordé dans cet article

de huit pages. Chacun sait que Goéland brun et Goéland argenté sont des formes très voisines, la plupart des auteurs s'accordant à faire dériver ce premier d'une forme nord-eurasiatique du Goéland argenté. Or, lorsque deux formes apparentées et de mœurs semblables coexistent, les lois de GAUSSE et de LACK prévoient en gros trois possibilités :

- 1°) l'occupation par les deux formes de deux régions distinctes, ou...
- 2°) l'occupation par les deux formes de milieux distincts dans la même région, ou...
- 3°) l'utilisation par les deux formes de nourritures différentes dans le même milieu.

Dans le cas présent, ces lois semblent battues en brèche puisque :

- l'aire de répartition de *fuscus* chevauche celle de plusieurs formes d'*argentatus* ;

- les deux dernières possibilités ne se vérifient pas non plus en période de reproduction selon les travaux de BROWN et de HARRIS. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette anomalie : l'importance de l'apport humain dans l'alimentation de ces Goélands et le fait que les études des Britanniques ont été menées à la période de l'année où la nourriture est la plus abondante, ces deux facteurs étant susceptibles de réduire sensiblement une éventuelle concurrence.

Il restait donc à trouver, hors de la période d'abondance estivale, un secteur géographique où coexistent Goéland brun et Goéland argenté et à y étudier l'écologie et l'alimentation des deux espèces. Le problème étant ainsi posé, GUILLON a tenté de le résoudre en Bretagne, région où cohabitent en hivernage une importante population de *Larus a. argentatus* et un assez fort contingent de *Larus fuscus graelsii*. A l'issue de son étude, il considère comme établi que les deux espèces fréquentent en hiver des milieux distincts : le Goéland brun montre une prédilection pour les vasières alors que le Goéland argenté, très peu fréquent dans ce biotope, exploite des milieux plus divers et notamment les côtes rocheuses d'où le Goéland brun est absent.

Partant d'une excellente hypothèse de travail, l'auteur aboutit à des conclusions dont nous pensons, par expérience, qu'elles ont de bonnes chances d'être justes. Nous n'en donnerons pour exemple que les observations menées par R. MAHEO sur la vasière de Bailleron/Séné (56) au cours de l'hiver 1970-1971. En 14 observations échelonnées du 16 novembre 1970 au 15 mars 1971 :

Goéland brun : 14 données de 4 à 18 oiseaux, totalisant 124 individus.

Goéland argenté : 14 données de 1 à 5 oiseaux, totalisant 14 individus

ce qui représente en moyenne 1 argenté pour 9 bruns.

Malheureusement, rien dans le corps de l'article ne vient étayer

de façon vraiment convaincante les thèses de l'auteur, et ceci pour plusieurs raisons. En premier lieu, nous ne sommes pas du tout persuadés que la baie de Kerogan (le principal exemple de l'article) constitue un milieu naturel suffisamment à l'abri des influences humaines : les quatre kilomètres qui la séparent de Quimper permettent-ils véritablement aux effluents de cette ville de 50 000 habitants d'être totalement écumés par les Houettes rieuses et les Goélards bruns avant de pénétrer dans la baie ? Notant un peu plus loin la remarquable et constante dominance de *fuscus* en milieux d'estuaire et de fond de ria, milieux qu'il considère comme artificiels, l'auteur aurait dû s'interroger sur le caractère "naturel" de la baie de Kerogan.

En second lieu, on est surpris par le peu de consistance des faits avancés pour mettre en évidence les différences écologiques entre les deux espèces et, par conséquent, pour étayer une hypothèse théorique de cette importance. L'étude d'un seul milieu du type baie de Kerogan est-elle suffisante ? Où sont les comparaisons entre les différents milieux "naturels" ou non, les corrélations statistiquement établies entre l'abondance de telle espèce et tel milieu ?.. Dans ce domaine, un raisonnement, aussi logique soit-il, ne peut se fonder sur des perceptions brutes ou des impressions forcément subjectives. L'hypothèse de travail était très intéressante. La démonstration n'est pas faite.

J.-Y. M

HAYS, C., 1969.- Le Gros-bec (*Coccythraustes coccythraustes*) in Nidification de quelques oiseaux rares dans le Morbihan. *Penn at Bed* n° 56 : 55.

Sept lignes sur la découverte d'un nid vide de Gros-bec dans une branche de pommier à Grandchamp (56) en 1965. Deux couples pourraient nicher dans ce secteur.

J.-Y. M

JARRY, G. & NICOLAU-GUILLAUMET, P., 1969.- Chevalier solitaire *Tringa solitaria* Wilson à l'île d'Ouessant (Finistère). *Ois. Rev. Fr. Ornith.*, 39 : 267-268.

Dans cette note de 27 lignes, les auteurs font une relation détaillée de l'observation puis de la capture d'un Chevalier solitaire à Ouessant (cf. *At Vran*, 1970, 3 [1] : 19). Il s'agit de la seconde citation de cet oiseau en Bretagne : le précédent avait été capturé le 21 août 1961, à Ouessant également. Aucune autre observation en France.

LEBEURIER, E., 1970.- Reprises d'oiseaux bagués après démaçoutage. *Penn at Bed* n° 60 : 261.

Le centre de soins pour oiseaux maçoutés créé à Prinel par Edouard LEBEURIER lors de la marée noire d'avril 1967 est sans doute le seul à avoir fonctionné dans des conditions acceptables. Les oiseaux n'ont été relâchés qu'en septembre 1967, soit 4 ou 5 mois après avoir été recueillis,

long délai sans doute, mais indispensable à la reconstitution de l'imperméabilité du plumage. Faute de l'avoir respecté, les autres centres ont très vraisemblablement exposé les oiseaux traités à une mort rapide. Deux Pingouins bagués, et relâchés le 10 septembre 1967 en baie de Morlaix, ont été repris à ce jour. L'un capturé vivant deux mois plus tard sur place fut à nouveau relâché après de nouveaux soins. Le second fut trouvé mort à la pointe St-Mathieu/Plougonvelin (29N) le 26 janvier 1969, soit 16 mois et demi après avoir été remis à l'eau. Ce résultat témoigne de la qualité des soins donnés à Primel par Monsieur LEBEURIER et ses aides.

J.-Y. M

MAHEO, R., 1969 a.- La Réserve ornithologique du Golfe du Morbihan : bilan de dix années. *Penn ar Bed* n° 58 : 139-144.

En 1958 est créée la Réserve du Golfe du Morbihan, au coeur d'une des plus importantes zones de stationnement hivernal d'Anatidés du littoral atlantique français. Quelques graphiques résument l'évolution des effectifs de Canards et Bernaches de 1960 à 1968. Jusqu'en 1964, la réserve, en dépit de quelques vicissitudes, est à peu près respectée : elle joue son rôle et les effectifs d'hivernants augmentent. Mais à partir de là, la situation se dégrade rapidement, pour revenir pratiquement à ce qu'elle était avant 1958. De 60 à 65000 oiseaux en 1964 et 1965, on passe à 40-45000 en 1966 et 1967 et à 25000 seulement en 1968 ! Des solutions sont proposées pour rétablir l'efficacité de la réserve.

J.-Y. M

MAHEO, R., 1969 b.- La réserve ornithologique du Golfe du Morbihan : bilan de dix années. *Le courtier de la nature* n° 12 : 151-155.

Reprise intégrale de l'article précédent.

PLINZ, W., 1972.- Vogelbeobachtungen an der französischen Atlantik-Küste.

Il s'agit là du compte-rendu de deux voyages effectués par l'auteur sur les côtes bretonnes en septembre 1961 (Piriac (44), Quiberon (56), Camaret (29S), Ploumanac'h (22) et Cap Fréhel (22) et en juillet-août 1971 (Grand-Lieu (44), Bourgneuf (44), pointe du Raz (29S) et Cap Fréhel).

Parmi les 106 espèces notées, nous retiendrons les observations suivantes :

Foulque noire : nicheuse en 1971 au petit Loc'h de la baie des Trépassés/Plougoff (29S). C'est le premier cas connu pour cette localité, à l'extrême ouest de la Bretagne.

Pluvier guignard : 1 à Quiberon le 10 septembre 1961. Une des quelques observations morbihannaises de cette espèce régu-

lière (mais rare) au passage post-nuptial.

Pigeon colombin : Deux observations en 1971 au Collet/Bourgneuf.

Hibou moyen-duc : Cris de 4 jeunes au Collet en juillet 1971.

Engoulevent : Chant le 17 juillet 1971 sur la lande de Fréhel.

Ruppe : Un couple observé du 12 au 18 juillet 1971 à Fréhel, transportant régulièrement de la nourriture. Un autre couple nourrissant 4 juvéniles volants le 2 août 1971 au Collet.

Traquet tarier : Un couple en bordure d'un terrain de football près du Cap Fréhel en juillet 1971. Signalons que les plus proches lieux de nidification connus sont les polders de la baie du Mont-Saint-Michel (35).

J.-Y. M

POSTEL, E., 1969.- Réserve du Cap-Fréhel (Côtes-du-Nord). Penn ar Bed n° 56 : 41.

BOZEC, R., 1969.- Réserve de l'île de Meaban (Morbihan). Penn ar Bed n° 56 : 42

LEBEURIER, E., 1969.- Réserve de la baie de Morlaix (Finistère) Penn ar Bed n° 56 : 42.

BOLLORE, G., 1969.- Réserve de l'archipel des Glénans (Finistère). Penn ar Bed n° 56 : 42-43.

La phrase suivante que l'on peut lire dans ce compte-rendu est une pure invention : "*Les colonies de Sternes se maintiennent assez bien à Guiriden...*" Le dernier ornithologiste à avoir vu des Sternes sur cet îlot (Ar Gurunenn Zabl) est B. MAUGARD en 1965, et encore les colonies étaient-elles réduites à quelques nids. Dès 1966 il était envahi par les Goélands argentés (85 nids) et marins (1 couple). En 1968, il y avait là 71 nids de Goélands argentés ! L'auteur confond-il Sternes et Goélands ou, plutôt n'a-t-il pas mis les pieds sur l'îlot ?

J.-Y. M

MONNAT, J.-Y., 1969.- Réserve de l'Iroise (Finistère). Penn ar Bed n° 56 : 43-44.

LE PAPE, L., 1969.- Réserve du Cap-Sizun (Finistère). Penn ar Bed n° 56 : 45-46.

Le numéro 61 de Penn ar Bed est entièrement consacré aux réserves du Massif Armoricaïn. Dix des onze réserves bretonnes ont été

créées pour leur intérêt ornithologique. Pour chacune, les auteurs retracent l'histoire de la réserve et l'évolution des effectifs d'oiseaux nicheurs :

JULIEN, H.-H., 1970.- La Réserve naturelle du Cap-Sizun. Les Oiseaux de la Réserve. *Penn ar Bed n° 61* : 272-279.

Il s'agit de l'article déjà publié en 1961 et remis à jour en 1970 par Albert LUCAS.

LUCAS, A., 1970.- Les oiseaux du Cap Fréhel. *Penn ar Bed n° 61* : 290-294.

BOZEC, R., 1970.- La Réserve de l'île de Méaban. *Penn ar Bed n° 61* : 295-301.

LE DEMEZET, M., 1970.- Réserve des Glénan. *Penn ar Bed n° 61* : 302 - 304.

BRIEN, Y., 1970.- La Réserve de "Nar-Hor" en Belle-Ile-en-Mer. *Penn ar Bed n° 61* : 304-305.

MONNAT, J.-Y., 1970.- La Réserve de l'Iroise. *Penn ar Bed n° 61* : 306-311.

DORVAL, P., 1970.- L'Avifaune nicheuse de Trevorc'h. *Penn ar Bed n° 61* : 312.

LEBEURIER, E., 1970.- Réserve ornithologique des îlots de la baie de Morlaix. *Penn ar Bed n° 61* : 313-318.

BABIN, C., 1970.- Les Réserves d'Ille-et-Vilaine. *Penn ar Bed n° 61* : 319-321.

MONNAT, J.-Y., 1970.- La Réserve Albert Chappelier (Les Sept-Îles). *Penn ar Bed n° 61* : 328-330.