



AR VRAN

PUBLICATION ORNITHOLOGIQUE DU
LABORATOIRE DE ZOOLOGIE DE LA
FACULTE DES SCIENCES DE BREST



1972 - TOME V, fasc. 4

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU
16 JUILLET AU 15 NOVEMBRE 1972



SOMMAIRE

Actualités Ornithologiques du 16 juillet au 15 novembre 1972

par Yvon GUERMEUR
Maurice LE DEMEZET
Jean-Yves MONNAT.....P 139

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 16 JUILLET AU 15 NOVEMBRE 1972

par Yvon GUERMEUR, Maurice LE DMEZET & Jean-Yves MONNAT

Ont participé aux présentes actualités :

Jean-François ANNEZO, Jean-Pierre ANNEZO, Bernard ANTOINE, Loïc ANTOINE, Patrick BAILLEUL, Philippe BAILLEUL, Annie BARRE, Patrick BECHET, R. BELLEC, Henri BLANQUART, François-Xavier de BLIGNIERES, Yannick BOURGAUT, Jean-Louis BRAVE, Yves BRIEN, Pierre CANEVET, Gilbert CAPP, Noël CAPP, Yann CHEMINAN, François CNUDE, Hervé CORRE, Denis COULN, Pierre CRENN, P.-Y. DALINO, Philippe DANAIRE, Gérard DECROIX, Christophe DELAUNAY, Jean DELAUNAY, Jean-Loup DUPONT, Jean-Pierre FERRAND, Denis FLOTE, Pierre FONQUERNIE, Alain GERARD, Michel GOASDOUE, Yvons GUERMEUR, Nicolas GUYOMARC'H, Patrick HAMON, Jacques HENRY, Charlotte & Marcel JACQUAT (*Jura Suisse*), Lucien KERAUTRET, B. KEREZEON, Ewenn de KERGARIOU, Yvon KERSAUDY, Yves LAMOE, Maurice LE DMEZET, Jakez LE FEVRE, Joseph LE LANNIC, Michel LE PAPE, Marcel LE PENNEC, Raymond LE PENUIZIC, Alain LE TOQUIN, René de LIEDEKERKE (*Belgique*), Guy LORCY, B. LUNAIS, Claude MAHE, Roger MAHEO, René MAHUAS, Joseph MANAC'H, Philippe MILON, Jean-Yves MONNAT, Guy MOREL, Jérôme MOUTON, Gérard MOYSAN, NENON, Pierre NICOLAU-GUILLAUMET, Michel OMNES, G. OREEL (*Amsterdam*), R. PENNEC, Roland PERON, A. PERTHUIS, Jacques PETIT, Jean-Louis PRATZ, Michel QUANTENNE, C.S. ROSELAAR (*Amsterdam*), Conrad STEIN, Loïc STEVANT, Philippe TAQUET, Joël THERY, Alain THOMAS, J.-P. TURPIN, Richard VAUGHAN (*Grande Bretagne*), et les stagiaires des camps de Bagueage d'Ouessant.

Les camps de bagueage d'Ouessant se sont déroulés du 1er au 28 septembre 1972. En outre, C.S. ROSELAAR et G. OREEL ont effectué une série d'observations en mer au large de l'île de Batz (29N) du 3 au 16 septembre. Enfin, Joseph LE LANNIC, et Raymond LE PENUIZIC ont séjourné sur Hoedic (56) du 5 au 12 septembre.

PLONGEON SP. (*Gavia sp.*) 7 données

Deux observations très précoces : 1 en rade de Brest (29N) le 3 août et 1 à la pointe du Croisic (44) le 11 septembre. Ensuite, 1 au Vougo/Guissény (29N) le 1er octobre et 1 au Croisic le même jour. Les autres données concernent des isolés en fin octobre et début novembre.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) 5 données

Une donnée très précoce : 4 à la pointe du Croisic (44) le 9 septembre. Puis rien avant la fin octobre : 1 à l'Ile Chevalier/Pont-l'Abbé (29S) le 23 octobre, 5 dont 3 en plumage nuptial en baie de Beoulas (29N) le 25 octobre, 2 à Pentrez/St-Nic (29S) le 28 octobre, 5 au Bendi/Logonna-Daoulas (29N) le 11 novembre.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*). 1 à la pointe du Croisic (44) le 11 novembre.

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) 2 données

1, très précoce, à la pointe de Gâvres (56) le 2 septembre. 1 à Port-Manec'h/Névez (29S) le 2 novembre.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) 85 données

Cette année encore, on retrouve le schéma des années précédentes. En juillet, l'essentiel des données provient des sites de reproduction : le Cranic/Brec'h (56), Yeun-Elez (29N)... Premières observations en mer dans les derniers jours du mois : en baie de la Fresnaye/Plévenon (22), 1 le 25 juillet, 24 le 29, 26 le 30, 23 le 10 août, 21 le 12... Au Croisic (44), 2 le 5 août et 1 le 27 août. Dans le Golfe (56), 35 le 17 juillet, 40 le 21, 60 le 25, 120 le 1er août, 120 le 3, 110 le 5 et 100 le 8. De façon classique, le passage dans cette localité a lieu dans la deuxième décade de septembre : 80 le 7 septembre, 100 le 10, 80 le 11, 240 le 16... En octobre, passage et arrivée des hivernants se superposent : dans le Golfe, 120 le 4, 160 le 5 et 175 le 9. Par ailleurs, 25 à Suscinio/Sarzeau (56) et 13 à Kervoyal/Dangan (56) le 30 septembre, 6 à l'étang de la Provostière/Riaillé (44) le 15 octobre, 8 au Boulet/Feins (35) le 17, 28 à St-Jacut (22) le 22... En novembre, les chiffres semblent se stabiliser : dans le Golfe, 115 le 8, 105 le 14 et 100 le 15 ; 59 en baie de St-Brieuc (22) le 4...

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) 5 données

1 à la pointe des Guets/Hillion (22) le 17 septembre, 6 dans l'anse de Breneguy/Larmor-Baden (56) le 20 septembre et 2 en cet endroit le 22 septembre ; 3 à Trébeurden (22)

le 3 novembre et 2 en baie de St-Brieuc (22) le 4 novembre.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) 21 données

Quatre observations sur eau douce dans la seconde décade d'août : 1 juv. à St-Vio/Treguennec (29S) le 9 août, 4 ind. dont 3 en plumage nuptial au Yeun-Elez/Botmeur (29N) les 12 et 16 août, 1 juv. à St-Renan (29N) le 16 août. Premières données en mer à partir de la deuxième décade de septembre : 1 en Penzé (29N) le 12 septembre ; l'évolution des effectifs a été particulièrement bien suivie dans le Golfe (56) : aucun le 11 septembre, 8 le 16, 7 le 29, 20 le 9 octobre, 10 le 24 octobre, 20 le 25, 10 le 30, 25 le 2 novembre, 20 le 6, 30 le 8, 11 le 14 et 17 le 15 novembre ; 1 à St-Renan le 5 octobre ; 3 en baie de Morlaix (29N) et 80 en trois bandes dans la baie de Daoulas (29N) le 25 novembre ; 28 au Bendi (baie de Daoulas) le 11 novembre.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*) 120 données

Nidification.- 1 chanteur à Ster Vras/Belle-Ile (56) le 11 août.

La dispersion des nicheurs est notée à partir de début-août : 15 à Loc'h Nizeleg/Plovan (29S), où l'espèce ne niche pas, le 2 août (il peut s'agir d'oiseaux venant des étangs voisins de la baie d'Audierne), 2 au sillon du Len/Louannec (22) le 6... puis 6 en Penzé (29N) le 26 août, 1 au barrage d'Ouessant (29N) le 28, 6 au sillon du Len le 7 septembre. Ce n'est que dans les derniers jours de septembre et en octobre que les observations en milieu maritime se généralisent : 15 à St-Suliac (35) le 30 septembre, 9 à St-Pabu (29N) le 4 octobre, 44 en rivière d'Etel (56) le 5, 15 à Brouël/Séné (56) le 6, 5 à Penfoullec/Poussant (29S) le 7... Augmentation sensible fin octobre et début novembre : 16 sur le Goyen/Audierne (29S) et 12 en Penzé (29N) le 23 octobre, 30 sur la Rance (35) le 26, 29 en Penzé et 30 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 1er novembre, 10 au Len le 3, 30 en baie de Kerogan/Quimper (29S) le 9 et 34 à Kerhuon (29N) le 12 novembre (contre 12 le 7 octobre et 6 le 22 octobre).

PETREL TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*) 5 données

Quatre observations en haute mer ; 2 à la pointe du Croisic (44) le 19 juillet.

PUFFIN SP. (*Puffinus* sp.) 2 données

1 de grande taille le 22 juillet au Croisic (44) et 1 Puffin cendré probable le 21 août au Cap Fréhel (22).

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*) 57 données

Deux localités fournissent des observations suivies : le Cap Fréhel (22) en juillet-août et la pointe du Croisic (44) tout au long de la période. Au Cap Fréhel, les observa-

teurs ont régulièrement noté la race des Baléares (*Puffinus p. mauritanicus*) : sur l'ensemble des observations cette sous-espèce représente les trois-quarts des effectifs.

Retenons les observations consécutives à la tempête de fin-juillet - début août : au Cap Fréhel, 1100 le 30 juillet, 600 le 31, 300 le 1er août et 400 le 3 août ; 200 à Piriac (44) le 2 août...

Une série d'observations au large de l'Île de Batz (29N) donne les résultats suivants : en 28 heures d'observation du 5 au 15 septembre, 76 Puffins des Anglais sont notés, sans maximum significatif ; 40 *P. p. mauritanicus*, 22 *P. p. puffinus* et 14 oiseaux de sous-espèce indéterminée ; tous ces oiseaux volaient vers l'ouest ; la majeure partie des observations concernait des isolés, mais de petits groupes ne dépassant pas 4 ind. ont aussi été notés, comprenant parfois les deux sous-espèces.

Par ailleurs, quelques grosses bandes ici et là : 200 au Cap Sizun (29S) le 19 août, 650 en baie d'Hillion (22) le 2 septembre, 3000 à la Turballe (44) le 23 septembre, 500 en baie de Penvis/Sarzeau (56) le 30 septembre, 1000 à la pointe du Croisic et 600 à Kervoyal/Dangan (56) le 1er octobre. Passage notable fin octobre et début novembre au Croisic : 300 en 1h le 30 octobre (passage ininterrompu toute la journée) et 240 en 1 h le 1er novembre. Par la suite les observations à cet endroit sont nettement plus faibles : 10 le 5 novembre, 20 le 11 novembre.

PUFFIN MAJEUR (*Puffinus gravis*) [Quelques groupes d'une dizaine d'individus du 6 au 9 août, 40 milles au sud de la Grande Sole (47°34'N, 08°40'W).

PUFFIN FULIGINEUX (*Puffinus griseus*) 10 données

1 au Cap Fréhel (22) le 27 juillet, 1 dans un groupe de Puffins majeurs, 40 milles au sud de la Grande Sole le 7 août, 1 à Molène (29N) le 3 septembre, 2 à la pointe du Croisic (44) et 3 vers l'ouest au large de Batz (29N) le 11 septembre, 1 vers l'ouest à Batz le 15 septembre, 2 à Balaneg (archipel de Molène) le 17 septembre, 1 entre Molène et le Conquet (29N) le 30 septembre.

FULMAR (*Fulmarus glacialis*) 8 données


→ Quatre observations sur les lieux de reproduction : au Cap Fréhel, 1 le 24 juillet, 3 le 1er août, 3 le 19 août ; au Cap Sizun (29S), 1 le 3 septembre.

1 en phase claire 40 milles au sud de la Grande Sole le 9 août. A Kadoran/Quessant (29N), 1 le 17 septembre, 2 le 18 septembre et 3 le 20 septembre.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) 137 données.

Les 16 données de juillet-août concernent essentiellement des isolés ; retenons : 8 à la pointe du Croisic (44) le 22 juillet, 10 dans le Golfe (56) le 5 août, 4 à St-Nazaire (44) le 12, 4 au Cap Fréhel (22) le 19, 1 juv. à St-Renan (29N) le 25 et 8 au port de Brest (29N) le 28 août.

Le passage ne débute vraiment que dans les premiers jours de septembre ; 4 en migration à Ouessant (29N) le 5 septembre, 84 près d'Er Hadden/Hoedic (56) le 6 ; augmentation brutale dans le Golfe :



35 le 5 et 50 les 6 et 10 septembre ; 30 à Piriac (44) et 15 en baie de Bourgneuf (44) le 10 ; 14 à la pointe du Croisic le 11... Puis, 18 au Croisic le 23 septembre, 53 à St-Mathieu/Plongonvelin (29N) le 24, 50 dans le Golfe le 29 et 19 à Suscínio/Sarzeau (56) le 30. Nouvelle vague de passage dans la première quinzaine d'octobre : dans le Golfe, 60 le 4, 64 le 5, 70 le 10, 50 le 19... ; 150 à Locmariaquer (56) le 4 ; 25 au Croisic le 1er ; 30 à la pointe de Gâvres (56) le 15... A partir de cette date, les effectifs se stabilisent plus ou moins : 40 à 50 dans le Golfe du 19 octobre au 14 novembre. Citons encore 24 en vol à la pointe du Kongell/Quiberon (56) le 21 octobre, 26 dans l'anse de Betahon/Dangan (56) le 1er novembre, 25 aux Hébihens/St-Jacut (22) le 8 novembre, 18 à Roscanvel (29N) et 19 à Kerhuon (29N) (deux localités de la rade de Brest) le 11 novembre, 31 à Gâvres le 12 novembre.

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) 15 données

Nidification.- 2 nids contenant encore 1 oeuf le 6 août au Cap Fréhel (22) ; 1 nid avec un poussin de 2 à 3 semaines à cet endroit le 28 août ; 2 juvéniles prêts à l'envol à Koh Kastell/Belle-Ile (56) le 4 septembre.

1 ind. posé 9 km au large de l'île de Batz le 21 juillet ; 1 à la pointe du Croisic (44) les 11 septembre et 1er octobre ; 4 à 10 dans le bassin oriental du Golfe (56) durant toute la période.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) 197 données

deuxième quinzaine de juillet.- 26 données provenant du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Atlantique.

Contrairement aux années précédentes plusieurs données de cette période concernent des groupes importants : 46 à St-Jean/Loceal-Mendon (56) le 17 (maximum de la période), 15 à Reniac/Ambon (56) le 24, 28 à St-Jean le 25 et 20 à cet endroit le 29...

première quinzaine d'août.- 14 données : les effectifs augmentent sur le littoral. 25 dans le bassin oriental du Golfe (56) le 3, 9 à Roc'h Du/Crac'h (56) et 13 à Trely/Ambon le 4, 29 en rivière d'Auray (56) le 13 et 27 à Kerogan/Quimper (29S) le 15.

deuxième quinzaine d'août.- 12 données : 30 en rivière de Pont l'Abbé (29S) le 27.

première quinzaine de septembre.- 22 données : un passage a probablement lieu au cours de cette quinzaine. Deux localités montrent leur maximum de la période, la baie de Kerogan avec 40 ind. le 3 et la rivière de Pont-l'Abbé avec 60 le 7 ; 23 à St-Jean (contre 5 le 13 août et 14 le 24 septembre) le 13 ; 15 dans le bassin oriental du Golfe le 12 ; 17 en baie de Morlaix (29N) le 11.

deuxième quinzaine de septembre.- 42 données. Augmentation du nombre des localités, mais la plupart des observations concernent des isolés ou de petits groupes de 2 à 7 oiseaux. 15 bandes atteignent ou dépassent 10 oiseaux : 13 sur l'Aulne (29N) le 18, 10 en rivière de Pont-l'Abbé le 23, 14 au Loc'h/Guidel (56) le 24, 11 au Boulet/Feins (35) le 25, 35 à Mauves (44) le 26, 20 dans l'étier de Noyal (56) le 30.

première quinzaine d'octobre.- 42 données. Plusieurs localités montrent un second maximum au cours de cette quinzaine : St-Jean avec 17 ind. le 5 et 21 le 11, Kerogan avec 32 ind. le 6 et 35 le 15, la rivière de Pont-l'Abbé avec 60 ind. le 11. Par ailleurs, seulement deux bandes atteignent la dizaine de Hérons : 10 à Brouël/Séné (56) le 3 et 21 au Plac/ri vi è re d'Etel le 11.

deuxième quinzaine d'octobre.- 19 données. Aucune bande observée ne dépasse 4 oiseaux.

première quinzaine de novembre.- 20 données, toutes sur le littoral. 20 en rivière de Pont-l'Abbé le 1er, 25 à Kerogan le 3, 7 à Audierne (29S) le 4, 18 à Kergeorget/Sarzeau (56) le 8, 27 à Kerogan le 12.

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*). 6 données.

Au lac de Grand-Lieu (44), 2 le 27 juillet, 5 le 15 août; au Roc'h Du/Crac'h (56) 1 le 4 août ; à St-Renan (29N) 1 les 25 août et 11 septembre ; à l'étang du Band/Henvic (29N), 1 le 3 septembre.

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) 9 données

1 à Grand-Lieu (44) le 27 juillet, 1 à Kerogan/Quimper (29S) les 15 et 19 août, 3 ou 4 dans le marais Breton (44) le 26 août, 1 à Dolan/Séné (56) les 6 et 20 septembre et 6 octobre, 1 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) les 23 septembre et 15 octobre.

GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*) 1 au lac de Grand-Lieu (44) le 31 octobre.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) 6 données

1 à Mauves (44) le 22 août ; 4 observations dans la partie nord occidentale du Golfe du Morbihan peuvent se rapporter au même oiseau : 1 juv. à Liré/Noyalo les 22 et 29 septembre, 1 juv. à Brouël/Séné le 26, 1 à Baillaron/St-Armel le 4 octobre ; 5 en vol à la pointe du Croisic (44) le 24 septembre.

CYGNE TUBERCULE (*Cygnus olor*) 5 données

A Goulven (29N), 3 le 27 septembre et 2 le 1er novembre ; au Curnic/Guissény (29N), 1 les 4 et 15 octobre et le 1er novembre ; 2 à Kerogan/Quimper (29S) le 14 novembre.

OIE SP. (*Anser* sp.) 2 données

50 en vol à Thouaré (44) le 13 octobre et 15 en rivière de Noyalo (56) le 15 octobre.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) 21 données

Pour le Golfe, la plupart des données concernent le bassin oriental : 1 le 3 octobre, 14 le 9 octobre, 250 au Duer/Sarzeau le 11 octobre, 350 le 18, 530 le 23, 700 le 25, 600 le 30 octobre, 700 le 2 novembre, 750 le 6 novembre, 700 le 8, 800 le 9, 1000 le 14 et 1400 le 15 novembre ; 1 dans l'estuaire de la Penzé (29N) le 14 octobre ; à St-Jacut (35), 3 le 22 octobre, 1 le 8 novembre.


TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) 8 données

Surtout des juvéniles, isolés pour la plupart (5 observations d'isolés) : 1 à Goulven (29N) le 27 juillet ; dans le bassin oriental du Golfe (56), 2 le 1er août ; en rivière de Pont-l'Abbé (29S), 1 le 11 septembre, 1 le 19 septembre ; 1 juv. en baie de la Fresnaye/Plévénon (22) ; 1 à St-Séran (44) le 24 septembre ; 10 à Tascon/St-Armel (56) le 15 novembre.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) 149 données

Aucun schéma d'ensemble ne se dégage au cours de cette période. Peu d'endroits sont régulièrement suivis et sur ceux qui le sont, les variations sont le plus souvent sans concordance. En fait, seul le bassin oriental du Golfe est bien suivi (cf. histogramme ci-contre) ; le fort pic de la fin septembre est classique : il est sans doute dû à un regroupement dans le Golfe, consécutif à l'ouverture générale de la chasse.

Quelques gros effectifs : environ 250 entre l'étang du Pont/Kerlouan (29N) et le Curnic/Guissény (29N) dès la seconde quinzaine de juillet, 200 à Loc'h Kergaran/Plovan (29S) le 9 août, 300 à St-Renan


COLVERT

le 26 août, 800 autour du Mont-St-Michel (35) le 16 octobre, 500 à Kergeorget/Sarzeau (56) le 8 novembre...

Nidification, - encore des poussins à Grand-Lieu (44) le 27 juillet.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) 115 données.

Seulement trois données dans la seconde quinzaine de juillet : 4 et 15 en deux points de la Brière/St-Lyphard (44) le 16, 10 dans le Golfe (56) le 21. En août, seulement quatorze observations concernant de petits effectifs : 2 à Kerléguer/le Guilvinec (29S) le 2, 1 à Kerjean/Trébabu (29N) et 1 à Belle-Ile (56) le 8, 5 au Mont-St-Michel (35) le 12, 15 au Boulet/Feins (35) le 20, 7 à St-Jacut (22) le 23, 7 à St-Renan (29N) le 30 (contre 2 le 15 août). Les observations se multiplient dès les premiers jours de septembre, et concernent des bandes bien plus étoffées. Correspondant aux pics de 100 ind. des 4 et 12 septembre dans le Golfe, notons : 10 au Vioreau (44) le 2, 22 au Curnic/Guissény (29N) le 3... 150 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 10 et 20 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 13. 31 à St-Renan le 20, 35 à l'étang du Pont le 21, 110 au Boulet/Feins (35) le 25, puis 40 aux marais de Bodaval/Sarzeau (56) et 80 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) le 30 septembre. Le mois d'octobre est marqué par de fortes variations dans le Golfe et sur les étangs du Morbihan : au Roc'h Du/Crac'h, 800 le 4 et 100 le 15... Rien de spécial en novembre en dehors d'un pic très accentué le 8 dans le Golfe.



CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) 2 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 15 octobre.


CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) 70 données


Les arrivées ne débutent que dans la première quinzaine de septembre : 6 en baie d'Yffiniac (22) le 1er, 50 dans le Golfe (56) le 5, 1 en baie de Morlaix (29N) le 6, 150 dans le Golfe le 10, 27 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 13, 10 à St-Renan (29N) le 15... Les effectifs augmentent assez régulièrement ensuite dans le Golfe (cf. histogramme), et l'espèce s'installe sur la plupart des localités classiques ; on assiste cependant à un fort passage dans la seconde quinzaine de septembre avec 5000 à Kergeorget/Sarzeau (56) le 18 et 3000 dans le Golfe le 25 (contre 700 le 22 et 1700 le 29 dans cette dernière localité) ; 1 ind à Ouessant (29N) du 16 au 21. Notons encore 1 ind. à Thouaré (44) le 17 octobre, 120 en Penzé (29N) le 23 octobre (28 seulement la veille), 310 en rivière du Faou (29N) le 11 novembre.

SARCELLE D'HIVER

1^{er} août

1^{er} octobre





CANARD PILET (*Anas acuta*) 36 données

Une seule observation début septembre : 1 en baie d'Yffiniac (22). Il faut ensuite attendre la seconde quinzaine de septembre pour enregistrer les premières arrivées : 1 en baie de Kerogan/Quimper (29S) et 20 dans le Golfe (56) le 16, 2 à la pointe des Guets/Hillion (22) le 17, 200 dans le Golfe le 25, 10 dans les marais de Bodaval/Sarzeau (56) le 30... Les effectifs du Golfe croissent assez régulièrement jusqu'à la mi-novembre, avec quelques fluctuations peu marquées (cf. histogramme). Partout ailleurs ne sont observés que des effectifs très faibles, sauf 120 en baie d'Yffiniac le 7 novembre.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) 10 données


A St-Renan (29N), 12 le 31 juillet, 2 les 21 et 25 août, 1 le 11 septembre ; 10 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 3 août ; 6 à Bodaval/Sarzeau (56) le 4 août ; à Trenvel/Tréogat (29S) 80 le 6 septembre, 7 le 11 septembre. Dernières observations : 3 au phare de Kermovan/le Conquet (29N) et 100 à St-Jean/Loceal-Mendon (56) le 24 septembre.

CANARD SOUCHET (*Anas platyrhynchos*) 22 données


Nombre dérisoire de données par rapport aux étés précédents. En outre, trois observations seulement atteignent ou dépassent 10 ind. 1 à St-Renan (29N) le 31 juillet, 6 dans le Yeun-Elez/Botmeur (29N) le 12 août, 1 à Trenvel/Tréogat (29S) le 21 août, 2 à St-Renan le 30 août... 8 à l'étang du Boulet/Feins (35) le 1er septembre, 30 à Trenvel le 6 septembre, 10 en ce lieu les 11 et 19 septembre, 8 dans le bassin oriental du Golfe (56) le 22 septembre, 7 à Trenvel le 3 octobre... Seulement trois données du 5 octobre à la fin de la période : 4 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 15 octobre, 5 à Kervoyal/Dangan (56) le 23 octobre et 4 à Lannec/Ploemeur (56) le 8 novembre.

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) 1 (♀ ou juv.) à Trenvel/Tréogat (29S) le 19 septembre.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) 47 données.



Aucun signe évident de passage avant la fin septembre (!). Jusqu'à cette date, la plupart des observations proviennent de localités où des Milouins ont été présents tout au long du printemps : Yeun-Elez/Botmeur (29N), St-Renan (29N), baie d'Audierne (29S). Notons cependant 50 à Trévi-gnon/Trégunc (29S) le 7 août, 30 au Yeun Elez le 12 août, 1 au Curnic/Guissény (29N) le 3 septembre, 6 à Trenvel/Tréogat (29S) le 19 septembre.



(Passages à partir des premiers jours d'octobre : 2 à Kerhuon (29N) le 1er, 13 à Trenvel le 3, 10 à St-Renan le 5, 80 à Trenvel le 6, 7 à Kerhuon le 7, 14 à St-Renan le 11... Recrudescence du passage dans la dernière décade d'octobre : 30 à St-Renan et 10 à la Poitevinnière (44) le 21, 600 en mer à Kervoyal/Dangan (56) le 23, 35 à Trenvel le 28, 60 à Trémignon/Combours (35) le 30. Puis 30 dans l'anse de Bétahon/Billiers (56) le 1er novembre, 80 à Trenvel le 4 novembre, 32 à Kerhuon le 6, 30 au Yeun-Elez et 46 à Kerhuon le 12, 33 à Kerogan/Quimper le 14.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 22 données

Toutes les observations proviennent du Finistère, et jusqu'au début novembre rien n'indique qu'un passage ait eu lieu, 14 des 15 données de cette période provenant de localités où des Morillons étaient présents tout le printemps : Yeun-Elez/Botmeur (29N) avec un maximum de 3 ♂ le 26 juillet ; Trenvel/Treogat (29S) avec 3 ind. le 9 août et 5 ♀ le 29 octobre ; St-Renan (29N) avec 3 ind. les 20 septembre et 21 octobre... La quinzième donnée concerne 1 ind. à Kerhuon (29N) le 22 octobre.

Cette dernière observation et les 5 ind. du 29 octobre à Trenvel situent peut-être le début du passage. Celui-ci ne devient évident qu'à partir du 4 novembre : 6 à Trenvel et 21 à Kerogan/Quimper. Puis 12 à Trenvel le 6 novembre, 30 dans le Yeun-Elez et 5 à Kerhuon le 12 novembre.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) 4 données

45 en baie d'Yffiniac (22) le 17 septembre, 1 à St-Renan (29N) le 22 septembre ; 3 à Trenvel/Treogat (29S) le 23 octobre et 2 en ce lieu le 28 octobre.

EIDER A DUVET (*Scoteria mollissima*) 6 données

Au Croisic (44), 1 les 19 et 20 juillet, 1 le 16 septembre, 1 imm. le 1er octobre ; 1 vers l'ouest à Batz (29N) le 14 septembre ; 3 à Bag an Dorcheun/Plo-meur (29S) le 16 octobre.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) 59 données

Les passages en mer ont été suivis journellement jusqu'au 25 août au Cap Fréhel (22). Tous les mouvements notés se font vers l'ouest. Retenons 180 le 28 juillet, 170 le 30 juillet, 400 en 1 heure le 1er août (tempête), 300 le 8 août, 205 en quatre bandes le 9 août, 770 en six bandes le 11 août, 265 en trois bandes le 23 août. Quelques données de passage en mer au large de la pointe du Croisic (44) en septembre-octobre : 24 le 10 septembre, 101 en vol vers le sud le 24 (1/2 heure), 13 en 15 minutes le 1er octobre et 2 en 1 heure le 15 octobre. Notons aussi 20 en vol vers le sud à En Eidig (56) le 7 septembre.

Les premiers stationnements sont notés à partir de la deuxième semaine de septembre. En baie d'Yffiniac (22), 11 le 9 septembre, 10 le 10 et 29 le 17 septembre ; 1 dans le Golfe (56) le 10 septembre. Mais les observations ne se multiplient qu'à partir de la deuxième décade d'octobre : 250 à Kervoyal/Dangan (56) le 11 octobre, première hivernante en Penzé (29N) le 21 octobre, 185 à Pentrez/St-Mic (29S) le 28 octobre, 300 à Suscinio/Sarzeau (56) le 1er novembre, 2000 en baie d'Yffiniac le 4 novembre, 200 à St-Jacut (22) le 12 novembre.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) 2 données

5 au Croisic (44) les 29 octobre et 1er novembre.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*) 4 données

1 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) et 1 à l'étang de Carné/Noyal-Muzillac (56) le 24 octobre, 1 à Pont-l'Abbé le 1er novembre et 1 dans le bassin oriental du Golfe (56) le 6 novembre.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*) 17 données

Une observation précoce : 1 ♀ imm. à la pointe du Croisic (44) le 9 septembre. Il faut attendre la dernière décade d'octobre pour voir les premiers Harles : 4 à la pointe du Croisic et 6 en Penzé (29N) le 22, 10 pour toute la baie de Daoulas (29N) le 26 octobre, 7 à la pointe du Croisic le 29 octobre. A la mi-novembre, les secteurs classiques d'hivernage ne recèlent que très peu d'oiseaux : un peu plus d'une centaine en rade de Brest (29N) le 11 novembre, 10 en baie de Morlaix (29N) le 9, 26 dans le Golfe (56) le 15.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 63 données

Peu de faits notables. En début de période, 1 ind. à queue rousse à Trédudon/la Feuillée (29N) le 25 juillet, 3 à St-Brandan (22) le 27 juillet, 10 en forêt du Gâvre/le Gâvre (44) le 29...

EPERVIER (*Accipiter nisus*) 24 données

Ille-et-Vilaine.- 1 ♀ à Pléchatel le 18 juillet.

Finistère.- 1 ♀ poursuit une Crécérille à Roudoudero'h/Sizun le 10 août ; 1 ♀ à Keriou/Brennilis le 15 août ; 1 en rivière de Pont-l'Abbé le 24 octobre.

Morbihan.- 1 à Dolan/Séné le 22 septembre, 3 à Kerstang/Séné le 29 septembre, 1 ♀ à Noyal le 30 septembre, 1 à Locmariaquer le 4 octobre, 1 à Brouël/Séné le 6 octobre, 1 à Michot/Séné le 10 octobre, 1 à Roc'h Du/Crac'h et 1 à St-Jean/Lochal-Mendon le 11 octobre, 1 à Penhièvre/Quiberon le 15 octobre, 1 à Surzur le 31 octobre.

Loire-Atlantique.- 1 à l'île du Petit Carnet/Frossay le 19 juillet, 1 au lac de Grand-Lieu le 27 juillet, 2 à Mauves le 28 août et 1 le 12 septembre, 1 en forêt de la Bretesche/Missillac le 23 septembre, 1 à Mauves les 1er et 3 octobre, 2 au Vioreau le 12 octobre et 1 le 21 octobre.

AUTOIR (*Accipiter gentilis*) 1 au Menez-Hon/Plomodiern (29S) le 22 juillet.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) 4 données

1 à Kerogan/Quimper (29S) les 11, 12 et 13 septembre ; 1 à Quessant (29N) les 26 et 27 septembre ; 1 à En Eidig (56) le 9 octobre et 1 au Moustoir/Arzal (56) le 11 octobre.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) 11 données

Uniquement en Loire-Atlantique, et surtout en Brière. Par ailleurs, 9 à l'île du Petit-Carnet/Frossay le 20 juillet, 1 sur les bords de l'Erdre à Sucé le 29 juillet, 10 à St-Aignan-Grand-Lieu le 15 août, 1 dans le Marais Breton le 24 septembre, 2 au Petit Vioreau le 12 octobre et 1 à la Provostière le 21 octobre.

BONDREE (*Perisoreus inornatus*) 17 données

La plupart des observations proviennent du centre Finistère et concernent des nicheurs. 2 couples au moins en forêt du Huelgoat (29N) et 2 en forêt du Cranou/Hanvec (29N). Par ailleurs, 1 en baie de la Fresnaye/Pléboulle (22) le 20 juillet, 1 à Lancieux (22) le 29 juillet, 2 en forêt de la Hunaudaie (22) le 4 août et 1 à Joué-sur-Erdre (44) le 5 août. Enfin 3 dans les landes de Lanvaux (56) le 5 septembre puis 1 à Bon-Abri/Hillion (22) le 17 septembre, ces deux dernières données ayant trait à des oiseaux en migration.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) 35 données

Six observations fin juillet sur les lieux de nidification : Brière (44), Grand-Lieu (44) et presque-île de Rhuy (56).

Dispersion et passage dans l'ensemble de la Bretagne dès les premiers jours d'août. 1 au Yeun-Elez/Botneur (29N) les 2 et 5 août, 1 à Trenvel/Treogat (29S) le 7, 1 à Bulat-Pestivien (22) le 9, 1 juv. au Curnic/Guissény (29N) le 2 septembre, 1 ♀ ad. à St-Renan (29N) le 19 septembre. Dans la première quinzaine d'octobre : 3 à Bodaval/Sarzeau (56) et 1 juv. au Roc'h Du/Crac'h (56) le 4, 2 ♂ et 2 ♀♀ à Sarzeau le 5, 1 ♂ à Brouail/Séné (56) et 1 ♀ dans les marais de Séné le 6, 1 à St-Renan le 7, 1 ♂ à Reniac/Ambon (56) et 2 juv. au Roc'h Du le 11, 1 juv. à Mazerolles /Sucé (44) le 15. Dernière observation : 2 ♂ à Passay/Grand-Lieu le 31 octobre.

BUSARD ST MARTIN (*Circus cyaneus*) 5 données

1 ♂ à Brasparts (29N) le 27 août, 1 ♀ et 1 ♂ dans les marais de Séné (56) le 6 octobre, 1 ♂ et 1 ♀ à Mazerolles/Sucé (44) du 6 au 18 octobre et le 28 octobre, 1 ♂ à Merezelle/Belle-Ile (56) le 21 octobre.

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*) 22 données

Un des deux sites connus de la forêt de la Hunaudaie-la Poterie (22) n'a pas été occupé cette année. Familles notées à St-Vio (29S), St-Jean-Trolimon (29S), Belle Ile (56), Mazerolles (44). Dernières observations : à Belle-Ile les 23 et 24 septembre, à Botneur (29N) et dans le Marais breton (44) le 26 septembre.

BUSARD "CULBLANC" (*Circus cyaneus/pygargus*) 6 données

3 au Yeun-Elez/Botneur (29N) le 24 juillet et 1 le 5 août, 1 à la Feuillée (29N) le 5 août, 1 à Quiberon (56) le 5 septembre, 1 sur En Eldig (56) le 8 septembre et 1 à St-Vio/Tréguennec le 19 octobre.

CIRCAETE (*Circus gallioides*) Trois observations les Monts d'Arrée (29N) les 22 juillet, 12 et 27 août.

BALBUZARD (*Pandion haliaetus*) 10 données

1 au lac de Grand-Lieu (44) le 27 juillet, 1 au Yeun-Elez/Botneur (29N) le 16 août, 1 à Bailleron/Séné (56) le 18 août, 1 au Cranic/Brec'h (56) le 26 août, 1 au Curnic/Guissény (29N) le 28 août, 1 juv. à Belle-Ile (56) les 13 et 15 septembre, 1 juv. au bord de la Loire/Thouaré (44) le 15 septembre, 1 à Moustierlin/Pouesnant (29S) le 18 septembre, 1 à St-Jean/Loceol-Mendon (56) le 24 septembre et 2 à l'île Arouix/Mauves (44) du 16 au 26 septembre.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) 2 données

1 sur Hoedic (56) le 8 septembre et 1 à l'étier de Noyal (56) le 4 octobre.

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) 6 données

Deux observations d'un oiseau dans les Monts d'Arrée (29N) le 3 août : Croaz ar Go et Menez Neur (le même ?) ; 1 à Mazerolles/Sucé (44) le 6 août ; 1 couple en chasse au Menez Neur/Hanvec (29N) le 7 août, 1 au Cloître-St-Thégonnec (29N) le 9 août. Puis 1 à Broûl/Séné (56) le 6 octobre.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) 6 données

A Ouessant (29N), 1 ♀ observée le 25 septembre au Stiff et le 28 à Kadoran ; 1 couple à Mazerolles/Sucé (44) le 15 octobre, et 1 ♀ à cet endroit le 18 octobre ; 1 ♂ au Gollot/Plounévez-Moëdec (22) le 20 octobre.

FAUCON CRECERELLE (*Falco vespertinus*) 179 données

Les données du baguage et les observations menées à Ouessant (29N) permettent de déceler un passage net du 20 au 25 septembre avec, par exemple, 7 ind. simultanément au barrage le 20. Au même moment, plusieurs dizaines d'individus dans le Marais Breton (44) le 24... Nouveau passage ressenti dans le Morbihan le 18 octobre : 60 en presqu'île de Rhuys, 3 puis 4 oiseaux en vol à St-Armel et 5 à Sarzeau.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) 4 données

2 à Reniac/Ambon (56) le 24 juillet, 2 ad. et 5 juv. à Mégrit (22) le 11 septembre, 3 à Reniac le 11 octobre et 2 à Surzur (56) le 31 octobre.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) 7 données

1 chanteur à le Clion-sur-Mer (44) le 17 juillet, 1 chanteur aux Sables d'Or (22) le 19 juillet, 1 chant au Haut-de-Trécelin/Flévenon (22) le 26 juillet, 2 chanteurs à Mogueriec/Sibiril (29N) le 30 juillet, 1 aux marais de Vue (44) le 31 juillet, 1 à Ker Yegu/Ouessant (29N) le 14 septembre et 2 à la Potine/Pancé (35) le 20 septembre.

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) 36 données

Les 8 premières observations de cette période peuvent concerner des nicheurs : 1 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) les 17 et 29 juillet, 1 au Curnic/Guissény (29N) le 30 juillet, 2 ad. et 2 juv. à Kerléguer/Le Guilvinec (29S) le 3 août, 2 ad. et 4 juv. à Loc'h Lehen/Treffiat (29S) le 4 août. Rien de notable ensuite.

MARQUETTE PONCTUEE (*Porsana porsana*) Une capture à Ouessant (29N) le 5 septembre.

MARQUETTE SP. (*Porsana sp.*) 3 données

1 à Kerogan/Quimper (29S), 1 au barrage d'Ouessant (29N) le 26 septembre et 1 à Mauves (44) le 3 octobre.

RALE DE GENETS (*Crex crex*) 5 données

1 chanteur le 19 juillet et 3 le 20 à l'île du Petit Carnet/Frossay (44), 1 au marais de vue (44) le 31 juillet, 1 à la Noë Blanche/Messac (35) le 12 septembre et 1 à Belle-île (56) le 15 octobre.


POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) 50 données

Les effectifs augmentent dans la seconde quinzaine de septembre sur les étangs du Léon (29N) : 90 à l'étang du Pont/Kerlouan le 21 septembre, 28 au Curnic/Guissény le 30 ... Maximum à l'étang du Pont le 1er novembre avec 175 ind.

FOULQUE (*Fulica atra*). 142 données

Comme chaque année le passage commence dès les premiers jours d'août sur les eaux douces : à l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 45 le 21 juillet, 54 le 26, 75 le 30 juillet, 80 le 3 août, 160 le 4 août ; au Yeun-Elez Botneur (29N), 120 le 5 août ; à Trévignon/Trégunc (29S), seulement (?) 30 le 21 juillet, 420 le 4 août, 450 à 500 le 7 août. Alors que les effectifs stagnent ou décroissent ensuite pour certains plans d'eau (étang du Pont...), passages et arrivées se poursuivent pour d'autres localités : au Yeun-Elez, 600 le 25 août ; à St-Renan (29N), 40 le 17 août, 165 le 10 septembre, 229 le 22 septembre ; à Trenvel/Tréogat (29S), 100 le 24 juillet, 300 le 21 août, 500 les 4 et 5 septembre, 600 les 11 et 18 septembre, un millier le 19 septembre ; au Cranic/Brec'h (56), 9 le 26 août, 20 le 13 septembre ; à St-Jean/Locoal-Mendon (56), 32 le 17 juillet, 300 le 24 septembre. C'est à cette époque que les premières Foulques apparaissent en mer : 150 dans le Golfe (56) le 10 septembre.

Mais il semble bien que, dans la majorité des cas, ces augmentations d'août et septembre n'aient été qu'un passage, les effectifs étant souvent plus réduits en octobre (St-Renan, étang du Pont, Trévignon, le Boulet/Feins (35), Yeun-Elez, Trenvel...). On enregistre cependant une nouvelle augmentation à St-Jean, avec 475 ind. le 11 octobre. A partir de la seconde quinzaine d'octobre les arrivées reprennent lentement, mais régulièrement en de nombreuses localités ; des Foulques apparaissent en mer : 50 à Kerogan/Quimper (29S) le 20, 7 au sillon du Len/Louannec (22). Dans le bassin oriental du Golfe, les effectifs montent par paliers de 150 le 10 septembre à 3900 le 9 novembre (voir histogramme) ; à la forte poussée de la dernière décade d'octobre en cette localité correspond l'arrivée des premiers hivernants à Kerogan et au Len.



HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) 125 données utilisées.

Dans quelques secteurs bien suivis, on peut suivre l'évolution des effectifs. C'est surtout dans la dernière décade de juillet que les grosses arrivées commencent : à Goulven (29N), 15 le 17 juillet, 25 le 19, 30 le 22, 80 le 23, 102 le 25, 90 le 26, 80 le 31 juillet et le 2 août, 75 le 5 août, 115 le 7... ; en baie de la Fresnaye (22), 32 le 29 juillet, 72 le 12 août, 280 le 14 août. Les chiffres gonflent dans la deuxième quinzaine d'août : 3000-4000 sur 5 km de côte en baie du Mont St-Michel (35) le 17, 150 le 24 à Goulven, 300 le 26 dans l'estuaire de la Penzé (29N), 150 le 29 à Trédrez (22), 1500 en baie d'Yffiniac (22) le 1er septembre. Il semble qu'il faille situer un premier maximum de passage à cette époque. Nouveaux apports dans la seconde quinzaine de septembre : 1000 le 17 et 2000 le 21 en baie d'Yffiniac, 162 le 17 en baie de l'Arguenon/St-Jacut (22), 300 le 23 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) (80 en ce lieu dans la première quinzaine de septembre).

En octobre, faute de données suivies, on ne peut faire la part des migrateurs et des premiers hivernants. On note : 194 au Croisic (44) le 1er, 125 à Pont-Mahé/Assérac (44) le 1er, 70 au Korrejou/Plouguerneau (29N) le 7, 110 à Penerf/Dangan (56) le 23, 100 au Guilvinec (29S) le 23, 280 à Port Groix/Surzur (56) le 24, 94 à Pentrez/St-Nic (29S) le 28, 2000 en baie de St-Brieuc (22) le 28, 200 au Croisic (44) le 29, 2000 à Cherrueix/baie du Mont St-Michel le 29. Début novembre, on ne note plus que 80 à Goulven, 50 en rivière de Pont-L'Abbé...

VANNEAU HUPPE (*Varellus vanellus*) 140 données utilisées.

Nicheurs toujours présents en Brière (44) à mi-juillet : 7 couples agressifs (sur 18 oiseaux présents) en Petite-Brière le 17 ; les 70 oiseaux observés le 18 à la Butte-aux-Pierres ne sont pas forcément des locaux. Déjà on observe des bandes loin des lieux de reproduction : 21 à Mauves-sur-Loire (44) le 20 juillet ; 35 le 23 et 54 le 27 sur la lande de Lanfains (22) ; 300 le 31 dans les marais de Vue (44) ; 60 le 6 août au Vioreau (44) ; 1 au vol au Cap Fréhel (22) le 7 ; 30 à Scrignac (29N) le 8, 25 à Pleurtuit (35) le 11, 500 le 18 sur les polders de la baie du Mont St-Michel (35), 15 le 18 à Lanhouarneau (29N)...

Il ne fait aucun doute que tous ces oiseaux ne sont pas des nicheurs bretons, et que des passages accompagnent la dispersion. On note encore 50 à Mauves du 12 au 16 septembre, des isolés sur Ouessant (29N) du 17 au 20, puis les passages sont plus marqués : 250 à Surzur (56) le 21 ; 100 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 23 ; 40 à Belle-Ile (56), 90 au Loc'h/Guidel (56), 30 à Plougourvest (29N), 250 à Bouin (44) le 24... 200 à Mazerolles/Sucé (44) le 27..., 70 à Noyal (56) et 60 à Ambon (56) le 30 ; 65 à Plougourvest et 100 à Mauves le 1er octobre ; 170 à Séné (56) le 5 octobre ; 40 à Bodilis (29N) le 7 ; 50 à Etel (56) le 9 ; 100 à Reniac/Ambon et 75 à Bétahon/Ambon le 11 ; 100 au Vioreau le 12.

De nouvelles arrivées semblent se produire en fin octobre : 130 à Mazerolles le 18 ; 200 le 21, 300 le 31 au Vioreau ; 500 dans les polders du Mont St-Michel les 21, 29 et 30 octobre ; 200 à Bétahon le 23... 200 à St-Colombier/Sarzeau (56) le 25... 85 à Loudéac (22) le 31 ; 120 en rivière de Pont-l'Abbé le 1er novembre ; 70 à Plougourvest le 1er novembre ; 300 au Ludré/St-Arnel (56) le 9 novembre.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) 52 données

Cinq observations dans la deuxième décade d'août : 10 sur les polders de la baie du Mont St-Michel (35) le 18, 2 au Curnic/Guissény (29N) le 22, 1 à Goulven (29N) et 15 à Lampaul-Ploudalmézeau (29N) le 26.

Très peu dans la première quinzaine de septembre, et presque uniquement dans la Finistère : 1 à Kerlouan le 1er, 7 en Penzé le 3, 2 à Quessant les 5 et 6, 7 à Tréguennec le 6, 4 à Belle-Ile (56) le 7, 5 à la Mer Blanche/Fouesnant le 9.

Le passage est nettement plus marqué dans la deuxième quinzaine de septembre : à Quessant, migration nocturne le 16, 30 les 16 et 17, passage nocturne le 19, 12 le 29 ; à St-Jacut (22), 27 le 21 ; au Kernenic/Plounévez-Lochrist (29N), 300 le 23 ; à Lampaul-Ploudalmézeau (29N), 90 le 27.

En octobre, à côté de groupes insignifiants sur le littoral du Finistère et du Morbihan, on note : 20 à Séné (56) le 6, 28 en baie de la Fresnaye (22) et 21 à Quessant le 14, 100 le 21 et 182 le 30 sur les polders de la baie du Mont St-Michel, 40 en Penzé le 26. C'est à cette époque que des isolés sont notés dans l'intérieur : Vioreau (44) les 21 et 31, Mazerolles/Sucé (44) le 15.

Pas de données pour la première quinzaine de novembre.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squarrola*) 118 données

22 données avant la mi-septembre, 20 d'entre elles provenant de Goulven (29N) entre le 15 juillet et le 25 août, les deux autres concernant un isolé à St-Jacut (22) les 26 août et 1er septembre. A Goulven, 1 jusqu'au 23 juillet, 3 les 24 et 25, 6 les 27 et 30, 1 début-août, 5 le 5, 2 le 7, 4 le 19, 6 le 21, 8 le 22, 17 le 25 août. Les oiseaux de juillet et début août font figure d'estivants, alors qu'une petite arrivée se produit dans la dernière décade (voir les deux données de St-Jacut).

Mais ailleurs, les premiers n'apparaissent qu'après le 15 septembre : 1 au Cap Coz/Fouesnant (29S) le 16, 7 en Mer Blanche/Fouesnant le 17, 2 aux Sables-d'Or/Pléhérel (22) le 19... L'essentiel du passage a lieu du 20 septembre à fin octobre, mais il est impossible de dégager les maxima faute de données suivies : 150 le 22 septembre dans l'étier de Surzur (56), 80 le 23 en rivière de Pont-l'Abbé (29S), 25 le 25 dans l'anse du Po/Plouharnel (56), 50 dans la partie orientale du Golfe (56) et 20 en Mer Blanche le 31, 20 en ce dernier lieu les 2 et 15 octobre,

20 à Brouël/Séné (56) le 6, 26 à Plouharnel le 9, 20 à Reniac/Ambon (56) le 10, 80 en Mer Blanche le 22, 40 à Port-Groix/Surzur le 24, 50 à Cherruëix (35) le 31, 50 à Goulven le 1er novembre, 30 en Mer Blanche le 1er, 100 dans l'est du Golfe et 30 en Mer Blanche le 11.

Quatre observations dans l'intérieur : 2 à Mauves-sur-Loire (44) le 23 septembre, 1 au Boulet/Feins (35) le 16 octobre, 2 le 21 et 1 le 31 octobre au Vioreau (44).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) 215 données

L'essentiel du passage a lieu de fin juillet à fin septembre, avec le maximum habituel en août. On peut cependant noter que l'analyse des données est rendue très difficile par l'irrégularité de leur répartition dans le temps, les mois de juillet et août fournissant presque toutes les observations léonardes alors que les chiffres manquent totalement pour ce secteur par la suite.

La première vague va de juillet à début septembre avec plusieurs maxima : petit pic à Goulven (29N) du 22 au 26 juillet, noté aussi à Gâvres (56) (100 le 24, puis 50 les 25 et 26) ; on note aussi 50 au Kernic/Plouescat (29N) le 25. Nouveau pic plus marqué du 28 juillet au 6 août : maximum de 150 à Goulven le 5 août, de 100 au Curnic/Guissény les 28 juillet et 3 août, de 30 au Cap Coz/la Forest-Fouesnant (29S) le 31 juillet. Le passage est partout fort en août : 95 à St-Fiacre/Crozon (29S) le 14, 70 à Lancieux (35) le 11. Un nouveau maximum, le plus marqué, se produit dans la dernière décade d'août : 370 le 22, 200 le 24 à Goulven, 200 le 26 à Lampaul-Ploudalmézeau, 40 au Cap Coz les 26 et 27, 85 en baie de la Fresnaye (22) le 26, 50 à St-Jacut (22) le 27. On peut déplorer l'absence de données pour le sud de la Bretagne à cette époque. Aucune donnée dans l'intérieur au mois d'août ; par contre alors que le passage reste fort en septembre, l'intérieur fournit sept observations : 3 le 2 au Vioreau (44), 3 le 10, 1 les 13 et 14 ; 10 les 16 et 17 à Mauves-sur-Loire (44), 5 le 25 à l'étang du Boulet/Feins (35). On note aussi : 40 le 6 à Hoedic (56), 50 le 3 à St-Jacut (22), 310 le 9 à Gâvres (56), 70 le 14 à Kerjean/Tréhabu (29N), 40 le 15 au Cap Coz, 100 le 17 à Bon-Abrî/Hillion (22), 120 le 22 à la Mer Blanche/Fouesnant (29S). Un petit pic possible en fin septembre : 30 le 24 à St-Nazaire (44), 250 le 24 à Bon-Abrî. En octobre, encore quelques belles bandes : 50 au Guillec/Sibiril (29N) le 1er, 50 à Kervoyal/Dangan (56) le 1er, 45 à le Tour-du-Parc (56) le 4, 60 au Conquet (29N) le 5, 40 à Trez Rous/Canaret (29S) et 150 à la Mer Blanche (29S) le 22. Trois observations dans l'intérieur confirment le passage : 2 à Mauves le 1er, 3 au Vioreau le 12 et 1 à Oudon (44) le 15.

Le passage se poursuit dans les premiers jours de novembre : 100 à la Mer Blanche (29S) et 75 au Sillon du Len/Louannec (22) le 1er (55 en ce lieu le lendemain). Encore 205 au Curnic le 7 ; mais il semble ne rester que des hivernants : 30 à Roscanvel (29S), 56 en rivièrre du Faou (29N), 45 à Landevennec (29S) le 11.



Poussin de Gravelot à Collier Interrompu
Baie de Goulven

Cliché Gilbert DECROIX

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) 18 données

Une seule observation peut concerner des migrateurs : 2 au Vioreau (44) le 6 septembre.

Les autres se rapportent à des oiseaux sur leurs lieux de reproduction : 2 couples alarmant le 17 juillet à St-Jean/Mendon (56) ; 3 adultes alarmant et un nid contient 4 oeufs le 20 sur l'île du Petit Carnet/Frossay (44) ; un couple alarme à Trenvel/Tréogat (29S) le 9 août...

Derniers le 28 août à St-Renan (29N), le 30 août à Mauves-sur-Loire (44) (10 ind.), le 10 septembre à Guérande (44), le 30 septembre à Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys (56), le 9 octobre à Trenvel/Tréogat (29S) (5 ind.) et le 15 octobre à Oudon (44).

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) 75 données

Poussins à Gâvres (56) le 16 juillet, 1 ♀ avec 1 juvénile le 25 août à Cléder (29N).

Le plus gros du passage a lieu de fin juillet à fin août, mais il n'est pas toujours facile à discerner, les oiseaux stationnant généralement sur les lieux de reproduction et s'y mêlant aux nicheurs. A Goulven (29N) on peut distinguer deux vagues, l'une en fin-juillet et début-août, l'autre en fin août : 53 le 16 juillet, 70 le 22, 140 le 27, 200 le 28, 140 le 30, 160 le 31, 150 les 2 et 3 août ; puis 280 le 19 août, 200 le 20 et 180 le 25. On note aussi 20 à l'Aber/Roscoff (29N) le 25 juillet, 100 au Curnic/Guissény (29N) le 28, 20 au Cap Cox/Pouesnant (29S) le 30... 1 en baie de la Fresnaye (22) le 12 août, 3 à St-Fiacre/Crozon (29S) le 18. Jusqu'à fin septembre, les observations restent nombreuses, mais les effectifs ont beaucoup diminué : 16 le 6 à Hoedic (56), 40 en Mer Blanche/Pouesnant le 22, 12 à Plouharnel (56) le 25... On peut aussi noter 2 dans l'anse de Kerogan/Quimper le 20 et 1 à Mauves-sur-Loire (44) le 16.

Ensuite, 4 le 1er octobre à l'embouchure du Guillec/Sibiril (29N), 6 les 9 et 23 octobre à Trenvel/Tréogat (29S), 6 dans l'aber du Conquet (29N) le 15 octobre, 11 en baie de Guissény et 1 à Goulven le 1er novembre.

PLUVIER GUIGNARD (*Eudromias morinellus*) 1 au Cap Fréhel (22) du 20 au 27 août, 1 à Belle-Ile (56) le 29 août, 1 ad. et 1 juv. à Ouessant (29N) le 6 septembre, 15 à Trenvel/Tréogat (29S) le 18 septembre.

TOURNEPIERRE (*Arenaria interpres*) 125 données

Premiers à Goulven (29N) : 4 le 16 juillet, 3 le 17, 10 les 20 et 21. Puis 1 au Croisic (44) le 21, 1 aux Sept-Iles/Perros-Guirec (22) le 23. Les arrivées importantes commencent le 24 juillet : 20 à Goulven, 50 dans l'estuaire de la Penzé (29N). Passage bien marqué en août : 40 à Penmarc'h (29S) le 4, 20 au sillon

du Len/Louannec (22) le 6, 30 au Kongell/Quiberon (56) le 9 et le 27
35 à Locquirec (29N) le 20. Plusieurs localités montrent des maxima
en septembre : 20 le 2 au Cap Coz/Fouesnant (29S), 45 le 3 à Dumet
(44), 55 le 8 à Melon/Porspoder (29N), 80 le 10 au Len/Louannec (22),
30 le 10 à Locmariaquer (56), 50 le 18 à Moustierlin/Fouesnant, 50 le
22 à la Mer Blanche/Fouesnant, 30 le 23 au Kongell.

Reprise sensible dans la dernière décade d'octobre et début-novembre : 80 à la Mer Blanche le 20, 25 au Cap Coz le 24, 30 à Bétahon/Dangan (56) le 31 octobre, 30 le 1er et 70 le 3 au Len, 26 le 11 à Roscanvel (29S).

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) 173 données

En juillet-août, les groupes observés sont faibles, atteignant rarement la dizaine : 10 le 6 août au Vioreau (44), 12 en vol le 12 août à Lancieux (22) (6 autres groupes supérieurs à 5 oiseaux).

Début septembre, les effectifs grossissent localement : 40 à Congor (44) le 3 (contre 6 le 27 août), 20 à Dolan/Séné (56) le 8, 50 en un point des marais de Guérande (44) le 10. Dans la deuxième quinzaine du mois, les arrivées sont plus sensibles : 12 à St Renan (29N) le 20, 40 à Dolan le 22, 10 au Curnic/Guissény (29N) le 24, 32 à Noyal (56) le 29, 25 au Duer/Sarzeau (56), 30 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) le 30 (et 6 groupes de plus de 10 oiseaux). L'augmentation est plus nette encore en octobre et début novembre : 50 le 1er octobre au Curnic (maximum en ce lieu), 100-120 dans l'étier de Noyal (56) le 4, 26 tuées (dont 1 porteuse d'une bague finlandaise) à St-Renan le 8, 30 le 12 et 85 le 31 au Vioreau, 55 le 17 octobre et 180 le 4 novembre au Boulet/Feins (35), 30 le 1er novembre à Kerhoant/St-Pol-de-Léon (29N).

BECASSINE SOURDE (*Limocryptes minimus*) 13 données

Les premières observations sont faites à Ouessant (29N) dans la deuxième quinzaine de septembre : 2 les 16 et 19, 1 les 21 et 28. Puis on note successivement : 3 au Curnic/Guissény (29N) le 7 octobre, 3 tuées à St-Renan (29N) le 8, 1 à l'étang du Band/Henvic (29N) à partir du 15, 1 en vol vers l'est à la pointe du Kongell/Quiberon (56) et 1 à Belle-Ile (56) le 21, 1 à le Vivier-sur-Mer (35) le 31, 1 au Sillon du Len/Louannec (22) le 1er novembre, et plusieurs au Loc'h/Guidel (56) le 8 novembre.

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) Une observation précoce : 3 le 15 septembre au bois de Molac (56).

Après une observation à Dinan (22) le 1er octobre, le passage est nettement senti dans la deuxième semaine du mois : 1 à St-Renan (29N) le 7, 1 à Trévignon/Trégunc (29S) et 1 à St-Sauveur (29N) le 8, arrivées nocturnes à Ouessant (29N) le 14, premières tuées à Belle-Ile

(56) le 15. Un chasseur de Landerneau (29N) en capture 7 du 15 au 30 octobre, deux autres 15 du 15 octobre au 11 novembre. Les autres données sont de fin octobre et de la première quinzaine de novembre : isolées à Loc-Brévalaire (29N) le 28 octobre, à Duault(22) le 1er novembre, Belle-Ile (56) et St-Brandan (22) le 4, 8 à Bourbriac (22) le 8, 4 en forêt de Lorges (22) le 12, 1 à Goulien (29S) le 14.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 100 données

Le passage a surtout lieu de juillet à mi-octobre, les différentes vagues étant difficiles à dégager.

On note déjà 115 en Penzé (29N) le 17 et 80 à Ambon (56) le 18 juillet, puis un premier maximum fin juillet et début août : 220 le 24 juillet à Ambon, 180 le 29 et 130 le 2 août en baie de la Fresnaye (22), 85 à Goulven (29N) le 5 août, 200 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 2.

De mi-août à mi-septembre, on note : 500-700 sur 5 km en baie du Mont St-Michel (35) le 16 août, 350 à Gâvres (56) le 24 août, 200 à Gâvres (56) le 9 septembre, 120 le 7 et 150 le 11 septembre en rivière de Pont-l'Abbé.

Nouvelle vague dans la deuxième quinzaine de septembre et début octobre : 3-400 le 19 et 250 le 23 septembre en rivière de Pont-l'Abbé, 285 le 21 en baie d'Yffiniac (22), 400 le 22 dans l'étier de Surzur (56).. 200 à Noyal (56) le 30, 200 à Brouël/Séné (56) le 3 octobre, 250 en rivière d'Étel (56) le 5, 350 à Séné le 6...

Aucun passage n'est ensuite discernable : 60 en rivière de Pont-l'Abbé le 24 octobre, 200 en baie de St-Brieuc le 28, 125 à Gâvres le 1er novembre, 120 à Kerstang/Séné le 14.

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) 103 données.

Le passage a surtout lieu de mi-juillet à fin septembre, avec l'habituel maximum de fin juillet et début août.

Dans la deuxième quinzaine de juillet, les arrivages importants commencent : 17 à Bailleron (56) le 17, 15 à Goulven (29N) le 21 (contre 5 les jours précédents). De petits groupes apparaissent ici et là jusqu'à Préfaillies (44) (3 le 22).

Maximum bien marqué du 27 juillet au 9 août : 34 le 27 et 50 le 29 à Goulven, 17 le 27 et 35 le 29 en baie de la Fresnaye (22), 150 au moins dans le Golfe du Morbihan le 3 août, nombreux à Penmarc'h (29S) le 4, 110 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 6, 300 dans le Golfe du Morbihan le 8.

Net ralentissement ensuite avec reprise en fin août : 30 à St-Jacut (22) le 23, 35 en baie de la Fresnaye le 26, 60 à St-Jacut le 27.

Les données restent assez nombreuses jusqu'à fin septembre, mais

ne concernent plus que de faibles bandes, à l'exception de : 35 à Plouhinec (56) le 14, 100 en rivière de Pont-l'Abbé le 23, 25 à Quessant le 28.

Le mois d'octobre ne fournit que 4 observations : isolés à Quessant et Penthièvre (56) le 15, mais 61 à Ambon (56) le 11 et 16 à St-Michel-en-Grève (22) le 25. Enfin, 4 à Audierne (29S) le 8 novembre.

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) 49 données

Quatre données seulement avant le 22 août ; en fin juillet, deux belles bandes dans le sud de la Bretagne : 28 à Reniac/Ambon (56) le 24 et 40 à Vue (44) le 31. Puis 5 à Trély/Ambon le 10 et 5 à l'île du Loc'h/Glénen (29S) le 12 août.

Le passage commence véritablement le 22 août, s'étalant ensuite sur septembre et la première moitié d'octobre essentiellement : 1 au Vougo et 5 au Curnic/Guissény (29N) le 22 août, puis 11 à Gâvres (56) et 8 au Curnic le 24, 1 à Goulven (29N) et 1 à St-Renan (29N) le 26, 2 à Congor (44) le 27... Au Curnic, on note un petit pic (12 oiseaux) le 3 septembre (8 à Erdeven -56- le même jour). Nouveau petit pic (12 oiseaux) au Curnic le 21 ; 7 à Plovan (29S) le 19. De 6 à 8 au Curnic jusqu'au 17 octobre, alors qu'ailleurs les groupes observés ne dépassent guère 2 ou 3 individus.

Les plus fortes bandes apparaissent après le 10 octobre dans le Morbihan uniquement, alors que le passage n'est plus noté ailleurs (Curnic excepté) : 58 à Reniac le 11, 11 à Port-Groix/Surzur le 24, 20 aux marais d'Ambon le 24, 20 à Pentès/Surzur le 7 novembre.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) 130 données

Du 16 juillet au 3 août, 12 observations (dont 9 de Goulven) sur les côtes nord de Bretagne : 5 le 16 juillet, 3 du 23 au 25, 2 les 26 et 27 juillet, 3 du 1 au 3 août à Goulven (29N) ; 2 le 23 et 7 le 30 juillet en Penzé (29N) ; 2 le 29 en baie de la Fresnaye (22).

Le passage commence dans la deuxième quinzaine d'août : 19 le 16 en Penzé, 30 le 18 à Cherruex (35), 15 le 19 à Goulven... 17 le 3 septembre à St-Jacut (22), 16 le 6 au Kongell/Quiberon (56) (en tout 14 données dont 7 de Goulven pour les trois semaines du 15 août au 7 septembre).

Après le 8 septembre, les données se multiplient, restant très nombreuses jusqu'à la première décade d'octobre. En tout 83 observations, soit près des 2/3 des données, du 8 septembre au 8 octobre. Maxima locaux : 47 le 17 septembre en baie d'Yffiniac (22) ; 195 le 11 septembre en Penzé ; 97 en vol vers le sud-est à Hoedic (56) le 11 septembre ; 23 le 11 septembre au Guilvinec (29S) ; 34 à Magouero/Plouhinec (56) le 14 septembre ; 35 le 18 à St-Jacut ; 80 le 22 à St-Armel (56) ; 150 le 22 dans l'étier de Surzur (56) ; 35 le 22 en Mer-Blanche/Fouesnant

(29S) ; 45 le 25 à Penthièvre (56). Après le 25 septembre, les chiffres diminuent, mais l'on note encore 50 à St-Armel le 30, 36 à Treduder (22) et 17 à Toull-an-Duc'h/Plougoulin (29N) le 1er octobre... 20 à Tréglo-nou (29N) le 4, 35 à Mergleux/Landéda (29N) le 7, 30 à Bon Abri/Hillion (22) le 8, 150 en Penzé le 10...

Les deux dernières décades d'octobre ne fournissent que 13 observations concernant de faibles bandes : 20 à Ambon (56) le 11, 15 à Landéda le 15, 12 à St-Jacut le 18, 30 à Truskat/Sarzeau (56) le 23. On note cependant une arrivée massive en baie de St-Brieuc (22) : 1000 le 28. Très peu en novembre : au moins 30 en Penzé le 1er, 40 à Pentès/Surzur (56) le 7.

Une observation dans l'intérieur : 1 à Dudon (44) le 9 septembre.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) 63 données

Une donnée isolée à mi-juillet :

17 le 17 à St-Jean/Loceol-Mendon (56).

Le passage commence le 20 août pour se terminer début-novembre : 12 à l'étang du Boulet/Feins (35) le 20 août, 1 à St-Renan (29N) le 21, 3 à Gâvres (56) le 24... 7 au Curnic/Guissény (29N) le 31, 12 à St-Jacut (22) au Boulet le 1er septembre... 5 au Vioreau (44) le 6... 18 en Penzé (29N) le 16, 17 à St-Jacut le 18... 7 au Curnic le 31 septembre, 10 à Brouël/Séné (56) le 3 octobre... 7 à Reniac/Ambon (56), 15 au Vioreau le 12... 1 seul en ce lieu le 21. De fortes bandes stationnent en quelques points du sud de la Bretagne dans la dernière décade d'octobre alors qu'ailleurs le passage est presque achevé : 107 le 22 à St-Jean, 30 le 23 à Penerf/Dangan (56), 6 le 31 à Reniac, 20 au Vioreau le 31, encore 16 en ce lieu le 1er novembre. Dernières données : 1 le 7 novembre à Pentès/Surzur (56) et 11 en rivièrre du Faou (29N).

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*) 1 au réservoir du Vioreau (44) les 31 octobre et 1er novembre.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) 155 données

(Étalé de juillet à fin octobre, le passage présente deux maxima bien distincts, l'un en fin juillet l'autre en fin août et début septembre ; une troisième vague dans la première quinzaine d'octobre ne touche que le Morbihan.

Jusqu'au 25 juillet, les seuls groupes sont observés à Goulven (29N) : 7 le 16, 9 le 17, 12 le 20, 9 le 22, 6 le 23, 7 le 24. Les autres données concernent des isolés sur le littoral du Morbihan et dans l'estuaire de la Loire (44).

Du 25 au 30 juillet, premier maximum : 4 à Roscoff (29N) le 25 ; à Goulven, 20 le 25, 25 le 26, 16 le 28, 15 le 30 ; 40 le 27 en rivièrre de Pont-l'Abbé (29S) ; 30 le 31 à Vue (44).

Jusqu'au 25 août, les groupes observés sont faibles : maxima de 12 le 1er août et 14 le 19 août à Goulven, 8 à Roc'h Du/Crac'h (56) le

4, 7 aux îles de Glenen (29S) le 12.

A partir du 25 août, nouveau maximum : 24 à Goulven le 25 ; à Congor/marais de Guérande (44), 25 le 26, 20 le 27 et 30 le 3 septembre ; 15 à Tariesc/Plouvien (29N) le 8 septembre. Noté en deux points de l'intérieur à cette époque : à Mauves-sur-Loire (44), 2 du 31 août au 6 septembre ; au Vioreau, 5 le 2 septembre.

Du 8 septembre au début d'octobre, les observations sont fréquentes, mais aucun groupe n'atteint 10 oiseaux : 8 le 19 en rivière de Pont-l'Abbé, 8 le 23 à Kerogan/Quimper (29S). Deux apparitions dans l'intérieur : 1 le 15 à St-Renan (29N) et 1 le 25 à l'étang du Boulet/Feins (35).

Du 3 au 11 octobre, maximum noté uniquement dans le Morbihan : 10 le 3 à Brouël/Séné, 38 le 5 à St-Jean/Locoal-Mendon, 28 au Plec/rivière d'Etel et 14 à Reniac/Ambon le 11. Ailleurs, on note 5 au Cap Coz/Fouesnant (29S) le 7 et 5 au Vioreau le 12.

Les observations se font moins fréquentes dans la deuxième quinzaine d'octobre (6 données) : 2 au Vioreau le 21, 4 à Port-Groix/Surzur (56) le 24, 12 à Kervégant/Quéven (56) le 25.

Quatre observations dans la première quinzaine de novembre : 9 à Goulven le 1er, 1 à Sarzeau (56) le 8, 2 à Lorient (56) le 11, 1 à Penzance/Sarzeau le 14.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) 99 données

(Le passage a surtout lieu de mi-juillet à fin septembre. 22 données proviennent de l'intérieur, 77 du littoral.

Deuxième quinzaine de juillet.- 20 données parmi lesquelles 3 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 17, 3 au Lic/Dangan (56) le 29, 7 à Trély/Ambon (56) le 31.

Première quinzaine d'août.- 18 données : 4 à Trély le 1er et le 10, 3 à Goulven (29N) le 4, 4 à Pont-l'Abbé (29S) les 6 et 11, 4 à Belle-Ile (56) le 8, 3 en ce lieu le 11, 4 à l'île du Loc'h/Glenen (29S) le 12.

Deuxième quinzaine d'août.- 14 données : 4 à Belle-Ile (56) le 24, 6-7 en ce lieu le 30, 3 à St-Renan (29N) le 30.

Première quinzaine de septembre.- 20 données (dont 10 de Belle-Ile) : 3 à Congor/Guérande le 3, 3 à Mauves-sur-Loire (44) le 3, 3 à Belle-Ile les 4 et 5, 17 en Penzé (29N) le 4, 3 à Séné (56) le 8, 3 à Pont-l'Abbé le 11.

Deuxième quinzaine de septembre.- 21 données (dont 8 de Belle-Ile) : isolés ou groupes de 2.

Après le 20 septembre, les observations s'espacent : on note encore 8 à Trévignon/Trégunc (29S) le 2 octobre, 1 à Kerogan/Quimper (29S) le 9, puis cinq observations espacées dans l'intérieur : 1 à

Mazerolles/Sucé (44) et 1 à Oudon (44) le 15, 1 le 21 et 1 le 31 octobre au Vioreau (44), 1 le 4 novembre au Boulet/Feins (35).

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) 27 données

Une observation à mi juillet : 1 le

16 en Brière (44).

Le passage, faible, est noté de 30 juillet au 11 septembre.

Le Finistère fournit 16 observations du 30 juillet au 25 août, le maximum se situant en fin juillet et début août dans le Léon (11 le 30 juillet, 5 les 1er et 8 août au Curnic/Guissény ; 2 le 31 juillet à St-Renan). La seule bande importante (20 oiseaux) est observée le 12 août sur l'île du Loc'h/Glenen (29S). La seule donnée des Côtes-du-Nord est aussi du 12 août : 1 à St-Jacut.

Dans le sud de la Bretagne (Morbihan et Loire-Atlantique), les observations sont plus tardives et ne concernent que peu d'oiseaux : isolés à Belle-Ile entre le 8 août et le 11 septembre, à Guérande les 26 août et 3 septembre, 3 au Vioreau le 2 septembre et 5 à Mauves-sur-Loire le 3 septembre.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) 260 données

Le passage est fort de juillet à mi septembre surtout, faiblissant très sensiblement dans la dernière semaine du mois. La situation est examinée quinzaine par quinzaine (231 données utilisées).

2ème quinzaine de juillet.- 53 données : 26 au Frémur (22) et 14 en Penzé (29N) le 16, 10 à Lechiagat (29S) le 25, 15 à Trély/Ambon (56) le 24, 11 en ce lieu le 31. En tout, 16 observations de plus de 5 oiseaux.

1ère quinzaine d'août.- 35 données : 10 à Loc'h Nizeleg/Flovan (29S) et 20 à Kerjean/Trébabu (29N) le 2, 12 à Mauves-sur-Loire (44) le 5, 13 au Vioreau (44) le 6, 15 à Lancieux (22) le 7, 15 à Bailleron (56) et 12 à Kerjean/Trébabu le 8. En tout, 16 observations de plus de 5 oiseaux.

2ème quinzaine d'août.- 45 données : 13 à Lervily/Audierne (29S) le 18, 12 à la Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 19, 11 au Frémur le 23, 20 à Gâvres (56) le 24, 15 à Guérande (44) et 12 à Kerjean/Trébabu (29N) le 25, 10 à Goulven le 26, 20 au Kongell/Quiberon (56) le 27, 50 en Penzé (29N) et 12 à Mauves-sur-Loire (44) le 29. En tout, 20 observations de plus de 5 oiseaux.

1ère quinzaine de septembre.- 40 données : 15 à Kerogan/Quimper (29S) les 1, 7 et 8, 10 en ce lieu les 11 et 12, 30-40 à Guérande le 3, 39 à Hoedic (56) le 6, 10 à Dolan/Séné (56) le 8. En tout, 20 observations de plus de 5 oiseaux.

2ème quinzaine de septembre.- 40 données : 15 à l'île Chevalier/Pont-l'Abbé (29S) le 23. En tout, 3 observa-

tions de plus de 5 oiseaux.

1ère quinzaine d'octobre.- 10 données : aucun groupe n'atteint 5 oiseaux ;
4 au Croisic (44) le 1er, 3 à Belle-Ile (56) le
le 2, puis des isolés à Kerogan/Quimper, à Noyal (56) et au Curnic/
Guissény (29N).

2ème quinzaine d'octobre.- 4 données : 2 à Mauves-sur-Loire le 17, 1 au
Vioreau le 21, 1 au Cap Coz/Fouesnant (29S)
le 24 et 2 à Kervégant/Quéven (56) le 25.

1ère quinzaine de novembre.- 4 données : 2 au Cap Coz les 5 et 12, 1 à
St-Suliac (35) le 12, 1 à Benance/Sarzeau
(56) le 12.

BECASSEAU MAUBECHE (*Calidris canutus*) 95 données

2 le 16 juillet à Goulven (29N),
puis une petite série d'observations en fin juillet et début août : 1
les 22 et 29 juillet au Cap Coz/Fouesnant (29S), 8 le 26, 5 le 27, 3 le
28, 4 le 29, 5 le 31 à Goulven, 1 le 28 au Curnic/Guissény (29N), 2 le
2 août à Loc'h Nizeleg/Plovan (29S). Mais le véritable passage ne
commence qu'à la fin août (une seule observation avant le 24 : 1 le 19
à Fouesnant). Ce passage reste fort en septembre pour s'éteindre peu
avant mi octobre. Limites du gros passage : 24 août-25 septembre.

En fin août, 20 le 25 en baie de la Fresnaye (22), 20 le 27 à
St-Jacut (22), 7 le 27 au Kergell/Quiberon (56). Les maxima sont notés
en septembre : du 12 au 23 dans le Léon avec 35 à Goulven le 12, 13 au
Conquet le 15, 30 à Ouessant le 17, 40 au Kernic/Plouescat le 23 ; deux
pics à Fouesnant (29S) avec 45 le 9 à la Mer-Blanche et 10 le 10 au Cap
Coz, puis 40 le 22 à la Mer-Blanche ; autres maxima du sud-Finistère :
23 le 1er septembre en baie de Kerogan/Quimper, 22 le 14 à Audierne,
20 le 19 à Pont-l'Abbé ; dans les Côtes-du-Nord, maximum de 150 le 3
à St-Jacut (puis 54 le 17 et 80 le 18), 256 le 1er, 450 le 9, 300 le
21 puis 86 le 24 en baie d'Yffiniac ; en Loire-Atlantique, 40 le 3 et
23 le 10 à Congor/Guérande, 300 le 24 à L'Epoids ; peu de données nor-
bihannaises.

Ensuite, on note encore 60 à Noyal (56) le 30 septembre, 10 à
Fouesnant le 2 octobre, 30 à Séné (56) le 6, 11 à la Forest-Fouesnant
(29S) le 9, 50 à Reniac/Amboin (56) le 11.

Après un isolé le 14 octobre en baie de la Fresnaye (22), rien
avant novembre. Mis à part les isolés notés le 1er au Len/Louannec (22)
et au Curnic/Guissény (29N), les oiseaux observés sont des hivernants :
33 à Gâvres le 1er, 600 en baie de St-Brieuc (22) le 7, 70 en Penzé
(29N) le 12.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 80 données

Passage du 12 août (1 aux Glenen
-29S-) au 1er novembre (Curnic/Guissény -29N- et Vioreau -44-).

Les deux premières données concernent un isolé à l'île du Loc'h/Glenen les 12 et 16 août. Mais le passage ne commence véritablement que dans la dernière semaine d'août : 1 au Curnic le 24, 2 au Conquet (29N) le 25, 3 à Congor/Guérande (44) et 1 en baie de la Fresnaye (22) le 26...

(Le plus gros du passage a lieu en septembre (54 données), avec un pic dans la première décade : à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) plusieurs dizaines le 10, 14 le 20, 21 le 27 ; à Ouessant (29N), 13 le 4 ; à Melon/Porspoder (29N), 12 le 8 ; au Conquet, 7 le 15 ; à Lampaul-Ploudal-mézeau (29N), 6 le 27 ; en baie de Kerogan/Quimper (29S), 17 le 4, 15 les 7 et 8, 10 les 11 et 12, 9 le 13... 8 à Penhors/Pouldreuzic (29S) et 9 à Plovan (29S) le 19 ; en Loire-Atlantique, 10 le 3 et 17 le 10 à Congor ; dans le Morbihan, 5 le 6 et 11 le 8 à Hoedic ; dans les Côtes-du-Nord, 6 le 2 et 11 le 3 à St-Jacut.

Dans la première semaine d'octobre, les observations restent fréquentes (9 données) : 7 au Curnic le 1er, 10 à Trévignon/Trégunc (29S) le 2, 4 à le Tour-du-Parc (56) le 4, 6 à Séné (56) le 6, 4 au Curnic le 7.

On note encore 20 à Gâvres (56), 3 à l'étang du Pont et 5 à Oudon (44) le 15 octobre, puis 1 au Vioreau (44) le 21. Un petit passage se produit encore fin octobre et début novembre, en particulier au Vioreau : 10 le 31 octobre, 17 le 1er novembre ; 6 au Curnic le 1er novembre.

Les cinq données de Bretagne intérieure sont tardives : 29 septembre au Boulet/Feins (35), 15 octobre à Oudon (44), 21 le 31 octobre puis 1er novembre au Vioreau (44).

BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*) 1 à Goulven (29N) le 25 août, 1 au Vioreau (44) le 2 septembre, 1 à Belle-Ile (56) du 5 au 10 septembre.

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) 1 le 24 septembre dans l'anse de Bon Abri/Hillion (22) ; 5 en baie de Morlaix (29N) le 5 novembre.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) 202 données
A mi juillet, on note 100 à Goulven (29N) le 15 et 100 au Curnic/Guissény (29N) le 18.

Une première vague importante est observée dans le Léon (29N) du 21 juillet au 8 août avec deux pics distincts : à Goulven, 430 le 21, 410 le 24, 350 le 26, puis 450 le 2 août, 520 le 5, 450 le 6 ; au Curnic, 300 le 28 juillet, 390 le 1er août ; on note par ailleurs 400 en Penzé le 22 juillet, 600 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 4 août, 250 à Plouescat (29N) le 8 août.

Par la suite, aucun secteur n'est bien suivi et l'on ne peut que relever quelques chiffres jusqu'à mi octobre : 250 au Curnic le 3 septembre, 1000 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 23 ; 3-4000 à Since/Noyal (56) le 27, 420 à Séné (56) le 6 octobre, 600 à Plouharnel le

7, 260 à St-Jacut (22) le 17. On peut relever quelques apparitions, parfois en bon nombre, dans l'intérieur en septembre-octobre : 1 le 6 septembre, 4 le 21, 3 le 30 septembre, 50 le 12 octobre, 2 le 21 au Vioreau (44) ; 3 le 25 septembre à l'étang du Boulet/Feins (35).

A partir de la mi octobre, de grosses arrivées se produisent sur les lieux d'hivernage : dans le Golfe du Morbihan, 1500-2000 le 18 au passage/St-Armel, 2000 le 19 dans le bassin oriental, 6000 le 23 en cet endroit, puis 7000 le 25, 9000 les 3, 8 et 9 novembre ; à St-Jacut, 400 le 22 octobre, 600 le 8 novembre, plus de 1000 le 12 ; à la Mer-Blanche/Pouesnant (29S), 800 le 22 octobre, 500 le 1er novembre ; au Len/Louannec (22), 134 le 1er novembre, 250 le 3 ; 350 le 11 en rivière du Faou (29N) ; 500 à Gâvres (56) le 12 novembre.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) 49 données

(Du 26 juillet (Goulven -29N-) au 12 octobre (Vioreau -44-).

Des 11 données enregistrées du 26 juillet au 24 août, 9 proviennent du Léon (29N), les deux autres de Gâvres (56) le 26 juillet (2 ind.) et des Îles de Glenen (29S) le 1er août (1 ind.) ; dans le Léon, maximum de 5 le 27 juillet à Goulven, de 3 le 28 au Curnic/Guissény.

L'essentiel du passage se déroule du 24 août à début octobre, mais les maxima locaux sont faibles ; 9 le 24 août, 40 le 8 septembre au Curnic ; 7 le 26 août, 10 le 3 septembre, 22 le 10 septembre à Congor/marais de Guérande (44) ; 12 le 3 septembre à St-Jacut (22), 11 le 15 septembre à Kerjean/Tréhabu (29N), 7 le 21 septembre à Kerogan/Quimper (29S).

Alors que le Morbihan n'a fourni que trois observations d'isolés en septembre, de fortes bandes y apparaissent dans les premiers jours d'octobre : 70 le 1er à Penerf/Dangan, 60 le 4 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc. Rien de semblable ailleurs : 2 dans l'embouchure du Guillec/Sibiril (29N) le 1er, 1 au Curnic le 7.

Deux observations dans l'intérieur : 4 le 6 septembre et 1 le 12 octobre au Vioreau (44).

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) 86 données

30 de ces données proviennent de Goulven (29N) en juillet-août.

Un net maximum se dégage entre le 25 juillet et le 8 août sur la côte léonarde (29N) : à Goulven, de quelques oiseaux le 16 juillet, on passe progressivement à 30 le 19, 50 le 29, 75 le 22, puis 150 le 25, 100 le 27 ; puis nouveau pic début août : 120 le 2, 220 les 3 et 4, 380 le 5, 180 le 6, 105 le 7. On note aussi 65 à Roscoff (29N) le 25, 200 au Kernic/Plouescat le 25, 300 au Curnic/Guissény le 28, 150 à Plouescat le 8.

Par la suite, les données, bien que nombreuses, ne sont plus utilisables. On note qu'en fin août de belles bandes séjournent dans le Léon : à Goulven, 105 le 19, 90 le 22, 150 le 25, 90 le 26 ; à Lampaul-

Ploudalmézeau, 50 le 26. Pas de chiffres sur les secteurs importants en septembre, les groupes observés étant très faibles à l'exception de : 60 à Beg an Dorchenn/Plomeur (29S) le 18, 45 à la Mer-Blanche le 11 octobre, 50 en ce lieu le 22 octobre, 40 à Pentrez/St-Nic (29S) le 27 octobre, 60 au Curnic le 1er novembre, 20 à Beg an Dorchenn le 6.

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) 36 données

Comme d'habitude, le passage postnuptial est très faible en Bretagne. La plupart des observations se rapporte à des isolés, la plus forte bande ne dépassant pas la dizaine.

Une observation à mi juillet dans le Morbihan : 1 le 17 à St-Jean/Locoal-Mendon.

Quatre observations début août dans le Finistère : 1 au Vougo/Guissény (29N) le 1er, 5 à Loc'h Nizeleg/Plovan (29S) le 2, 1 à Treffiagat (29S) le 4, 2 à Loc'h Nizeleg le 9.

Le passage se déroule pour l'essentiel de la fin août à la première semaine d'octobre, 21 données étant groupées entre le 18 septembre et le 7 octobre : 1 à Guissény les 24 et 28 août, 1 à Mauves-sur-Loire (44) le 31, 1 à St-Jacut (22) le 1er septembre, 10 au Vioreau (44) le 2, 4 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 10, 4 à St-Jacut le 18, 8 à Poulguidou/Plouhinec (29S) le 19, 4 à l'étang du Pont le 27, 4 au Curnic/Guissény le 30, 5 en ce lieu le 1er octobre.

Enfin, deux observations plus tardives : 10-15 dans les polders de la baie du Mont-St-Michel (35) le 21 octobre et 1 à Bailleron/Séné (56) le 8 novembre.

On peut noter que trois données seulement viennent de Bretagne intérieure : Vioreau (44) et Mauves-sur-Loire.

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) La présence de 2 échasses le 20 juillet en Petite Mer de Gâvres (56), précédée par l'observation d'1 ind. en ce lieu depuis le 13 juillet peut faire penser à une nidification dans un secteur proche.

1 ad. le 27 août dans le Marais Breton (44).

Deux observations automnales : 5 le 5 septembre dans les marais de Guérande (44), 1 juv. le 4 novembre dans l'anse de Bon Abri/Hillion (22).

AVOCETTE (*Recurvirostra avocetta*) 1 au Curnic/Guissény (29N) les 28 juillet et 3 août ; 13 à Saillé (44) le 27 août ; 1 en Penzé (29N) et 1 à Noyalo (56) le 13 octobre ; 7 en vol vers l'ouest à Mauves-sur-Loire (44) le 22 octobre.

OEDICNE (*Burhinus oedicanus*) 10 le 9 octobre dans les dunes de Plouharnel (56).

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) 11 données

1 le 21 juillet au large de l'île de Batz (29N), 2 le 22 juillet devant le Croisic (44), 1 le 5 août dans le chenal des Moutons/Concarneau (29S), 1 le 8 août par 47°34N-08°40W, 1 vers l'ouest le 21 août devant le Cap Fréhel (22), 1 le 29 août au Fret/Crozon (29S) ; au large de l'île de Batz, 3 en 7h le 10 septembre, 3 en 4h le 11 septembre, 7 en 7h le 14 et 1 en 7h le 15 ; 1 à Kadoran/Ouessant (29N) le 18 septembre.

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) Une seule observation certaine :
2 en vol vers le sud le 9 septembre au Croisic (44).

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) 12 données

Au Cap Fréhel (22), 1 imm. le 11 août, 4 dont 2 ad. le 18, 2 ad. le 21, 3 dont 2 ad. le 24, 1 ad. le 26 août, 1 le 7 septembre (tous ces oiseaux passent vers l'ouest). Par ailleurs, 2 à Hoedic (56) et 2 au Croisic (44) le 9 septembre, 1 imm. à la pointe des Guets/Hillion (22) le 10 septembre. En 28 heures d'observation au large de l'île de Batz (29N) du 5 au 15 septembre, 89 oiseaux de cette espèce furent observés passant vers l'ouest, 35 en phase claire (24 adultes) et 46 en phase sombre (dont au moins 14 adultes) ; presque tous ont été notés avant midi, les nombres observés décroissant rapidement dans l'après-midi. Enfin 1 à 80 milles au large d'Ar Men/Sein (29S) le 26 octobre.

LABBE SP. (*Stercorarius sp.*) 12 données

Il s'agit dans tous les cas de petits labbes, probablement *S. parasiticus* pour la plupart. 1 le 22 juillet au Croisic (44), 1 le 28 août au Stiff/Ouessant (29N), 1 le 6 septembre à Hoedic (56), 4 vers le sud le 9 septembre au Croisic, 14 passent devant Kadoran/Ouessant le 17 septembre entre 14h et 17h, 2 vers l'ouest le 18 et 1 le 19 au même endroit, 1 le 20 entre Ouessant et le Conquet, 1 le 29 à Kadoran, 2 le 30 entre Molène et le Conquet (29N), 1 le 1er, 1 le 16 et 2 le 17 devant le Croisic.

GOELAND BOURGEMESTRE (*Larus hyperboreus*) Une observation le 1er octobre à la pointe de Kervoyal/Dangan (56) semble concerner 1 adulte de cette espèce. Taille et coloration ont été notées par comparaison avec des Goélands argentés.

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) 33 données

Trop peu de données. En juillet et août, les chiffres sont très faibles, quelques groupes étant notés ici et là sur les côtes : 10 le 17 juillet et le 1er août, 20 le 3 août à Bailleron/Séné (56), 7 au Curnic/Guissény (29N) le 22 août.

Les effectifs augmentent à partir de la dernière décade de septembre : 11 le 21 à Yffiniac (22), 20 le 25 à Bailleron, 40 le 30 à

Penvins (56), 60 dans les dunes de Goulven (29N) le 4 octobre, 70 à Bailleron le 5 et le 9, 15 à Landevennec (29S) le 28, 45 à Goulven (29N) le 1er novembre, 300 à St-Colombier/Sarzeau (56) le 2, 45 à Bailleron le 8.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) 19 données

2 le 18 juillet sur la Loire/Mauves
(44) où une bande séjourne depuis le 20 juin.!

Toutes les observations de juillet-août proviennent du Curnic/Guissény (29N) : 1 imm. les 18 et 21 juillet, 2 imm. le 28. 3 imm. le 1er août, 1 le 3 août, 1 imm. le 11, 1 ad. le 22, 2 imm. le 24, 1 imm. le 28 août, 1 imm. le 3 septembre. On note aussi 1 ad. le 3 septembre dans les marais de Guérande (44).

Rien ensuite jusqu'à la deuxième quinzaine du mois : 1 ad. le 17 au Croisic (44), 100 à 200 dont 80 % d'immatrices à St-Jacut (22) le 19, 1 imm. le 21 au Vougo/Guissény, 1 juv. le 24 au même endroit, 11 le 1er octobre dans l'anse de Bon-Abri/Hillion (22). Enfin 5 à St-Jacut le 18 octobre.

MOUETTE DE SABINE (*Larus sabini*) 1 vers le sud devant le Croisic (44) le 22 juillet ; 2 juvéniles passant vers l'ouest tout près de l'île de Batz (29N) le 10 septembre.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) 24 données

Alors que la colonie du Cap Fréhel (22) est à peu près déserte en fin juillet, celle du Cap Sizun (29S) n'est totalement abandonnée que le 18 août, celle de Koh Kastell/Belle-Ile (56) le 6 septembre (on y note encore 11 poussins le 19 août, 9 juv. et 13 ad. le 26, 6 ad. et 4 juv. le 30, 3 ad. et 2 juv. le 4 septembre).

Peu de données hors des colonies : 2 imm. au Croisic (44) le 22 juillet, 1 ad. à Perros-Guirec (22) le 23 ; en août, passages devant le Cap Fréhel : 40 en 2h le 1er, 39 ad. vers l'ouest le 21, 13 juv. vers l'ouest le 24. Seulement 2 ind. en vol vers l'ouest au large de Roscoff, en 28 heures d'observation du 5 au 15 septembre. Ensuite, 2 juvéniles à Quessant (29N) le 17 septembre, 1 ad. en ce lieu le 20, 2 à Brest (29N) le 30, 1 juv. entre Belle-Ile et Quiberon le 4 octobre, 5 au Croisic le 1er novembre, 4 en ce lieu le 5 et 5 à Roscanvel (rade de Brest) le 11 novembre.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) 35 données concernant des migrants.

Nidification.- Une visite en Brière, (44) les 16 et 17 juillet est un peu tardive pour que l'on puisse se faire une idée des effectifs de ce vaste ensemble : un couple nourrit des juvéniles sur le nid le 17 en Petite Brière alors que, parmi les groupes

composés d'adultes et de juvéniles non émancipés, on relève 15 à Kerfeuille/Camerun et 30 sur la Grande Curée.

Le passage commence le 5 août : 2 au Yeun Elez (29N), puis 8 au Vioreau (44) le 6, 1 ad. au Curnic/Guissény (29N) les 8 et 11, 9 en vol vers l'ouest au Cap Fréhel (22) et 18 au Yeun Elez le 12, 2 juv. à St-Renan (29N) le 16...

Les observations restent régulières jusqu'au 25 septembre, mais ne concernent que de petits groupes parmi lesquels : 8 le 1er septembre en baie d'Yffiniac (22), 4 le 1er septembre et 4 le 12 au Curnic, 5 le 11 à St-Renan, 12 le 12 à Taden/Rance (35), 5 aux Sables-d'Or (22) le 17, 4 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 18.

Encore trois observations dans la première quinzaine d'octobre : 1 le 1er et 3 le 3 à Trenvel/Treogat (29S), 1 le 14 à Mauves-sur-Loire (44). Enfin, 1 à St-Vio le 28 octobre.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) 1 le 29 juillet à l'étang du Cranic/Brec'h (56). Deux observations incertaines en Loire-Atlantique (Vioreau) ont été écartées.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) 30 données

La présence d'une cinquantaine d'oiseaux sur l'île du Petit Carnet/Frossay (embouchure de la Loire-44-) peut faire penser à l'existence d'une petite colonie dans ce secteur. Aucun renseignement à ce sujet.

La tendance à séjourner sur les étangs de St-Renan dans l'intérieur du Léon (29N) se confirme : 11 le 31 juillet, 6 le 16 août, 3 le 21, 2 le 23, 2 ad. et 1 juv. le 25.

Notons aussi 2 ad. et 1 juv. à Mauves-sur-Loire (44) les 9 et 11 août.

Dernières observations en fin septembre et début octobre : 2 à St-Nazaire (44) le 24 septembre, 1 à St-Gildas-de-Rhuys (56) et 1 à Surzur (56) le 31, 3 vers le sud le 1er octobre au Croisic et 2 le 8 octobre à Kernorvan/le Conquet (29N).

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougalli*) Espèce totalement négligée. Cinq données seulement, dont quatre entre le 24 juillet et le 13 août sur la côte cornouaillaise (29S) dans la région de Fouesnant. En outre, 4 au Fret (rade de Brest) le 29 août.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) 26 données

Dans la deuxième quinzaine de juillet, des groupes stationnent en quelques secteurs du littoral où des adultes nourrissent des juvéniles. Sur la côte nord du Léon, groupes de 10 à 20 au Curnic/Guissény, à Goulven et dans l'anse du Kernic/Plouescat (d'où viennent ces oiseaux ?) ; à Tréglonou (29N), 11 ad. le 29 ; en Loire-

Atlantique, 1 sur l'île du Petit Carnet/Frossay le 19, 40 à la pointe St-Gildas/Préfailles le 22.

Très peu observée ensuite, douze observations seulement, s'échelonnant du 5 août au 20 septembre : 10 en Penzé (29N) le 13 août, 5 à Lorient (56) le 19, 5 à l'île Arouix/Mauves (44) le 5 septembre, 6 (dont 1 ad.) à la pointe des Guets/Hillion (22) le 17, 4 à St-Jacut (22) le 20.

Encore 1 au Croisic (44) le 1er octobre et 1 juv. en baie de St-Brieuc (22) le 28 octobre.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) 56 données

Rien d'original ne ressort de ces données trop peu nombreuses et rarement utilisables. Une donnée cependant mérite attention : passage nocturne le 14 septembre au-dessus de St-Brandan (22) ; les oiseaux se dirigent vers le sud et traversent donc l'intérieur de la Bretagne, ce qui n'avait jamais été noté pour cette espèce dont les déplacements sont très liés au tracé des côtes. Ce fait est sans doute à mettre en relation avec un passage nettement marqué vers l'ouest les 14 et 15 septembre au large de l'île de Batz, seul fait notable concernant cette espèce en 10 jours d'observations dans ce secteur.

Encore sept observations dans la première quinzaine d'octobre, parmi lesquelles : 2 au Croisic (44) les 1er et 8 octobre, 2 au Conquet (29N) les 8 et 12.

Quatre observations ensuite en Loire-Atlantique : 2 le 22 octobre à Pen Bron/la Turballe ; 3 le 29 octobre, 4 le 5 novembre, 11 le 11 novembre au Croisic.

PIGEON BISET (*Columba livia*) 9 données

Nidification.- Un couple sans doute nicheur au Cap Fréhel (22) le 5 août. Un nid contient encore deux oeufs les 19 et 26 août à Koh Kastell/Belle-Ile (56).

Notons encore une bande de 40 oiseaux au Pouldon/Belle-Ile le 6 septembre alors que 15 oiseaux sont notés simultanément à Grand-Village/Belle-Ile.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) 3 données

2 ind. possibles le 18 septembre à Porz Doum/Guessant (29N) ; 2 à Noyal-Pontivy (56) le 14 octobre et 1 à Marzerolles/Sucé (44) le 15 octobre.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) 23 données

Nidification.- Parades et chants sont notés jusqu'à la mi septembre à Noyal-Pontivy (56) alors qu'un nid con-

tient 2 oeufs le 17 septembre à Tremobian/Guipronvel (29N).

Quelques grosses bandes en octobre-novembre : 50 à Noyal-Pontivy (56) le 14 octobre, 100 à Mazerolles/Sucé (44) le 15 octobre, 50 à Ti Bleiz/Brasparts (29N) le 29 octobre, 100 à l'Hôpital-Camfrout (29N) le 11 novembre.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) 48 données

Idification.- Envol de 2
juvéniles

à Peaule (56) le 29 juillet ; chants réguliers jusqu'au 13 août autour de Lancieux (22).

Le très petit nombre d'observations jusqu'à la mi septembre (2 données dans la seconde moitié d'août et 9 dans la première quinzaine de septembre) ne nous permet pas de localiser le passage.

Notons cependant : 7 à Hoedic (56) le 10 septembre, 130 à Keriero/Belle-Ile (56) le 11 septembre, 35 à Pleuven (29S) le 22 septembre, dernière à Messac (35) et 100 sur un chaume à Henvic (29N) le 24 septembre, 14 au Stang/Plougourvest (29N) le 29.

Encore six données en octobre : 5 à Kervellan/Belle-Ile le 1er, 4 à Kerdonis/Belle-Ile le 2, 4 à Noyal-Pontivy (56) et 2 à Belle-Ile le 3, puis 2 sur un chaume à Henvic le 12 et enfin 1 à Ouessant (29N) le 14 octobre.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) 31 données

Localités nouvelles.-

Côtes-du-Nord.- Présence notée à St-Jacut (12 sur un champ le 8 septembre).

Finistère.- Chants à Raguenez/Nevez (6 chanteurs le 7 août) ; présence notée à Henvic (3 sur un chaume le 24 septembre), Pleyber-Christ (2 le 9 août), Landivisiau (2 le 12 août), le Conquet (5-6 le 17 septembre), Crozon (1 à Morgat le 29 septembre), Plovan (1 le 2 août).

Morbihan.- Chant à Quiberon (1 chanteur le 12 septembre).

Loire-Atlantique.- Reproduction prouvée à la Turballe (1 couple à Lerat le 14 août).

Plus de 200 ind. à St-Nazaire (44) le 9 novembre.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) 7 données

Un juvénile à peine volant au Cap Fréhel (22) le 6 août, et un juvénile nourri par des Accenteurs au Yeun Elez (29N) le 9 août.

1 à Mauves-sur-Loire (44) le 20 juillet, 1 à Landunvez (29N) le 28 juillet, 2 à Keremma/Tréflex (29N) le 3 août et le dernier à Ouessant (29N) le 28 août.

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) 1 juvénile et 1 adulte écrasés au Tuchen
Kador/Botmeur (29N) le 10 août.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) 5 données

1 à Penn ar Lann/Ouessant (29N) le 24
septembre, 1 trouvé mort à Enter/Belle-Ile (56) le 1er octobre, 1 à
Brouel/Séné (56) le 13 octobre, 1 sur la lande du Croisic (44) le 15
octobre, 1 à Bindre/Séné (56) le 17 novembre.

HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*) 1 chant à Préfailles (44) le 22 juillet.

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) 15 données

Nidification.- Envol des deux derniers ju-
véniles au Stang/Plougour-
vest (29N) le 28 juillet.

ENGOULEVENT (*Caprimulgus europaeus*) 2 chanteurs en forêt du Gâvre
(44) le 29 juillet.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) 72 données

Les derniers locaux sont notés le 31 juillet
à St-Nazaire (44), alors que des rondes sont observées le 1er août à
Fouesnant (29S) et jusqu'au 12 août à Beg Meil/Fouesnant ; l'espèce est
présente partout jusqu'au 11 août dans la région de Messac (35) ; la
population de Commana (29N) est là jusqu'au 16 août.

Des passages sont déjà enregistrés dans la seconde quinzaine de
juillet : 11 en vol vers le sud-est en baie de Morlaix (29N) le 17, 2
vers le sud à 9 km au large de l'île de Batz (29N) le 21, 50 à St-Nazaire
les 21 et 22. Mais la migration se déroule essentiellement dans les deux
premières décades d'août : 93 à St-Nazaire le 3, 100 à Trenvel/Tréogat
(29S) et passages dans la région Fouesnant-Concarneau (29S) le 7, 30
à Concarneau et nombreux migrants à Lancieux (22) le 10, 150 en deux
points de Belle-Ile le 11, 38 à St-Nazaire le 15, 31 à St-Nazaire le 17,
15 à St-Nazaire le 20. Après quoi les passages ralentissent considéra-
blement : 4 à St-Nazaire le 21... 2 à Plévenon (22) le 22... 3 à Guéran-
de (44) le 26, 1 à St-Brieuc (22) le 28. Quelques attardés en septembre :
1 à Guérande et 1 à St-Nazaire le 3, 3 à Hoedic le 11, enfin 1 en deux
points d'Ouessant (29N) le 26 septembre.

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) 125 données

Nidification.- Un transport de poisson à
Lancieux (22) le 11 août.

Le déplacement des oiseaux vers le littoral s'accroît dans la
seconde quinzaine de juillet : 1 au Croisic (44) le 19, 1 à l'île du
Petit Carnet/Frossay (44) le 20, 1 à Beg ar Forn/Trédrez (22) et 1 à

Fouldavid/Douarnenez (29S) le 25, 1 à Préfaïlles (44) le 28...

Si l'on en juge par le nombre des données, l'essentiel du passage aurait lieu en septembre : 53 données pour ce seul mois. En outre 8 des 27 observations de la deuxième quinzaine du mois concernent 2 oiseaux ou plus. Plusieurs données provenant des îles : à Belle-Ile (56), 1 le 30 août, 2 en deux points le 7 septembre, 2 en deux points le 11... 1 à Hoedic (56) le 8 septembre ; à Quessant (29N), 13 captures du 1er au 28 septembre, et 3 oiseaux en deux points le 17. Notons encore, 3 ind. pour 2 km de rivière à Noyal-Pontivy (56) le 1er septembre, 3 au Croisic le 2 septembre, 3 à Kerjean/Trébabu (29N) le 15, 4 au Cap Coz/Fouesnant (29S) le 26.

Une arrivée ou un passage pourrait se produire à partir de la dernière semaine d'octobre : 32 données du 25 octobre au 15 novembre. Dans la première quinzaine de novembre, le tiers des observations concerne des groupes de 2 oiseaux.

HUPPE (*Upupa epops*) 14 données

Nidification.- Un couple nourrit des poussins à Erdeven (56) le 18 juillet et 1 ind. alarme à Lancieux (22) le 3 août.

Toutes les données reçues proviennent de localités situées dans l'aire de reproduction connue et parmi lesquelles quatre sont nouvelles : St-Père-en-Retz en Loire-Atlantique (1 le 2^e juillet), Langon en Ille-et-Vilaine (1 à Port-la-Roche le 25 juillet), Bangor (Belle-Ile) dans le Morbihan (1 à Merlin) le 22 août et Lancieux dans les Côtes-du-Nord (3 données du 3 au 13 août).

Dernière observation : 1 à Vioreau (44) le 12 octobre.

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) 19 données

Localités nouvelles :

Finistère.- 1 au Quinquis/Fouesnant le 19 septembre et 1 chanteur à Raguenez/Névez le 7 septembre.

Morbihan.- 1 à Kerstang/Séné le 3 novembre, 1 chanteur à l'étang de Noyalo et 1 chanteur au bois de Kervest/St-Gildas-de-Rhuys le 30 septembre, 1 à Keredren/Dangan le 1er octobre.

Loire-Atlantique.- 1 à Pornic le 17 juillet.

! Un migrateur sur Quessant (29N) le 11 septembre.

TORCOL (*Jynx torquilla*) 4 données

Toutes concernent des migrants : 1 à Kervin/Noyal-Pontivy (56) et 1 à Kerogan/Quimper (29S) le 1er septembre, 1 à Hoedic (56) du 6 au 8 septembre, 1 capture à Quessant (29N) le 25 septembre.



Hibou Moyen Duc juvénile
Monts d'Arrée

Cliché Gilbert DECROIX

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) A Hoedic (56), 14 en
trois bandes le 6
septembre, et au moins 11 en une bande le 12 septembre.

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) 16 données

Données originales : 3 chanteurs
sur 8 ind. à Préfaillies (44) le 30 juillet, 2 dans les salines de
Guérande (44) le 1er octobre, 1 chanteur en gare d'Hennebont (56) le
3 octobre, 10 ind. à Etel le 9 octobre, 1 chanteur en gare de Lorient
(56) le 21 octobre.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) 2 données (!)

1 chanteur à St-Père-en-Retz (44) le 24
juillet et 1 ind. à Fréhel (22) le 31 juillet.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) 31 données

Nidification.- Colonie de 60
couples environ
à Erdevén (56).

Les données reçues, extrêmement peu nombreuses, ne permettent guère que de situer la fin du passage. Encore de belles bandes dans la seconde quinzaine de septembre : le 16, 53 en baie de St-Nazaire (44), 58 en ville de St-Nazaire et 10 au barrage d'Ouessant (29N), le 19, 60 à Flovan (29S), 48 à St-Nazaire le 22, date après laquelle les données s'espacent considérablement. Présente à Ouessant le 26 septembre, 1 à Belle-Ile (56) le 29, 30 à Trévignon/Trégunc (29S) le 2 octobre, 1 à Trenvel/Tréogat (29S) le 3 octobre. Enfin, 1 à Lannec/Ploemeur (56) le 8 novembre, ce qui constitue, et de loin, notre donnée la plus tardive à ce jour.

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*) 51 données

Nidification.- Alors que l'on
recueille les
premiers indices de migration depuis le début du mois, un nid contient 4 poussins le 27 août dans le Léon (29N). Les locales quittent Péaule (56) le 1^{er} septembre et des groupes familiaux locaux sont encore observés à Ouessant (29N) le 15 octobre.

Les vols et rassemblements les plus importants sont observés dans la deuxième moitié de septembre : 290 à St-Nazaire (44) le 16, 119 en cet endroit le 18, puis 96 le 22, 80 à Noyal-Pontivy (56) le 29. Passage nettement plus faible en octobre avec cependant 25 à Daoulas (29N) le 1er, 50 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 9, 50 sur des fils à Beauvoir (44) le 16.

Les dernières sont vues dans la dernière décade d'octobre : 2 à Lanrivouaré (29N) le 21, 1 à Dangan (56) le 23 et 1 à Lanrivouaré le 29.

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*) 29 données
Nidification.- Nid occupé
jusqu'au 8 octobre à Noyal-Pontivy (56).

Observations assez régulières jusqu'à mi-octobre. Une seule donnée ensuite : 1 à Landivisiau (29N) le 28 octobre.

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*). 1 à Ouessant (29N) le 23 septembre
et 1 imm. au Grand-Mont/St-Gildas-
de-Rhuys (56) le 25 septembre.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) 15 données
Nidification.- 2 chanteurs à St-
Père-en-Retz (44)
le 24 juillet.

9 captures à Ouessant (29N) du 5 au 26 septembre ; 1 à Quiberon
(56) le 17 septembre ; 7 à Pleuven (29S) le 10 octobre.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) 46 données
Nidification.- Très commun à Batz
(29N) le 16 juillet,
3 à l'île du Petit Carnet/Frossay (44) le 19 juillet, 1 poussin à Tré-
boul (29S) le 21 juillet, 6 dans les marais de Vue (44) le 31 juillet,
chant à Loc'h Lehen/Treffiat (29S) le 4 août, nourrissage à Ste-Anne-
du-Forzic (29N) le 20 août.

Des observations sur lieu-témoin à Hoedic (56) du 6 au 12 septembre mettent peut-être en évidence un début de passage : 9 le 6 et 14 le 12 contre de 2 à 6 seulement les autres jours. Arrivées ressenties à Mazerolles/Sucé (44) le 16 septembre. La migration devient alors évidente : 30 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 21, plusieurs dizaines en vol à Plouharnel (56) le 25, 40 à Noyal-Pontivy (56) le 26, 60 à Noyal (56) le 30 septembre... Les passages prennent de l'ampleur en octobre, avec : 150 à St-Brandan (22) le 2, 120 dans les marais de Séné (56) le 6, 100 à Etel (56) le 9, 110 au Stang/Plougourvest (29N) le 14, passages vers le sud au Croisic (44) le 15... Il semble bien que cette première quinzaine d'octobre marque le point culminant de la migration. En tout cas les données deviennent très peu nombreuses, et les bandes insignifiantes après cela.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta spinoletta*) 4 données
6 à Mazerolles/Sucé (44)
le 6 octobre, 1 à Pern/Ouessant (29N) le 14 octobre, 1 à Trenvel/Tréogat
(29S) le 28 octobre, 5 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 1er novembre.

PIPIT MARITIME (*Anthus spinoletta petrosus*) 15 données.
39 à Hoedic (56) le 6 sep-

tembre, 101 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 1er novembre (cette localité est située à 2 km du littoral le plus proche).

Nidification.- Chant à l'île de Batz (29N) le 16 juillet, 2 chanteurs à Préfaillies (44) le 22 juillet (9 ind. en ce lieu le 23), 1 couple à Siec/Santec (29N) le 23 juillet.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*) 44 données

Nidification.- *M. f. flava* : 1 à Dangan (56) le 29 juillet.

M. f. flavissima : 1 couple accompagné de 2 juv. à Mahalon (29S) le 19 juillet.

Quelques données de passage : 4 à Noyal-Pontivy (56) le 2 septembre, 10 à Hoedic (56) le 6 septembre, 20 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 21 septembre, 6 à Begaronce/Belle-Ile (56) le 24 septembre, 12 à Penn ar Lenn/Ouessant (29N) le 26, 30 à l'étang du Pont le 27, 7 en deux points d'Ouessant le 28. Puis rien jusqu'au 7 octobre : 2 à Kergleuz/Landéda (29N), dernière observation.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) 43 données

Nidification.- Un couple accompagné de 2 juv. à Mahalon (29S) le 19 juillet.

Premiers migrants certains à Belle-Ile (56) le 7 septembre, à Ouessant (29N) à partir du 13 septembre. Passage marqué en septembre en cette localité avec 16 captures du 13 au 25 (3 le 18, 5 le 19, 4 le 25). Observations nombreuses en octobre : 6 en un point de Belle-Ile le 2, 3 en baie de Plouharnel (56) et 3 au Kongell/Quiberon (56) le 7, 2 ind. à Ploufragan (22) le 13. Apparition dans les villes en octobre également : 1 à la gare d'Auray (56) le 6, 2 à St-Nazaire (44) le 14, 1 à Rennes (35) le 19.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) 77 données

Nidification.- Nourrissage en Brière (44) le 18 juillet.

Passage surtout à partir des derniers jours d'août, prenant de l'ampleur en septembre. 10 en baie de la Fresnaye (22) le 29 août, 8 à Quiberon (56) le 3 septembre, 12 à Hoedic (56) le 10, augmentation importante à Ouessant (29N) le 18, migrants à Croëx Person/Noyal-Pontivy (56) le 26. La migration se poursuit en octobre : 10 vers le sud au Croisic (44) le 1er, 2 vers le sud à Croëx Person le 14...

Les premières Bergeronnette de Yarrell (*M. a. yarrelli*) (13 données) sont observées dans la première décade d'octobre : 1 à Plougourvest (29N)

le 7, 1 à Batz (44) le 8, 1 à St-Nazaire (44) et 1 à Plouguenest le 14, 1 à Ouessant le 15, etc... 3 à Penvis/Sarzeau (56) le 14 novembre.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*) 6 données

Nidification.- 12 ind. et un nid sur l'île

du Petit Carnet/Frossay (44) le 19 juillet, 3 dans les marais de Vue (44) le 31 juillet.

A Hoedic (56), 2 le 6 septembre et 1 autre le 7 ; 1 à Ouessant (29N) le 24 septembre.

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*) 1 juv. à Ouessant (29N) le 28 août et à Kervilaquen/Belle-Ile (56) le 29 septembre.

CINCLE (*Cinclus cinclus*) 3 données

1 dans la vallée du Légué (22) le 19 juillet, 1 en baie de la Fresnaye (22) le 20 juillet et 1 à Malon/Messac (35) le 9 septembre.

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*) 84 données

Nidification.- Les trois premières

données peuvent se rapporter à des nicheurs ; une localité nouvelle : 3 ind. à l'île du Petit Carnet/Frossay (44) le 20 juillet. Un nourrissage au Yeun-Elez/Botneur (29N) le 25 août.

Premiers indices de passage dans la seconde quinzaine d'août : 2 à Fréhel (22) le 18, 6 en cet endroit le 22, 2 au Croisic (44) le 25, 3 à Fréhel le 26, peu nombreux encore à Ouessant (29N) le 28.

(L'essentiel de la migration a lieu en septembre, le point culminant se situant dans la première quinzaine du mois : 4 à Noyal-Pontivy (56) le 2 ; nombreux à Guérande (44) le 3 ; 6 captures à Ouessant le 4 ; 8 à Ste-Anne-d'Auray (56), 5 captures à Quiberon (56) et 7 captures à Ouessant le 5 ; 6 à Hoedic (56), 3 à Belle-Ile (56) et 7 captures à Ouessant le 6 ; 14 à Hoedic le 8 ; 20 à Hoedic le 9, puis 15 le 10 et 13 le 11, 11 à Belle-Ile le 15. Le passage décroît en abondance dans la seconde moitié du mois : 7 à Croëx Person/Noyal-Pontivy le 21, 6 au service d'eau/Belle-Ile le 22, 6 captures à Ouessant le 24, 5 au Curnic/Guissény (29N) le 30 septembre.

Seulement 7 données en octobre : 3 à Croëx Person le 3, 1 à Portivy/Quiberon le 7, 1 à Ouessant le 14, 2 à Quiberon le 15 et 6 au Moustoir/Billiers (56) le 22.

Enfin 5 à Suscinio/Sarzeau (56) le 14 novembre.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*) 52 données

Nidification.- Nourrissages le 2 août à Fouesnant (29S), le 7 août à Logonna-Daoulas (29N) et le 11 août à Brest (29N). 2 chanteurs à Ouessant (29N) le 28 septembre.

Les augmentations enregistrées en août et septembre sur des lieux très bien suivis sont peut-être l'indice de passages : au Cap Fréhel, 2 le 17 août, 4 le 19 août, 7 le 21 août, 9 le 22, 5 le 23 et 9 le 26 ; à Hoedic, 6 le 5 septembre, 1 les 8 et 9, aucun le 10, 3 le 11 et 14 le 12.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) 95 données

Nidification.- Nourrissage à l'île de Batz (29N) le 15 juillet, 2 couples à l'île de Sieg/Santec (29N) le 23 juillet, 1 à Porz Milin/Locmaria-Plouzané (29N) le 24 juillet et une famille à Loc'h Nizeleg/Plovan (29S) le 2 août.

Les premiers indices de la migration sont recueillis peu après la mi-août : 1 à Pancé (35 intérieur) le 19, 1 à St-Nazaire (44) le 20, 11 à Fréhel (22) le 22 contre 1 à 2 seulement les jours précédents, 1 à Mazerolles (44 intérieur) le 27...

Mais c'est en septembre que la migration bat son plein : 20 à la pointe du Croisic (44) le 3, 52 sur 8 km de route côtière à Quiberon (56) le 5, 26 sur un lieu-témoin à Hoedic (56) le 6, 27 en ce lieu le 7, puis 15 le 12. A ce moment les données concernent des groupes plus faibles. Reprise dans la dernière décade avec 15 en Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 22, 10 au Lic/Dangan (56) le 24, 11 au Grand-Mont/St-Gildas-de-Rhuys (56) le 25, 5 à Croëz Person/Moyal-Pontivy (56 intérieur) le 26...

Les observations restent régulières jusque dans la dernière décade d'octobre, moins nombreuses toutefois à partir du 16 : 10 à Trévignon/Trégunc (29S) le 2, 3 à Croëz Person le 3, nombreux oiseaux de grande taille (*O. o. leucorrhoa*) à Ouessant (29N) le 14 octobre, nombreux dans les marais de Guérande (44) et plusieurs dizaines d'ind. de grande taille à Ouessant le 15. Encore 2 au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) le 20, 2 au Kongell/Quiberon (56) le 21 et 4 à Penerf/Dangan le 23. Enfin trois isolés, à Goulien (29S) le 26, à Trenvel/Tréogat (29S) le 28 et à Fouesnant (29S) le 1er novembre.

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*) 1 au Lic/Dangan (56) le 24 septembre.

→ AGROBATE ROUX (*Cercotrichas galactotes*) 1 ind. *galactotes* observé à Hoedic (56) le 7 septembre de 9h à 19h par Joseph LE LANNIC et Raymond LE PENNUIZIC. Il s'agit là de la première observation de l'espèce en Bretagne.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) 29 données

Jusqu'à la première semaine de septembre, toutes les observations ont été effectuées en des localités où l'espèce est connue comme nicheuse, y compris 11 ind. au Cap Fréhel (22) le 10 août.

Si un passage se produit en septembre, il reste très faible : 1 à Hoedic (56) les 6 et 7, 1 à Moustierlin/Fouessant (29S) le 15, 1 à Dolan/Séné (56) le 20, noté en quatre localités de Belle-Ile du 22 au 29.

Il faut attendre la mi-octobre pour avoir des indices sérieux de migration, alors que le chant a repris à St-Nazaire (44) depuis le 7 octobre. 1 à Fouessant (29S) le 13, 7 à Ouessant (29N) le 14, 8 à Pen-thièvre/Quiberon (56) le 15...

ROUGEQUEUE A FONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) 48 données

Toutes les observations se rapportent à des migrateurs ; aucune donnée avant la fin-août : 1 capture à Quiberon (56) et 1 à Arouix/Mauves (44).

(Le gros de la migration a lieu en septembre (40/48 données) : 3 à Ste-Marie-sur-Mer (44) et 1 capture à Ouessant (29N) le 1er, 2 à Hoedic (56) le 6, 4 en ce lieu le 7, puis 3 le 12, 1 à Belle-Ile (56) et 7 captures à Ouessant le 15, 5 captures à Ouessant le 16, 1 capture à Quiberon le 18, 5 captures à Ouessant le 20, 5 captures à Ouessant et 1 à Quiberon le 21, 2 à Fleuven (29S) le 22, 5 captures à Ouessant le 24, etc...

Encore six données dans la première quinzaine d'octobre : 1 à Brest (29N) et 1 à Thouaré (44) le 1er, 1 à Noyal-Pontivy (56) le 3, 1 à la pointe du Croisic (44) le 8, 1 à Etel (56) le 8 et 1 à Ouessant le 15.

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*) 29 données

326 captures à Ouessant (29N) du 1er au 26 septembre et 54 captures à Quiberon (56) du 1er au 25 septembre. Moyenne de 12 captures journalières à Ouessant, mais 18 le 12, 18 le 20, 18 le 23, 26 le 24, 27 le 25 et 29 le 26. A ce maximum de captures dans la quatrième semaine de septembre à Ouessant correspond le maximum de captures à Quiberon : 17 captures les 21 et 22. Le passage semble se poursuivre dans la première quinzaine d'octobre : sur le lieu-témoin de Croëz Person/Noyal-Pontivy (56) on note 20 chanteurs le 3 et 24 chanteurs le 5 (contre une dizaine de chanteurs seulement dans la deuxième quinzaine de septembre et 12 chanteurs + 7 ind. le 14 octobre).

1 ind. en plumage juvénile le 29 septembre à Ouessant.

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*) 3 données

Noté à Ouessant (29N) le 16 septembre. Une observation remarquable : 1 ind. émettant quelques bri-

des de chant présent du 1er au 9 novembre au Stang/Plougourvest (29N).

GORGEBLEUE (*Luscinia svecica*) 22 données

Nidification.- Un couple alarme à l'île du
Petit Carnet/Trossay (44)

les 19 et 20 juillet.

→ 1 capture à Loc'h Kergaran/Plovan (29S) entre le 16 et le 18 août.
Par ailleurs, passage très localisé du 1er au 30 septembre : 1 à Noyal-
Pontivy (56) le 1er ; 1 à Belle-Ile (56) les 5 et 7 ; à Hoedic (56), 2
dont 1 ♂ à miroir roux le 6, 2 le 7, 1 le 8, 3 le 12 ; à Ouessant (29N),
1 capture les 15, 18 et 26 ; 1 à St-Jacut (22) le 21 ; 1 capture à
Quiberon (56) le 22 ; 1 ind. dont les mensurations correspondent à *L. s.*
namnetum capturé à Beslé (35) le 30.

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) 36 données

Six données très précoces à Ouessant (29N)
concernent sans doute le même oiseau : 1 en divers points de l'île du
16 au 29 septembre.

Par la suite, petite arrivée dans la troisième semaine d'octobre :
1 à Ouessant et 12 à Pleuven (29S) le 15, 50 à Mazerolles/Sucé (44) le
18, 18 en 3 points de Belle-Ile (56) le 21.

Il faut attendre les tous derniers jours du mois pour obtenir de
nouvelles données, après quoi les observations se multiplient jusqu'à
la fin de la période : 13 à Plougourvest (29N), 10 à Pont-l'Abbé (29S)
et 1 en vol à 2 milles au large du Croisic (44) le 1er ; 25 à Goulven
(29N) le 3 ; 50 en trois points de Belle-Ile et 25 à Bohars (29N) le 4 ;
21 à Roscanvel (29S) le 11, etc...

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*) 7 données

2 à Borthelo/Belle-Ile (56) le 13
septembre ; 2 au Korz/Ouessant (29N) le 25 septembre ; 1 en ce lieu le
26 septembre ; 1 à Penthievre/St-Pierre (56) et 1 à Ouessant le 15 octo-
bre ; 1 à Belle-Ile le 21 octobre et 1 à Goulien (29S) le 26 octobre.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) 19 données

Sur le lieu-témoignage de Croëz Person/Noyal-
Pontivy (56), 10 le 17 septembre, 9 le 21, 16 le 26, 14 le 3 octobre,
20 le 6 octobre, 16 le 14 octobre... 9 le 12 novembre ; oiseaux de passa-
ge à St-Nazaire (44) les 7 et 28 octobre.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) 31 données

A Ouessant (29N) trois données de septembre
(25 au 29) concernant 1 ind. chaque fois.

Il faut attendre la deuxième semaine d'octobre pour obtenir les
données suivantes : 1 à Ploufragan (22) le 9, quelques unes au Vioreau

(44) le 11 ; 24 à Croëz Person/Noyal-Pontivy (56), 5 à Ploufragan (22) et abondante sur toute la surface d'Ouessant le 14 ; 10 à Pleuven (29S) le 15, 13 en trois points de Belle-Ile le 21.

Deuxième vague fin octobre et début novembre : 50 à Mauves (44) le 29 octobre, passage nocturne à St-Brieuc (22) le 30, 117 cris d'oiseaux volant vers le sud entendus le 31 à Beaulieu/Rennes (35) de 22 à 23 heures, 242 volant vers l'est en une demi-heure à Plougourvest (29N) le 1er novembre.

Puis, 30 au Croisic (44) le 11 novembre, 50 à Croëz Person le 12, 50 à Goulien (29S) le 13 et 50 à Mauves le 15.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) 31 données

Au lieu-témoin de Croëz Person/Noyal-Pontivy (56), 13 le 17 septembre, 3 le 21 septembre, 20 le 29 septembre, 11 le 3 octobre, 28 le 8 octobre, 6 le 14 octobre, 3 le 12 novembre.

Chant automnal les 29 septembre et 6 octobre à Noyal-Pontivy, le 7 octobre à St-Nazaire (44), le 24 octobre à St-Brandan (22).

BOUSCARLE (*Cettia cetti*) 24 données

Nidification.- 2 chanteurs à St-Père-en-Retz (44) le 20 juillet et 2 chanteurs dans les marais de Vue (44) le 31 juillet.

Par ailleurs, quelques localités nouvelles, pour l'erranisme ou l'hivernage : en Loire-Atlantique, Batz (1 chanteur le 8 octobre) ; dans le Morbihan, Quiberon (2 les 5 et 22 septembre), Lorient (1 chanteur au Vieux-Moulin le 7 octobre) ; dans le Finistère, Trégouennec (2 chanteurs à St-Vio le 28 octobre) et Roscanvel (1 chanteur le 11 novembre) ; dans les Côtes-du-Nord, Dinan (1 le 30 septembre) et Taden (1 chanteur le 4 novembre) ; en Ile-et-Vilaine, le Vivier-sur-Mer (1 au Pont-d'Angoulême le 31 octobre).

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (*Locustella luscinioides*) 2 données

Deux localités nouvelles : Penmarc'h (29S) avec 2 ou 3 chanteurs au marais de Kerguiden le 4 août et Frossay (44) avec 2 chanteurs à l'île du Petit Carnet le 20 juillet.

LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*) 13 données

Nidification.- Chanteurs localisés dans trois nouvelles localités : Miniac-Morvan (35) le 31 juillet (notre première donnée pour l'Ile-et-Vilaine!), à Penmarc'h (29S) dans les premiers jours d'août et à Frossay (44) les 19 et 20 juillet.

Observée et capturée à plusieurs reprises à Ouessant (29N) en septembre : dernière observation le 27 septembre.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) 33 données

Les premiers migrateurs ne sont notés sûrement que dans la seconde quinzaine d'août : 1 le 17 au Cap Fréhel (22). Seulement 92 captures à Ouessant (29N) du 1er au 26 septembre : 9 le 3, 13 le 13, 8 le 17... 10 à Mauves (44) le 10 ; peu observée à Hoedic (56) du 6 au 12. Dernière à Bétahon/Billiers (56) le 1er octobre.

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*) 5 données

5 captures à Loc'h Kergaran/ Plovan (29S) du 16 au 18 août, 1 à Mauves-sur-Loire (44) le 29 août, 3 à Mauves le 10 septembre, 1 à St-Jacut (22) le 12 septembre et 1 à Ouessant (29N) le 14 septembre.

ROUSSEROLLE EFFARVATE (*Acrocephalus scirpaceus*) 27 données

Nidification. - 2 chanteurs à l'île du Petit Carnet/Frossay (44) le 20 juillet.

Un indice de mouvement dans la seconde quinzaine d'août : 1 à Bordelann/Belle-Île (56) le 23. 50 captures à Ouessant (29N) du 1er au 26 septembre : 6 le 2, 5 le 17, 5 le 24 et le 25, 8 le 26, dernière donnée de la période.

ROUSSEROLLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*) 1 donnée

1 chanteur à l'île du Petit Carnet/Frossay (44) le 20 juillet.

PETIT CONTREFAISANT (*Hippobos polyglotta*) 16 données

Les sept données de juillet août se rapportent probablement à des nicheurs ; une localité nouvelle : 2 chanteurs à 100 m de distance à Miniac-Morvan (35) le 31 juillet.

Neuf données de passage en septembre : 7 captures à Ouessant (29N) du 3 au 16 septembre (dernière donnée) ; 1 à Hoedic (56) les 8 et 11, 3 en ce lieu le 12 ; 2 sur la dune du Maner/Fouesnant (29S) le 15.

GRAND CONTREFAISANT (*Hippobos icterina*) 5 données

Captures à Ouessant (29N) les 11, 12, 13, 14 et 20 septembre.

→ FAUVETTE EPERVIERE (*Sylvia nisoria*) 1 capture le 18 septembre à Ouessant (29N).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) 41 données

158 captures à Ouessant (29N) du 1er au 26 septembre : 15 le 6 et 10 le 7, 11 le 12, 10 le 21, 10 les 24 et 25. Au maximum de la première semaine de septembre à Ouessant correspon-

dent les observations de 4 ind. le 7 et 7 le 8 sur un lieu-témoin à Hoedic (56) (0 le 9 au même endroit).

Encore 1 à Penn Kear/Ouessant le 14 octobre et 1 à Ar Godec/Ouessant le 15.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) 47 données

Nidification.- Encore des chants à

Mahalon (29S) le 19 juillet, à Pouldavid/Douarnenez (29S) le 25 juillet ; nourrissage à Quimper (29S) le 17 août.

122 captures à Ouessant (29N) du 1er au 26 septembre : maximum très net à la fin du mois avec 9 captures le 22, 13 le 23, 15 le 24, 21 le 25 et 29 le 26.

10 observations du 8 octobre à la fin de la période : 2 à Batz (44) le 8 octobre, 7 dont au moins 5 ♂ en trois points d'Ouessant les 15 et 15 octobre, 2 ♂ et 1 ♀ à Messac (35) le 9 novembre, 1 ♂ et 1 ♀ à Quimper (29S) le 12 octobre.

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) 4 données

1 au Cap Fréhel (22) le 5 août et

2 en ce lieu le 16 août, 1 à Hoedic (56) le 11 septembre et 1 capture à Ouessant (29N) le 13 septembre.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) 28 données

Nidification.- Dernier chant noté :

à Plovan (29S) le 2 août.

Migration essentiellement notée sur les îles : à Ouessant (29N), 20 captures du 1er au 26 septembre, dont 4 le 16 et 3 le 20 ; à Hoedic (56) 3 sur un lieu-témoin le 8 septembre, contre 1 ind. les jours précédents et suivants. Encore 1 ind. à Pern/Ouessant le 15 octobre et 1 à Belle-Ile (56) le 21 octobre.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 38 données

Nidification.- 4 poussins au nid à

Roc'h Kleger/Brasparts

(29N) le 9 août, envol le 13 août ; nourrissage à Botmeur (29N) le 18 août. Chants nombreux dans la première quinzaine d'août. 4 chants au Grand Mont/St-Gildas-de-Rhuys (56) le 25, 1 chant au Petit Vioreau/Joué-sur-Erdre (44) le 21 octobre.

1 ind. un erratisme à Plougragan (22) les 10 et 15 novembre.

Localités où l'espèce n'avait pas encore été signalée : Pennarc'h (29S) (2 près du marais de Kerguiden le 4 août), les Fougerêts (56) (5 ou 6 le 15 octobre), Hillion (22) (2 à la pointe des Guettes le 24 octobre), Cancale (35) (1 à la pointe du Meinga le 1er octobre).



Fauvette Pitchou mâle évacuant un sac fécal

Cliché Gilbert DECROIX

CISTICOLE (*Cisticola juncidis*) 19 données

Au cours de l'été 1972 la Cisticole a considérablement progressé en Bretagne, des chanteurs étant entendus jusque sur la côte nord du Léon.

Loire-Atlantique.- plus de 10 chanteurs à Guérande le 16 juillet, 4 à l'île du Petit Carnet/Frossay le 20 juillet, 1 à Préfailles le 23 juillet, 3 aux marais de Vue le 31 juillet, nourrissage à Mazerolles/Suob le 6 août (il s'agit à notre connaissance du point de nidification le plus septentrional jamais atteint par l'espèce).

Morbihan.- 1 chanteur du 25 août au 1er septembre à Locmariaquer.

Finistère.- 1 chanteur à Locudy le 23 juillet, 1 chanteur à Loc'h Nizeleg/Plovan le 2 août, 15 chanteurs sur la commune de Penmarc'h début-août, 1 chanteur sur Treffiagat le 4 août, chants notés au Curnic/Guissény et à Meneham/Kerlouan à partir de septembre.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) 33 données

168 captures à Quessant du 1er au 26 septembre : maximum dans la première quinzaine du mois (18 le 6, 14 les 13 et 14...). 1 chanteur à Croëz Person/Noyal-Pontivy (56) le 17 septembre. Dernière donnée certaine : 1 à Beslé-sur-Vilaine (44) le 1er octobre.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) 64 données

177 captures à Quessant du 1er au 26 septembre : maximum autour de la mi-septembre : 14 captures le 11, 13 captures le 13, 9 captures à Quiberon (56) le 15, 16 captures à Quessant le 16, 19 captures à Quessant le 17, 17 captures à Quessant le 19, 13 captures à Quessant le 26. C'est dans la seconde quinzaine de septembre que, par ailleurs, les observations sont les plus nombreuses : 5 à St-Renan (29N) le 17 dont 1 chanteur à St-Nazaire (44) le 22, 4 à Plougourvest (29N) le 27, 4 à St-Nazaire le 28, abondance extraordinaire à Beslé (44) le 30... Observations encore régulières dans la première décade d'octobre : 3 chanteurs à Noyal-Pontivy (56) le 3, 4 en deux points de Plougourvest le 7, 2 à Batz (44) le 8...

Les données s'espacent considérablement ensuite (8 données jusqu'à la fin de la période) : 4 en forêt de la Hunaudaie (22) le 15 octobre, 3 dont 1 chanteur à St-Nazaire le 28 octobre, 1 chanteur à Ploufragan (22) le 1er novembre, 3 dont 1 chanteur à Plougourvest le 9 novembre, 1 à Landevennec (29S) le 11 novembre.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) 2 données

1 capture le 3 septembre et 1 autre le 5 septembre à Quessant (29N).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) 7 données

Toutes concernent des migrants. Données remarquablement groupées du 2 au 23 septembre : 1 à Quessant (29N) le 2 septembre, 1 à Dumet/Piriac (44) le 3, 2 à Dolan/Séné (56) le 8, 1 à Quessant le 11, 1 à Quessant le 13, puis 1 le 19 et 1 le 23.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) 47 données

Nidification.- Chants à Mahalon (29S) et au Ri/Kerlaz (29S) les 19 et 22 juillet ; poussins au nid à Tréboul/Douarnenez (29S) le 21 juillet ; chant dans les landes de Lanvaux (56) le 5 septembre.

Noté sur Quessant (29N) à partir du 11 septembre, avec 31 captures de cette date au 26 septembre (4 le 13, 5 le 23...) ; passage sensible à Quessant le 21 septembre ; abondance extraordinaire à Beslé (44) le 30 septembre ; passage sensible début-octobre dans la région de St-Brieuc (22)...

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) 34 données

Une observation précède toutes les autres de près d'un mois et demi, et peut faire penser à une nidification : 3 ind. à Préfailles (44) le 28 juillet.

(Les premiers indices du passage sont recueillis en septembre : 1 capture à Quessant (29N) le 6, 1 à Hoedic (56) le 10 ; mais le passage ne va prendre de l'ampleur que dans la troisième décennie du mois : passage sensible à Quessant le 21, 1 à St-Nazaire (44) le 23, 5 captures à Quessant le 24, 8 captures le 26, abondance extraordinaire à Beslé (44) le 30.

Les observations ne se généralisent vraiment que dans la seconde moitié d'octobre : Pleuven (29S), Landevennec (29S), Tréogat (29S), St-Brandan (22), Plougourvest (29N), Dinan (22), Goulien (29S), Lorient (56), Rosnoën (29), Brest (29N)...

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) 82 données

Passage du 25 août au 11 octobre. 1 à Messac (35) et 1 au Cap Fréhel (22) le 25 août, 3 à Quessant le 28, 1 à Messac le 31.

Mais c'est en septembre que l'essentiel de la migration se produit (73 données). A Quessant où des filets sont posés en permanence du 1er au 26, on enregistre les maxima suivants pour 173 captures : 14 le 7, 13 le 10, 13 le 15, décroissance régulière ensuite. A Hoedic (56), 7 en deux points le 6, 17 en trois points le 7, 7 en deux points le 8... Toutes les autres observations continentales concernent des isolés, sauf à St-Nazaire (44) où l'on enregistre un passage vers le 20 : 2 le 18, 3 le 21, 8 le 22, 3 le 23... 2 le 28.

Quatre attardés en octobre : 1 à Messac et 1 à Noyal-Pontivy (56) le 6, 1 à St-Nazaire le 7 et 1 à Messac le 11.

→ GOBEMOUCHE NAIN (*Ficedula parva*) 3 données

5 au Poulliot/Lorient (56) le 20 septembre, 1 à Quessant (29N) le 26 septembre et 3 à Kerletu/Lorient le 27 septembre.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) 77 données

Jusqu'à la mi août, toutes les observations concernent des nicheurs. Des adultes alarment à Roscoff (29N) le 23 juillet, à Noyal-Pontivy (56) le 28 juillet et à Plévenon (22) le 14 août ; nourrissages de juvéniles les 5 et 12 août à St-Nazaire.

Migration du 25 août au 15 octobre. Quelques isolés en août : à Fréhel (22) et Quimper (29S) le 25, à Louannec (22) le 27, à Quessant (29N) le 28 et à Mauves (44) le 31.

Au cours des stades de septembre à Quessant, 243 oiseaux sont capturés avec les maxima suivants : 13 le 4, 32 le 14, 19 le 24. 8 en deux points de Noyal-Pontivy le 2 ; 1 à Hoad (56) le 3 ; 6 à Hoedic (56) le 12 ; 4 à St-Nazaire (44) le 18...

Cinq observations d'isolés dans la première moitié d'octobre : 1 à Noyal-Pontivy les 3 et 6, 1 à St-Nazaire les 7 et 14, 1 à Quessant le 15 octobre.

MESANGE A MOUSTACHES (*Parus biarmicus*) 5 données

2 le 18 juillet en Brière (44), 1 le 19 septembre à Suscinio/Sarzeau (56), 2 le 21 octobre à la Poitevinère (44), et 1 capture à Loc'h Kergaran/Plovan (29S) du 16 au 18 août.

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*) 15 données

L'expérience semblant montrer que l'espèce est inégalement répartie en Bretagne, nous citerons désormais toutes les localités où elle est notée.

Ille-et-Vilaine.- 1 à Messac le 28 octobre.

Côtes-du-Nord.- 1 à St-Brandan les 28 juillet et 30 octobre ; 1 en forêt de la Hunaudaie le 15 octobre.

Finistère.- 3 à Trébehu (étang de Kerjean) le 8 août.

Morbihan.- Brec'h (3 au Cranic le 13 août), Lorient (2 à Kerletu le 11 novembre), Questembert (1 à Keredren le 1er octobre).

Loire-Atlantique.- Préfaillies (commune en juillet), Beslé (abondance extraordinaire le 30 septembre), St-Nazaire (1-2 à plusieurs reprises entre le 19 septembre et le 7 octobre).

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) 16 données

Ille-et-Vilaine.- 2 à Beaulieu/Rennes le 23 octobre ; à Messac, 1 le 27 octobre, 4 le 31 octobre et de 1 à 10 ind. du 1er au 15 novembre.

Côtes-du-Nord.- 1 chanteur à St-Brandan le 2 octobre.

Finistère.- 1 à l'Arc'hantell/Brest le 20 septembre ; à Ouessant, 1 capture le 25 et une autre le 26 septembre.

Morbihan.- 1 à Quiberon le 19 juillet ; 1 à Dolan/Séné le 8 août ; 2 au Grand Mont/St-Gildas-de-Rhuys le 25 septembre : 1 à Croëz Person/Noyal-Pontivy les 3 et 14 octobre ; 2 à Kerletu/Lorient les 18 octobre et 4 novembre.

Loire-Atlantique.- 1 à St-Nazaire le 28 septembre.

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) 17 données

5 données à Ouessant (29N) où cet oiseau ne niche pas : 2 captures le 26 septembre, partout sur l'île les 29 et 30 septembre, au moins 2 le 15 octobre.

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*) 21 données

Chants : le 19 août à Fréhel (22), les 3 et 14 octobre à Noyal-Pontivy (56), le 5 novembre à Ploufragan (22).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) 28 données

Nidification.- Localités nouvelles : toutes dans le Finistère-sud : la Forest-Fouesnant (1 chanteur au Cap Coz le 7 août) ; Treffiat (1 chanteur à Loc'h Lehen le 4 août) ; Plovan (nourrissage le 2 août) ; Penmarc'h (7 chanteurs en divers points de la commune le 4 août) ; Plogastel-St-Germain (2 chanteurs à Menez Kerveyen, à plus de 8 km de la côte, le 2 août).

Des bandes sont notées à partir de la mi-août : 10 à Bordelann/Belle-Ile le 17 août, 35 à Hoedic (56) le 10 septembre, bandes de 10 à 20 ind. aux Quatre-Chemins/Belle-Ile le 24 septembre...

Chants du 6 au 12 septembre à Hoedic, les 18 septembre et 4 novembre à Belle-Ile.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) 13 données

3 poussins à Lanfains (22) le 23 juillet ; 2 chants à Ploufragan (22) le 5 novembre.

BRUANT ZIZI (*Emberiza citrinella*) 46 données

Nidification.- Nourrissages de juvéniles à Pouldavid/Douarnenez (29S)

le 23 juillet et à Trenagon/Plougar (29N) le 17 août. Nouvelles localités nord-finistériennes : Sibiril (1 ♂ cantonné à Port-Neuf le 16 juillet) ; Cléder (1 ♂ à Ker Anied le 25 juillet) ; Plougar (nourrissage) ; Communa (4 chanteurs du 3 au 15 août) ; Brasparts (1 chanteur à Roc'h-quelyan le 11 août).

Chants tout au long de la période (2ème quinzaine d'août : 1 donnée ; 1-15/09 : 2 données ; 16-30/09 : 1 donnée ; 1-15/10 : 5 données ; 16-31/10 : 3 données ; 1-15/11 : 5 données).

Concentrations à Noyal-Pontivy (lieu-témoin -56-) en septembre et octobre : 2 le 2 septembre, 3 le 17 septembre, 10 le 21 septembre, 14 le 26 septembre, 7 et 1 chanteur le 3 octobre, 19 et 1 chanteur le 14 octobre... 2 le 12 novembre.

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) 2 ind. à Hoedic (56) du 7 au 10 septembre.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) 28 données
Nidification.- 5 oeufs à Kerbois/Crac'h
(56) le 17 juillet.

Des huit données de septembre, aucune ne dépasse 2 ind. Les premiers groupes ne sont notés que dans la seconde quinzaine d'octobre - 3 en vol au Kongell/Quiberon (56) et 7 à Koh Kastell/Belle-Ile (56) le 21 ; 6 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 28 ; 15 à Cherrueix (35) le 31 octobre ; 30 à Goulven (29N) le 1er novembre...

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) 33 données
Premiers indices de passage le 26 septembre : à Quessant (29N) où cet oiseau ne niche pas, 1 ind. chantant à Penn ar Lann et 1 à Pount Salaün.

Le passage ne prend d'ampleur que dans la deuxième décade d'octobre : 9 à Croëz-Person/Noyal-Pontivy (56) le 14 ; nombreuses bandes d'une vingtaine d'oiseaux à Quessant et 310 en 1 heure par bandes de 7 à 15 à Plougourvest (29N) le 15 ; 40 vers le sud au Kongell/Quiberon (56) le 21... 70 à Pont-Croix (29S) le 28 octobre...

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) 3 données
A Quessant (29N), 1 le 25 et 1 le 26 septembre ; 1 à Kerbois/Crac'h (56) le 5 octobre.

VERDIER (*Carduelis chloris*) 44 données
Nidification.- 2 oeufs à Perros-Guirec (22) le 18 juillet ; nourrissage de 3 juvéniles à Pouldavid/Douarnenez (29S) le 25 juillet ; 4 poussins

et 1 oeuf à Rumengol (29N) le 3 août ; nourrissage d'1 juvénile à St-Nazaire (44) le 5 août ; envol à Perros-Guirec le 20 août ; nourrissages de juvéniles à St-Nazaire les 21 et 23 septembre.

Premières concentrations à partir de septembre : 45 à Croëz Person/Noyal-Pontivy (56) le 2, 45 à Hoedic le 6, 150 à Croëz Person le 17, 100 à Croëz Person et 50 à Pleuven (29S) le 21, 65 à Croëz Person le 26, 90 en Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 30, 60 à Trévignon-Trégunc (29S) le 2 octobre alors que les effectifs de Croëz Person sont devenus squelettiques (8 le 3 et 7 le 6 octobre), 120 à Kergleuz/Landéda (29N) le 15 octobre...

CHARDONNERET (*Carduelis carduelis*) 55 données

Nidification.- 2 poussins à Quiberon (56) le 26 juillet ;

nourrissages de juvéniles à St-Nazaire (44) le 5 août et à St-Renan (29N) le 17 août.

Rassemblements importants dès la fin-août : 100 à Kergleuz/Landéda (29N) le 29 août, 30 à Koh Kastell/Belle-Ile (56) le 4 septembre, 50 à Belle-Ile le 18 septembre, 100 à Kervelan/Belle-Ile et 100 à Bordaroue/Belle-Ile le 24... 60 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 1er novembre.

Un chant à St-Nazaire le 28 octobre.

TARIN (*Carduelis spinus*) 26 données

Première vague fin septembre : 1 à Quessant (29N) le 26, 120 à Lancieux (22) le 27, 3 à Quessant le 30, 1 à St-Brandan (22) le 1er octobre.

Seconde vague de passage à partir de la mi octobre : 7 vers le nord-est à Croëz Person/Noyal-Pontivy (56) le 14, 60 au Stang/Plougourvest (29N) et 250 par bandes de 30-40 en trois-quarts d'heure à Goulven (29N) le 15, 5 à Ploufragan (22) le 16, 3 bandes d'une dizaine au Kongell/Quiberon (56) le 21, 15 à Pen Mur/Muzillac (56) le 23, 30 vers le sud à Trenvel/Treogat (29S) le 28, 75 à Kerhellen/Trébeurden (22) le 31 ; 24 au Stang le 2 novembre...

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) 48 données

Nidification.- Eclosion à Quiberon (56) le

22 juillet.

C'est en septembre que l'on note les premiers mouvements : 55 vers le sud-est à Hoedic (56) le 6 ; 300 à Croëz Person/Noyal-Pontivy (56) le 17 septembre et 200 en ce lieu le 21 (contre 46 le 2 septembre, 30 le 26 septembre, 8 le 4 octobre). Puis 1200 vers le sud en 1 heure au Kongell/Quiberon (56) le 7 octobre ; 30 vers le sud-est au Kongell le 21 octobre. 300 à Goulven (29N) le 1er novembre. 11 sur le lieu-témoin de Croëz Person le 12 novembre (aucune le 14 octobre).

SERIN CINI (*Serinus serinus*) 22 données

Nidification.- Nourrissage de juvéniles à
St-Nazaire (44) le 19 août.

Localités nouvelles.- Crêhen (22- 4 ou 5 chanteurs le 2 septembre),
Kerlaz (29S- 3 chanteurs au Ri le 22 juillet), Quiberon (56- captures en
juillet) ; Hoedic (56- 1 le 7 septembre) ; ce dernier est probablement
de passage.

BEC CROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) 8 données

8 le 3 août à Plougourvest
(29N) ; à Ouessant (29N), 2 le 16, 1 ♂ et 2 ♀♀ le 20, 1 ♂ le 26, 3 le
27, 2 le 30 septembre ; au moins 5 à Trestignel/Trévou-Tréguignec (22)
le 4 novembre.

GROS BEC (*Coccothraustes coccothraustes*) 4 données

5 en vol à St-Brandan (22) le
18 juillet ; 1 à Bordelann/Belle-Ile (56) le 17 août ; 1 à St-Brandan les
15 septembre et 7 octobre.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) 19[?] données

1 albinos au Stang/Plougourvest
(29N) le 22 septembre.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) 10 données

Nouvelles localités.- St-Suliac (22)
(une vingtaine le 26 octobre) ; Plounéour-Trez (29N) (1 ad. et 3 juv.
le 28 juillet) ; Porspoder (29N) (présent à Penfoul le 11 septembre) ;
Batz (44) (11 le 8 octobre).

LORIOT (*Oriolus oriolus*) 5 chanteurs de Thouaré à Mauves (44) le 20
juillet.

GEAI (*Garrulus glandarius*) 15 données

Mouvements en septembre-octobre : 6 en vol
à Messac (35) le 29 septembre, 4 volant vers le sud à haute altitude à
Croëz Person/Noyal-Pontivy (56) le 3 octobre, 8 en vol à Messac le 13
octobre, 10 à Croëz Person le 14 octobre et 30 en vol en 1 heure à
l'île Arouix/Mauves (44) le 14 octobre.

CHOUCAS (*Corvus monedula*) 4[?] données

2 à la pointe St-Marc/Belle-Ile (56) le 23
septembre.

FREUX (*Corvus frugilegus*) 17 données

Toutes les observations à partir du 12 octobre.

Ille-et-Vilaine.- Grand-Fougeray : 1 le 15 octobre ; Rennes : 20 en vol vers le sud-ouest le 31 octobre à Beaulieu.

Côtes-du-Nord.- Ploufragan : 6 le 12 octobre, 10 le 14 octobre ; St-Brandan : 6 le 22 octobre ; Loudéac : 17 le 31 octobre ; Dinan : une trentaine le 2 novembre.

Finistère.- Pont-Croix : 30 le 13 novembre.

Morbihan.- Noyal-Pontivy : 87 en vol vers l'est-nord-est le 14 octobre ; Questenbert : 220 le 4 novembre, 100 le 11 novembre ; Belle-Ile : 13 en deux points le 21 octobre, 80 en deux points le 5 novembre.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) 14 données

Quelques observations dans l'intérieur ou à quelque distance de sites de nidification connus : trois données dans les monts d'Arrée en juillet-août, dont 13 à Menez Meur/Hanvec (29N) le 13 août ; 1 à Ste-Marie-du Menez Hom (29S) le 28 août ; 2 à Poulgui-dou/Plouhinec (29S) le 19 septembre et 2 harcelant un Héron cendré au bois de l'Ecluse/Audierne (29S) le 10 novembre.