

Ménezhen
(Kerlouan)

Tédougon
(Fragance)

→ Pointe du Croizic

AR VRAN

PUBLICATION ORNITHOLOGIQUE DU
LABORATOIRE DE ZOOLOGIE DE LA
FACULTE DES SCIENCES DE BREST

1973 - TOME VI, fasc. 2

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES
DU 16 MARS AU 15 JUILLET 1973

PREMIERES NIDIFICATIONS DU
FULIGULE MORILLON EN BRETAGNE

SOMMAIRE

Actualités ornithologiques du 16 mars au 15 juillet 1973.

par Y. GUERMEUR
C. HAYS
M. L'HER
J.-Y. MONNAT
A. THOMAS..... 63

Premières nidifications du Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) en Bretagne.

par F. PUSTOC'H
R. PERON..... 137

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 16 MARS AU 15 JUILLET 1973

par Yvon GUERMEUR, Christian HAYS, Maurice L'HER, Jean-Yves MONNAT
& Alain THOMAS

Ont participé aux présentes actualités :

Jean-Pierre ANNEZO, Patrick BAILLEUL, Philippe BAILLEUL, Joseph BALC'H, Jean-Claude BEAUDOIN, Patrick BECHET, Jean-Yves BERNAUD, P. BIZIEN, Pascal BOURDON, Yannick BOURGAUT, René BOZEC, Jean-Louis BRAVE, Yves BRIEN, Norbert BRIGANT, Paul CANEVET, Gilbert CAPP, Noël CAPP, Jean-Pierre CORMIER, Hervé CORRE, Pierre CRENN, Pierre-Yvon DALINO, Jean DELAUNAY, Pierrick DESCHAMPS, Philippe DUBOIS, Jean-Loup DUPONT, Raymond ENAY, Jean-Pierre FENARD, Jean-Pierre FERRAND, Denis FLOTE, Pierre FONQUERNIE, D. GAUDICHEAU, Alain GERARD, Aymar de GESINCOURT, G. OLIOSO, Michel GODOFFRE, Yvon GUERMEUR, Patrick HAMON, Christian HAYS, Jacques HENRY, HUET, Ewenn de KERGARIOU, Yvon KERSAUDY, Daniel LATROUITE, Maurice LE DMEZET, Joseph LE LANNIC, Pierre LEON, Michel LE PAPE, Raymond LE FENUZIC, Michel LERAY, Christian LEVER, René de LIEDEKERKE, Claude MAHE, Roger MAHEO, Joseph MANAC'H, Loïc MARION, Jean-Yves MONNAT, Guy MOREL, Gérard MOYSAN, Pierre NICOLAU-GUILLAUMET, René ONNO, Roland PERON, Daniel PERTUISEL, Jacques PETIT, Fanch PUSTOC'H, Michel QUANTENNE, Yves ROBIC, Alain THOMAS, Hippolyte VATAR, et le groupe ornithologique St-François Xavier de Vannes sous la direction de René MAHUAS.

Plus encore que les années précédentes, le printemps 1973 a surtout été consacré à l'amélioration de l'inventaire-atlas des oiseaux nicheurs. De nombreuses cartes de l'intérieur ont été prospectées, notamment celles de St-Méen et de Broons qui ont fait l'objet d'une opération concertée en mai. De plus, les travaux de Pierre NICOLAU-GUILLAUMET sur l'avifaune terrestre des îles de la côte atlantique l'ont amené à recueillir, à côté d'intéressantes données sur la nidification, de nombreuses observations de migrateurs qui ont plus de chances de passer inaperçus sur le continent.

En ce qui concerne l'avifaune nicheuse, on relèvera, outre les données originales sur les îles, les premières preuves de nidification breton-

nes du Canard chipeau (Loire-Atlantique) et du Morillon (Finistère), la tentative de reproduction de la Cigogne blanche aux confins de l'Ille-et-Vilaine et de la Normandie, la présence d'un Circaète dans les Monts d'Arrée, la reproduction de l'Echasse en deux points du Morbihan, la découverte de nouvelles petites colonies de Mouettes rieuses dans le sud-est breton, l'implantation de la Sterne pierregarin dans plusieurs marais côtiers, la présence du Pic Mar dans le centre du Finistère, l'existence probable d'une petite population de Rousserolles verderolles dans le sud de la Bretagne, la découverte (ou redécouverte) du Roitelet triple-bandeau nicheur dans les Côtes-du-Nord, la présence à nouveau notée du Bruant proyer dans une localité intérieure des Côtes-du-Nord.

Parmi les migrateurs les plus remarquables, on note : des Puffins fuligineux en juin, des Aigrettes garzettes dans le nord-ouest breton, des Oies cendrées séjournant en mai-juin en Loire-Atlantique, un Aigle (criard ?) en Loire-Atlantique, un Faucon émerillon en juin dans le Morbihan, des Glaréoles à collier en Loire-Atlantique, notre première observation printanière de Mouette de Sabine, des Guifettes leucoptère et moustac dans le Léon, une Alouette calandrella dans le même secteur, une Gorgebleue à miroir roux dans le Morbihan, un passage inhabituel de Mergles à plastron, la première observation printanière de la Fauvette babillarde, un Gobemouche nain à Pâques en Loire-Atlantique, quelques Becroisés en juin, le passage de Loriots sur plusieurs îles en mai et début-juin.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) 7 données.

3 à la Mer-Blanche/Fouesnant (29S) le 22 mars, 3 au Cap Fréhel (22) le 27 mars, 1 à l'Îlot de Rehellan/Erdeven (56) le 31 mars, 2 à Penvins/Sarzeau le 1er avril, 3 à la pointe de la Tour/Brehec (22) le 7 avril, 2 à Brallach/Fouesnant le 17 avril, 1 trouvé noyé dans un filet de pêche dans l'embouchure de la Penzé (29N) le 24 avril.

PLONGEON IMERIN (*Gavia immer*) 4 données.

1 à l'Île Hoëdic (56) le 18 avril, 1 le 19 entre Houad et Hoëdic, 1 au Sillon du Talbert (22) le 23 avril, 1 à Kerregma/Tréflex (29N) le 30 avril.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) 82 données.

En zone maritime le départ des hivernants est bien suivi dans le Golfe du Morbihan: de 90 le 16 mars, 100 le 21 et 105 le 26 mars, on passe à 50 le 10 avril. La plupart des autres observations en mer proviennent du Morbihan, en particulier de l'embouchure de la Vilaine et de la côte de Sarzeau : 6 à Penvins le 25 mars, 3 à Erdeven le 1er avril, 5 à Dangan le 2, 5 à Penvins le 4, 1 à Carnac le 15, encore 11 à Kervoyal/Dangan le 21. Dans les Côtes-du-Nord, on note 3 le 18 mars, 4 le 12 avril, 1 le 19 avril dans l'anse d'Yffiniac et 1 le 13 avril en baie de la Fresnaye. En mai, on retrouve 8 ind. le

14 dans le Golfe du Morbihan alors que 2 ad. sont observés les 10 et 21 en baie de Saint-Brieuc (22).

(Retours dans le Golfe du Morbihan en fin-juin : 40 le 29 juin, 65 le 11 juillet, 60 le 14 juillet. 1 ad. le 6 juillet à Saint-Jacut (35) et 1 à Trévignon-Trégunc (295) le 15.

Nidification.- Premières pontes le 6 mai à l'étang du Rouvre/Saint-Pierre-de-Flesguen (35) : 2 nids contiennent respectivement 1 et 3 oeufs.

Ille-et-Vilaine.- Etang de Combours : 2 couples en parade le 8 avril ; étang du Rouvre : 2 couples (2 nids trouvés) ; étang du Boulet/Feins : 16 par couples paraded le 31 mars ; étang de la Musse/Baulon : 7 ind. le 7 juillet ; étang de Lampâtre/Goven : 1 ad. et 2 pulli le 7 juillet ; étang de la Taberge/Sainte-Anne-sur-Vilaine : 2 couples min. le 9 avril.

Côtes-du-Nord.- Etang des Fourneaux/Mur-de-Bretagne : 2 le 23 mars ; étang de la Hardsouinais : 2 ind le 15 avril, 7 ind. le 12 mai ; étang de Loscouët : 2 le 12 mai ; étang du Beffou : 1 les 21 et 26 mai.

Finistère.- Yeun-Elez : 10 le 13 mai, 3 couples au moins le 27 mai, 6 ad. et 1 juv. le 11 juillet, 5 ad. et 4 juv. le 14 juillet.

Morbihan.- Etang des Salles/Ferret : 2 le 25 mars, 2 les 14 avril, 10 et 14 mai ; étang au Duc/Ploermel : 2 le 5 avril ; étang du Cranic/Brech : de 13 à 17 ad. en mars, 17 ad. le 14 avril, 16 ad. le 21 avril, 4 le 23 avril, 10 juv. et pulli le 10 juin ; étang de Noyal : 1 ad. le 8 avril, 1 ad. le 22 avril, 2 le 18 mai ; Kerstang/Séné : 1 ad. et 1 juv. le 4 juillet.

Loire-Atlantique.- Réservoir du Vioreau : 2 couples le 5 avril, 2 ind. le 2 juin, 1 le 8 juin ; Lac de Grandlieu : 3 couples le 17 avril, 2 familles le 8 juin à Saint-Aignan ; étang de Sandun/Guérande : 2 couples le 7 avril, 2 couvées réussies ; étang de la Hunsau-dièrre/Saint-Aubin-des-Châteaux : 2 le 11 avril ; étang de Chanin/Sion-les-Mines : 1 le 11 avril ; étang de Gruellau/Treffieux : 1 le 8 avril ; étang de Tesdan/Avessac : 2 couples et 2 juv. le 16 juin ; étang d'Aunée/Avessac : 3 ad. le 17 juin ; étang du Pin : 4 ad. et 1 pull. le 1er juillet ; étang de Maubusson/Juigné-des-Moutiers : 3 ad. et 1 pull. le 1er juillet.

Ces nombreuses données ne nous apprennent malheureusement pas grand chose. Combien d'étangs n'abritent que des estivants, des oiseaux de passage. Quels sont les effectifs réellement reproducteurs ? Autant de questions qui méritent rapidement une réponse.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) 3 données

2 à Beg Lann/Sarzeau (56) le 1er avril, 1 à la pointe du Grand-Mont/Saint-Gildas-de-Rhuys (56) le 1er avril et 1 en baie de la Fresnaye (22) le 13 avril.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) 7 données

Disparition en fin-mars dans le Golfe du Morbihan ; 50 le 21, 18 le 26. On en note encore 17 en baie de Daoulas (rade de Brest) le 3 avril. Par ailleurs, 1 le 16 et 2 le 20 mars sur l'étang du Cranic/Brech (56) et dernier à Hoedic (56) le 15 avril.

Retour estival dans le Yeun-Elez (29N) : 1 ad. le 11 juillet.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*) 99 données.

Quelques observations en mer jusqu'au début-avril : 2 à Paluden (Aber Wrach)/Lannilis (29N) le 17 mars, 32 en baie de Kerogan (Odet)/Quimper (29S) le 18, 7 en rivière d'Etal (56) le 30, 1 dans l'étier de Kerboullico/Sarzeau (56) le 31, 3 en baie de Morlaix (29N) le 3 avril. Départ à la même époque sur quelques plans d'eau douce du Léon (29N) : encore 2 le 9 avril à Kerhuon, 4 le 10 à l'étang du Pont/Kerlouan (aucune observation ensuite dans ces localités où la nidification resta possible). Même remarque pour les 3 ind. de l'étang des Salles/Perret (22) les 17 mars et 14 avril.

Nidification.- 2 oeufs le 22 avril à Saint-Vio (baie d'Audierne) (29S), 1 oeuf le 29 avril à Toulvern/Baden (56), 1 oeuf le 19 mai à Trebehan/Plusquellec (22). Une ponte précoce à Saint-Renan (29N) ou 2 pulli de plusieurs jours sont observés dès le 16 avril.

Ille-et-Vilaine.- Très peu de renseignements : 1 chanteur à l'étang de Combourg le 8 avril ; 1 chanteur à l'étang de l'Etier/Langon le 11 avril et le 1er mai ; 3 ou 4 couples parquent en arrière de la plage du Verger/Cannale le 18 mars.

Côtes-du-Nord.- Au marais de Kerhelen/Trébeurden, 1 les 14 et 24 avril, 2 juv. le 3 juillet ; à l'étang de Trébéhan/Plusquellec, 1 chanteur et 1 nid/1 oeuf le 19 mai ; à l'étang du Beffou, 1 chanteur les 21 et 26 mai. Par ailleurs, des oiseaux ont été notés en début de saison en des localités peu visitées ensuite : 1 à l'étang des Fourneaux/Mur-de-Bretagne le 17 mars, 3 à l'étang du Moulin-Neuf/Plounérin.

Finistère.- Pas de dénombrement à Ménéham/Kerlouan ; la nidification n'est pas prouvée à l'étang du Pont malgré la présence d'un chanteur le 5 avril. A St-Renan, 3 couples ont niché sur un bassin, alors que 4 ind. (dont 1 chanteur) étaient observés sur le lac de Lannéon le 22 mars et le 17 avril ; au Yeun-Elez, 5 chanteurs le 28 juin ; en baie d'Audierne, pas de dénombrements : plusieurs chanteurs à Trenvel, ainsi qu'à Saint-Vio. 1 chanteur à l'étang de Poulguidou/Plouhinec le 10 juillet, 7 ind. sur Loc'h Nizeleg le 11 juillet. Au Loch/Plogoff (baie des Trépassés), 1 ad. et 2 juv. le 4 juillet ; à l'étang de Kermor/l'Ile-Tudy, 7-9 ind. le 2 juillet ; aux étangs de Trévignon/Trégunc, le seul Loc'h Kozioù abrite 5 couples.

Morbihan.- A l'étang du Roch-Du/Crach, 6 chanteurs le 24 mars ; à l'étang du Cranic/Brech, 6 chanteurs le 20 mars ; à l'étang de Lannec/Ploemeur, 1 chanteur le 20 mars ; au Fort-Bloqué/Ploemeur,

2 ind. le 23 juin ; à la Tour d'Elven/Elven, 2 chanteurs le 4 avril ; à l'étang de Trébry, 8 dont 1 chanteur le 11 mai ; à l'étang de Saint-Jean/Mendon, 2 chanteurs le 26 mai ; à l'étang de Toulvern/Baden, 3 chanteurs le 20 mars, 1 nid/1 oeuf le 29 avril, 1 chanteur le 10 juin ; à l'étang de Saint-Aubin/Plumelec, 1 ad. le 12 juillet ; au marais de Kerpenhir/Locmariaquer, 1 chanteur le 5 mai ; à Sainte-Barbe/Erdeven, 2 ind. le 31 mai ; à Suscinio/Sarzeau, 4 chanteurs le 25 mars ; à Calzac/Sarzeau, 4 chanteurs le 31 mars, 3 chanteurs le 22 avril, 1 chanteur le 2 mai. Enfin, on note la présence d'1 ind sur l'île Hoëdic le 19 avril, mais il peut s'agir de passage (voir Saint-Renan - 29N).

Loire-Atlantique.- Au lac de Murin, plusieurs chanteurs le 18 mars ; au réservoir du Vioreau, 1 le 5 avril (passage vraisemblablement) ; à l'étang de la Hunaudière/Saint-Aubin-des-Châteaux, 1 ind. le 11 avril ; à l'étang de Gruellau/Tréffieux, 1 le 8 avril, à la Boire-de-Mauves/Thouaré, 1 couple le 17 avril ; Saint-Aignan-Grandlieu, 1 chanteur le 17 avril ; à l'étang du Pin, 2 ad. + 7 ind. + d'autres entendus le 1er juillet.

En l'absence de précisions sur la plupart des étangs, il est difficile de se prononcer sur un éventuel passage en avril. Que deviennent ces oiseaux observés au début du printemps sur les plans d'eau négligés par la suite ? Un dénombrement précis s'impose si nous voulons donner une interprétation correcte des mouvements de cette espèce.

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*) Des 15 données reçues, on ne peut évidemment rien tirer : 13 le 23 mars entre Quessant et le Conquet (29N), 30 le 17 avril aux Grands Cardinaux (Mor Bras) (56), 30 entre l'île Houad et le Croisic le 11 juin, trois groupes de 30-40 le 7 juillet entre Houad et le Croisic. Deux gros rassemblements en fin-mai devant la réserve du Cap Sizun (29S) : 2000 le 19, 1000 le 25.

PUFFIN FULIGINEUX (*Puffinus griseus*) 2 données.
2 le 11 juin et 3-4 le 7 juillet entre Houad et le Croisic.

FULMAR (*Fulmarus glacialis*) 19 données
Trois observations seulement sont faites loin des points de nidification, dont deux dans la première décade de juin : 1 en vol vers l'est à Ménéham/Kerlouan (29N) le 6, 1 à Argenton/Porspoder (29N) le 10. On note aussi un cadavre sur la plage d'Erdeven (56) le 31 mai et 1 en vol aux Poulains/Belle-Île (56) le 23 avril.

Nidification.- Les premiers sont vus le 27 mars au Cap Fréhel (2 ind.),
→ le 28 au Cap Sizun (5 ind.).

A la réserve du Cap Sizun/Goulien (29S), 10 à 25 oiseaux sont observés continuellement, mais il ne semble y avoir que 4 couples nicheurs. Un oiseau est aussi noté le 24 mai à la pointe du Raz.

→ Au Tas-de-Pois/Camaret (29S), 5 couples visibles le 31 avril.

Au Cap Fréhel (22), 2 couples les 11 et 13 avril, 9 ou 10 ind. le 4 mai, 5 le 3 juin, plusieurs le 11 juin, 10 le 14 juin, 3 ind. le 11 juillet. A cette date un nid contient 1 œuf qui disparaît le 13 (Goéland ou collectionneur ?).

Dans les Côtes-du-Nord, le Fulmar semble chercher à s'installer dans les falaises de Bréhec et Plouha, dans des colonies d'oiseaux marins ; 1 le 31 mai à Plouha, 1 le 11 juin à la pointe de la Tour/Bréhec.

PETREL TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*) 4 vers le sud le 25 juin à Pen Men/Groix. L'espèce n'a pas été retrouvée sur l'île du Grand Chevreuil (35).

POU DE BASSAN (*Sula bassana*) On peut noter 150 devant Kerity-Pennarch (29S) le 16 juin et de forts passages vers l'ouest au large de Santec et de Brignogan (29N) le 20 juin.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) 67 données

50 de ces observations sont groupées avant le 15 avril : 20 le 16 mars, 16 le 26 mars dans le bassin oriental du Golfe du Morbihan, 40 le 18 mars à Le Cellier (44), 10 à l'île Arouix/Mauves-sur-Loire (44) le 19 mars, 53 à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 25 mars, 10 le 28 à Kerhuon (29N), 1 le 30 à l'étang du Rouvre (35), 55 à Méaban (56) et 20 sur Robellan (56) le 31 mars, 60 à l'île Dumet (44) le 1er avril, 26 à Bag Lann/Sarzeau (56) le 1er et 20 à Penvins/Sarzeau (56) le 4, 30 à Kerpenhir le 7, 9 à Kerhuon le 9, 10 entre Hoedic et Quiberon (56) le 12, 20 aux Grands Cardinaux (56) le 13, 10 à Baden (56) le 14, 9 à Locmariaquer le 15.

12 observations du 16 avril au 15 mai : 15 au Kongell/Quiberon (56) le 20 avril, 5 à Kervoyal/Dangan (56) le 25, 2 imm. au Croisic jusqu'au 13 mai, 3 imm. au Kongell le 3, 3 imm. à Kerhuon le 8.

A On note ensuite 9 à l'île Dumet et 3 à Piriac (44) le 20 mai, 2 à l'île Beniget/Molène et 1 au Conquet (29N) le 11 juin, puis 5 le 28 juin et 2 le 14 juillet dans le bassin oriental du golfe du Morbihan, 3 dont 2 imm. le 31 juin à Trévignon/Trégunc (29S).

La seule colonie bretonne, celle de l'île-des-Landes (35) prospère puisque 18 nids y ont été comptés cette année.

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) Premières pontes observées le 24 mars à Belle Ile, le 27 au Cap Fréhel, mais déjà des éclosions au Cap Fréhel le 9 avril, à Belle Ile le 13 (1 nid contient 2 œufs et 2 pulli).

Cependant des oiseaux contruisent encore à mi-avril à Fréhel. Alors que la population de la réserve du Cap Sizun marque le pas

(88-90 couples), celle de Belle-Ile est en forte augmentation (262-274 nids trouvés). On peut aussi noter 9 nids sur les Grands Cardinaux (56), 4 couples dans les falaises du sémaphore/Groix (56), 1 nid à la pointe de Kastell-Meur (Cap Sizun).

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) 229 données

Deuxième quinzaine de mars.- 45 données, dont 6 sur les lieux de nidification du Morbihan, 15 dans l'intérieur et 24 sur le littoral ou à proximité. Répartition des données par département : Loire-Atlantique : 3 ; Ille-et-Vilaine : 2 ; Côtes-du-Nord : 4 ; Finistère : 11 ; Morbihan : 25. On note en particulier 40 à Kerstang/Séné (56) le 16, 4 au lac de Murin (44) le 18, 6 le 19 et 5 le 23 à Kerogan/Quimper (29S), 4 en rivière d'Etel et 4 au Cranic/Brech (56) le 20, 6 à Séné (56) le 23, 4 à Bailleron (56) le 26, 4 en rivière d'Etel et 4 à Saint-Jean/Mendon (56) le 30, 8 à Séné le 31.

Première quinzaine d'avril.- 42 données, dont 5 sur les lieux de reproduction du Morbihan et de Loire-Atlantique, 9 dans l'intérieur et 28 en zone littorale. Par département : L-A : 15 ; I & V : 0 ; C-d-N : 0 ; F. : 14 ; M : 13. Les bandes semblent grossir, mais beaucoup sont observées à peu de distance des héronnières : 5 à Bodaval/Le Tour-du-Parc (56) le 1, 10 à Séné (56) le 6, 9 à Saillé (44) le 7, 8 au Duer/Sarzeau (56) le 8, 7 à l'île Arouix/Mauves (44) le 13, 6 vers le nord à Saint-Nazaire (44) le 14, 30 au lac de Grand-Lieu le 15.

Deuxième quinzaine d'avril.- 39 données, dont 4 sur les lieux de reproduction, 3 dans l'intérieur et 32 en zone littorale. Par département : I & V : 0 ; C-d-N : 2 ; F. : 3 ; M : 22 ; L-A : 12.

Les bandes importantes sont observées dans les parages des colonies : 18 à Calzac/Sarzeau (56) le 22, 25 ad. le 30 et 32 ad. le 31 dans les marais de Guérande. La dispersion commence déjà dans le Morbihan, quelques juvéniles étant observés sur plusieurs plans d'eau : 2 ad. et 1 juv. à Bodaval (56) le 26, 5 ad. et 1 juv. en ce lieu le 29, 6 à Kerpont/Saint-Gildas de Rhuys (56) le 29, 10 au Duer (56) le 30. On note par ailleurs des groupes passant vers le nord à Nantes : 12 le 20 et 6 le 22.

Première quinzaine de mai.- 21 données, dont 2 sur les lieux de reproduction, 2 dans l'intérieur et 17 en zone littorale. Par départements : I & V : 0 ; C-d-N : 0 ; F. : 7 ; M : 9 ; L-A : 5. Peu de grosses bandes : 3 à Kerogan/Quimper le 1, 6 à Séné le 4, 3 dans le Yeun-Elez (29N) le 13, 4 au lac de Murin le 13, 40-50 dans les marais de Guérande le 13.

Deuxième quinzaine de mai.- 13 données, dont 2 dans l'intérieur. Par département : I & V : 0 ; C-d-N : 0 ; F. : 2 ; M : 8 ; L-A : 3. La dispersion commence à se faire sentir dans le sud de la Bretagne : 4 à Pen-en-Toull/Larmor/Baden (56), 12 au lac de Murin, 4 en rivière de Pont-l'Abbé (29S), 5 à Saint-Etienne-de-Montluc

(44) et 1 juv. au Roch Du/Crach (56) le 25.

Première quinzaine de juin.- 20 données, dont 8 dans l'intérieur. Par département : I & V : 0 ; C-d-N : 2 ; F : 0 ; M : 13 ; L-A : 5. La dispersion se poursuit, plus sensible comme en témoignent les 8 observations dans l'intérieur : 17 à Séné, 6 à Bodaval, 8 au Pont-Neuf (56), 11 à Pen-en-Toull le 10, 9 à Séné le 12, 4 à La Renouillière/Pierrie (44) et 8 à Séné le 15.

Deuxième quinzaine de juin.- 33 données, dont 13 dans l'intérieur. Par département : I & V : 1 ; C-d-N : 0 ; F : 7 ; M : 15 ; L-A : 10. L'augmentation du nombre des données, de celui des localités occupées et des chiffres observés montrent que la dispersion s'amplifie nettement : 5 à Saint-Jean/Mendon (56) le 18, 6 à Murin le 19, 10 à Séné le 20, 4 à Penfoullic/Fouesnant (29S) le 22, 2 ad. et 1 juv. à Kerjean/Trébabu (29N) le 22, 17 au Petit-Traict du Croisic (44) le 24, plus de 15 sur l'Aulne entre Landevennec et Port-Launay (29S) le 26, 20 en rivière de Pont l'Abbé (29S) et 18 à Séné le 26, 10 à Saint-Jean/Mendon le 28, 12 à l'Île Aroux/Mauves (44) et 10 à Séné le 30.

Première quinzaine de juillet.- 24 données, dont 4 dans l'intérieur. Par département : I & V : 1 ; C-d-N : 1 ; F : 9 ; M : 10 ; L-A : 3. La répartition reste la même : 46 au Duer/Saint-Colombier (56) le 1er, 8 juv. à Bodaval (56), 12 juv à Noyal (56), 6 à Port-Groix/Surzur (56) et 6 juv. à le Tour-du-Parc (56) le 3, 10 en rivière de Pont-l'Abbé et 15 à Kerstang/Séné le 4, 14 à Saint-Jean/Mendon le 8, 20 à Pont-l'Abbé le 9, 15 à l'Île Aroux/Mauves le 15.

Nidification.- Pas de chiffres pour les colonies du lac de Grand-Lieu ni celles de Guérande ; pas davantage de chiffres pour la Brière où des juvéniles prêts à l'envol voisinent avec des pontes fraîches le 13 mai. Dans les marais côtiers de Sarzeau (56), trois petites colonies : à Calzac, 4 nids occupés le 30 mars : 1 vide, 1 avec 4 oeufs, 1 avec 4 oeufs et 1 poussin, 1 avec 3 oeufs et 1 poussin ; à la Brousse, 5 nids : premier oeuf le 21 février ; 2 pontes de 6 oeufs, 2 de 5 oeufs, 1 de 4 oeufs ont donné 18 poussins (bagués) ; alors que la colonie précédente était installée dans des saules, c'est sur des roseaux qu'ont niché les (2) couples de *Suscinio* : 1 nid contient 3 pulli et 1 oeuf à l'éclosion le 25 mars, l'autre 2 pulli le 3 avril. Plusieurs observateurs envisagent l'existence d'une colonie dans les parages du lac de Murin (ou, pourquoi pas, dans les roselières impénétrables du lac lui-même ?).

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*) 3 données

1 à Montoir-de-Bretagne (44) le 28 avril, 1 à Saint-Aignan-Grand-Lieu (44) le 13 mai. Plus étonnante est l'observation d'1 ind. en vol vers le NE à Koh Kastell/Belle-Ile (56) le 11 juillet.

Les données sur la reproduction font toujours défaut.



Chouette chevêche

cliché R. OGOR

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) 7 données.

4 observations dans le secteur du
Lac de Grand-Lieu où elle se reproduit : 5 le 15 avril et 15 le 10 mai
à Grand-Lieu, 1 à Saint-Mars-de-Coutais et 3 à Machecoul le 29 avril.

Trois observations simultanées dans le nord-ouest de la Bretagne :
1 le 9 mai dans l'anse d'Yffiniac (22), 1 au Curnic/Guissény (29N) et 2
en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 12 mai.

HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*) 3 données

1 ad. le 15 avril à la Boire de
Mauves/Thouaré (44), 1 à l'île Beaulieu/Nantes et 5 ad. à Grand-Lieu
le 20 juin.

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) 1 donnée

1 ♂ à Trévignon/Trégunc (29S) le 26
juin. Rien sur les lieux de nidification du sud-est breton !

GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*) 1 donnée

1 "chanteur" à Kerfeuille/Fédru (Brière
-44-) le 25 mars.

CICOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) Le 25 mai, 1 couple construit à Sou-
geal(35). Le nid est placé sur un châ-
ne à une dizaine de mètres du sol. Les oiseaux sont observés jusqu'à fin-
juillet, mais il ne semble pas y avoir eu de poussins.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) 8 données

3 à Trévignon/Trégunc (29S) le 11
avril, 4 au lac de Grand-Lieu le 15 avril, 1 imm. à Séné (56) le 4 mai,
1 ad. à Pen-en-Toull/Larmor-Baden (56) le 15 mai, 2 au lac de Grand-
Lieu le 20 mai, 1 imm. en rivière d'Etel (56) le 9 juin, 1 ad. au résér-
voir du Vioreau (44) le 17 juin, 1 au petit traict du Croisic (44) le
24 juin. Le comportement des oiseaux de Grand-Lieu le 20 mai, leur pré-
sence dans une colonie d'Ardéidés laissent espérer une nidification fu-
ture.

OIE CENDREE (*Anser anser*) Un groupe de 12 ind. séjourne au lac de Grand-
Lieu du 20 mai au 15 juin.

OIE SP. (*Anser sp.*) 76 en vol au Petit-Mont (56) le 25 mars. Une donnée
tardive, à rapprocher de celles de Grand-Lieu : 7
en vol vers le sud à Vannes (56) le 12 juin.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) 14 données.

(Départ massif et brutal du Golfe du

Morbihan : 2000 le 16 mars, 70 le 19, 25 le 21 et le 26, 15 le 29 mars, 10 le 2 avril, 5 le 5, 7 le 10, 2 le 17 et le 20 avril, dernière donnée. Ailleurs, quelques observations en mars : 2 le 21 en baie d'Yffiniac (22), 110 le 23 au Len/Dangan (56), 2 le 28 en baie de la Fresnaye (22) et 1 à Dangan le 31.

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) 105 données.

De grosses "bandes" subsistent en quelques points (zones d'hivernage) en fin-mars et jusqu'à mi-avril surtout : dans l'anse d'Yffiniac (22), 54 le 18 mars, 34 le 12 avril, 22 le 19 ; à Séné (56), 43 le 20 mars, 55 le 22, 40 le 27, 20 le 6 avril ; à Dangan (56), 60 le 23 mars, 55 le 30 ; au Moustoir/Billiers (56), 51 le 6 avril (sans doute les oiseaux de Dangan) ; 30 le 27 mars en baie de la Fresnaye (22) et 100 le 1er avril à le Vivier-sur-Mer (baie du Mont-Saint-Michel) (35). Au sein de ces rassemblements figurent les couples nicheurs des environs.

En fin-avril et mai, les rassemblements ont pour la plupart disparu, les seuls gros chiffres étant notés à l'île des Landes/Cancalle (35) : 45 le 27 avril, 30-35 le 15 mai. A côté de cela, des groupes formés de quelques couples en divers points (Billiers, Yffiniac, Guérande, Saint-Jacut, Ile Bacchus/Penestin), à noter également un groupe de 7 ind. sur l'étang de Loscouët (22 - intérieur) le 12 mai.

En juin, les familles se regroupent et l'on note à nouveau de grosses bandes où les poussins dominent largement : 30 dont 27 pulli à Lirey/Moyalo (56) le 8, 30 à Séné le 12,...

Nidification.- Parades le 18 mars en baie d'Yffiniac. Premiers poussins le 5 mai à Dolan/Séné (2 couples avec 10 et 6 pulli), mais c'est dans la première décade de juin qu'ils sont surtout observés : le 2 à Yffiniac, le 7 à Moyalo, etc.. Encore des poussins de 8 jours le 7 juillet en rivière d'Etel (56).

Ille-et-Vilaine.- Pas de données en dehors des rassemblements de l'île des Landes.

Côtes-du-Nord.- 3 couples en baie de Baussais/Saint-Jacut le 14 mai ; en baie de la Fresnaye, 2 couples le 15 avril, 11 ind. le 10 mai, 8 ad. et 8 pulli le 22 juin ; en baie d'Hillion, 1 couple visite la falaise le 20 mai ; en baie d'Yffiniac, 8 ad. le 30 avril, les 8 et 27 mai, 5 ad. dont 1 couple menant 9 pulli de 8 jours le 2 juin, 8 ad. et deux groupes de poussins (8 de 8-10 jours et 2 de 15-20 jours) le 8 juin ; 1 couple à Pleudihen le 11 avril ; 1 couple et 1 juv. sur Enez Plat/Sept-Iles le 11 juillet ; au Sillon du Len/Louannec, les observations s'arrêtent en fin-avril et doivent concerner des oiseaux nichant sur les îles voisines (Sept-Iles, Taveeg ?).

Finistère.- 1 couple à l'embouchure de l'Aber Benoit le 20 mai ; 10 ind. sur l'île Beniget/Molène le 11 juin ; 3 ind. sur Banneg/Molène le 23 avril ; 2 couples avec 1 et 6 pulli en rivière du Faou le

26 juin ; 2 couples avec 8 et 10 pulli dans l'anse de Keroulé/L'Hopital-Camfrout le 26 juin ; 1 couple avec 15 pulli, 1 ad. et 7 imm. sur l'Aulne/Mogona-Quimerch le 26 juin ; 1 à 4 ad. régulièrement en rivière de Pont-l'Abbé en mai-juin-juillet ; à l'étang de Kernoor/l'Ile Tudy, 2 couples et 1 ♂ le 2 mai, 2 couples le 3 mai, 1 couple le 14 mai, 11 ad. les 7 et 9 juillet.

Morbihan.- 1 ♂, 2 ♀ et 9 pulli de 8 jours en rivière d'Étel le 7 juillet ; dans les marais de Séné, 2 couples et 9 ad. le 21 avril, 2 couples avec 6 et 10 pulli à Dolan le 5 mai, 3 couples (3 et 4 pulli) le 10 juin, 30 ind. le 12, 26 le 15, 25 le 26 juin à Dolan, 2 ad. et 16 juv. le 30 juin ; 1 couple à Bailleron le 13 juin ; 30 dont 27 pulli à Liréy/Noyalo le 8 juin ; 1 couple régulièrement à Trely/Surzur ; 1 couple au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc ; 6 couples dans l'embouchure de la Vilaine le 2 mai (22, dont 1 juv. en ce lieu le 8 juillet) ; 1 couple au Haut-Penestin le 23 mai ; 12 ad. à l'île Bacchus (Pointe du Bile) le 27 mai. Notons aussi 2 ind. sur Hoëdic le 13 avril.

Loire-Atlantique.- Dans les marais de Guérande, 3 couples le 30 avril, 2 couples au Grand-Bal le 2 mai, 1 couple et 2 pulli de 15 jours à Congor le 24 juin ; notons aussi 11 (couples formés) à l'île Dumet le 20 mai, 15 au Petit Traict du Croisic le 24 juin et 13 à la Turballe le 8 juillet.

Dans l'ensemble, les données sur la nidification et la répartition sont assez minces et les effectifs des principaux secteurs ne sont pas calculables.

On peut aussi remarquer que les données de juillet portent sur des groupes relativement faibles, alors que l'on pourrait s'attendre à de grands rassemblements de juvéniles. La pression touristique y est-elle pour quelque chose ou y-a-t-il déplacement vers des lieux d'estivage (et de mue) dès cette époque ?

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) 252 données

Aucune évidence de passage en mars, malgré 51 à Toulvern/Baden (56) et 100 au Cranic/Brac'h (56) le 16. A cette époque, les oiseaux sont déjà sur leurs lieux de reproduction et les ♂ commencent à se regrouper dès la fin du mois, mais surtout en avril-mai. Un décompte systématique des ♂ ainsi rassemblés pendant la couvaison et l'élevage des poussins, serait à la limite, le meilleur moyen de se faire une idée assez précise des effectifs nicheurs d'un secteur donné, voire d'une région entière. Notons simplement une observation en mer : 1 le 29 avril en baie de Morlaix.

Relayer les localités où la reproduction a été prouvée ou supposée équivaldrait, ou presque, à dresser l'inventaire des communes de Bretagne. Nous nous contenterons de noter quelques données sur la nidification : pulli notés le 5 avril à Porh Yoh/Belle-Ile (56), le 10 au service d'eau de Belle-Ile, début-avril au Duer/Saint-Colombier (56),....

le 30 juin à Priziac (56), le 1er juillet au Pin (44) (en tout 25 données concernant des poussins, surtout entre le 15 avril et le 15 mai).

Les premiers (6 ind.) sont notés le 29 juin dans le Golfe du Morbihan, mais c'est surtout en juillet que les bandes se forment: 80 le 5, 350 le 14 en soirée (chasse en Brière) dans le Golfe; 44 le 4, 123 le 10, 105 le 12 au Curnic/Guissény (29N); 110 le 11 à Ménéham/Kerlouan (29N); 25 le 12 et 50 le 13 sur la palud de Goulven (29N), 30 le 4 et 70 le 14 à Trevignon/Trégunc (29S), 45 le 1er juillet au Pin (44).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) 57 données

48 de ces données sont groupées avant le 17 avril et concernent la fin de l'hivernage et quelques petits passages en fin-mars: 30 le 16 mars et 40 le 21 dans le Golfe du Morbihan; 50 le 17 mars, 52 le 23, 46 le 25 à l'étang des Salles/Perret (56); 40 le 18 mars à l'étang de la Taberge/Sainte-Anne-sur-Vilaine (35), 36 à l'île Arouix/Mauves (44) le 19; 370 le 24 mars, 175 le 7 avril au Roch Du/Crach (56); 30 au Curnic/Guissény (29N) et 50 à Ménéham/Kerlouan (29N) le 28 mars, 40 à Beg Lann/Sarzeau (56) le 1er avril, 11 au Vioreau (44). Par la suite et jusqu'au 17 avril, les groupes observés sont faibles: 8 au Curnic du 8 au 13, 4 à 6 ind. (couples) à St-Renan (29N), 20 à St-Joachim (44) le 14, 3 couples à l'étang de Gourveaux/St-Gilles-Vieux-Marché (22) le 14.

Quelques oiseaux s'attardent ensuite, certains jusqu'à fin-mai: 2 couples à Saint-Renan le 22 et le 25 avril, 1 ♂ et 2 ♀ au Roch-Du (56) le 5 mai, 1 couple à l'étang de Saint-Conan (22) le 21 mai, 2 ♂ à Saint-Jean/Mendon (56) le 26 mai.

A l'exception d'1 ind. à l'étang de Goulven (29N) le 6 juillet, les autres observations (3) sont faites en fin-juin et juillet au Yeu-Elez (29N) et concernent des nicheurs: le 29 juin, 2 couples et 2 chanteurs (1 couple avec poussins); les 11 et 14 juillet, quelques oiseaux notés.

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) 15 données

Une première série de 10 observations au début du printemps, la plupart dans le Morbihan: 1 couple à Suscinio/Sarzeau (56) les 17 et 28 mars; 2 ♂ le 20 mars à Saint-Jean/Mendon (56); 1 ♂ le 20, 1 ♂ et 1 ♀ les 22, 27, 28 mars et 1er avril à Lannec/Ploemeur (56); 2 ind. au Duer/Saint-Colombier (56) le 8 avril; 2 ♂ et 3 ♀ le 14 avril à l'étang de Gourveaux/Saint-Gilles-Vieux-Marché (22). On note aussi 4 ind. (dont 2 ♂) au lac de Grand-Lieu (44) le 17 avril. Après un accroissement des apparitions hivernales ces dernières années, le Chipeau est en train de devenir un hôte régulier en nombre croissant en hiver et, montre un passage automnal et même pré-nuptial (l'observation des Côtes-du-Nord l'illustre parfaitement).

Mais "l'évènement" (prévisible depuis l'an dernier) est sans doute la découverte d'une ♀ accompagnée de 5 poussins de 15 jours au lac de

Grand-Lieu le 30 juin ; auparavant, 3-4 ind. y avaient été observés le 8 juin, ce qui rend plausible la nidification d'un ou plusieurs autres couples. Deux autres localités ont fourni des observations en juin : 6 (dont 1 couple) à Trenvel/Treogat (29S) le 9, noté le 15 ; 1 couple à Toulvern/Baden (56) le 10. Peut-être faut-il s'attendre à voir le Chipeau nicher en d'autres points de Bretagne dès l'an prochain.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) 22 données

Fin d'hivernage : 100 au Cranic/Brech (56) et 30 à Toulvern/Baden (56) le 16 mars, 21 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 19 et le 21 ; 51 le 21 mars, 25 le 30, 16 le 16 avril à Saint-Jean/Mendon (56), encore 12 le 5 avril et 5 le 9 à l'étang du Pont, 9 au marais du Duer/Saint Colombier (56) le 8 avril. Un petit passage est aussi noté avec 1 couple à Saint-Renan (29N) du 18 au 22 mars et à l'étang de Gourveaux/Saint-Gilles-Vieux-Marché (22) avec 3 couples le 23 mars.

Encore trois observations dans la dernière décade d'avril : 2 couples le 22 et 1 couple le 30 au Duer (56) et 5 le 28 à Saint-Jean/Mendon (56). Enfin, 1 à Saint-Jean le 26 mai.

CANARD PILET (*Anas acuta*) 29 données

Quelques données sur les lieux d'hivernage : 12 en baie de Saint-Brieuc (22) le 18 mars, 7 dans l'embouchure de la Vilaine (56) le 18 mars. Toutes les autres traduisent le passage pré-nuptial, surtout sensible sur les étangs et marais côtiers. 20 données dans la deuxième quinzaine de mars, 7 dans la première quinzaine d'avril, 2 dans la dernière décade d'avril : 10 couples à Toulvern/Baden (56) le 16 mars, 3 le 17 mars et 4 le 8 avril à Trenvel/Treogat (29S), 12 couples à l'étang de la Taberge/Sainte-Anne-sur-Vilaine (35) le 18 mars, 4 le 19 mars, puis 3 les 21 et 22 mars et 1 les 5 et 9 avril à l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 3 couples le 22 et 2 couples le 30 à Dolan/Séné (56), 7 à l'étang d'Ambon (56) le 25 mars, 5 à Suscinio/Sarzeau (56) le 25 mars, 4 à Dangan et 3 à Noyal (56) le 30 mars, 3 au Duer/Sarzeau (56) le 8 avril, 3 à Trévignon/Trégunc (29S) le 11 avril, 2 couples en baie de la Fresnaye (22) les 13 et 15 avril. Enfin, 1 couple au Duer (56) le 22 avril et 1 ind. au Bindre/Séné (56) le 27 avril.

SARCELLE D'ETE (*Anas (Anas) querquedula*) 134 données

Répartition des données dans le temps et l'espace : Deuxième quinzaine de mars : 45 données en 24 localités, dont 7 intérieures ; première quinzaine d'avril : 29 données en 18 localités, dont 5 intérieures ; deuxième quinzaine d'avril : 20 données en 14 localités, dont 2 intérieures ; première quinzaine de mai : 17 données en 12 localités, dont 4 intérieures ; deuxième quinzaine de mai : 10 données en 8 localités, dont 1 intérieure ; première quinzaine de juin : 5 données en 4 localités côtières ; seconde quinzaine de juin : 3 données en 3 localités côtières ; première quinzaine de juillet : 8 données en 7 localités côtières.

Bien que surtout fort en mars et à un moindre degré jusqu'à mi-avril, le passage se poursuit jusqu'à mi-mai (Saint-Renan, Yeun-Elez) : 19 à Kervran/Plouhinec (56), 12 couples à l'étang de la Taberge/Sainte-Anne-sur-Vilaine (35) le 18 mars, 8 à Kervoyal/Dangan (56) et 18 à la Brousse/Sarzeau (56) le 18 mars, 2 couples au Band/Henvic (29N) les 19 20 et 21 mars, 17 à Lannec/Ploemeur (56), 10 au Loch/Guidel (56) et 8 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 19 mars, 7 à l'étang de Plounérin (22), 7 à Trévignon/Trégunc (29S), 35 à Kervran (56), 3 couples à Saint-Renan (29N) le 21 mars, 4 couples à Saint-Renan et 20 au Loch/Guidel (56) le 22, 10 à Ambon (56), 24 à Kervran, 10-12 à Suscinio/Sarzeau (56) et 8 à la Tour-du-Parc (56) le 25, 10 au Lac de Murin (44) le 27, 4 couples à la Brousse/Sarzeau le 28, 7 couples à Noyal (56) le 30, 6 à Trévignon le 31 mars, 7 à Trévignon le 1er avril, 8 à la Brousse le 3, 5 au Roch Du/Crach (56) le 7, 20 à Trenvel/Trégogat (29S) et 4 à l'étang du Pont le 9, 12 à l'étang du Pont et 11 au lac de Murin le 10, 7 à Trévignon et 2 couples à Saint-Renan le 11, 22 à Saint-Vio/Trégunc et 15 à Trenvel le 14, 1 couple à Belle-Ile et 2 à Hoedic (56) le 15, 10 à l'étang du Pont et 3 à Hoedic le 16. Par la suite des groupes fondent : 3 à Langonnet (56) et 3 à Ambon le 17, 2 à Saint-Renan le 25, 3 ♂ en ce lieu le 1er mai, 2 à l'étang du Pont, 1 couple à l'Etier/Langon (35) le 1er mai, 2 au Yeun-Elez (29N), et 1 couple à Saint-Renan le 13 mai, 2 ♂ et 1 ♀ à Saint-Renan le 17. Ces deux dernières localités n'ayant pas fourni de données ensuite malgré de fréquentes visites, doivent être écartées de la liste des localités de reproduction possible pour cette année. Ceci nous apprend au moins que le passage est plus étalé qu'il ne semblait et qu'il convient d'être prudent dans l'interprétation des observations de mai lorsqu'elles ne concernent que des adultes ne manifestant aucun comportement de nicheurs.

En fait, les preuves de reproduction sont très peu nombreuses. En baie d'Audierne (29S), 1 nid contenant 9 oeufs est trouvé le 24 avril à Trenvel, un autre 2 oeufs le 20 mai à Saint-Vio, 1 ♀ mène 9 poussins à Saint-Vio le 20 mai également. Par ailleurs, 1 ♂ alarme le 26 mai à l'étang de Saint-Jean/Mendon (56) ; à Kervran/Plouhinec (56), plusieurs oiseaux sont régulièrement notés en mai-juin-juillet, de même à Trévignon/Trégunc (29S). Quant aux observations des marais de Guérande (44) et de Saint-Etienne-de-Montluc (44) en fin-mai, elles suffisent à peine à envisager la reproduction. De même, les observations de juillet peuvent se rapporter à un début de dispersion plutôt qu'à des nicheurs locaux : 1 ♀ à la Tour-du-Parc (56) le 3, 5 au Curnic et 2 à Poulguidou (29S) le 10, 10 au Curnic et 5 à l'étang du Pont le 12 ; Poulguidou est tout proche des marais de la baie d'Audierne, le Curnic et l'étang du Pont près de Ménéhan où la reproduction est connue depuis longtemps et qui n'est pas très prospecté.

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) 83 données

Le passage se déroule essentiellement avant le 15 avril, avec quelques attardés jusqu'au 25 avril. Maximum dans la dernière décade de mars et les premiers jours d'avril. Nombre

des données par quinzaine : Mars 2 : 40 données en 23 localités, dont 6 intérieures ; première quinzaine d'avril : 31 données en 19 localités, dont 9 intérieures. On note : 9 le 17 mars, 6 le 25 à l'étang des Salles/Perret (56) ; 40 le 17 mars, 80 le 26 mars et le 1er avril, 25-30 le 9 avril à Trenvel/Treogat (29S) ; au moins 50 le 18 mars, 14 le 27 mars, 9 le 10 avril au lac de Murin (44) ; 10 le 20 mars à Lannec/Ploeneur (56) ; 25 le 20 mars, 30 le 31 mars et le 3 avril, 16 le 12 avril, au marais de Calzac/Sarzeau (56) ; 50 le 25 et 34 le 27 mars en baie de Suscinio/Sarzeau (56) ; 9 à Dolan/Séné (56) le 20 mars, 8 à Toulven/Baden (56) le même jour ; 5 le 22 mars, 13 le 5 avril, 5 le 9 avril, 4 le 10 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) ; 60 le 28 mars à Ménéham/Kerlouan ; 5 au Poulbéc et 10 à Keraveon (dunes d'Erdeven - 56) le 31 mars ; 18 au Yeun-Elez (29N) le 5 avril ; 40 au lac de Grand-Lieu (44) le 7 avril, 6 couples à l'île Arouix/Mauves (44) le 15 avril. Après cette date, six observations en deux points du Léon jusqu'au 25 avril : 6 les 16, 17 et 20 avril, 1 couple les 24 et 25 à St-Renan, et 2 couples à l'étang du Pont le 20.

1 couple est observé le 13 mai au lac de Murin (comportement de nicheurs), 1 ♂ le 27 mai à l'étang de Kervran/Plouhinec (56). La nidification n'est prouvée qu'en baie d'Audierne (1 ♀ mène des poussins le 19 mai), mais nous ignorons les effectifs de ce secteur. Il est aberrant qu'aucune observation n'ait été faite après le 27 mai.

FULIGULE MILLOUIN (*Aythya ferina*) 83 données

Le départ des hivernants se termine en mars, quelques oiseaux s'attardant ou passant encore dans la première quinzaine d'avril, certains plus tard. Parmi les 55 données du 16 mars, au 15 avril, on note : 6 le 16, 9 le 18 et 3 le 23 à Kerogan/Quimper (29S), 30 le 17 et 5 le 30 à Trenvel/Treogat (29S), 20 le 17, 6 le 23 à Merléac (22), 18 le 17 à l'étang des Salles/Perret (56), 14 le 18 à l'étang de la Taberge/Ste Anne-sur-Vilaine (35), derniers le 22 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) et à Saint-Renan (29N), 11 le 20 à Lannec/Ploeneur (56), 9 le 20, 5 les 24 et 25 au Cranic/Brech (56), 5 le 30 à Trenvel/Treogat (29S) ; derniers isolés le 30 mars à Noyal, le 31 à Sarzeau (56), le 1er avril à Lannec, le 3 au Vioreau (44) (3 ind.), le 9 à Kerhuon (29N), le 14 à Merleac (3 ind.), alors qu'un ♂ séjourne jusqu'au 27 avril à Rosporden (29S).

Plusieurs localités ont été fréquentées tardivement par des Milouins : à Trenvel (baie d'Audierne), 2 ♂ les 4 et 6 mai, 3 ind. le 27 mai, 1 ♂ le 12 juin, 1 ind. le 1er juillet, 1 ♂ et 2 ♀ le 9 juillet ; à Kervran/Plouhinec (56), 2 couples le 30 avril, 1 ♂ le 3 juin ; à Saint-Renan (29N), 1 ♀ les 1er, 16 et 17 mai et le 27 juin ; à l'étang du Beffou (22), 1 couple le 21 mai, 1 ♀ le 26 mai ; à l'étang de Noyal (56), 1 couple le 25 mai, 1 ♂ le 3 juillet ; au Yeun-Elez (29N), 4 ♂ le 20 mai, 10 ♂ et 1 ♀ le 28 juin, 4 ♂ et 2 ♀ le 11 juillet, 4 ♂ le 14 juillet.

Nidification.- Au lac de Grand-Lieu, 4 ad. et 7 poussins en fin-mai ; à l'étang du Boulet/Feins (35), 1 ♀ mène 2 poussins le 5 juillet.

L'observation des 10 ♂ au Yeun-Elez le 28 juin pourrait bien marquer le début de la dispersion, de même que le ♂ de Noyal le 3 juillet ; 1 ♂ à Trévignon/Trégunc (295) le 15 juillet (absent auparavant).

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 93 données

Le schéma est très proche de celui du Milouin, le départ des hivernants se faisant surtout en mars avec quelques attardés dans la première quinzaine d'avril. Un passage s'y superpose avec des oiseaux séjournant en quelques points jusqu'à mi-mai ou même fin-mai.

Répartition des données par quinzaine : mars II : 36 données en 18 localités, dont 8 intérieures ; avril I : 20 données en 11 localités, dont 6 intérieures ; avril II : 11 données en 3 localités finistériennes dont 2 seront fréquentées tout l'été ; mai I : 8 données en 4 localités dont les trois de la quinzaine précédente ; mai II : 6 données en 4 localités dont deux des précédentes ; juin I : 5 données dans les 2 localités finistériennes ; juin II : 2 données, mêmes localités ; juillet I : 3 données, 3 localités finistériennes.

Avant le 15 avril, on note : 40 le 16 mars, 35 le 18, 32 le 19, 20 le 25 à Kérogan/Quimper (29S) ; 100 le 17 mars, 26 le 2 avril, 9 le 9 avril, 5 le 14 à Trenvel/Tréogat (29S) ; 30 le 17 mars à Rosporden (29S) ; 36 le 17 mars, 16 le 23, 9 le 25 mars, 5 le 14 avril à l'étang des Salles/Ferret (22) ; 4 le 18 mars, 16 le 21, 6 le 22, 4 le 25 et le 28 mars, 4 le 11 avril à Saint-Renan (29N) ; 17 le 18 mars, 4 le 25 à Kervran/Plouhinec (56) ; 17 le 20 mars, 1 seul le 27 et le 28 à Lannec/Ploemeur (56) ; 33 le 17 mars, 30 le 21, 27 le 24, 20 le 31 mars, 17 le 1er avril, 7 le 8 avril, 10 le 11, 8 le 14 à Trévignon/Trégunc (29S) ; 15 le 23 mars à l'étang des Fourneaux/Mur-de-Bretagne (22) ; 20 le 23 mars, 5 le 14 avril à l'étang de Merléac (22) ; 6 le 3 avril et 5 le 9 à Kerhuon (29N), 7 le 5 avril au Yeun-Elez (29N), 3 couples à l'étang de Combourg (35) le 8.

Ensuite, il faut distinguer deux séries de données. Les premières concernent des oiseaux séjournant jusque dans la seconde quinzaine de mai en de rares points : à Saint-Renan, 1 ♂ du 16 au 21 avril, 2 ♂ du 22 au 24, 2 ♂ et 1 ♀ le 25, 2 ♂ les 1er, 13, 16 et 17 mai, puis disparition ; les 3 ♀ de Kerhuon (29N) le 3 mai montrent que des oiseaux continuent de passer ; de même, observation sans lendemain d'un ♂ au Duer/Sarzeau (56) le 25 mai. La présence de 2 ♂ et 2 ♀ sur l'étang du Beffou les 21 et 26 mai ne peut être interprétée. Cet étang n'étant à peu près jamais visité. La deuxième série d'observations est réalisée en deux points du sud-Finistère où des oiseaux séjournent jusqu'en été : à Trenvel (baie d'Audierne), 9 le 16 avril, 5 le 24, 2 ♂ et 4 ♀ le 4 mai, 1 ♂ et 2 ♀ le 12 juin, 1 ♀ le 24 juin, 2 ind. le 1er juillet. Si ces observations ne permettent pas d'envisager une nidification, celles de Trévignon/Trégunc sont plus intéressantes puisqu'elles prouvent la reproduction d'au moins 2 couples, probablement 3 : 3 couples cantonnés le 28 avril ... 2 ♀ accompagnées respectivement de 9 et 11 grands poussins le 28 juin, 1 ♀ avec 4 poussins le 3 juillet (il semble peu probable que cette dernière observation concerne une des familles du 28 juin).

Enfin, 2 ♂ en mue à l'étang du Pin (44) le 1er juillet, 1 ♂ le 11 juillet au Yeun-Elez montrent sans doute le début de la dispersion.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) 1 ♂ (sans doute aussi 1 ♀) le 27 mai à l'étang de Suscinio/Sarzeau (56).

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*) 7 données

6 de ces données concernant des oiseaux passant devant la pointe du Croisic (44) : 2 ♂ et 2 ♀ vers le sud le 15 avril, 8 vers le nord le 28 avril, 1 couple posé sur l'eau le 29, 1 ♂ et 1 ♀ vers le sud le 30 avril, 1 ♂ et 1 ♀ vers le sud le 12 mai, 1 ♂ vers le sud le 20 mai. En outre, 1 ♀ devant Gâvres (56) le 30 juin.

Les observations du Croisic remettent en mémoire le problème de la reproduction sur l'île de Pierre-Percée.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) 32 données

150 le 31 mars à Robellan/Erdeven (56).
Le passage est surtout senti dans la première quinzaine d'avril : 600 à Penvins et 150 à Beg Lann/Sarzeau (56) le 1er, 140 à Dangan (56) le 2 ; passages vers le nord à la pointe du Croisic le 1er, le 15, le 17, à Groix (56) le 1er ; passage nocturne au-dessus de Brest (29N) le 5 avril ; des groupes se posent en des endroits inhabituels : 6 le 6 en baie de Kerogan/Quimper (29S), 5 sur l'étang de Combours (35) le 8.

Très peu après le 20 avril : 10 le 20 entre Houat et Hoédic (56), 3 le 21 à Dangan (56), 4 vers le nord au Croisic le 28, 1 même endroit le 9 mai, 11 en baie du Croisic le 13, 40 vers le nord et 20 vers le sud à la pointe du Croisic le même jour ; 3 vers le nord au même endroit le 18, 1 ♂ et 1 ♀ à Piriac (44) le 20, 120 en baie de Saint-Brieuc (22) le 21.

Rien ensuite, excepté 5 en vol vers l'embouchure de la Penzé (29N) le 18 juin.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) 12 vers le nord-ouest à la pointe du Croisic (44) le 15 avril.

HARELDE DE MIQUELON (*Clangula hyemalis*) 3 ♂ en baie de Saint-Brieuc (22) en fin-mars.

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*) L'hivernage se termine brusquement dans le Golfe du Morbihan : 120 le 16 mars, 40 le 19, 50 le 21, 2 le 26 mars. Par ailleurs, 5 en Penzé (29N) le 18 mars.

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*) 29 données

Toutes les observations sont groupées avant

le 15 avril. Dans le Golfe du Morbihan, 180 le 16 mars, 170 le 21, 120 le 26, 100 les 5 et 6 avril, 80 le 10 avril ; encore 77 en baie de Daoulas (rade de Brest) le 3 avril. On note aussi 40 à Dangan (56) le 2 avril, 12 en baie de Morlaix (29W) le 3, 17 à Penlan/Billiers (56) le 6, 20 à Saint-Philibert (56) le 8, 9 au petit traict du Croisic (44) et enfin 17 à Carnac (56) le 15.

"AIGLE" SP. (*Aquila sp.*) Un aigle a été observé le 17 juin au réservoir de Vioreau (44). Les descriptions et les conclusions de l'auteur font penser à un Aigle criard (*Aquila clanga*) immature.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 133 données

Ille-et-Vilaine.- 4 ind. en forêt de Villecartier le 16 mars, 3 paraden en forêt de Rennes le 29 avril, 1 couple le 23 mai à l'étang de Paimpont.

Côtes-du-Nord.- 2 à l'étang des Salles/Perret le 23 mars ; 1 couple parade le 3 avril à Jugon ; 2 ind. à Saint Brandan le 14 avril ; 2 couples en forêt de Saint Aubin le 10 mai ; 2 ind., cris et ancienne aire en forêt de Boquen et 1 couple à la Hardonais le 12 mai ; 2 ind. au Plessis, le 11 juillet ; 2 dans les gorges du Daoulas le 11 mai.

Finistère.- Nidification, établie à St-Rivoal (2 aires avec oeufs le 15 avril, 2 poussins prêts à l'envol le 30 juin), au Cloître St-Thégonnec (1 aire avec 1 oeuf le 28 avril et 1 poussin de 1-2 jours le 3 juin), à St-Cadou (1 aire le 11 avril), à Pleuven (1 aire avec 2 oeufs le 15 avril), à Lanroz (1 aire), au bois de Kerminaoët/Trégunc (1 couveuse sur l'aire le 9 mai), à St-Goazec (4 couples avec juv. observés en juillet).

2 ind. observés à Ti Bleiz/Yeun Elez le 5 avril ; 2 à Hanvec le 13 ; 3 à Pleuven le 20 et 4 au Labou dans les Monts d'Arrée le 29 ; 1 couple en forêt de Fréau le 19 mai ; 3 ind. bois de Gouspagn/Dineault le 26 juin ; 2 le 5 juillet au Tréhou ; 1 à la Forest-Landerneau le 23 mars.

Morbihan.- 2 ind. à Cadoudal/Plumelec le 21 mars ; 3 à l'étang au Duc/Ploërmel le 7 avril ; 1 couple au bois de Kerfily/Trédion le 12 avril ; 2 ind à Théillac le 17 avril. Parades notées le 7 avril (1 couple à Péaule), le 12 (1 couple au bois de Hanvaux) et le 29 (1 couple au bois de Meucon). Nidification notée sur les lieux habituels : le 3 juin : 1 aire avec 1 poussin de 15 jours au bois de Meucon, 1 aire avec 1 poussin de 15-20 jours en forêt de Floranges, 1 aires avec 2 poussins de 5-10 jours en forêt de Camors, 1 aire avec 2 poussins prêts à l'envol en forêt de Pluvigner, 1 aire avec 3 poussins de 20-30 jours à Languidic. Le 8 juin : 1 aire avec 2 poussins à Plouray.

Loire-Atlantique.- Au réservoir de Vioreau : 5 ind. le 3 avril, 6 le 2 juin, 9 le 13 juin ; 1 couple parade le 9 avril en forêt du Gâvre ; 1 couple en forêt de Pavé le 25 mai ; 1 couple et 1

aire avec fientes en forêt du Cellier le 3 juin ; 2 ind. à l'étang du Grand Rocher et 2 à l'étang du Petit Rocher le 16 juin ; un nourrissage observé à l'étang d'Aumée le 16 juin ; 1 couple le 20 juin à St Aubin des Châteaux ; 1 juv. en forêt de Domaiche/Lusanger le 3 juillet.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) 21 données

Ille-et-Vilaine.- 1 ind. le 24 mai aux Buttes de Tiot/Painpont.

Finistère.- 1 aire vide le 20 mai à Ergué-Gabéric ; 5 poussins bagués à Guilligomarc'h le 13 juin ; 1 ind. le 12 juillet à Créac'h Queta/Pleuven.

Morbihan.- Bois de Calzac/Sarzeau 1 ♀ le 31 mars et le 22 avril ; le 9 avril 1 aire avec oeufs détruite à Cléguer ; 1 ind. le 23 avril à Flescop ; 1 le 6 mai à Branhéré/Guernon ; 1 ♀ tuée sur son aire à Sulniac le 13 mai ; 1 ♀ le 25 mai dans les marais de Trély/Surzur ; 1 ind. le 26 mai à l'étang de St-Jean/Mendon ; 1 à l'écluse de Rieux/St-Congard le 10 juin ; 3 à Kerdoullouën/Marzan le 17 juin ; 1 au bois de Colpo le 9 juillet.

Loire-Atlantique.- 1 ind. en forêt de St-Mars/La Poitevinnière le 3 avril ; 1 ♂ en forêt du Givre le 4 avril ; 1 ind. chasse en forêt du Cellier le 19 avril ; au Vioreau, 1 ♀ le 13 juin et 1 ♂ avec transport de proie, le 20 juin.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) 4 données

Parades notées : au bois de Kéronic/Pluvigner (56) le 18 mars (1 couple) ; en forêt de Camors (56) le 20 mars (1 couple), le 20 mai à les Godarts/l'Hermitage-Longe (22) (2 ind.).

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) 22 données

1 ind. le 25 mars à Montoir (44) ; 1 à Kervran/Plouhinec (56) le 30 avril ; 1 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 1 mai ; à Pen-en-Toul/Larmor-Baden (56), 1 le 15 mai et 2 le 16 mai ; 1 en vol le 28 juin, à Grand-Champ (56).

Nidification : - notée à Grand-Lieu (20 couples nicheurs en mai) ; le 17 avril, 10 avec cris et chants à St-Aignan ; 1 couple avec parades et offrandes le 3 juin à Passay ; 2 aires situées dans des pins à St-Aignan le 13 juin.

- probable au Vioreau où l'espèce est notée régulièrement du 2 juin au 8 juillet.

- probable en plaine de Mazerolles où deux "sites" sont notés le 23 juin.

BONDREE APIVORE (*Peris apivorus*) 18 données

Première arrivée le 17 avril : 1 au lac de Grand-Lieu/St-Aignan (44).

Ille-et-Vilaine.- 1 à Beauvais/Painpont le 25 mai ; 1 vers le nord à Beaulieu/Rennes le 28 mai.

Côtes-du-Nord.- 2 le 21 mai au bois de Coat-Liou/Bourbriac ; 1 en forêt de Lorges le 15 juin ; 1 le 17 juin sur la lande de Fréhel/Plévenon.

Finistère.- 1 à Toul-ar-Coat/le Faou le 6 juin ; 2 le 26 juin au bois du Folgoat/Landevennec ; 1 le 9 juillet, à Trévarha/Seuzec.

Morbihan.- 1 le 15 juin au Ter/Ploemeur ; 2 le 11 juillet au bois de St Bily/Plaudren ; 1 le 13 juillet à la Butte-au-Tertre/St Dolay.

Loire-Atlantique.- 1 en forêt de Vioreau le 13 juin ; 1 le 21 juin à la Roulais/Jans ; 1 en plaine de Mazerolles le 23 juin ; 1 à l'étang de Kernevy/Misillac le 24 juin.

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) 51 données

Une seule observation hors des sites habituels de reproduction : 1 ♀ au Curnic (29N) le 19 mai.

Nidification.-

Morbihan.- Presqu'île de Rhuys : 2 ♂ et 2 ♀ à Suscinio/Sarzeau le 17 mars ; 1 couple le 28 mars à Suscinio ; 1 ♀ le 7 avril à l'étang de Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys ; 1 ♀ transporte des matériaux à Suscinio le 8 avril ; 2 juv. à Suscinio le 2 juillet ; 1 ♀ à Rodaval/le-Tour-du-Parc le 4 juillet.

Plouhinec : 1 couple parade le 25 mars à Kervran ; l'espace sera notée régulièrement à Kervran ; Kerzine et Len Vraz d'avril à juillet.

Marais de la Vilaine : 1 ♂ cantonné le 17 avril dans les roseaux en aval du Pont de Cran/Théhillac.

Loire-Atlantique.- Brière : 4 ♂ et 3 ♂ à St-Joachim le 14 avril, 3 ind. le 13 mai.

Lac de Grand-Lieu : 2 ind le 17 avril, 1 ♀ le 3 juin, 3 ind le 13 juin.

Lac de Murin : 1 ♀ ou 1 imm (?) le 18 mars, 1 ind. le 25 mai, 2 le 19 juin.

Marais de Machecoul : 1 ♀, transport de matériaux, le 29 avril

Plaine de Mazerolles : 1 ♀ et 1 juv. le 23 juin.

Etang du Pont de Fer/Asserac : 1 ♂ et 1 ♀ le 8 juillet.

BUSARD "CUL BLANC" (*Circus cyaneus/pygargus*) 9 données

1 ♀ à Kerguerh/Belle Ile (56) le 24 mars, 1 ♀ le 19 avril à Kergloannec/Ambon (56) 1 ♀ chasse au

Curnic/Guissény (29N) et 1 à Beauvais/Paimpont (35) le 24 mai, 1 ♂ à Trenvel/Tréogat (29S) le 1 juillet, 1 ♀ le 11 juillet aux landes de Lanfains (22).

BUSARD ST-MARTIN (*Circus cyaneus*) 6 données

3 ♀ et 1 ♂ le 17 mars à Suscinio/Sarzeau (56), 1 ♀ à Dolan/Séné (56) le 18 mars.

Nidification.- 1 couple nicheur au Labou/St-Rivoal (29N) ; 1 ♀ transporte une proie le 27 juin.

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*) 63 données

Premières observations : le 13 avril, 1 ♂ à la Roche St-Barnabé/le Cloître-St-Thégonnec (29N) ; le 14 avril, 3 ♀ et 1 ♂ à St-Joachim (44).

Nidification et sites occupés.-

Côtes-du-Nord.- Landes de Lanfains : 1 couple ; aire avec 4 poussins contrôlée le 22 juin.

Landes de Locarn/St Nicodème : 2 couples ; parades notées le 26 mai.

Finistère.- Le Cloître-St-Thégonnec : 1 couple ; aire avec 3 poussins contrôlée le 17 juin aux Cragou.

Yeun-Elez : 1 couple le 2 juin

St-Vio : 1 couple le 9 juin

Menez Hon : 1 couple et 2 ♂ cantonnés le 31 mai.

St-Goazec : 2 couples nicheurs autour de Castel-Rufel

Clédén - Cap Sizun : 1 couple régulièrement observé

En outre 1 ♂ dans les marais de Penmarc'h le 4 mai ; 1 ♀ à Berbougais/Plougonvelin le 15 mai et 1 ♀ à la pointe de Kermorvan/le Conquet le 16 mai (la même ?).

Morbihan.- Landes de Grand-Champ : 2 couples minimum ; une aire contrôlée à Parc Menah le 29 juin contenant 4 poussins et 1 œuf clair ; une aire à Fetenio/Brandivy avec 4 poussins le 30 juin.

Dunes de Plouhinec : 2 couples le 6 mai ; parades et accouplement notés le 26 mai.

Presqu'île de Rhuys : 1 couple minimum.

Elven : 1 couple le 29 mai

Belle-Ile : 2 couples minimum

1 ♂ régulièrement observé dans la région Bailleron/Séné.

Loire-Atlantique.- Marais de Guérande : 1 ♂ et 2 ♀ le 21 mai ; essai de nidification sans succès , dans un pré, noté le 27 mai ; 1 ♂ le 29 avril dans les marais de Machecoul ; 1 ♂ dans la plaine de Mazerolles le 23 juin et 2 ind. dont 1 ♂ le 28.

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC (*Circus gallicus*) 1 ind. le 29 avril au Labou dans les Monts d'Arrée (29N).

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*) 2 données
1 ad. au réservoir de Vioreau le 2 juin ; 1 en rivière de Pont-l'Abbé (sans précision de date).

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*) 10 données
1 chasse à St Mars de Coutais (44) le 29 avril ; 1 vers le nord le 11 mai dans les landes de Lanfains (22) ; 1 au Yeun Elez le 13 mai ; 1 en vol à Piriac (44) le 20 mai ; 1 à Saint-Aignan (44) le 13 juin ; 1 à la Munaudière/St-Aubin-des-Châteaux (44) ; 1 à Dolan/Séné (56) le 30 juin ; 1 couple (le ♂ chasse les hirondelles) à la Musse/Boulon (35) le 7 juillet ; 1 poursuit des vanneaux et 1 corneille le 12 juillet dans les polders du Mont St-Michel (35).

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) 4 données
1 le 17 mars, route de St Arnel/Sarzeau (56) ; 1 vers le nord le 25 mars dans les dunes de Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys (56) ; 1 ♂ le 20 juin à Dolan/Séné (56) ; 1 chasse les alouettes et les étourneaux sur les herbus face à Cherruël en baie du Mont Saint-Michel (35).

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) 210 données
Nous ne retiendrons ici que les données relatives à la nidification.

Le 22 mars, 2-3 couples paraded et trois aires sont occupées aux rochers de Mauves (44) ; le 12 avril, un couple parade à l'aérodrome de Guipavas (29N) ; le 13 avril, un couple et une aire à la Roche St-Barnabé/le Cloître-St-Thégonnec (29N) ; le 19 avril, une aire avec de très jeunes poussins près d'Hennebont (56) ; le 18 mai, 5 oeufs à Surzur (56) ; le 24 mai, nourrissage à la pointe du Raz/Plogoff (29S) ; le 31 mai, nourrissage dans une carrière au Ménez Hom (29S) ; le 2 juin, 3 poussins prêts à l'envol aux Rochers de Mauves ; le 8 juin, une aire avec 3 oeufs et 3 poussins à l'éclosion au Faouët (56) ; le 10 juin, 1 poussin prêt à l'envol à Kernorgant/le Cloître-St-Thégonnec ; le 15 juin, 4 poussins à Roudoualec (56) ; le 28 juin, 5 poussins de moins d'une semaine au Yeun-Elez (29N) ; le 10 juillet, 1 couple et 1 juv. à Trégastel (22).

Notons encore : un transport de proie aux salines de Batz (44) le 7 avril, 2 ou 3 couples sur Ouessant du 14 au 18 avril, 2 ind. alarmant

à Coatsancourt/Plourin-les-Morlaix (29N) le 5 mai, 1 juv. au Loc'h Kozioù/Trégunc (29S) le 8 juin, 1 juv. au lac de Murin (44) le 16 juin, un nourrissage à la Roche-Bernard (56) le 17 juin, un transport de proie à Bétahon/Billiers (56) le 17 juin, 1 juv. à la pointe de Kastell-Meur/Clédén (29S) le 5 juillet, 1 couple cantonné sur la cathédrale de Nantes.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) 2 à Quenallé/Larré (56) le 14 avril.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) 26 données

1 chanteur le 21 et 22 mars à Pleuven (29S), 2 à Suscinio/Sarzeau le 28 mars, 2 à l'étang de Noyal (56) le 31 mars, 2 à Cadoudal/Plumelec (56) les 6 et 14 avril, 1 rappelle dans le bocage devant la réserve de M.-H. Julien (29S), 2 à la pointe de Corsen (29N) le 1 mai, 1 couple à le Bendi/Logonna-Daoulas (29N) le 1er mai, 1 couple le 12 mai aux landes de Bréhinier/Plénée-Jugon (22), 1 couple au Stang/St-Jean-Trolimon (29S) le 14 mai, 2 à Closelande/Bain-de-Bretagne (35) le 16 mai, 5 à Maudeneuf/Grand-Fougeray (35) le 4 juin.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) 6 données.

1 à Brallac'h et 1 à la Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 13 mai, 1 chanteur au Stang/Plougourvest (29N) le 26 mai, 4 chanteurs le 22 juin en plaine de Mazerolles (44), 1 chanteur le 26 juin au Labou/Hanvec (29N).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) 38 données

Chant à Brallac'h/Fouesnant (29S) le 13 avril; 1 entendu à Kerhellen/Trébeurden (22) le 14 avril, le 24 juin et le 3 juillet; 2-3 ind. dans les marais d'Hoëdic le 16 avril; 2 à l'étang de St-Jean/Mendon (56) le 16 avril; 1 dans les marais à St-Pierre-Quiberon (56) le 20 avril; 1, cris, Boire de Thouaré (44) le 23 avril; 1 cris, marais de Guérande (44) le 31 avril; 3 à Suscinio/Sarzeau le 2 mai; 1 dans le Yeun Elez (29N) le 13 mai; 1 à l'étang de Lozier/Lanrelas (22) et 1 à l'étang de Jugon (22) le 13 mai; 2 alarmant à Roz-ar-Vinglen/le Moustoir (22) le 26 mai; 2 à l'étang de Tesdan/Avessac (44) le 17 juin; chant le 19 juin au lac de Murin (44); plusieurs cris le 4 juillet Loc'h Plogoff (29S); 1 le 5 juillet à Coatsancourt/Plourin-les-Morlaix (29N); 2 juv. à l'étang de Poulguidou/Plouhinec (29S) le 10 juillet; plusieurs couples à Kervran et Kervine/Plouhinec (56).

Nidification.- le 22 avril, 1 nid garni avec 5 oeufs cassés à St-Vio/Tréguennec (29S), le 16 mai, 4 oeufs brisés aux marais de Cadoudal/Plumelec (56) et le 16 juin, nid vide et cris au Curnic/Guissény (29N).


MARQUETTE PONCTUEE (*Porzana porzana*) 1 cadavre desséché à Balanag/Molène (29N) le 23 avril; le 23 juin, 1 noté à 2 reprises au même endroit qu'au Fort-Bloqué/Ploemeur (56).

RALE DE GENET (*Crex crex*) 5 données

pour deux localités de Loire-Atlantique
Thouaré (44) : 1er chant noté le 17 avril, (7-8 chanteurs dans la prairie de Mauves et 2 sur l'île d'Arouix) ; dernier chant le 2 juillet.

St-Etienne-de-Montluc (44) : 7 chanteurs le 25 avril et 17 le 25 mai.

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) 100 données



FOULQUE (*Fulica atra*) 70 données

Fin d'hivernage classique, illustrée par 5 localités bien suivies : Bassin oriental du Golfe du Morbihan : 2500 le 16 mars, 500 le 21, 300 le 26, 270 le 28 et 0 le 6 avril ; Kérogan/Quimper (29S) : 350 le 18 mars, 30 le 23, 15 le 25, 0 le 1er avril ; Trévignon/Trégunc (29S) : 60 le 17 mars, 74 le 24, 80 le 1er avril, 36 le 11 avril ; Rospenden (29S) : 33 le 17 mars, 10 le 22, 4 le 26, 5 le 31, 4 le 6 avril, 1 le 12 ; étangs de St-Jean et du Cranic (56) : 75 & 39 le 20 mars, 41 & 25 le 24, 34 & 17 le 30.

Nidification.- L'installation des nicheurs est terminée à la mi-avril ; les premières pontes sont observées le 16 avril à St-Renan (29N), puis régulièrement jusqu'au 27 mai (à noter une ponte de 6 oeufs le 24 juin dans les marais de Kerhellen/Trébeurden -22-). Les premiers poussins observés le 24 avril.

Ille-et-Vilaine.- Etang de Combourg : 100 le 8 avril, parades ; Verger : 15 nicheurs, le 12 avril.

Etang de Rouvre : 12-15 nids et 3 poussins le 6 mai.

Côtes-du-Nord.- Marais de Kerhellen/Trébeurden : 14 ad. 2 poussins et 1 nid/6 oeufs le 24 juin, étang de Trébry : 4 ind. le 11 mai.

St-Martin-des-prés : 11 ad, 1 nid/ 14 oeufs le 11 mai.

Etang de la Hardouinais : 6 ind. le 12 mai ; étang de Beaulieu/Trébédan : nid + 3 oeufs le 12 mai ; étang de Lozier/Lanrelas : 4 ad. & coquilles brisées le 12 mai ; étang de Jugon : 1 + 7 poussins le 12 mai et 5 couples nicheurs minimum le 3 juillet ; Trébehan/Plusquellec : 3 couples et 5-6 poussins le 18 mai ; étang de Beffou/Loguivy-Plougras : 11-15 couples + nids avec oeufs le 21 mai ; réservoir de Bosmeleac/le Bodeo : 18 dont 5 ad. le 1er juillet ; Boulet : 50 + imm. le 5 juillet ; en outre, 1 ou 2 ind ont été observés au Sillon du Len/Louannec (en avril) ; étang de Lescouët (12 mai) ; étang de St-Connan (21 mai) ; étang de St Bihy (21 mai) ; étang de Loudéac (18 avril).

Finistère.- Etangs de Trévignon/Trégunc : 1 nid/4 oeufs le 23 avril , 2 familles de 4 et 5 poussins le 6 mai , 12 familles le 19 juin , 81 dont 48 juv. le 28 juin , 200 le 15 juillet ; St-Renan : 10 couples nicheurs (1 couveuse et 1 nid/1 oeuf) , 14 ind. le 6 mai , 22 le 27 juin ; Trenvel/Tréogat : 60-70 ind et 2 nids/8 et 11 oeufs en cours d'éclosion , 20 ind le 6 mai , 120 dont de nombreux juv. le 12 juin ; Poulguidou/Plouhinec : 5 ind. le 1er mai , 3 couples avec juv. le 10 juillet ; Kergaran/Plovan : 1 poussin le 24 avril ; Stang Gourinet/Pouldreuzic : 3 le 24 avril ; Conifren/Bourg-Blanc : 4-5 couples le 6 mai ; Curnic : 1 couple le 12 mai ; Yeun Elez : 2 chanteurs le 10 avril , 3 ind. le 13 mai ; Loc'h/Plogoff : ad. nourrissant 1 juv. le 4 juillet ; étang de Kerhuon : 1 ad. le 3 mai.

Morbihan.- Zone de la presqu'île de Rhuys : Calzac/Sarzeau : 7 couples minimum le 31 mars , 24 ad. et 14 poussins le 22 avril ; Suscinio/Sarzeau : 31 ind. le 31 mars , 14 et 1 nid/8 oeufs le 30 avril ; Kervoyal/Dangan : 2 couples avec 3 et 6 poussins et 1 nid/7 oeufs le 26 mai ; marais du Pont Neuf/le Tour-du-Parc : 3 ad le 10 juin ; marais du Duer/St Colombier : 35 le 8 avril , 30 le 22 avril , 22 le 30 avril ; Noyalo : 12 le 8 avril , 8 le 25 mai ; étang d'Ambon : 2 couples avec poussins et 1 nid/6 oeufs le 25 avril ; au Roc'h Du/Crac'h : 25 le 7 avril , 5 couples et 5 juv. le 13 mai ; étang du Cranic/Brech : 8 couples le 7 avril ; étang de St-Jean/Mendon : 36 + 6 couples le 16 avril ; étang de Kernevest/St Philibert : 2 couples le 22 avril ; Toulvern/Larnor-Baden : 3 le 25 avril et 1 couple avec 5 juv. le 10 juin ; Kervran/Plouhinec : 1 nid/7 oeufs le 30 avril ; Kerninihy/Erdeven : poussins notés le 2 juillet ; étang du Fort Bloqué/Plocmeur : 10 couples avec poussins le 23 juin ; Ster Vras/Belle Isle : 1 ad. et 1 juv. le 12 juillet ; étang au Duc/Ploermel : 12 le 5 avril.

Loire-Atlantique.- Au Vioreau - 16 ind. le 5 avril , 3-4 le 2 juin ; lac de Grand-Lieu : 30 env. le 17 avril et 25-30 le 8 juin ; lac de Murin : 3-4 couples et 7 juv. le 16 juin ; étang de Tesdan/Avessac : 7 ad. et 2 juv. le 16 juin ; étang de la Guardière : 15 ad. le 21 juin ; marais de Petit-Mars : 3 le 28 juin ; le 11 avril notée sur les étangs de la Munaudière, de Chanin à Sion-les-Mines, à l'étier de Langon où l'espèce se reproduit.

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) 90 données

La baie de St-Brieuc (22) est le secteur le mieux suivi : les effectifs hivernants ont fondu au cours du mois de mars : il reste 1300 oiseaux le 18 mars, mais seulement 300 le 13 avril, 600 le 19 avril, 800 le 30 avril ; ensuite, les chiffres varient entre 200 ind. (le 12 mai) et 550 ind. (le 21 mai).

La diminution entre mars et avril est également ressentie en d'autres points : au sillon du Len/Louannec (22), 100 le 23 mars, 14 le 11 avril, 15 le 22 avril... ; en baie de la Fresnaye (22), 60 le 28 mars, 2 les 9 et 13 avril.

Cependant, de belles bandes sont encore notées par la suite, en mai et juin : 250 en Penzé (29N) et 350 en baie de Morlaix (29N) le 13 mai, 100 à l'îlot de Bel Air/Piriac (44) le 15 mai, 70 à Tréhiguier/Pénestin (56) le 23 mai, 150 au moins en Penzé le 11 juin, 100 à Kéridy/Pennarc'h (29S) le 16 juin, 100 à Goulven (29N) le 20 juin.

Dans la première quinzaine de juillet, on assiste à une augmentation progressive en baie de Baussais/St-Jacut (22) : 10 le 6, 38 le 10, 50 le 13.

Nidification.- Des couples sont cantonnés à Belle-Ile (56) dès le 24 mars.

Un nid contient 3 oeufs le 3 juin sur Kerlaban Vihan/Plougrescant (22) (localité nouvelle). 65 couples comptés sur Beniget/Molène (29N) le 11 juin.

VANNEAU HUPPE (*Varellus varellus*) 170 données

Quelques rares données du début de la période se rapportent à des migrateurs : 5 à l'étang des Salles/Perret (22) et 3 à l'étang de Merléac (22) le 17 mars, 3 à Ouessant (29N), 15 à l'étang de la Renouillère/Pierric (44) et 5 à l'île Arouix/Mauves (44) le 18, 1 à St-Jean/Lochal-Mendon (56) le 20, 10 à Kerinot/Irvillac (29N), 15 à Kerdaigne/Belle-Ile (56), 200 à Grand-Lieu (44) le 1er mai. Aux Salles/Perret, 4 ind. parquent le 23 mars ; il en reste 2 le 14 avril et 1 le 1er mai. De même, à Grand-Lieu, 20 oiseaux sont observés les 15 avril, 22 avril et 20 mai, date où ils semblent cantonnés, mais aucune preuve de reproduction n'est apportée. 1 ind. à St-Bihy (22) le 21 mai.

Couples présents sur les sites de reproduction visités en 1973 :

(Les localités nouvelles sont soulignées)

Ille-et-Vilaine.-

La Chapelle St-Mélaine + 5

Côtes-du-Nord.-

Kernartail/ 5

Finistère.-

le Kernic/Plouescat 3-4

Morbihan.-

dunes de Gâvres à Plouhinec 27

dunes d'Etel 1

Ste-Barbe/Erdeven 4

dunes de Plouharnel 1

Brénéguy/Locmariaquer 1

Pierres-Plates/Locmariaquer 4

Keremma/Tréfléz	1	Dolan/Séné	10-15
Goulven	6	Brouel/Séné	≥ 2
Plounéour-Trez	1	marais de Noyal	1
Pontusval/Brignogan	2	étang de Noyal	2
Ménéham/Kerlouan	3	Ludré/St-Armel	≥ 10
Curnic/Guissény	1	Calzac/Sarzeau	2-3
Vougo/	2	Kervest/St-Gildas de-Rhuys	3
Languéro/Milizac	3	Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys	1
Poulguidou/Plozévet	2	Brouel/Ambon	4
Gourined/Pouldreuzic	+	Enter/Belle Ile	3
Loc'h Nizeleg/Plovan	1-2	Loire-Atlantique.-	
Kergaran/Plovan	2-3	Congor/Guérande	10
Trenvel/Tréogat	20	Le Grand Bal/Guérande	4-5
St-Vic/St-Jean-Trolimon	11	Trignac	2-3
Kerouné/Plomeur	4-5	Mazerolles/Sucé	3-4
Marais de Pennarc'h	+	Massérac	6
Larvor/			
Trévignon/Trégunc	10		
Kerminacquet/Trégunc	2		
Loge Gaor/Scaer	2		


Nidification.- Parades et couples cantonnés le 23 mars à Dolan, le 28 mars à Ménéham, le 31 mars à Calzac et Trévignon... Ebauches de nids le 30 mars à Dolan... Pontes complètes le 31 mars à Brouel (deux), le 4 avril à Pontusval, le 13 avril au Vougo... Poussins le 24 avril à Trenvel, le 4 mai à Plouharnel, le 6 mai à Larvor... Encore des oeufs le 20 juin à Dolan et des poussins le 3 juillet à Trenvel.

La dispersion est amorcée dès la première décade de juin : 4 en deux points d'Ouessant (29N) le 7 juin, 1 à Ouessant le 9 juin, 1 au Croëziou/Rédéné (56) le 10 juin, 130 sur un labour à Convent-le-Borgne/St-Nicodème (22) le 11, 20 en vol à Lanfains (22) le 14, 150 à l'étang de Tesdon/Avessac (44) le 16, 50 au Vioreau (44) le 17, près de 300 à Mazerolles (44) le 22, 400 aux marais de Petit-Mars (44) le 28, 120 au Vioreau le 1er juillet, 200 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 2, 165 au Vioreau le 8, plus de 100 à l'Ile Aroux le 15.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) 16 données

Le gros des observations jusqu'au 10 avril : 100 à Tronoën/St-Jean-Trolimon (29S) le 17 mars, 60 à Kerinet/Irvillac (29N), 55 près de Merléac (22) et 20 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 23 mars, 15 à Kerdaigne/Belle-Ile (56) le 25, 1 dans les marais d'Ambon (56) le 30, 16 vers le nord à Plouédern (29N) le 6 avril, 100 en vol à Irvillac le 10. Encore 6 à St-Lumine-de-Coutais (44) le 22 avril et 4 au Len/Louannec (22) le 28. Les quatre dernières observations concernent des isolés et sont très espacées jusqu'à début-juin : 1 à l'Ile/Dangan (56) le 1er mai, 1 à St-Pabu (29N) le 20 mai, 1 à Pern/Ouessant (29N) le 1er juin, 1 à Plouhinec (56) et 3 à Yffiniac (22) le 2 juin, 1 ind. de la forme nordique au Rumiou/Ouessant le 9 juin.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squarrotola*) 68 données




Départ des hivernants et passages se superposent jusqu'à la mi-mai environ. Sur les lieux d'hivernage, les oiseaux disparaissent dans la première quinzaine d'avril. Dans le Golfe (56), 100 le 16 mars et 70 le 28 mars ; à Bailleron/Séné (île du Golfe), 35 le 21 mars, 28 le 26 mars, 14 le 5 avril, 1 le 10 avril. En Mer Blanche/Fouesnant (29S), 20 le 26 mars, 6 le 30 mars, 10 le 3 avril, 1 le 19 avril, 1 les 23 avril et 13 mai. En baie d'Yffiniac (22) par contre, une vingtaine d'oiseaux sont notés du 21 mars au 21 avril, puis 12 au 30 avril, 4 le 12 avril et 2 le 23 mai.

Quelques données de passage : 16 au bord du lac de Grand-Lieu (44) le 1er avril, 16 au Len/Louannec (22) le 11 avril (2 le 23 mars), 50 en vol à Groix (56) le 15 avril, 1 sur une falaise de Belle-Ile (56) le 21 avril. Des petites bandes en mai : 12 à l'île/Dangan (56) le 1er, 12 dans l'estuaire de la Vilaine (56) le 2, 12 en baie de St-Brieuc (22) le 10, 50 en Penzé (29N) le 13, 11 à Penn en Toull/Larnor-Baden (56) le 15. Les données s'espacent ensuite (six seulement du 15 mai au 4 juillet) : 10 à Dolan/Séné le 17 mai, 10 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) le 19 mai, 9 à Tréhiguer/Pénestin (56) le 23 mai, 8 à Lirey/Moyalo (56) le 8 juin et 10 en rivière de Pénarff le 10 juin.

Retours à partir du 4 juillet : 30 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 4, 20 à Goulven (29N) le 5, 40 en rivière de Pont-l'Abbé le 9, toujours 20 à Goulven le 15.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) 82 données



Les passages se poursuivent faiblement jusqu'à la mi-avril, culminent dans la seconde quinzaine de ce mois, et se poursuivent jusqu'en début-juin.

Jusqu'à la troisième décade d'avril, les données sont peu nombreuses et peu significatives. Le passage n'est guère marqué que par la présence d'oiseaux sur des plans d'eau intérieurs : au moins 3 à l'étang de la Renouillère/Pierric (44) le 18 mars, 5 au Vioreau (44) le 3 avril, 3 au Vioreau le 5 avril.

200-300 dans les marais de Guérande (44) le 22 avril, 60 à Hillion (22) le 28 avril, 180 à Goulven (29N) et 400 en baie de St-Brieuc (22) le 30 avril.

Contrairement aux années précédentes, les observations de mai sont nettement moins nombreuses, et les bandes concernées plus faibles : 30 en baie de St-Brieuc le 10, 100 dans le marais de Guérande le 13 et 50 en baie de Baussais/St-Jacut (22) le 14... 20 à Goulven le 20, 25 à Yffiniac (22) le 27. Dernière petite vague vers le 10 juin (10 à Goulven le 8, 40 dans les dunes de Plouhinec (56) le 11) laissant des attardés jusqu'au 20 juin : 1 au Curnic/Guissény (29N) le 15 et un au Guillec/Plougoum (29N) le 20.

Deux données seulement concernent le retour : 9 juv. et 2 ad. à Loc'h Nizeleg/Plovan (29S) et 4 ind. en baie de Baussais le 11 juillet.

Nidification.- 24 couples sur Beniget/Molène (29N) le 11 juin. 2 ind. manifestent un comportement de nicheurs sur An Ero Vili/Plovan (29S) le 6 mai, observation sans lendemain ; la nidification de l'espèce serait cependant très possible en baie d'Audierne. 1 couple semblant cantonné parade sur Sein (29S) les 10 et 11 mai. 1 couple sur Molène même le 13 mai.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) 73 données

Huit observations d'avril et mai se rapportent à des localités où il ne semble pas y avoir eu de reproduction : 1 à Rosporden (29S) les 10, 12 et 17 avril, 1 à Penn en Toull/Larmor-Baden (56) le 17 avril, 1 à l'Ile Grande/Trébeurden (22) le 25 avril, 2 dans les dunes de Bonabry/Hillion (22) le 28 avril, 3 à l'étang de Gourveaux/St-Gilles-Vieux-Marché (22) et 1 à l'étang des Salles/Perret (22) le 1er mai.

Nidification. - Arrivées au Loc'h/Guidel (56) le 19 mars, au Fort-Bloqué/Guidel (56) le 27 mars (4 ind.), à St-Renan (29N) et Batz (44) le 7 avril... ~~Parades~~ à St-Marc/Brest (29N) le 13 avril, à la Grande-Paroisse/la Turballe (44) le 14 avril.... 2 oeufs à Guiscriff (56) le 20 avril...

Localités nouvelles.-

Ille-et-Vilaine.- Ste-Anne-Sur-Vilaine : 3 oeufs le 16 juin.

Finistère.- Bourg-Blanc : 3 couples alarmant sur des gravières récemment mises en exploitation le 6 mai ; Crozon : 1 couple alarme le 31 mai à l'Aber, localité déjà connue, mais non citée depuis 1967 ; St-Nic : 1 ind. alarme le 31 mai à Brénélec-Pentrez ; Ploeven : 1 couple alarme à Kervijen le 31 mai ; Plovan : 2 ou 3 couples à Loc'h Nizeleg.

Morbihan.- Plouhinec : au moins 3 couples dans les dunes ; Locmariaquer : 1 couple alarme à Brénéguay et 1 couple à Kerpenhir le 5 mai ; Noyal : 1 couple alarme dans le marais le 3 juillet ; le Tour-du-Parc : 1 alarme au Pont-Neuf le 10 juin ;

Loire-Atlantique.- la Turballe : 2 couples alarmant à la Saline de la Grande Paroisse le 14 juin ; Guérande : 1 couple à Congor le 3 juin ; la Meilleraye : 3-4 couples au Vioreau ; Soudan : 3 couples à l'étang de la Blessière le 21 juin ; Ancenis : 4 couples le 23 juin.

Nous ne disposons pas de renseignements assez complets pour publier la liste des localités recensés.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) 100 données

Arrivée générale

dans la troisième décade de mars : 2 à Trévignon/Trégunc (29S) le 24, 2 à Trenvel/Tréogat (29S) le 25, 4 en Mer Blanche/Fouesnant (29S) le 26, 4 au Fort Bloqué/Guidel (56) le 27, 1 à la Digue/Kerlouan (29N) le 28, 1 à Suscinio/Sarzeau (56) le 31 mars... Deux données simultanées peuvent correspondre à un passage : 2 à l'étang de Guébriand/Plancoët (22) et 3 à Pentès/Surzur (56) le 20 avril.

Nidification.- Parade à Suscinio le 31 mars ; premiers poussins le 2 mai à Suscinio ; encore 3 oeufs à Gèvres (56) le 1er juillet.

Couples présents sur les localités visitées en 1973 :

Ille-et-Vilaine.- Cherrueix : 7 nids sur 2 km le 18 mai ; peut-être
→ 30 couples de Cancale à Cherrueix !

Finistère.- Sibiril : 3 au Guillec le 20 juin ; Plouescat : 2 nids au Kernic le 21 avril ; Kerlouan : 1 à la Digue le 28 mars ; Guissény : 1 couple au Curnic et 1 couple au Vougo ; Landéda : 7 ind. à Kergleuz le 22 avril ; Plovan : 2-3 couples à Loc'h Nizeleg, 4 couples à Crumuni et 3 couples à Kergaran (à moins qu'il n'y ait qu'une colonie désignée selon les observateurs sous le nom de Crumuni ou Kergaran ?) ; St-Jean-Trolimon : 1 couple à St-Vio, 2 couples à Kergaradec ; Ploneur : 1 couple à Beg an Dorchenn ; Loctudy : 3-4 couples à Larvor ; Fouesnant : 1 nid à Brallac'h le 5 mai, 4 ind. en Mer Blanche le 26 mars ; Trégunc : 5 couples à Loc'h Kozioù, 14 ind. à Kersidan le 6 mai et 7 ind. à Kerdallé le 20 mai.

Morbihan.- Guidel : 4 ind. au Fort Bloqué le 26 mars ; Plouhinec : 12-13 couples dans les dunes et marais salés ; Plouharnel : 1 couple à la ferme aquicole ; la Trinité : 6 ind. à Kerdual le 1er mai, 2 couples à Kerdual ; Locmariaquer : 1 nid à St Pierre le 4 mai, 3 ind. à Kerpenhir le 5 mai ; Arzon : 3 ind. au Croësty le 4 mai, 3 couples au moins à Kerjouanno ; St-Gildas-de-Rhuys : 2 couples à Kervert, 1 ind. à Kerpont le 10 juin ; Sarzeau : 1 couple à Suscinio ; Surzur : 3 ind. à Pentès le 20 avril ; Ambon : 12 ind. et 3 poussins à Betahon le 17 juin ; Houat : 6 couples notés le 19 juin ; Hoedic : 5-6 couples notés du 24 au 28 juin ; Pénestin : 4 ind. à Ménard le 29 avril.


Loire-Atlantique.- Guérande : 2 couples à la Saline des Charmes le 20 mai.

PLUVIER GUIGNARD (*Eudromias morinellus*) 3 dans les dunes de Beg an Dorchenn/
Ploneur (29S) le 4 mai.

TOURNEPIERRE (*Arenaria interpres*) 84 données

L'essentiel du passage prénuptial est concentré de la mi-avril à la mi-mai.

60 ind. à Kergleuz/Landéda (29N) le 21 mars, 25 à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 31 mars, 20 à Beg Lann/Sarzeau (56) le 1er avril.



Les données se multiplient et les groupes s'étoffent à partir de la mi-avril : 50 à Porz Doun/Ouessant (29N) le 15, 27 à Hoëdic (56) le 19, 25 à Trémazan/Landunvez (29N) le 21, 54 à Suscinio/Sarzeau le 23 avril. Le passage culmine fin-avril et début-mai : 52 au Len/Louannec (22) le 28, 83 au Croësty/Arzon (56) et 80 à Tréhiguier/Pénestin (56) le 29, 150 à Yffiniac (22) le 30, 50 au Len/Dangan (56) le 1er mai, 50 au Croësty et 70 à Kervert/St-Gildas-de-Rhuys (56) le 4 mai, 140 à Kerpenhir et 55 à Brallac'h/Fouesnant (29S) le 5, 84 en une troupe à Sein (29S) le 9, 140 en une troupe à Sein le 11 mai, 45 vers le nord à Men-er-Beleg/St-Philibert (56), 80 à Penvins/Sarzeau et au moins en Penzé (29N) le 13, 40 à Kervoyal/Dangan et 40 à Penerf/Dangan le 16. Le passage s'atténue alors

fortement : on note encore 20 à Noyal (56) et 22 à Locmaria/Groix (56) le 20 mai, une trentaine à Kermarec/Groix le 23, 10 à Kermarec le 24, 10 à Kerpenhir le 27, 10 à Trévignon/Trégunc (29S) le 28 mai.


Ensuite l'espèce n'est plus notée que cinq fois jusqu'à la fin de la période : 1 à Kadoran/Ouessant (29N) le 9 juin, 6 à Beniget/Molène (29N) le 11, 3 au Curnic/Guissény (29N) le 16, 1 à Hoëdic le 25 juin et 7 à Porz Kelepe/Goulien (29S) le 14 juillet.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) 100 données

La migration prénuptiale se poursuit jusqu'à début-mai, date à laquelle, de façon classique, elle s'interrompt brutalement.

Passage net après la mi-mars : 60 à Penmarc'h (29S) le 17, 18 à Dolan/Séné (56) et très nombreuses à la Renouillère/Pierric (44) le 18, 20 à St-Jean/Loceal-Mendon (56) et 20 à Dolan le 20, 17 à Trévignon/Trégunc (29S) le 21, 66 à Dolan le 23.

Par la suite, quelques belles bandes sont encore notées jusqu'à la mi-avril : 10 à Croësty/Parson/Noyal-Pontivy (56) le 31 mars, plusieurs dizaines à Goulven (29N) et plus de 8 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 8 avril, 50 à St-Vio le 14 avril...



Des 20 données de la seconde moitié d'avril, 9 concernent des isolés ; retenons 6 à Rosporden (295) le 17 et 5 à St-Renan (29N) le 22. Dernier migrateur à la saline de Grand Bal/Guérande (44) le 2 mai.

Nidification.- Huit observations seulement s'y rapportent à coup sûr, toutes dans le Léon : chevrottements et chants au Stang/Plougourvest, à Pennerguès/Le Cloître-St-Thégonnec (1 le 9 avril), à Forsquilly/St Eloy (3 le 11 mai), à Ménéham/Kerlouan (7 le 11 juillet), au Relecq/Plounéour-Ménez (1 le 13 juillet), à Plouvorn (1 le 14 juillet). A noter 1 ind. au marais de Kerhellen/Trébeurden (22) le 24 juin.


BECASSINE SOURDE (*Lymnecryptes minimus*) 2 données

E de la Penne

1 à l'étang du Band/Henvic (29N) le 30 mars et 1 à Kervoyal/Dangan (56) le 31 mars.

BECASSE (*Scolopax rusticola*) 2 le 17 mars à l'île Chevalier/Pont-l'Abbé (29S).

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 135 données



Passages et départ des hivernants se superposent jusqu'à la première décade de mai ; cependant, les bandes observées sont de moins en moins importantes à mesure que l'on avance dans la saison. A Gâvres (56), 250 le 18 mars, 80 le 19 avril, dernière observation en ce lieu avant juin ; à Yffiniac (22), 70 le 18 mars, 200 le 21 mars, 10 le 30 avril. 160 à Kerstang/Séné (56) le 20 mars, 80 en baie de la Fresnaye (22) et 125 à Kerstang le 27 mars, 60 au Len/Dangan (56) et 40 à Ambon (56) le 30 mars... 32 en baie de la Fresnaye le 13 avril, 40 en vol à Hoedic (56) le 19 avril, 40 à Reniac/Ambon le 20, 70 dans les marais de Séné le 21, 50 à Kervoyal/Dangan le 25... Ensuite les bandes deviennent squelettiques sauf en baie de St-Brieuc (22) où de 4 à 32 oiseaux sont observés tout au long de la période, et 20 ind. à Goulven (29N) le 20 mai.

Retours dès la première décade de juin, mais surtout après le 20 de ce mois. A Gâvres, 6 le 7 juin, 8 le 16, 14 le 21, 82 le 24, 103 le 29, 122 le 3 juillet, 131 le 7 juillet... 42 à Locoal-Mendon (56) le 18 juin, 160 à Pentès/Surzur (56) le 3 juillet, 250 en rivière de

Pont-l'Abbé (29S) et 150 à Kerstang le 4 juillet, 30 à Goulven le 5 et 31 en baie de Baussais/St-Jacut (22) le 10 juillet.

Nidification.-


Côtes-du-Nord.- St-Nicodème : 5 couples à Convent-le-Borgne le 11 juin ; Lanfains : ponte de 4 oeufs le 15 mai ; à Bel-Air/Trédaniel, 1 ind attaque une Crécereille le 11 mai.

Finistère.- Scrignac : 2 couples alarmant au sud-est des Cragou le 27 mai ; le Cloître-St-Thégonnec : 11 couples localisés (Cragou : 3 ; Pennerguès : 1 ; le Nergoat : 2 ; roche St-Barnabé : 1 ; rochers du Relecq : 4) ; Sizun : 1 couple à Kervelly le 17 mars ; St-Rivoal : 2 couples à Roudouderc'h le 24 avril ; Brasparts : 1 couple à Ti ar Bleiz le 11 avril ; Plomodiern : 3-4 couples aux Menez Hon le 31 mai ; St-Goazec : 1 couple à Kastell-Rufel.

Morbihan.- Présent à Roudouallec.

Couvées: 2 oeufs et 4 oeufs le 21 avril aux Cragou, 4 oeufs le 22 avril au Nergoat, 4 oeufs le 15 mai à Lanfains, 4 oeufs le 20 mai à la Roche St-Barnabé, 1 poussin encore au nid le 3 juin aux Cragou.

COURLIS CORLIEU (*Merula phaeopus*) 118 données



Passage très concentré du 13 avril au 20 mai, avec quelques attardés, ou une petite vague tardive, dans la première décade de juin.

1 au Cap Coz/Fouesnant (29S) le 13 avril, 3 vers le nord à Concarneau (29S) et 6 à Trévignon/Trégunc (29S) le 14, 4 à Hoëdic (56) et 10 à Porz Doun/Ouessant (29N) le 15... 40 à Trézel/Tréogat (29S) le 16 ; 30 à Hoëdic le 18, 40 en vol à Ste-Marie-sur-Mer (44) et 150 dans l'estier de Surzur (56) le 23, passage nocturne au-dessus de Vannes (56) le 25, 1 vers le nord à Gouesnou (Léon intérieur) le 27, passage nocturne à Vannes le 28, 35 à Plouhinec (56), 45 à Trély/Surzur et 70 à Goulven (29N) le 30 avril, 70 au Curnic/Guissény (29N) le 1er mai, 50 en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 3 mai, passage nocturne à Auray (56) le 5, 40 à Plouhinec le 6, 30 à Caden/Surzur le 7, 35 dans le Golfe (56) le 10, 13 en vol vers le nord-ouest deux milles au large du Croisic (44) le 12, 30 vers le nord à Men-er-Beg/St-Philibert (56) le 13, 40 dans le Golfe le 14, 10 à Dolan/Séné (56) le 17 et 20 à Goulven (29N) le 20 mai.


Puis rien jusqu'au 2 juin, date à laquelle débute une série de 5 données concernant vraisemblablement des attardés : à Trévignon/Trégunc (29S), 1 le 2, 5 le 3 et 4 le 9 juin, 2 à St-Vio/Tréguennec (29S) le 9 juin, 1 à Séné le 10 juin.

Le retour s'anorce peut-être le 24 juin avec l'observation d'1 ind. à Goulven. Puis 3 à Hoëdic le 28 juin, 1 à Dolan et 1 à Arouix/Mauves

(44) le 30 juin. En juillet, 20 à Pentès le 3, 10 à Kerstang/Séné le 4, 20 à Goulven le 5, 50 le Golfe le 11, 2 sur un labour à Troellu/Goulien (298) le 13. 40 dans le Golfe le 14...

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) 56 données

La vague de passage qui a débuté le



23 février se poursuit jusqu'au 23 mars (16 données très groupées) : 2 à l'étang des Salles/Perrat (22 intérieur) et 30 à Trenvel/Treogat (29S) le 17, 30 à Dolan/Séné (56), 300 à Trignac (44), 70 à l'île Arcoux/Mauves (44) et au moins 3 à l'étang de la Renouillière/Pierric (44 intérieur) le 18, 4 à St-Renan (29N) le 21, 20 à Dolan et 75 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 23.


Les 14 autres données de passage se répartissent du 31 mars au 14 mai. Retenons : 7 à Noyal (56) le 31 mars, 20 à Grand-Lieu (44) le 1er avril, 13 à Dolan le 6, 22 à Noyal le 8, 17 à Grand-Lieu le 15, 25 à Séné le 21, 7 à Légénès/Carnac (56) le 22, 15 à Séné le 4 mai et 1 à Ambon (56) le 14 mai.

Rien de cette date au 10 juin, puis huit observations difficilement interprétables, jusqu'à la fin de la période : à Séné, 3 les 10 et 12 juin, 2 le 20 juin, 1 le 7 juillet ; 1 au Curnic/Guissény (29N) le 20 juin ; 1 à Goulven (29N) le 9 juillet et 5 au Vioreau (44) le 14 juillet.

Nidification.- Des couples cantonnés de Barge à queue noire ont été notés en deux points de la baie d'Audierne, avec un maximum de 6 ind pour l'un des sites (le 2 mai) et de 4 ad. et 1 juv. pour l'autre (le 1er juillet); mais des déplacements sont possibles entre les deux points. Dans le 1er site, une ponte de 4 oeufs est trouvée le 15 avril alors que 5 ind sont présents.

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) 45 données

Au moins deux des trois données de mars concernent la fin de l'hivernage : 135 en baie d'Yffiniac (22) le 18 et 20 dans le Golfe (56) le 28.




Le passage s'étend du début d'avril au 20 mai. 20 en Penzé (29N) le 3 avril, 320 à Yffiniac le 12, 30 au Croisic (44) le 15, 150 à Yffiniac le 19, 90 au Len/Dangan (56) et 61 à Kergleuz/Landéda (29N) le 22 avril, 30 en Penzé le 29 avril, 40 au Len/Dangan et 35 à en Penzé le 1 mai, 70 en baie de St-Brieuc (22) le 10 mai, 30 en Penzé et 15 en Mer Blanche/Fouessant (29S) le 13 mai, enfin, 30 à Goulven (29N), 11 à Gâvres (56) et 1 à Grand-Lieu (44) le 20 mai. 1 attardé à Pénérif/Dameau le 10 juin.

2 en Penzé le 1er juillet, les quatre autres données concernant de 7 à 18 oiseaux à Goulven.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) 37 données

Commencé faiblement le 9 mars, le passage se poursuit dans la seconde quinzaine de ce mois : 4 au Curnic/Guissény (29N) le 17, 35 en Penzé (29N) le 18, 5 à St-Jean/Locoal-Mendon (56), 3 à Kersatang/Séné (56) et 50 en Penzé le 20...




Observations éparpillées jusqu'à la mi-avril, avec néanmoins 20 à Ambon (56) le 10 et 18 à St-Jean le 16. Une vague assez nette dans la dernière décade d'avril marque la fin de ce passage pré-nuptial : 17 à Trély/Surzur (56) le 22, 19 à Dolan/Séné le 27, 20 à Trély et 15 à Guérande

(44) le 30 avril, 10 en ce lieu le 1er mai. Encore 1 à Séné le 4 mai et 2 à Belle-Ile (56) le 13 mai, dernière observation avant les retours.

Retours peu après la mi-juin : 1 à Bétahon/Billiers (56) le 17, 1 à Dolan le 20, 3 en plumage nuptial sur l'Aulne/Logonna-Quimerch (29S) le 26, 6 à St-Jean le 28, 38 à Séné le 30 juin, 20 à Trély et 10 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) le 1er juillet, 13 en deux points de cette commune le 3 et 2 à Loc'h Nizeleg/Plovan (29S) le 11 juillet.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) 116 données

Quelques petites bandes en mars : 28 à St-Nazaire (44) le 17, 20 à Arouix/Mauves (44) et 20 à Dolan/Séné (56) le 18, 15 au Cap Coz/Fouesnant (29S) le 19, 19 à Kerouarc'h/Locmariaquer (56) le 24.



De cette date aux derniers jours d'avril, aucune bande observée ne dépasse 7 ind. Passage net, quoique de faible amplitude en fin-avril et début-mai : 50 à Dolan le 27 avril, 9 à Ludré/St-Armel (56) le 30, 2 à l'étang des Salles/Perret (22 intérieur) le 1er mai, 1 à l'île Arouix (44 intérieur) le 3 mai, 20 en baie de St-Brieuc (22) le 10 mai. Puis, 1 à Grand-Lieu (44 intérieur) et 10 à Goulven (29N) le 20 mai.


Six observations d'isolés de la fin-mai à la mi-juin. Les données de la seconde quinzaine de juin peuvent déjà concerner des retours : 1 au Vioreau (44 intérieur) et 6 à Bétahon/Billiers (56) le 17,

20 à Dolan le 20, 50 au Petit Traict du Croisic (44) le 24, 25 à Dolan le 26 juin. Les arrivées s'accroissent dans la première quinzaine de juillet : 70 à Pentès/Surzur (56) le 3, 30 à Kerstang/Séné et 50 à Goulven (29N) le 4, 94 au Len/Louannec (22) le 5, 135 à l'Aber/Roscoff (29N) le 7, 4 au Vioreau le 8, 150 en rivièrre de Pont-l'Abbé (29S) le 9, 1 à Arouix et 1 à l'étang de Poulguidou/Flouhinec (29S) le 10...

Nidification.- 11 ou 12 couples ont niché dans les marais de Séné cette année. 1 couple dans les marais de Noyal (56). 1 couple alarmant au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) en début-juillet. 1 couple à la Saline du Grand Bal/Guérande (44).

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) 50 données

Les quatre données du début de la période peuvent correspondre à un petit passage, aucun oiseau n'ayant été noté antérieurement dans ces localités. A Toulvern/Larmor-Baden (56) 3 le 16 mars ; 1 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 19 ; à St-Jean/Loccal-Mendon (56), 15 le 20 et 10 le 24 mars.




Passage pré-nuptial nettement délimité du 13 avril (1 à Yffiniac (22)) au 22 mai (1 à Ambon (56)), mais les bandes observées restent faibles dans l'ensemble : 8 à St-Jean le 16 avril, 3 à Dolan/Séné (56) le 17, 3 à Trély/Surzur (56) et 50 dans les marais

de Guérande (44) le 30 avril, 6 à Kernor/Ile Tudy (29S) le 2 mai, 4 à Guérande le 13 mai, puis 6 observations de 1 ou 2 oiseaux jusqu'au 22 mai.

Après l'observation d'1 ind. le 24 juin au Petit Traict du Croisic (44), le retour est évident en juillet : 3 à Trély le 1er, 2 à Noyal (56) le 3, 5 dans les marais de Séné le 7, 6 à Goulven (29N) le 10 et 10 en ce lieu le 15.

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) 48 données

Migration pré-nuptiale bien sentie, essentiellement du début de la période à la fin-avril. 1 à Lanniron/Quimper (29S) le 16 mars, 4 à Dolan/Séné (56) le 18, 5 à Séné le 20, 7 à Dolan le 30 mars, 11 à Dolan le 6 avril. Aucune autre observation ne dépasse 2 ind. Retenons seulement 2 ind. à Hoedic (56) le 16 avril.



Les données s'espacent considérablement en mai : à Séné, 1 les 4 et 29 mai ; 1 à Guérande (44) et 2 à Belle-Ile (56) le 13.


Une nouvelle série d'observations commence dans la deuxième semaine de juin et se poursuit presque sans interruption jusqu'à la fin de la période : 1 à Noyal (56) le 8 juin, 4 à Séné le 10, 5 à Guérande le 24... 15 à Trély/Surzur (56) le 1er juillet, 5 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) le 3 juillet, 3 à St-Jean/Locoal-Mendon (56) le 8 juillet.

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) 5 données !

1 à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 13 mai.

1 à Trély/Surzur (56) le 1er juillet, 2 à Séné (56) le 7 juillet, 11 au Vioreau (44) le 8 juillet et 1 en ce lieu le 14 juillet.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) 108 données



Le gros de la migration pré-nup-
concentré de la seconde semaine d'avril aux
premiers jours de mai.

3 en rivièrre d'Etel le 30 mars. Puis, 3 à Porz Guen/Clohars Fouesnant (29S) le 7 avril, 3 en baie de la Fresnaye (22) le 9, arrivée crépusculaire à Hoedic (56) le 13, 5 au service d'eau de Belle-Ile (56) le 15, 2 à St-Renan (29N) le 17, 6 perchées sur des barbelés à Brallac'h/Fouesnant (29S) le 18, 3 à Arouix/Mauves (44) le 20, 5 à l'étang de Sandun/Guérande (44), 7 en vol au Pormain/Ste-Marie-sur-Mer (44) et 9 à Locquémeau/Trédrez (22) le 22, 13 au Cranic/Brech (56), 5 à Balaneg/Molène (29N) et 4 à St-Renan le 23, 4 au Len/Louannec (22) les 28 et 29 avril, 1 à l'étang de Gourveaux/St-Gilles-Vieux-Marché (22), 5 à l'étang des Salles/Perret (22) et 4 à Kerogan/Quimper (29S) le 1er mai, passage nocturne à Brest le 2 mai.

Les données s'espacent notablement ensuite : 2 à l'étang de Loscoët (22) le 12 mai, 5 à Belle-Ile (56) le 13, 2 à Mesquer (44) et 2 à Groix (56) le 20, 15 à Yffiniac (22) le 23 mai et enfin 1 à Kerogan le 2 juin.

Retours dans les derniers jours de juin : 20 à Bindre/Séné (56) et 1 à Trégarvan (29S) le 26, 1 à St-Laurent-sur-Oust (56) le 29. Puis, 5 en Penzé (29N) le 1er juillet, 15 à Goulven (29N) le 6, 15 au Len le 9, 8 à Bailleron/Séné le 14...

Deux oiseaux sont notés du 26 avril à la fin de la période à l'île Arouix/Mauves (44).

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Callidris canutus*) 13 données

Encore 3000 en baie de St-Brieuc (22) les 18 et 21 mars, aucun en ce lieu début-avril. 9 dans les marais de Guérande (44) le 1er avril, 2 en baie de St-Brieuc le 30 avril, 6 en

baie de St-Pierre/Lozmariquer (56) le 4 mai, 20 à Guérande le 13 mai, 5 en baie de Baussais/St-Jacut (22) le 14 mai, 20 au Gâvres (56) et 1 à Goulven (29N) le 20 mai. 1 à l'étang du Steir/Pennmarc'h (29S) le 8 juillet.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 5 données


2 en plumage nuptial dans les marais de Guérande (44) le 6 mai, 1 au Curnic/Guissény (29N) les 16 et 28 mai, 1 à Trenvel/Tréogat (29S) le 9 juin.

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) 4 données

1 à Penn-ar-Ru-Meur/Ouessant (29N) et 1 à la pointe des Chats/Groix (56) le 15 avril, 2 à Trémazan/Landunvez (29N) le 21 avril, 4 à l'île Dumet/Piriac (44) le 20 mai.

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) 159 données

Départ des hivernants.- Dans le Golfe (56) 15000 le



16 mars, 7000 le 26 mars, 3200 le 28 mars, 300 le 4 avril, aucun le 17 avril. Dans l'anse d'Yffiniac (22), 4000 le 18 mars, 500 le 21 mars, 100 le 13 avril. En Mer Blanche/Fouesnant (29S) 200 le 22 mars, 80 le 26 mars, 70 le 3 avril. 600 en rivière de Crac'h (56) le 21 mars.

Les 4000 oiseaux dans l'anse d'Yffiniac le 18 mars traduisent sans doute un passage à cette époque (maximum de l'hiver en ce lieu : 3000 le 14 janvier) ; au moins deux à l'étang de la Renouillère/Pierric (44 intérieur) le 18 mars également.

Creux très net dans les observations de la dernière semaine de mars à la dernière décade d'avril, une seule donnée atteignant 100 ind.

Vague de passage dans la troisième décade d'avril : 800 en baie d'Yffiniac le 19, 200 à Pentès/Surzur (56) le 20, 300 dans les marais de Séné (56) le 21, 180 à Légénès/Carnac (56) et 1000 à Guérande (44) le 22, 120 en Mer Blanche le 23, 1500 à Yffiniac le 28, 90 au Len/Louannec (22) le 29 (1 le 11 avril), 300 au Curnic/Guissény (29N), 500 à Goulven (29N), 200 au Luder/St-Armel (56) et 3000 en baie de St-Brieuc (22) le 30 avril, 210 à Légénès et 2 à l'étang des Salles/Perret (22 intérieur) le 1er mai.

Nombre de données et importance numérique des bandes décroissent ensuite : 150 à Séné le 2 mai, 600 en baie de St-Brieuc le 10 mai, aucun en ce lieu le 20 mai... Mais on observe encore quelques belles bandes jus-

qu'à la fin du mois : 200 à Guérande le 13 mai, 250 à Goulven le 20, 150 au Curnic le 28, 100 en baie du Mont-St-Michel (35) le 31.

Les groupes observés en juin sont beaucoup plus étoffés que l'an dernier (13 des 18 données de ce mois atteignent ou dépassent 10 ind.) : 60 au Curnic les 6 et 8 juin, 58 en Mer Blanche le 9, 90 à Pénérif le 10, 52 à Beniget/Molène (29N) le 11, 40 à Dolan le 12, 37 à Gâvres (56) le 16...


Peu de retours en juillet : à Goulven, 4 le 5, 60 le 6, 100 le 15. 1 ind. au Guillec/Plougoulm (29N) le 9.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) 3 données

1 dans les marais de Guérande (44) le 15 avril, 6 en plumage nuptial à Guérande le 13 mai, 1 en plumage nuptial partiel au Curnic/Guissény (29N) le 29 mai.

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) 33 données

Le passage a lieu jusqu'à la mi-mai environ.




A Brallac'h/Fouesnant (29S) (10 données), 25 les 19 et 20 mars, 100 le 28, 60 le 31 mars, 70 le 5 avril, 115 le 10, 130 le 13, 50 le 17, 70 le 19 avril et 30 le 5 mai.

Ailleurs, hormis 3 ind. à Dangan (56) le 2 avril, il faut attendre la dernière semaine d'avril pour voir apparaître quelques bandes de Sanderlings : 50 en trois points de la baie d'Audierne (29S) le 24 avril, 25 à Trévignon/Trégunc (29S) le 28 avril, puis 10 à Penvins/Sarzeau(56) et 32 à Kervilen/la Trinité (56) le 13 mai, 40 à Trézel/Tréogat (29S) le 14, 15 à Dumet/Piriac (44), 5 à Groix (56) le 20 mai et 1 à Kernarec/Groix le 23 mai. Deux attardés dans le Finistère les 9 et 11 juin.

Un seul indice de retour à la fin de la période : 4 à Goulven (29N) le 15 juillet.

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) 44 données

Migration prénuptiale jusqu'au 20 mai avec deux vagues bien nettes.



La première, commencée début-mars, culmine autour du 20 de ce mois : 2 à l'étang des Salles/Perret (22 intérieur) le 17, 15 à Dolan/Séné (56), 50 à Trignac (44) et au moins 6 à la Renouillère/Pierric (44) le 18, 6 à Dolan et 30 à St-Etienne-

de-Montluc (44) le 23 mars.

La deuxième vague culmine après la mi-avril : 50 à Grand-Lieu (44) le 15 avril, 15 à Trély/Surzur (56) le 20, 10 à Séné le 21, 16 à Loc'h ar Stang/St-Jean-Trolimon (29S) et 84 à Grand-Lieu le 22, 15 à Trenvel/Tréogat (29S) le 24, 6 à Bindre/Séné le 27.

Sept données de 1 à 4 oiseaux de cette date à la mi-mai, puis : 12 à Grand-Lieu le 20 mai, et 1 au Curnic/Guissény (29N) le 28 mai.

Reprise des observations fin-juin : 2 à Brouël/Séné le 27 juin, 1 à Séné le 7 juillet, 2 au Vioreau (44) le 8, 8 à Loc'h Nizeleg/Plovan (29S) le 11 et 1 au Curnic le 12 juillet.

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) 17 données

Nidification.- Deux localités vannetaises ont abrité des échasses nicheuses en 1973. A Séné, 1 couple du 4 mai au 7 juillet (accompagné de 4 juvéniles cette dernière date). A Ambon, au moins 6 ind. le 26 avril, puis 3 ind. jusqu'au 25 mai au moins, 1 couple ensuite ; le 22 mai, 1 nid contient quatre oeufs et trois autres oeufs sont trouvés à même le sol alors que 3 ind. sont présents (1 ♂ et 2 ♀ ?).

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) 8 données

30 à Trenvel/Tréogat (29S) le 17 mars, 1 à Bodaval/le Tour-du-Parc (56) le 8 avril, 1 à Dolan/Séné (56) le 29 avril, 1 à Kerpenhir/Locmariaquer (56) le 5 mai, 21 le 9 juin à Trenvel, 2 le 10 juin à Séné, 6 le 12 juin à Kerstang/Séné, 1 au Vioreau (44) le 17 juin.

GLAREOLE A COLIER (*Glareola pratincola*) 2 données

A Congor/Guérande (44), 1 le 30 avril, 2 le 2 mai.

PHALAROPE A BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*) 1 à Trély/Surzur (56) le 25 mai.

OEDICNEME (*Burhinus oedicnemus*) 19 données

1er le 31 mars à Kercouriec/Erdeven (56). 1 à Dolan/Séné (56) le 4 mai.

Nidification.- Les données les plus précises et les plus complètes nous viennent des dunes situées à l'ouest de la rivière d'Etel sur la commune de Plouhinec (56) où la reproduction a été prouvée par la découverte d'un poussin : 3 couples au moins y ont été recensés.

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) 1 cadavre à la pointe Ste-Barbe/Plouharnel (56) le 31 mai.

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) 1 en phase claire à la pointe du Croisic (44) le 6 mai.

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) 3 données
1 à Suscinio/Sarzeau (56) le 1er avril ; 10 dont 4 en phase claire en 1h30 à la pointe du Croisic (44) le 6 mai ; 1 vers le nord à la pointe du Croisic le 20 mai.

LABBE SP. (*Stercorarius pomarinus/parasiticus*) 2 données
2 vers le nord à la pointe de Penchâteau (44) le 28 avril ; 2 vers le nord à la pointe du Croisic (44) le 13 mai.

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) 21 données
60-100 immatures dans le Golfe (56) de mai à début-juillet, en relation avec la présence des seiches.

Nidification.- 1 couple (3 oeufs) à Dumet/Piriac (44) le 20 mai ; 1 couple nicheur à Méaban/Locmariaquer (56) le 27 mai ; 1 couple à Enez Kerlaban/Plougrescant (22) le 3 juin. En dehors de ces trois localités nouvelles, 6-7 couples sur Beniget/Molène (29N) le 11 juin et toujours 1 couple alarmant à Beg ar C'Hastell Meur/Clédén (29S) le 5 juillet.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) 38 données
4 *L. f. graelsii* et 2 *L. f. fuscus* au Vougo/Guissény (29N) le 19 mars ; 3 à l'étang des Salles/Perret (22 intérieur) ; 3 ind. les premiers de la saison, à la réserve Michel-Hervé Julien/Goulien (29S) le 4 avril ; 150 à Port-Launay (29S) le 9 avril ; 3 vers le nord au Haut Moulac/St-Jean Brévelay (56 intérieur) le 13 avril ; 4 puis 18 en vol vers le nord-ouest à Sein (29N) le 8 mai, 4 à l'étang de Jugon (22) le 12 mai ; 9 ad. et imm. à l'étang de St-Bihy (22) le 21 mai ; 1 à l'étang de Beffou/Loguivy-Plougras (22) le 26 mai.


Nidification.- 1 couple a niché pour la première fois à Kastell ar Roc'h/Goulien (29S) ; 2 couples sur la lande littorale à Port Coton/Belle-Ile (56) le 13 mai ; 2 couples à Groix (56) le 25 juin ; 1 couple peut-être nicheur sur l'Anas du Cap/Plévenon (22) le 27 juin. En dehors de ces nouveautés, 20-22 couples à la réserve M.-H. Julien/Goulien, 550 à 600 couples à Dumet/Piriac (44), 1360 couples à Béniget/Molène (29N) le 11 juin.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) 36 données
18 vers le nord à Callac (22 intérieur) le 11 avril ; 200 à l'étang de Beffou/Loguivy-Plougras (22) le 26 mai.

Nidification.- 4-500 couples cantonnés à Méaban/Locmariaquer (56) le 31 mars ; premier oeuf le 19 avril sur Er Hardenn Vras/

En Eidig (56), ponte au cap Fréhel (22) le 20 avril, quelques nids contiennent 1 ou 2 oeufs à Banneg/Molène (29N) le 23 avril ; première éclosion le 15 mai au Grand-Chevreuil/Rothéneuf (35). 11 nids sur Er Hardenn Vras (localité nouvelle) le 19 avril ; 20 couples sur lande à Porh Coton/Belle-Ile (56) le 13 mai ; 8 à 900 couples à Dumet/Piriac (44) ; 477 couples à Méaban le 27 mai ; 10 couples sur les îles de Kerlaban/Plougrescant (22) ; plus de 20 nids sur Ar C'Helou/Fennarc'h (29S) le 16 juin ; 45-50 couples à Groix (56) le 25 juin ; plus de 20 couples sur Iniz en Toull Bihan/Quiberon (56) le 1er juillet.

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) 42 données



Essentiel des observations (33 données) jusqu'au 22 avril ; encore 4 données jusqu'au 21 mai, puis rien avant le 6 juillet.

Cette année la disproportion entre les observations vannetaises et celles du reste de la Bretagne n'est plus si écrasante. Dans le Golfe (56), 1200 le 16 mars, 1000 le 21 mars, 500 le 26 mars, encore 1200 le 28 mars. Sur la vasière de Bailleron (Golfe), 110 le 6 avril, 120 le 10 avril, 35 le 17 avril, aucun le 4 mai. 140 en trois points de la baie de St-Brieuc (22) le 18 mars, 8 au Fort-Bloqué/Ploemeur (56) le 20 mars,

16 dont 1 imm. à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 22 mars. En avril, les bandes deviennent squelettiques, 4 seulement (en dehors du Golfe) atteignant ou dépassant 10 ind. : 10 à l'étang du Pont le 10, 5 à Hoedic (56), 44 au Roc'h Du/Crac'h (56) et 44 au Moustoir/Baden (56) le 17 avril, 5 à Trély/Surzur (56) le 22.


Ensuite, 2 au Croësty/Arzon (56) le 29 avril, 30 imm. en Fresnaye (22) le 10 mai, 1 imm. à Guérande (44) le 13 mai, 5 imm. en baie de St-Brieuc (22) le 21 mai.

Alors qu'en hiver et jusqu'à fin-mars le nombre d'immatures observées est insignifiant, on en voit de plus en plus tout au long du mois d'avril, la proportion nombre d'immatures/nombre d'adultes s'inversant dans la deuxième quinzaine de ce mois. Les trois observations de mai ne concernent que des immatures.

Retours en juillet : 12 à St-Jacut (22) le 6, 1 ad. à Mesquer (44) et 3 ad. à Pen Bé/Assérac (44) le 8, 3 à Bailleron le 9.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) 94 données

Des bandes importantes jusqu'à la première décade de mai, avec un nombre croissant d'immatures : 250 à Trély/Surzur (56) le 6 avril, 400 en baie de la Fresnaye (22) le 13 avril, 5-600 en baie de St-Brieuc (22) le 20 avril, 300 au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) le 22, 200 ad. en baie de St-Brieuc le 28, 150 à Séné (56) le 4 mai, 250 en Fresnaye le 10 mai.



(Retours dès la première semaine de juin : plusieurs centaines en baie de St-Brieuc le 5, 10 adultes à Kerpont/St-Gildas de Rhuys (56) le 10, 1ère en mer au Croisic (44) le 12, près de 200 ad. et 1 juv. à Goulven (29N) le 20 juin, 75 (2 juv.) au Curnic/Guissény (29N) le 24, 200 ad. au Stun/Logonna-Quimerç'h (29S) le 26... Les données se multiplient ensuite, mais, jusqu'à la fin de la période, le nombre des juvéniles observés est faible : plusieurs au Curnic le 5 juillet, quelques-uns au Guillec/Plougoum (29N) le 9 juillet, 3 à Loc'h Nizeleg/Flovan (29S) et 1 à Penhors/Pouldreuzic (29S) le 11 juillet.

Nidification.- Deux localités nouvelles dans le sud-est de la Bretagne : 15 couples (nids et oeufs) le 16 juin à l'étang de Tesdan/Avessac (44) et 7 couples (nids sur des radeaux) le 21 juin à l'étang de Gruellau/Treffieux (44). A l'étang de l'Etier/Langon (35) 1 couple parade le 18 mars, observé sur une hutte de Rat Musqué le 23 avril, revu le 30 avril, mais aucune trace de nidification ensuite. Au lac de Murin/Massérac (44), population estimée à 25-30 couples le 13 mai, à 20 couples le 25 mai ; 6 nids contiennent de 1 à 3 oeufs le 13 mai, 5 oeufs dans le même nid le 25 mai. 1 ponte de 2 oeufs le 3 juin dans les marais de Guérande (44). 18 nids à St-Aignan-Grand-Lieu (44) le 8 juin.

MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*) 12 données

13 à Kervoyal/Dangan (56) et 1 en plumage nuptial à Yffiniac (22) le 18 mars, 3 ad. et 1 imm. à Kervoyal le 23 mars, 1 à Kervoyal le 26 mars, 1 ad. au Curnic/Guissény (29N) le 19 avril, 1 en plumage nuptial à Hillion (22) le 28 avril, 2 à Dumet/Piriac (44) le 20 mai, 1 imm. à Tréglonou (29N) le 22 mai, 1 ad et 1 im. au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) et 1 imm. à Séné (56) le 10 juin, 11 au barrage d'Arzal (56) le 8 juillet, 14 dont 1 ad. à Arzal le 15 juillet.

MOUETTE DE SABINE (*Xema sabini*) 1 à Hoedic (56) le 18 avril.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) 22 données

20 observations sur les lieux de reproduction ou dans leur voisinage. 10 ad. vers l'ouest en 5 minutes à Brignogan (29N) et 1 imm. à Dumet/Piriac (44) le 20 mai.

Nidification.- 600 couples à la réserve M.-H. Julien/Goulien (29S) ; 120 ind. reproducteurs à Koh Kastell/Belle-Ile (56) le 12 mai.

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) 17 données

2 à Dolan/Séné (56) le 27 avril, 1 à Fédern/St-Joachim (44) le 28 avril, 1 à Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys (56)

le 30 avril, 1 à 1 km en mer au Croisic (44) le 9 mai, 8 au Croisic le 12 mai, 2 à Murin/Massérac (44) le 13 mai, 1 à Trenvel/Tréogat (295) le 14, 1 à Ste-Hélène (56) le 19, 1 au phare du Four/le Croisic le 27, 2 à Ste-Barbe/Plouharnel (56) le 30 mai, 2 au Vioreau (44) le 2 juin, 4-5 au Vioreau le 8 juin, 1 au Curnic/Guissény (29N) le 15 juin, 1 ad. à Billiers (56) le 17 juin.

Aucune donnée précise sur la reproduction, si ce n'est 15-20 à St-Aignan-Grand-Lieu (44) les 5 et 13 juin.

GUIFETTE LEUCOPTERE (*Chlidonias leucopterus*) 2 données
1 ind. en plumage nuptial au
Curnic/Guissény (29N) les 20 et 24 juin.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) 2 données
1 ind. en plumage nuptial au Curnic/Guissény (29N) le 12 mai ; 5-6 à St-Aignan-Grand-Lieu (44) le 13 juin.

GUIFETTE SP. (*Chlidonias* sp) 1 Guifette moustac possible le 6 mai à Murin/Massérac (44).

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirsundo*) 78 données
Première donnée tardive : 7 en rivière de Pont-l'Abbé (295) le 14 avril. Puis 1 à Quiberon (56) le 20, 2 en parade à Légénès/Carnac (56) le 22, 40 à Arzal (56) le 23... 150 au Curnic/Guissény (29N) le 30 avril. Encore aucune à Belle-Ile (56) le 22 avril (des oiseaux étaient installés sur leur colonie de Boulardo le 18 avril 1972).

Nidification.-

Côtes-du-Nord.- Plougrescant : 3-4 couples (pontes) sur les îlots de Kerlaban.

Finistère.- 1 couple (3 oeufs le 9 juin) à Trenvel/Tréogat ; 100-150 couples à Moelex le 6 juin.

Morbihan.- Gâvres : 1 ou 2 couples nicheurs probables à l'ancienne saline de Kersahu ; Ste-Hélène (rivière d'Etel) : 41 nids sur 3 îlots le 19 mai ; Carnac : 15 couples aux salines de Légénès ; la Trinité : 2 couples à Kerdual et 2 couples à Kervilen ; Belle-Ile : 26 nids à Boulardo le 12 mai ; Pénestin : 2 couples alarment à Tréhiguier le 23 mai et 80 nids à Bel Air le 15 mai.

Loire-Atlantique.- Piriac : 279 nids à Dunat le 20 mai ; Guérande : 30-35 couples dans les marais le 13 mai ; Mauves : 4 ind. paradent le 3 mai ; Ancenis : transports de poissons le 23 juin.

Parades à Légénès les 22 et 28 avril... Ebauches de nids le 1er mai à Légénès... Pontes complètes le 13 avril à Légénès (deux), le 15

avril à Bel Air (notamment une ponte de 4 œufs)...

STERNE "COMIC" (*Sterna hirundo/paradisaea*) 6 données

1 le 17 mars à Kergleuz/Lan-
dédà (29N), 4 le 28 mars à Suscinio/Sarzeau (56), etc...

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougallii*) 12 données

Au Croisic (44), 2 le 9 mai, 1 le
13 mai, 1 le 18 mai et 5 le 19 mai. 2 le 27 mai à Méaban/Locmariaquer
(56) ; quelques unes à Moelez (29S) le 6 juin ; 1 à Argenton (29N) le
10 juin ; 1 à Gwenntrez/le Conquet (29N) le 19 Juin ; 1 à Port Fouquet/
Belle-Ile le 11 juillet, 1 au Talut/Belle-Ile le 14 juillet.

1 couple sur Dumet/Piriac (44) le 20 mai. 30 nids sur Bel Air/
Penestin (56) le 15 mai.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) 16 données

Hors des lieux de reproduction connus :
1 au Len/Louannec (22) et 18 à Hillion (22) le 28 avril ; 5 au Croisic
(44) le 29 avril ; 2 à Trenvel/Tréogat (29S) et 5 à Locmariaquer (56)
le 4 mai ; 1 à Piriac (44) le 20 mai, 2 à Bétahon/Billiers (56) le 17
juin.

En juillet, 5 à Goulven (29N) le 6, 16 à St-Nazaire (44) le 15.

16 couples en deux points de Beniget/Molène (29N) le 11 juin.

STERNE GAUGEK (*Sterna sandvicensis*) 89 données

2 au Croisic (44) le 18 mars, 1 à
Tréganna/Locmaria-Plouzané (29N) et 2 au Grand Minou/Plouzané (29N) le
22, 5 à Port Navalo/Arzon (56) le 23... 35 à Locmariaquer (56) le 31
mars, 20 au Grand-Mont/St-Gildas-de-Rhuys (56) et 7 dans les Coureaux
de Groix (56) le 1er avril... 30 à St-Philibert (56) le 8 avril, 30 au
Croisic le 15, 60 à Moustierlin/Fouesnant (29S) le 18, 200 au Croisic
le 29 avril.

Nidification.- 420 nids à Bel Air/Penestin (56) le 15 mai ; 1909 nids à
Dumet/Piriac (44) le 20 mai ; 40 couples à Er Lannig/
Golfe (56) le 10 juin.

PINGOUIN TORDA (*Alca torda*) 16 données

24 ind. 1 mille au large au Croisic (44) le
13 mai.

Nidification.- A la réserve M.-H. Julien/Goulien (29S), premiers dans
la falaise le 29 mars (4 ind.), derniers le 29 juin ; 12
couples reproducteurs en 1973.

GUILLEMOT DE TROÏL (*Uria aalge*) 16 données

8 à Er Hardenn Vras/Hoedic (56) le 17

avril, 6 à Hoëdic le 20 avril, 63 1 mille au large du Croisic (44) le 13 mai.

Nidification.- A la réserve M. H. Julien/Goulien (29S), 40 à 45 couples, derniers observés le 13 juillet. 23 couples au moins au Cap Fréhel (22).

MACAREUX (*Fratercula arctica*) 9 données

Nidification.- 5 près d'Ar Youc'h/Ouessant (29N) le 16 avril ; 1 au nid à Banneg/Molène (29N) le 23 avril ; 7 sur Milinou Bras/Goulien le 6 juin.

PIGEON BISET (*Columba livia*) 4 données

Pendant la période du 12 au 23 avril, 26 couples cantonnés sont notés sur la côte sauvage de Belle-Ile (56) où 15 individus sont observés le 15 juillet.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) 11 données

1 le 17 mars à Perret (56) ; en Loire-Atlantique : 1 à Beslé/Vilaine le 10 avril, 1 au réservoir du Vioreau le 2 juin, 2 observations dans les marais du Petit-Mars (23 et 28 juin), 1 à Joué/Erdre le 30 juin.

Nidification.- Chants : 1 à Saint Brandan (22) le 6 mai ; 1 dans les Gorges du Daoulas/Laniscat (22) le 11 mai ; 1 à plusieurs reprises en juin au Faouët (56) ; 1 nid avec poussins à Quimper (29S) le 30 avril ; 2 poussins à Quintin (22) le 30 avril.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) 49 données

Les premières sont observées sur l'île d'Hoëdic (56) au début de la seconde quinzaine d'avril : 2 individus le 16, 5 le 17, 2 puis 7 individus le 19 ; 1 à Houat (56) le 19 avril. Les arrivées ont lieu à partir du 28 avril et surtout au début de mai en Loire-Atlantique, Morbihan, Ile-et-Vilaine et Finistère-sud : le 28 à Carnac (56) et Beslé-sur-Vilaine (44), le 29 à Messac (35 sud), le 30 à Quimper (29S), le 3 mai à Paimpont (35 centre), seulement le 9 à Brasparts (29N), le 12 dans le nord-est des Côtes-du-Nord.

Des passages de migrants sont notés tout au long du mois de mai sur plusieurs îles : à l'île de Sein (29S) 7 le 7, 8 individus le 8, 3 le 10, 7 le 11 et 27 le 12 ; 7 à l'île Dumet (44) le 20 mai ; 17 à Groix (56) le 22, 25 au même endroit le jour suivant. Quelques groupes dans la première quinzaine de juin : 25 à Trévignon (29S) le 3 ; 20-25 à Tréneoc (29S) le 8 ; 30 à Sarzeau (56) le 10 ; 10 migrants (vers l'est) à Ouessant le 12. Il est également noté plusieurs dizaines d'individus au Marais de Petit Mars (44) les 22 et 28 juin, 15 individus à Hoëdic (56) le 25 juin et 21 le jour suivant.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) 40 données

Nidification précoce à Saint-Nazaire (44) où 1 juvénile est trouvé mort le 7 avril.

Localités nouvelles de nidification.-

Ille-et-Vilaine.- Nidification probable à Pancé et à Saint-Méen-le-Grand ; possible à Pipriac.

Côtes-du-Nord.- probable à Saint-Brieuc, les Ponts Neufs/Morieux, Penvénan, Plestin-les-Grèves ; possible à Loudéac, Uzel et Quintin.

Finistère.- probable à Plounevez-Lochrist, Esquibien, Audierne, Rospenden ; possible à Plounevezel, Carhaix, Camaret, Clédén, Sein, Goulien et Pouldreuzic.

Morbihan.- probable à Auray ; possible à Dangan. A noter la présence d'un individu à Mouat le 17 avril et à Hoëdic le 26 juin.

Loire-Atlantique.- Nidification établie à Saint-Nazaire ; 1 chanteur à l'île Dumet le 20 mai.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) 115 observations

2 observations précoces dans le Morbihan, le 21 mars : 1 chant à Vannes, 1 autre à l'île aux Moines. Les arrivées se précèdent pendant les 5 premiers jours d'avril : Hennebont (56) le 1er ; Vioreau (44) le 3 ; Messac (35) le 4, Paimpont (35) le 5. A partir du 7 avril les observations sont très nombreuses, tout au moins dans le Morbihan, la Loire-Atlantique et le Finistère-Sud. Première observation le 11 dans le Nord-Finistère (St-Cadou), le 14 dans les Côtes-du-Nord (Laniscat), mais seulement le 19 sur le littoral léonard. Dans le Léon, les arrivées ne sont sensibles qu'après le 20.

Forme rousse.- 1 à Trégunc (29S) le 27 avril, 1 à Plouharnel (56) le 4 mai ; 1 à la Vraie Croix (56) le 8 mai ; 3 à Belle Ile (56) le 13 mai ; 1 le 10 juin à Tal-ar-Groas/Crozon (29S) ; femelles notées en différents points de la côte de Gâvres, Plouhinec, Erdeven, Larmor-Plage (56).

Nidification.- Un oeuf à Larmor-Plage (56) le 28 avril, (nid de Geai).!

Un poussin au nid à Gâvres (56) le 6 mai (nid de Merle) ; 1 oeuf à Dangan (56) le 21 mai. A Quessant (29N) le 9 juin, 1 juv. dans un nid de Pipit maritime, le nid contenant encore un oeuf de l'espèce parasitée. 1 juv. nourri par un Pipit sp. le 11 juillet à Plaudren (56), 1 juv. nourri par les Pipits farlouse le 12 juillet à Clédén - Cap-Sizun (29S), 1 oeuf dans un nid de Linotte à Dangan (56) le 21 mai.

Derniers chants de la période entendus le 28 juin au marais de Petit-Mars (44) : 9 chanteurs et 16 individus.

HIBOU MOYEN DUC (*Asio otus*) Une observation le 21 mars à Plumelec (56).

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) 4 observations

1 à Pennarc'h (29S) le 17 mars, 1 le 13 avril à l'île de Groix (56) ; 1 dans les marais du Yeun-Elez (29N) les 10 mai et 11 juillet.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*) 21 données

3 poussins au nid à Roudouallec (29S) le 15 juin ; 1 le 16 juin au Faouët (56). Poussins au nid à Guiclan (29N) le 28 juin ; 1 juv. à Plovan (29S) le 11 juillet.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) 28 observations.

Nidification.- 4 nids signalés : 1 poussin à Léhon (22) le 2 mai ; 1 poussin à Dinan (22) le 5 mai ; 2 poussins à Bohars (29N) le 6 mai ; 1 poussin à Pont Scorff (56) le 9 mai.

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) 40 données

3 oeufs à Groix (56) le 1 avril ; 3 oeufs à Plouneour-Menez (29N) le 20 mai ; 3 juvéniles en duvet le 19 mai au Stang/Plougourvest (29N) ; 4 poussins (3 à 4 jours) au Cloître-Saint-Thégonnec (29N) le 3 juin ; poussins au nid à Meslan (56) le 13 juin ; 3 poussins au nid à Plouneour-Menez (29N) le 10 juin.

ENGOULEVENT (*Caprimulgus europaeus*) 10 observations

Côtes-du-Nord.- 2 observations, l'une à Saint-Brandan (17 mai), l'autre à Lanfains le 10 juin.

Finistère.- Chanteurs à Quimper les 23 juin et 10 juillet ; 1 à Pleuven le 27 juin.

Morbihan.- 1 chant très précoce à Saint Armel le 18 mars ; 1 observation à Séné le 17 mai ; 1 chanteur et un couple à Ploemeur le 23 juin ; 1 individu à Larmor-Plage le 4 juillet.

Loire-Atlantique.- 4 individus chantent le 25 mai dans les marais de St-Etienne-de-Montluc.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) 80 données

Premier observé le 1er avril à Kergleverit (56) ; la seconde observation à Nantes (44) 13 jours plus tard (14 avril). Dans la troisième semaine d'avril, quelques observations dans le sud : 2 à Nantes (44) le 16 avril, 35 à Saint-Aignan-Grand-Lieu (44) le 17 avril ; quelques jours plus tard : 1 à Nantes (44) (22 avril), arrivées à Beslé/Vilaine (44) du 23 au 28 avril.

Les arrivées sont très importantes à partir du 26 avril dans le sud Breton. Le Finistère et les Côtes-du-Nord sont atteints plus tard : 1 observation à Quimper (29S) le 24 avril, puis 3 à Daoulas (29N) et un passage de 10 individus à Loctudy (29S) le 28 avril ; 35 individus de pas-

sage à Trévignon (29S) le 30 avril ; 50 à Saint-Renan (29N) le 1er mai. Première observation dans les Côtes-du-Nord à Saint-Brieuc le 30 avril, 20 à Hillion (22) le 1er mai.

A cette époque il y a déjà de forts rassemblements dans le Morbihan et en Loire-Atlantique : 30 à Penn en Toull (56), 30 à le Tour-du-Parc (56) le 29 avril ; 300 à Le Tour-du-Parc le 30 avril ; 100 à Noyal (56) le 4 mai ; 300 à Roc'h Du (56) le 5 mai. Les arrivées se font importantes dans le sud-Finistère vers le 5 mai : environ 300 à Trenvel le 6 mai.

Les premiers nicheurs sont notés le 1 mai à Saint Nazaire (44), le 2 et le 3 à Brest où ils abondent le 14. Les 12 et 13 mai, alors que certains individus sont cantonnés dans la régions de Saint-Méen (35) - Broons (22), il y a encore des passages de migrateurs : étang de Loscouët (22), 50 à 60 à St-Vran (22). La migration se poursuit jusqu'à la fin du mois de mai : 1 migrateur à Groix (56) le 15 mai, 1 autre au même endroit le 25.

MARTIN PECHEUR (*Alcedo atthis*) 55 observations

Nidification.- 2 individus agressifs à Larmor-Baden (56) le 25 avril.

Transports de nourriture le 12 mai à Merdrignac (22) et Loscouët (22). Transport de matériaux à Mériadec (56) le 19 mai. 1 adulte nourrissant en rivière de Pont-l'Abbé (29S) le 25 mai. Nid avec poussins à Pleuven (29S) le 3 juin. 1 individu cantonné à Port-Launay (29S) le 26 juin. Nourrissage à Goven (35) le 7 juillet. Observation d'une famille (3 juv. et 2 adultes) à Plouhinec (29S) le 10 juillet.

Dispersion notée à mi-juillet : 1 à Goulien (29S) le 14, 1 à Belle-Ile (56) le 15.

HUPPE (*Upupa epops*) 71 observations

Premières observations à Belle-Ile (56) le 24 mars, puis à Sarzeau (56) et à Ambon (56) le 25. Premier chanteur à Roc'h Du (56) le 27 mars...

Nouvelles localités signalées.-

Ille-et-Vilaine.- Messac (probable)

Côtes-du-Nord.- Le Gouray (probable), Saint-Jacut (possible)

Finistère.- Trégunc (29S) (probable).

Morbihan.- possible à Plouhinec et Lorient (bois du Ter) ; probable à

Crac'h, Baden, Penn-en-Toul/Larmor-Baden, la Trinité/Mer, St-Philibert, Arzon, Peaule, Carnac ; certaine à Elven, Ste-Barbe/Plouharnel.

Loire-Atlantique.- probable à Thouaré et au Vioreau (Joué/Erdre) ; certaine à Ste-Marie-sur-Mer.

PIC CENDRE (*Picus catus*) 18 données

9 nouvelles localités.-

Ille-et-Vilaine.- 1 chanteur à St-Sulpice-des-Landes le 23 juin.

Côtes-du-Nord.- Le 12 mai, 1 à l'Hermitage/Broons ; chants à Trébedan, St-Vran (présence précédemment notée), Ploufragan (26 avril) ; Hénanbihen (15 avril) ; forêt de Lorges (3 avril et 26 juin).

Morbihan.- 1 chanteur à l'étang de Roc'h Du/Crac'h (24 mars).

Loire-Atlantique.- 1 chanteur à Sautron (15 juin).

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) 4 données

1 chanteur est noté le 4 avril en forêt du Gâvre (44).

Donnée très intéressante et inattendue dans l'ouest du Finistère :

→ le 30 avril il y avait au minimum deux chanteurs en forêt du Cranou/Kumengol-Hanvec.

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) 40 données

21 nouvelles localités.-

Ille-et-Vilaine.- 2 à l'étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen (14 avril) ; 2 à Cancale (30 avril).

Côtes-du-Nord.- 1 à Lehon (18 mars) ; 1 à Dinan (2 avril) ; 1 à Le Gouray (12 mai) ; chants et tambourinage le même jour à Broons et Plénée-Jugon ; tambourinage à le Moustoir (26 mai).

Finistère.- 2 individus se poursuivant à Guiclan le 25 juin ; chants à Coat Loc'h/Scaer (27 avril), à Landivisiau (17 mai), à Esquibien (9 et 13 juillet).

Morbihan.- 2 à Plumelec (21 mars) ; 1 à Elven (2 avril) ; 1 à Surzur (10 avril). Chants à Séné (21 avril), à Allaire (16 juin). 1 nid à Kerbois/Crac'h (28 avril), jeunes au nid le 19 mai, nid vide le 10 juin.

Loire-Atlantique.- 1 à Thouaré (23 avril) ; 1 couple à Courbière/Château-briant (21 juin) ; 3 individus à l'Île Arouix/Mauves (30 juin).

TORCOL (*Jynx torquilla*) 10 données

Premier chanteur à St-Armel (56) le 22 mars.

Localités nouvelles.-

Morbihan.- 1 couple à Malestroît (12 avril) et à St Congard (19 avril).

1 à l'étang de Kervily/Allaire (17 juin) ; 2 juvéniles à Coët-digo/le Cours (29 juin).

Loire-Atlantique.- 1 couple à Nantes (27 et 28 avril). 1 chanteur à l'Île de Fédrun en Brière (28 avril) ; 1 chanteur à Joué-sur-Erdre (13 juin).

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) 10 données

L'implantation en marais de Guérande (44) se confirme (elle y était connue dans la seconde moitié du siècle dernier). A Plouhinec (56), chanteurs notés les 13 et 28 mai, 11 et 29 juin. A Hoëdic (56), 1 le 13, 1 chanteur le 17 avril, 2 couples seulement (dont un nourrissant) localisés le 24 juin et les jours suivants.

On note la première apparition au nord des sites de reproduction : 1 le 19 mai dans les sablières du Vougo/Plouguerneau (29S).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) 10 données

Nourrissage à Batz (44) le 7 avril, 4 juvéniles à St-Nazaire (44) le 25 juin, 1 ind. au sillon du Len/Louanec (22) le 30 juin, 1 couple à Erdevén (56) le 1er juillet, 3 juv. à St-Nazaire le 15 juillet.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) 30 données

Nouvelles localités.-

Côtes-du-Nord.- chants à Plénée-Jugon et Langourla

Finistère.- chant à Plogastel-Saint-Germain

Morbihan.- Trédion, Plumelec, Plouray, le Faouët; chant à la Bertrie/Peillac. Transport de matériaux à les Fougerêts/Peillac le 28 juin.

Loire-Atlantique.- Chateaubriant ; chants à Massérac, marais de Guérande, Tréffieux et Ancenis.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) 39 observations

Encore une bande de 40 individus le 23 mars, à Quiberon (56). 3 oeufs à Fouesnant (29S) dès le 28 mars.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) 130 données

La première observation est faite en Loire-Atlantique : le 18 mars à Massérac ; puis 1 les 21 et 22 mars à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) ; 4 à Ploeneur (56) le 23 mars.

Le passage devient important dès la fin du mois de mars : 30 à Lannénec/Pbameur le 27, 100 à Massérac (44) le même jour.

Le gros des arrivées a lieu tout au long du mois d'avril : 15 à Trégunc (29S) le 1er, 50 au Vioreau (44) le 3, 30 à l'étang du Pont le 5, 200 à Combourc (35) le 8, 170 à St-Renan (29N) le 11, 60 à Trégunc

(29S) le 12, 100 à Ménéham (29N) le 13, 30 à Grand-Lieu (44) le 17, 200 à Plancoët (22) le 21, 20-50 à Langon (35) le 23, 150 en Brière (44) le 28.

Le passage se poursuit avec moins d'intensité, en mai : 20 à la Trinité/Mer (56) le 1, 100 à Saint-Renan le 4, 40 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 5, 300 à Bourg-Blanc (29N) le 6, migrateurs notés à l'île de Sein (29) les 8 et 11, 30 à l'étang de Trébry (22) le 11, 30 à Sizun (29N) le 17.

Après cette date, peu d'observations : 4 à Ouessant (29N) le 1er juin.

Nidification.- Premiers nids occupés : 6 à Plounevezel (29N) le 19 avril.

Nouvelles colonies signalées.-

1-10 nids.- St-Gilles-Pligeaux (22), vallée du Gouet (22), Plouha (22), Plounevezel (29N), Plogoff (29S), Plouhinec (56).

11-50 nids.- Erquy (22), Plumaugat (22), Plaine-Haute (22), Goulien/Crozon (29S).

51-100 nids.- Guerlesquin (29N).

? HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*) Deux observateurs nous ont signalé indépendamment la présence à Trévignon/trégunc (29S) d'une Hironnelle brune présentant à la queue des marques blanches identiques à celles de l'Hironnelle de rochers. S'agit-il vraiment de cette espèce ou d'un cas d'albinisme partiel très particulier chez une Hironnelle de rivage ?

HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*) 90 observations.

Le décalage est net cette année entre les arrivées en Bretagne sud et Bretagne nord : 1ère observation à Roc'h Du/Crac'h (56) le 24 mars, 2 à Bailleron (56) le 26 mars, 1 à Suscinio (56) le 28, 2 à Noyal (56) le 30, 2 à Dangan (56) le 31 et 1 ce même jour à St-Nazaire (44). La première observation du Finistère est faite à Trunvel/Tréogat (29S) le 1 avril, puis 22 individus à Rosporden (29S) le 6 avril ; 15 à Huelgoat (29S) le 7 avril. Dans le nord-Finistère il faut attendre le 8 avril : 1 à Plouézoc'h, 5-10 au Carnic.

Le gros du passage se situe dans la première quinzaine d'avril : 100 au Vioreau (44) le 3, 22 à Rosporden (29S) le 6, 60 à St-Michel-Chef-Chef (44) le 8, 100 à Combourg (35) le même jour ; 30 à Kerhuon (29N) le 9, etc...

La migration se poursuit cependant jusqu'en fin-mai au moins : 500 en Grande Brière le 28 avril, plusieurs centaines à Pierric (44) le 1er mai, 40-50 perchées à l'île de Sein (29S) le 12 mai, quelques migrateurs vers l'est à Groix (56) les 16, 26 et 27 mai ; 100 à Roc'h Du/Crac'h (56) le 5 juin.

Le 13 juin il y a 5 à 10 couples sur l'île Molène (29N).

HIRONDELLE DES FENETRE (*Delichon urbica*) 57 observations

Première observation le 1er avril à Trunvel/Tréogat (29S). Seulement 6 observations pour la première quinzaine d'avril : le Gâvre (44) le 4, Pierric (44) le 9, vallée du Gouet (22) le 12, Landivisiau et Plougourvest (29N) le 13. Cette année la migration reste diffuse tout au long de la période car les seuls groupes importants notés sont : 15 en vol à Groix (56) le 17 mai, 20 à Roc'h Du/Crac'h (56) et 20 à Plusquellec (22) le 19 mai.

Le gros du passage se situe entre le 28 avril et le 28 mai.

Les cantonnements et constructions de nids interviennent pratiquement dès l'apparition des premiers oiseaux : nids en construction à Auray (56) le 16 avril, au Conquet (29N) le 23 avril, à Daculas (29N) et Gouarec (22) le 11 mai, à Brest le 13 mai, 2 nids achevés à Auray le 13 mai. Construction de 2 nids à Ouessant (29N) le 7 juin.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) 53 données

Les deux premiers chanteurs ont été entendus le 30 mars à l'étang du Cranic (56) et au Vioreau (44).

L'espèce qui s'était précédemment révélée abondante surtout à l'est d'une ligne St-Brieuc-Lorient apparaît plus répandue à l'ouest de cette limite, notamment dans le Finistère.

Nouvelles localités.-

Côtes-du-Nord.- Chants à Duault, Plédéliac, Plénée-Jugon (très commun ; 4 oeufs le 12 mai), St Vran, Loscouët-sur-Meu.

Finistère.- Chanteurs à Sizun, Scaër, Tréboul/Douarnenez, Quimper, Fouesnant ; 1 couple nourrissant à St Rivoal le 30 avril.

Morbihan.- 1 à Plumelec, chants à Moëdic, Beignon et Mostang. Transport de matériaux le 28 mai à la Vraie-Croix, transport de nourriture à Trédion le 12 juillet.

Loire-Atlantique.- Noté en forêt de Cellier, entendu à Sautron et au marais de Petit-Mars. Transport de matériaux au Vioreau.

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) 68 données

Le seul indice de passage est la présence d'une bande de 50 à l'île d'Aroux/Mauves (44) le 18 mars. Pratiquement toutes les notes, dès le 21 mars, concernent des chanteurs ou des individus en vol nuptial.

Nouvelles localités.-

Côtes-du-Nord.- Présent dans les gorges du Daculas/Laniscat. Nidification possible à Plénée-Jugon, Loscouët, St Vran, Yffiniac, Ile Grande/Plumeur-Bodou. Nidification certaine à la Hardouinais/Merdri-gnac et à Perros-Guirec.

Finistère.- Le Farlouse est présent sur l'île de Beniget.

Morbihan.- Vol nuptial à Noyal. Nidification à Ploemeur, Carnac, St-Philibert, la Trinité/Mer, Locmariaquer, Bordery/Belle-Ile.

Loire-Atlantique.- Présent à St-Etienne-de-Montluc, Montoir-de-Bretagne, Thouaré. Niche dans le marais de Petit-Mars.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus s. spinoletta*) 11 données

7 à Quimper (29S) le 16 mars, 4 à l'étang de Trévignon/Trégunc (29S) le 17, au moins 2 à Saint-Renan le 18, 2 à 3 individus les 19, 21 et 22 à l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 1 au Curnic/Guissény (29N) le 22 et 1 le même jour à l'île d'Hoëdic (56), 2 à Quimper le 1 avril, puis 1 autre le 6, 1 à Goulven le 4 avril. Au Vioreau (44) 1 individu en parade nuptiale le 3 avril, un autre le 5 avril.

PIPIT MARITIME (*Anthus spinoletta petrosus*) 19 données

Nidification.- Le 23 avril, nid avec 3 poussins à Ledenez de Molène (29N), 2 poussins à Camaret (29S) le 29 avril, 1 juv. volant à Erquy (22) le 10 mai. A l'île de Meaban (56) juvéniles volants et nids avec oeufs le 27 mai. 3 oeufs à Plougrescant (22) le 9 juin. Transports de nourriture à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22) le 3 juillet et à Plogoff (29S) le 7 juillet.

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*) Les premières arrivées sont tardives ; ce sont d'abord

des flavéoles (*M.f. flavissima*) qui apparaissent : 1 à le Tour-du-Parc (56) le 8 avril, 1 le 10 et 2 ♂ le 13 au Curnic/Guissény (29N), 2 ♂ à Brest et 1 ♂ à Goulven (29N) le 13, 1 à Saint-Lyphard (44) le 14, 1 à Houat (56) et 1 ♂ à Saint-Renan (29N) le 17. Les oiseaux de la race type (*M.f. flava*) paraissent plus tardifs : 1 à Saint-Lyphard le 14, 5 le 17 à Pen-en-Toul/Larmor-Baden (56), 2 à Hoëdic (56) le 18. Mais il faut plutôt considérer que les premières ont échappé aux observateurs puisque des transports de matériaux sont notés dès le 17 à Pen-en-Toul.

Les arrivées et le passage sont surtout sensibles dans la dernière décade d'avril et début mai. Le passage des flavéoles se traduit par quelques observations dans le sud-est breton, en des localités où la nidification n'a pas été constatée : outre les trois données citées plus haut (le Tour-du-Parc, St-Lyphard et Houat), on note 1 ♂ le 1er mai à Carnac (56), 1 le 4 mai à Plouharnel (56). De même, quelques oiseaux de la race type sont observés dans le Finistère : 1 à Châteaulin (29S) le 27 avril, 2 au Curnic le 1er mai.

Répartition.- *M.f. flava* : 2 couples + 1 ind. sont à nouveau observés en baie d'Audierne (Trenvel) (29S) le 9 juin. Dans l'intérieur, on peut relever : plaine de Mazerolles et marais du Petit-Mars (44), vallée de la Vilaine dans la région de Beslé-

Massérac, vallée de l'Oust/Peillac (56).

M.f; flavissima : Localités nouvelles : Quimper (29S) (1 couple construit le 2 juin), Plougrescant et Penvenan (22), Clédén - Cap-Sizun, Plagoff, Primelin, Plouhinec (29S) ; 1 couple sur Ouessant du 4 au 17 juin ; 1 couple à Bourg-Blanc (Léon intérieur) le 6 mai. 1 ♂ à Peillac (56) le 29 juin : 2-3 couples sur l'île de Sein. (nid avec 5 oeufs le 11 et 6 oeufs le 12 mai).

Couples mixtes.- 1 couple (♂ *flava*, ♀ *flavissima*) sur l'île de Sein le 8 mai, 1 couple (♂ *flavissima*, ♀ *flava*) sur l'île Molène (29N) le 13 juin (à côté de 2 couples de flavéoles).

Aberrants.- 1 ♂ du type aberrant décrit par Stuart Smith en Angleterre (tête gris pâle avec sourcil et menton blanc, poitrine blanche, bas du ventre jaune vif) nourrit le 24 juin au Kernic/Treflez (29N).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) 47 données.

Nidification.- A Plougourvest (29N) la nidification de deux couples a été suivie : un nid contient 5 oeufs le 7 avril puis à nouveau 5 oeufs le 25 mai (2ème ponte) ; l'autre est encore vide le 7 avril, il est garni de 7 oeufs le 20 avril et le 6 mai, 5 jeunes sont éclos ; 3 poussins à Landivisiau le 9 avril ; oeufs à Sizun (29N) le 15 avril, au Huelgoat (29N) le 22 avril, à la Gouray (22) le 12 mai, à Lorge (22) le 20 mai, à Priziac (56) le 30 juin.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) 61 données

Dernières Bergeronnettes de Yarell signalées à Larmor Baden (56) le 16 mars, à St-Quay/Perros (22) le 28 mars. Fait remarquable : 1 individu de cette sous-espèce le 13 mai à Brest (29N).

Le passage de la sous-espèce type ne s'achève que dans la deuxième quinzaine d'avril puisque l'on note des migrants à Houat (56) le 16 avril, à Moëdic (56) le 18 et 19, 12 individus à Yffiniac (22) le 20, 2 aux îles Molène et Balaneg (29N) le 23.

PIE GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*) 2 données

2 couples et 5 ♂ le 25 mai à St-Etienne-de-Montluc (44).

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*) 1 ♂ entre Quéhelle et Gréhal/Groix (56) le 25 mai.

PIE GRIECHE GRISE (*Motacilla alba*) 2 données

1 le 4 avril à Fouesnant (29S) et 3 à Larré (56) le 2 juin.

? CINCLE (*Cinclus cinclus*) 1 observation (sans précision de date) sur le Scorff au moulin de Castellin/Arzano (29S) ; 1 à Penfoull/Logonna-Daoulas (29S) dans la première quinzaine de juillet. Ces données de source non ornithologique doivent être vérifiées.

TROGLODYTE (*Troglodytes troglodytes*) 12 données

Aucun fait marquant si ce n'est les données concernant la répartition de cette espèce sur les îles de l'Atlantique. Alors que la présence du Troglodyte à l'île de Sein (29S) n'a pu être mise en évidence (observation du 7 au 12 mai) il se reproduit sur les autres îles : présent à Beniget (29N) le 11 mai ; 1 chanteur à Dumet (44) le 20 mai ; 1 nichée à Groix (56) le 24 mai ; jeunes à Houat (56) le 20 juin.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prusella modularis*) 16 données

La population sur l'île Molène (29N) est de 10 à 15 couples ; à l'île de Sein (29S) 4 à 6 couples sont recensés du 7 au 12 mai.

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*) 21 données

Les premières données de mars et avril concernent sans doute des migrateurs : 3 à St Armel (56) le 21 mars ; 1 à la Roche-Bernard (56) le 26 mars ; 2 à Hoedic le 13 avril et 1 le 14. Par ailleurs, on note quelques ciseaux dans les localités de reproduction de Loire-Atlantique début-avril : 1 ♂ le 7 à Guérande, 1 ♂ le 14 à Montoir ; le 25 avril 10 ♂ à St-Etienne-de-Montluc (44) (chant).

En mai, quelques migrateurs sont encore notés : 1 à Langourla (22) les 12 et 13 mai ; 1 à Fouesnant (29S) le 13 mai ; 1 à Plusquellec (22) le 19 mai.

1 couple alarme dans les marais de Guérande (44) le 13 mai ; 2 dans le Yeun-Elez (29N) le 20 mai ; 4 couples à St Etienne de Montluc le 25 mai ; 1 à la Vraie-Croix (56) le 29 mai ; 1 à Plouhinec (56) le 10 juin ; 1 couple avec juvéniles volants et transport de nourriture au lac de Murin/Massérac (44) le 16 juin ; 2 alarmant dans la plaine de Mazerolles (44) le 23 juin, 1 au marais de Petit Mars (44) le 27 juin ; 2 alarmant dans le Yeun Elez (29N) le 28 juin. A Peillac (44), 1 couple avec 5 juv. le 29 juin.

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*) 76 données

Poussins à la Pointe de Corsen/Plouarzel (29N) le 1 avril ; 5 oeufs à Dangan (56) le 5 avril ; transport de matériaux au Vioreau (44) le 8 avril...

Sur Ouessant, 32 à 35 couples sont recensés du 1 au 16 juin, alors qu'aucune observation de l'espèce n'est faite à Sein (29S) du 7 au 12 mai. Mid en finition à Groix (56) le 15 avril. Le 13 mai, transport de nourriture à l'île Molène (29N) dont la population n'est pas supérieure à 3 couples.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) Après l'observation du 7 mars à Kerhuon (29N), on note : 1 ♂ à Trévignon (29S) le 17 mars, 1 ♂ à Brest, 3 ♂ à Fouesnant (29S) et 1 ♀ à Noyal (56) le 21, 1 ♀ à Belle-Ile (56) le 24, 3 ♂ à Plogoff (29S) le 25... 10 observations entre le 25 mars et le 10 avril.

Grosses arrivées à partir du 12 avril : 7 à Goulven (29N) le 12, 23 à Belle-Ile (56) le 13, abondant à Plouguerneau et Guissény (29N) le 13 (les ♂ sont encore nettement plus nombreux).

Si les 23 oiseaux du 13 avril à Belle-Ile sont des migrateurs, c'est surtout par les données de l'intérieur que l'on peut situer le passage : 1 ♂ à Brest le 21 mars, 1 au Vioreau (44) le 8 avril, 1 le 23 avril à Noyal-Pontivy (56), 1 ♂ et 1 ♀ le 24 dans le Yeun-Elez (29N), 1 le 27 en plaine de Mazerolles (44), 1 le 28 à Rennes, 1 le 29 à Brest, 1 le 3 mai à Rennes.

Les premiers chants sont entendus le 31 mars à Erdeven (56), le 11 avril au Curnic/Guissény (29N), le 12 à Goulven (29N). La première ponte n'est signalée que le 13 mai (6 oeufs à Plouhinec (56) où 1 juvénile vole le 26.

La population de l'île de Sein est estimée à une dizaine de couples (7 au 12 mai), celle de Ouessant à 60-65 couples (1 au 6 juin), alors que l'espèce n'est pas observée sur Molène même le 13 juin.

ROUGE QUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) 52 données

Passage certain jusqu'à la fin de la première quinzaine d'avril : St Renan (29N) le 21 mars, Belle-Ile (56) le 23, Trévignon/Trégunc (29S) le 31. 1 ♂ de passage chante à St-Nazaire le 5 avril ; 1 à Hoëdic le 14 avril ; 1 à Poullan (29S) le 15 avril et un individu à Belle Ile (56) le 17 avril.

Premiers chants à Beslé/Vilaine (44) le 23 mars, à Quimperlé (29S) le 3 avril...

Nouvelles localités.-

Côtes-du-Nord.- 1 chanteur à Hillion le 16 juin. Nid à St-Jacut le 16 juillet.

Finistère.- Transport de matériaux à Fouesnant (29S) le 7 mai. Chants à Quimperlé (29S) le 3 avril, à Rospenden (29S) le 24 avril.

Morbihan.- 1 chanteur à Séné le 17 avril, à Quiberon les 17 avril et 11 mai.

Loire-Atlantique.- Chant à la Meilleraye-de-Bretagne le 5 avril, à Joué/Erdre et au Vioreau le 8 avril, à Guérande le 28 avril, à Piriac le 20 mai, à Lusanger le 21 juin, à Ancenis le 23 juin. Présents toute la période de nidification à Thouaré. 2 nids achevés à St-Nazaire les 6 juin et 9 juillet ; 5 juv. au port de St-Nazaire le 15 juillet.

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) 11 données

Premières données.- 1 à Noyal-Pontivy (56) le 19 avril, 1 à Bailleron (56) le 20 avril.

Ille-et-Vilaine.- 1 chanteur en forêt de Rennes le 29 avril.

Côtes-du-Nord.- 1 à Trémeur le 12 mai, 1 couple cantonné à Plénée-Jugon le même jour ; le 21 mai, 1 chanteur en forêt de Lorge où un ♂ chante dans la première quinzaine du mois de juillet.

Morbihan.- 1 chanteur le 16 mai à Plumelec ; 2 peut être migratrices le 17 mai à Groix, une seule le 18. 1 couple et 3 jeunes à l'étang du Moulin du Val/Carentoir.

ROUGE GORGE (*Erithacus rubecula*) 30 données

1 nid à Auray (56) le 18 mars, contient 3 œufs le 24 et 6 œufs le 30...

Quelques données concernent les îles d'Ouessant et de Houat.

À Ouessant 5 chanteurs sont recensés du 1er au 16 juin ; 1 juvénile est observé le 7 juin ; 1 nid avec 4 œufs le 10 juin.

À Houat 1 chanteur le 19 juin, cris à la tombée de la nuit le 27 ; 1 chanteur le 28.

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*) 12 données

Premières observations :

chants à Thouaré (44) et au lac de Grand-Lieu (44) le 17 avril.

Ille-et-Vilaine.- 1 chanteur au Bouël-sur-Vilaine le 30 avril, 1 chanteur à Rennes le 9 mai.

Côtes-du-Nord.- 2 ♂ chantent dans le courant du mois d'avril à Hillion (vallée du Gouessant).

Morbihan.- 3 chanteurs dans les marais de Kervert/St-Gildas-de-Rhuys le 30 avril ; 1 au marais de Kerpenhir/Locmariaquer le 5 mai.

Loire-Atlantique.- 2 chanteurs le 17 avril au lac de Grand-Lieu ; 1 à Thouaré le 17 ; 1 à l'étang de Sandun/Guérande le 22 ; 1 à Mesquer le 20 mai ; 1 au Vioresau les 2 et 13 juin... En mai et juin, on dénombre 20 chanteurs le long de la Loire dans la région de Thouaré-Mauves ; aucun en juillet.

GORGEBLEUE (*Luscinia svecica*) 20 données

Une seule donnée concerne un migrateur, de la sous espèce *svecica* (à miroir roux) : 1 ♂ le 30 avril à Sarzeau (56).

Localités signalées.-

Loire-Atlantique.- Bourgneuf-en-Retz : 1 couple nourrit le 6 juillet au Collet. Marais de Guérande : 6 chanteurs sur 1 km le 1er avril, 7-8 chanteurs le 28 avril, des dizaines de chanteurs et des

nourrissages le 13 mai ; des nicheurs sont signalés des marais de Saillé, de Bourg-de-Batz (12 chanteurs le 13 mai) ; des juvéniles hors du nid le 10 mai à Guérande. Montoir-de-Bretagne : 2 chanteurs le 14 avril. Mezquer : 3 chanteurs le 20 mai à Le Lany.

Morbihan.- Pénestin : 1 le 8 juillet. Marais de Séné : 2 couples (Dolan et Brouël). Marais de Pen-en-Toul/Larmor-Baden : 1 chanteur le 17 avril. Gâvres : 1 couple a niché de nouveau cette année en bordure des marais salés (dans un massif d'ajonc) ; alarmes et nourrissages le 19 mai.

Enfin, 1 oiseau est observé le 2 juin à Larré (56).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) 54 données

Observations régulières dans la deuxième quinzaine de mars : 150 à St-Rivoal (29N) le 21, 150 à Perret (22), 130 à l'Hôpital-Camfrout (29N), 500 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 23 mars, 20-30 à Elven (56) le 26 mars, 50 à Noyal (56) et 30 à Bannalec (29S) le 31 mars.

Nombreuses observations dans la deuxième décade d'avril ; 20 à Plumelec (56) le 11 ; 30 à Bulat (22) et 5-6 à Guipavas (29N) le 12 ; 200 à Lanfains (22) le 13 ; 30 à St-Etienne-de-Montluc (44) le 14, 40 à Kergrenn/Pleyber-Christ (29N) le 15.

Les dernières notes concernent surtout les îles : 20 à Ouessant (29N) le 17 avril, 40 à Belle-Ile (56) les 17 et 18 ; 13 à Hoëdic (56) le 18 ; 1 à Houat (56) le 18 ; 15 à Belle-Ile le 20 avril. On note enfin : 17 à Plougourvest (29N) le 25 avril ; 8 dans le Yeun Elez (29N) le 29 et 1 à Sein (29S) les 10 et 11 mai.

MERLE A FLASTRON (*Turdus torquatus*) 34 données

Le passage est nettement plus fort que les printemps précédents. Il se traduit par l'observation de groupes parfois importants sur le littoral (îles surtout), mais aussi dans l'intérieur du Finistère (Monts d'Arrée).

C'est dans les Monts d'Arrée que les premiers apparaissent : 3 ♂ et 1 ♀ le 28 mars au Yeun Elez, puis gros stationnements dans la première quinzaine d'avril : 18 au Yeun Elez et 4 à Roudoudero'h/Sizun le 5, 28 au Yeun Elez le 7, 20 le 11, 8 (5 ♂) le 15. Le passage semble se terminer rapidement dans ce secteur bien que l'on note encore 1 ♂ et 1 ♀ au Labou/Hanvec le 29 avril.

Sur le littoral, les premiers oiseaux ne sont vus qu'à la mi-avril, le plus gros du passage ayant lieu entre le 13 et le 23 : à l'île Hoëdic (56) : 1 ♂ et 1 ♀ le 13, 2 ♂ et 1 ♀ le 14, 1 ♂ et 1 ♀ le 15, 3 ♂ le 16, 11 le 18, 2 et 1 le 19 ; à Belle-Ile (56), maximum le 22 avec 18 en un point (4 la veille) ; à Ouessant, 2 le 14, 8 au moins le 16 ; 1 ♀ à Molène le 23.

Par la suite, on ne note plus que : 1 ♂ le 27 au Cap Sizun (29S)

et 1 ou 2 journallement sur l'île de Sein (295) entre le 7 et 10 mai.

Nidification. Dans le Yeun Elez, il semble que les premiers nicheurs soient apparus début-avril lors du passage : 1 chanteur les 7, 11, 15 avril. En mai, 1 ♂ alarme le 9, 3 couples observés le 19, mais le 3 juin on ne note qu'1 chanteur et 1 ♀ . 2 juv. d'une douzaine de jours le 6 juin.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) 13 données

1 juvénile volant à l'île Dumet (44) le 20 mai ; non noté à l'île de Sein (295) du 7 au 12 mai ; population de l'île Molène (29N) inférieure à 10 couples.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) 27 données

Régulièrement observée dans la deuxième quinzaine de mars : 30 à Lanrivain (22) le 17 mars ; 30 à St-Jean/Mendon (56) le 24 ; 2 chanteur à Questembert (56) le 25 ; 16 dont 3 chanteurs à Noyal-Pontivy (56) le 31 mars.

Dernières données : 60 à Noyal (56) le 8 avril ; 3 à St-Brandan (22) le 9 ; 1 à Ouessant (29N) le 14, 1 autre le 16 ; 1 à Hoëdic (56) le 19 avril.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) 13 données

Bien moins fréquente que le Merle noir à Houat (56) ; 2 à 3 couples seulement sur Hoëdic.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) 51 données

A Fleuve (295) 1 nid avec 4 oeufs le 27 mars, 1 autre contenant 3 oeufs le 1 avril.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) 96 données

1) Nouvelles localités du 16 mars au 30 avril : 1 chant plage du Verger/Cancale (35) le 16 mars, au Roc'h Du/Crac'h (56) le 24 ; 3 chants au moulin du Lenn/Pouesnant (29S) le 7 avril, 1 chant à Mesléan/Gouesnou (29N) et à l'étang de Combourg (35) le 8, 1 chant à Hoëdic (56) et au Pont-Neuf/Morieux (22) le 13, 2 chants au marais de Cadoudal/Plumelec (56) et 3 chants à Landrezac/Damgan (56) le 14, 1 chant aux Grandes-Rivières/Montoir-de-Bretagne (44) et 1 au marais de Kerzo/Brec'h (56) le même jour, 2 à l'étang de Toulvern/Baden (56) le 17, 1 chant à Saint-Pierre-Quiberon (56) le 20, plusieurs chants à l'étang de Sandun/Guérande (44) le 22, 2 chants à Saint-Etienne-de-Montluc (44) le 25. A St-Renan, 1 chanteur le 28 mars et 2 avril, 2 chanteurs les 11 et 16 avril, 3 chanteurs le 17 avril, 2 chanteurs les 23 et 25 avril, 1 chanteur le premier mai, plus observée ensuite.

2) Nouvelles localités du 1er mai au 15 juillet (période de reproduction).

Côtes-du-Nord.- 1 chanteur à l'étang de Trébry le 10 mai, 1 chanteur à Mégrit et à l'étang de la Hardouinais/Merdignac le 11, 3 chants à l'étang de Jugon le 12, 3 chants au marais du Launay/Trévou-Tréguignec le 3 juin.

Finistère.- 1 chanteur au Lenn Du/Quimper le 14 mai, 3 chanteurs à Ker-loc'h/Crozon et 2 à l'Aber/Crozon le 31 ; 3 chants à Trenvel/Tréogat le 22 juin. En ce lieu, le 14 avril était observé un accouplement. Un chant au Loc'h/Plogoff le 4 juillet.

Morbihan.- 2 chants au Duer/St-Colombier le 30 avril, 1 chant au marais de Kerpenhir/Locmariaquer et à l'étang de Noyalo le 4 mai, 1 chant au stade Le Bail/Lanester le 13 mai, 5 chanteurs (territoires) au marais de Trénézan/Larré le 2 juin, 3 chants à Pen-en-Toul/Larmor-Baden le 10, 1 chant à Kerdoullouen/Marzan, au Val/Nivillac et à Kervity/Allaire le 17, 3 chants à Houat le 18, 2 chants à la Bertrie/Peillac le 29.

Loire-Atlantique.- 1 chant au Burou/Sautron le 15 juin, 1 chant au Tesdon/Avessac le 16, 15 chanteurs au marais du Petit-Mars (23 le 28), 4 chants à l'étang de la Coursière/Chateaubriand le 26 ; 1 chant à l'étang du Pin le 1 juillet.

LOCUSTELLE LUSCINOIDE (*Locustella luscinioides*) 18 données

Premiers chants dans la première décade d'avril au lac de Murin/Massérac (44) les 8 et 10, puis le 14 à Sarzeau (56), le 15 en baie d'Audierne.

Les trop rares données reçues n'apportent aucune nouveauté sur la distribution de l'espèce en Bretagne. Retenons comme point de repère en ce qui concerne la Brière (44) : 10 chants à l'île Pédrun le 28 avril.

LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*) 53 données

Premiers chanteurs notés à Groix (56) le 14 avril, en deux points de Saint-Philibert (56), à Hoëdic (56), à la pointe du Croisic (44) et dans les marais de Guérande (44) le 15.

Passage vraisemblable en avril : observations à Hoëdic, à Houat (56), à Belle-Ile (56) et à St-Renan (29N) (1 chanteur le 17, 2 chanteurs le 25), lieux où l'espèce n'est pas connue comme nicheuse.

Nouvelles localités.-

Ille-et-Vilaine.- 1 chanteur aux Gayeules/Rennes le 2 juin. Première donnée pour l'Ille-et-Vilaine...

Côtes-du-Nord.- 1 chant à la pointe des Guettes le 10 mai et dans la vallée du Gouessant le 19 à Hillion ; 1 chant dans une lande à Saint-Nicodème le 11 juin, 1 chant à Ploufragan le 21.

Finistère.- 3 chants à Bondivy/Plonéour-Ianvern le 28 avril ;

2 chants à Languéro et 1 à Kerañflech en Milizac les 10 et 14 mai, 1 chant à Brénélec/Saint-Nic le 31 mai ; un seul chanteur à Ouessant du 1 au 16 juin ; 2 chants à Esquibien le 6 juillet, 1 chant au Veryarc'h/Camaret le 10/7

Norbihan.- 1 chant à deux points de St-Philibert le 15 avril ; 1 chant à l'étang de Toulvern/Baden le 17 et le 29 ; 1 chant dans les dunes de Kerpont/Saint-Gildas-de-Rhuys le 30 ; chant à Groix en 3 points le 25 mai.

Loire-Atlantique.- 2 chants dans les marais de Guérande le 1 mai ; 2 chants et une alarme dans les marais de Petit-Mars le 23 juin.

Il ne faut cependant pas considérer l'audition d'un chanteur comme une preuve ou un indice de probabilité de reproduction, surtout dans la 1ère quinzaine de mai.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) 81 données.

Premier chant à Suscinio/Sarzeau (56) le 25 mars. Mais l'arrivée débute dans la 2ème semaine d'avril avec 1 au Roc'h Du/Crac'h (56) le 7, 1 au marais de Bodaval/Sarzeau le 8, 1 à Lanniron/Quimper (29S) le 10, 1 à St-Renan (29N) et plusieurs chanteurs à Languéro/Milizac (29N) le 11... Augmentation rapide à partir du 15 avril : 5 chanteurs au Pont/Kerlouan (29N) le 16, 9 chanteurs à Pen-en-Toul/Larmor-Baden (56) le 17...

Ce printemps apporte des précisions sur la répartition de l'espèce dans les Côtes-du-Nord. Observée à l'étang de Jugon, à l'étang de Loscoët (très forte densité le 12 mai), à l'étang de la Hardouinais, au Loc'h de Peumeurit-Quintin, au marais de Bodéo, et au Launay/Trévou-Tréguignec.

? ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*) 3 données

Un chanteur observé à l'Île Fédru/Brière (44) le 28 avril. 2 chants le 3 mai et une alarme le 2 juin au marais de Trémézan/Larré (56).

Même avec l'audition du chant, la détermination de la Verderolle reste délicate. Il faudrait obtenir confirmation au moyen de captures pour que soit admise sans réserves cette nouvelle espèce dans l'avifaune nicheuse de Bretagne.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) 45 données

1 chanteur aux étangs de Trévignon/Trégunc (29S) le 11 avril, à Hoëdic (56) le 13, au lac de Grand-Lieu (44) le 17, à Thouaré (44) le 23, à Langon (35) le 30. Mais la plupart des lieux de reproduction ne sont occupés que dans la première quinzaine de mai. 1 ind. observé le 23 mai sur Groix (56) semble être un migrateur.

Côtes-du-Nord.- Chants à l'étang de l'Etier/Langon le 30 avril, 2 chants à Vieille-Rivière/Dinan le 4 mai, 2 chants à l'étang du Lozier/Lanrelas le 13, 1 chant à la Grève-d'en-bas/Plévenon le 27, 1 chant au marais de Gouernel/Plougrescant le 31, nombreux chants au marais du Launay/Trévou-Tréguignec le 3 juin et 2 ind le 2 juillet, 1 chant au marais de Kerhellen/Trébeurden le 3 juillet.

Finistère.- 1 chant à Kerhuon le 4 mai, 3 chants à Kerjean/Trébabu le 16, 9 nids sur 200 mètres de phragmitaie à Trenvel/Tréogat le 27, 5 chants à Kerloc'h/Crozon le 31, 5 chanteurs à Quessant du 1 au 16 juin, 2 juvéniles en duvet à Goulven le 3, 1 couple au Curnic/Guissény le 16, plusieurs chants sur les bords de l'Aulne de Traon-Izella à Port Launay le 26, 1 chant au Loc'h/Plogoff et juvéniles au Loc'h/Primelin le 4 juillet.

Morbihan.- 4 chants à l'étang du Roc'h Du/Crac'h le 5 mai, transports de matériaux à Pen-en-Toul/Larmor Baden le 8, chants à Suscinio/Sarzeau le 18, 1 chant à Kerdual/La Trinité-sur-Mer et 3 chants à Saint Jean/Mendon le 26, 1 chant aux dunes de Sainte-Barbe/Plouharnel le 31; 1 à Landrezac/Pangan le 3 juin, 3 chants à la Grippé/Saint-Dolay le 17, 10 chants à Fort-Bloqué/Ploemeur et 5 couples à Hoëdic le 24.

Loire-Atlantique.- 5 chants au marais de Saint-Etienne-de-Montluc le 25 mai; 4 chants au lac de Murin/Assérac le 16 juin, 4 chants et 2 alarmes au marais de Petit-Mars le 28; nombreux chants à l'étang du Pin le 1er juillet.

ROUSSEROLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*) 2 données
Observée en nombre inhabituellement élevé à Saint-Etienne-de-Montluc (44) les 10 et 24 mai.

PETIT CONTREFAISANT (*Hippolais polyglotta*) 44 données
Premier chant à Saint-Aignan - Grand-Lieu (44) le 17 avril. Puis chants en forêt de Paimpont (35) les 3 et 4 mai, en plusieurs localités des Côtes-du-Nord les 12 et 13 mai.
Nouvelles localités.- (toutes comprises dans la zone de répartition établie en 1972).

Ille-et-Vilaine.- 1 chant à Lassy le 7 juillet.

Côtes-du-Nord.- 3 chants à l'étang de Jugon, 2 chants à Ville-Danet/St-Vran, 1 chant à Boquen/Plénée-Jugon, 1 chant à la Malheure le 12 mai; 1 chant à l'étang du Lozier/Lanrelas, 1 chant à Plumaugat le 13.

Morbihan.- 1 chant à Kerpenhir/Locmariaquer et au Cranic/Brec'h le 13 mai; 1 chant à Brandivy le 27; 2 chants à Marzeau le 17 juin, 2 chanteurs et 3 juvéniles au Monnouf/Questembert le 30; 2 à Largueven/St-Gildas-de-Rhuys le 8 juillet.

Loire-Atlantique.- 2 chants au Burou/Sautron le 15 juin, 1 chant à l'étang de Gruellau/Tréffieux, en forêt du Cèvre et à l'étang du fond du bois/Derval le 21, 1 chant plaine de Mazerolles (44), à Ancenis le 23, 2 chants au Petit Mars et transport de nourriture à Grandville /Jans le même jour ; 3 chants à Couesné/les Fougerets et transport de nourriture au bois de Molac le 29 ; 1 chant à Joué-sur-Erdre le 30.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) 61 données

Une donnée précoce : 1 chant le 24 mars à Kerbois/Crac'h (56). Il faut ensuite attendre la mi-avril pour avoir d'autres données sur la Loire-Atlantique et le Morbihan : 2 chants à St-Aignan (44) le 17, 1 chant au Pont-Neuf/le Tour-du-Parc (56) le 26, 1 à l'île Arouix/Mauves (44) et 2 chants aux salines de Carnac (56) le 30.

Début mai, les observations se multiplient et les premiers chants sont entendus dans le Finistère et les Côtes-du-Nord : 1 chant à Bodister/le Cloître-St-Thégonnec (29N) le 1, 1 à Brest (29N) le 2, 3 chants en forêt de Lorges (22) le 3, 1 chant à Penn-ar-Hoat/Pleuven (29S) le 4...

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) 73 données

Arrivée progressive : neuf données concernant 7 chanteurs du 18 mars au 1er avril pour l'Île-et-Vilaine (Messac le 26), le Finistère-sud (Pleuven le 28), le Morbihan (Meucon le 18, Vannes le 23, Calzac/Sarzeau le 31) et la Loire-Atlantique (Mauves le 19, le Vioreau le 30). Dans la première moitié d'avril, les arrivées sont plus nettes (20 données) : chants le 5 à Paimpont et Rennes (35), le 12 à Ploufragan et Louannec (22), le 13 à St-Brieuc (22), etc...

Passage sensible sur les Îles : 1 ind. manifestement migrateur à Houat (56) le 18 avril, 1 du 8 au 12 mai à Sein (29S).

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) 1 donnée

Première donnée printanière en Bretagne : 1 individu à l'île de Sein (29S) le 12 mai.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) 61 données

Les premières données d'avril proviennent des côtes du Morbihan (1 chant au marais de Pen-en-Toul/Larmor-Baden le 17, chant au Duer/Sarzeau le 22, 3 chants aux salines de Carnac le 28) et de Loire-Atlantique (1 chant à St-Aignan le 17, à St-Etienne-de-Montluc le 24, à Nantes le 28) ; seulement début-mai dans le Finistère (1 chant à Bodister/le Cloître-St-Thégonnec le 1er, 1 à Trenvel/Tréogat le 6...) ; les 12 et 13 mai en plusieurs localités des Côtes-du-Nord.

On peut noter : 3 couples sur Hoëdic (56) le 25 juin et 11 chanteurs

entre le 4 et 12 juillet sur les communes du Cap Sizun (29S) : Primelin, Plogoff, Goulien, Beuzec.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 58 données

Nouveautés.-

Ille-et-Vilaine.- 1 à Lassy le 7 juillet.

Côtes-du-Nord.- 1 dans les gorges du Daoulas/Laniscat le 14 avril, 1 chant à Kerchouan/le Haut-Corlay le 11 mai, 1 à Boquen/Plénée-Jugon et 1 chant à la Hardouinais le 12 mai, 2 au Cosquer/Locarn le 19, 1 à Landrellec le 7 juillet.

Finistère.- 1 à Toulvenn/Quimper le 12 avril, 1 chant à Kerminaouët/Trégunc le 10 mai, 7 dont 1 chanteur au Labou/Hanvec le 24, nourrissage à Quessant le 8 juin, 1 chant à Poull-Roudou/Locquirec le 9, 1 ind à Trenvel/Tréogat le 1 juillet.

Morbihan.- 1 au moulin de Tohan/Questembert le 20 mars, 2 chants à N.D. du Bergo/Grand-Champ le 23, 1 chant à Coët-Divel/Sarzeau le 15 avril, 1 chant à Men-ar-Beleg/St-Philibert le 13 mai, 1 nid/4 pulli à Groix le 18, 1 alarmant à St-Jean/Mendon le 26, 1 couple au Val/la Vraie-Croix le 28, transport de matériaux à Larré le 29, 1 couple avec juvéniles à Carnac le 19 juin, 1 chant à Mesnatellec/Ploemeur le 24, alarmes et nourrissage à Priziac le 30, 1 à Penautais/Trédion le 12 juillet.

Loire-Atlantique.- Nourrissage à Beslé sur Vilaine le 30 juin.

Retenons, en outre, 14 couples pour 29 ha de landes au Roc'h Cléguer/Brasparts (29S) le 12 mai, et trois familles en ce lieu le 3 juin.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) 54 données

→ La progression vers le nord se poursuit, des chanteurs ayant été entendus dans les localités suivantes :

Loire-Atlantique.- Bourgneuf, Sucé, St-Etienne-de-Montluc, Guérande, la Turballe et Mesquer.

Morbihan.- Pénestin, Sarzur, Sarzeau, Noyalo, Séné, Locmariaquer, Quiberon, Houat et Moedic.

Finistère.- Penmarc'h (nid vide), St-Jean-Trolimon, Tréguennec, Tréogat (poussins au nid), Primelin, Plogoff, Crozon et Guissény.

Côtes-du-Nord.- Penvenan, Plébouille et St-Jacut.

Premiers chants le 1er avril à Guérande, le 8 avril à Suscinio/Sarzeau et à Penmarc'h. Nourrissages les 28 juin et 1er juillet à Trenvel/Tréogat, 5 poussins au nid en ce lieu le 3 juillet.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) 60 données

Premiers chants en Loire-Atlantique et dans le Morbihan dans la dernière décade de mars : 1 chant au Cranic/Brec'h (56) et à St-Jean/Mendon (56) le 24, 1 chant à Joué-sur-Erdre (44) le 30, 1 chant à l'étang de Calzac/Sarzeau (56) le 31.

Du 5 au 18 avril, l'arrivée est plus rapide : 1 chanteur à St-Evarzec (29S) le 9, 1 chant à St Rivoal (29N) le 13, plusieurs chants à Languéro/Milizac (29N) le 14, 1 chant en forêt de Lorges (22) le 15. Mais le passage se superpose nettement à cette arrivée : nombreux chants dans un petit marais entre St-Thonan et Ploudaniel (29N) le 14, 3 chants à Landivisiau (29N) le 15, 9 chants à Penn-en-Toul/Larmor-Baden (56) et chants abondants à St-Renan le 17, 1 chanteur sur Molène (29N) le 23.

1 chanteur dans une lande de Groix (56) le 25 mai semble être un migrateur.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) 82 données

Commencée début-mars, l'arrivée s'intensifie rapidement, surtout observée dans la deuxième quinzaine de mars.

Retenons 4-5 chanteurs au Troneur/Bohars (29N) le 20 mars, 8 chanteurs à l'étang du Roc'h Du/Crac'h (56) et 5 au Cranic/Brec'h (56) le 24 ; nette arrivée notée à St-Renan (29N) le 28 et passage noté à Noyal-Pontivy (56) le 31.

La suite du passage n'est plus décelable : seulement 3 chanteurs au Roc'h Du où un transport de matériaux est noté le 7 avril. A l'île de Sein (29S), 1 ou 2 migrateurs probables les 8 et 11 mai.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) 9 données

Ille-et-Vilaine.- 1 chant à l'étang de Comper le 3 mai.

Loire-Atlantique.- 1 chant en forêt du Gâvre le 10 avril, 2 chants le 2 juin et 5 le 8 en forêt du Vioreau, 1 chant au Burou/Sautron le 15, 1 chant en forêt de Juigné/St-Julien-de-Vouvantes le 21.

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) 21 données.

Nouvelles localités.-

Cotes-du-Nord.- 2 chants au bois d'Yvignac, 3 chants à Boquen/Plénée-Jugon, 1 chant en forêt de Boquen/le Gouray, et 2 chants en forêt de la Hardouinais/Merdignac le 12 mai.

Finistère.- 1 chant au bois du Relecq/Plouneour-Menez le 20 mai et le 10 juin, 2 chants le 24.

Morbihan.- 1 chant en forêt de Pont-Callec/Kernasclédén le 13 mai.

Loire-Atlantique.- 1 chant en forêt de Juigné/St-Julien-de-Vouvantes le 24 juin.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) 54 données.

Transport de matériaux à Cheffontaines/
Pleuven (29S) le 1er avril.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) 15 données

Huit données en mars :
Brest (29W), St-Renan (29W), Auray (56), Trénézan/Larré (56), étang du
Roc'h Du/Crac'h (56), étang de la Renouillère (44), Gouesnac'h (29S).

Deux captures à St-Brandan (22) les 7 et 8 avril. Deux accouple-
ments à l'étang de St-Aubin (56) le 14 ; 1 à l'étang de Baron/Guipry
(35) le 17. Ces quelques données ne peuvent être retenues comme indices
sérieux de reproduction, les dates étant un peu précoces. Par contre,
les 2 chanteurs en forêt du Cranou/Hanvec (29W) semblent bien être des
nicheurs, de même que le chanteur du 17 mai à St-Brandan (22).

Enfin, un couple nicheur est signalé à Boquen/Plénée-Jugon (22) le
13 mai. C'est la première donnée récente de reproduction en Bretagne.

→ Espèce à rechercher systématiquement.

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) 1 ♂ au ruisseau du Lay/St-Jean-
Brévelay (56) les 13 et 14 avril.

GOBEMOUCHE NAIN (*Ficedula parva*) 1 donnée
1 oiseau dans les salines de Gué-
rande (44) le 20 avril.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) 66 données

Les premières données concernent
deux localités d'Ille-et-Vilaine le 3 mai : 1 à Beaulieu/Rennes et 1
ou 2 aux Hautes-Folles/Messac ; puis 1 à Dinan (22) le 4, 1 chanteur
à Ancenis (44) le 6, etc... Peut-être les oiseaux notés à Groix (56)
du 13 au 24 mai (3 maximum) sont-ils des migrants.

MESANGE A MOUSTACHES (*Parus biarmicus*) 16 données.

Suite à l'invasion hivernale
on note quelques oiseaux en fin mars : 2 ind à la plage du Verger/Cancalle
(35) le 18, 2 à l'étang du Roc'h Du/Crac'h (56) le 23.

Nidification.-

Finistère.- 1 couple nourrit à Trenvel/Tréogat (29S) le 9 juin ; alar-
mes et transports de matériaux sont notés le 1er juillet.
En mai, l'espèce est observée à Kergaran/Plovan où la nidification est
probable depuis 1971.

Morbihan.- 5 couples dans les marais de Suscinio/Sarzeau le 25 mars.

Loire-Atlantique.- Observées pour la première fois aux Grandes-Rivières/
Montoir-de-Bretagne (10 le 14 avril). Dans les marais

de Guérande : à Congor, 2 ♂, 5 ou 6 juvéniles et 1 ♀ nourrissant le 13 mai. Présentes en nombre les 20 et 24 juin ; entre Clis et Quéniquen, 1 ♀ avec 4 juvéniles. Enfin, la nidification est prouvée au lac de Grand-lieu le 8 juillet : 20 couples, 20 juvéniles et 2 adultes avec 5 poussins (construction notée le 17 avril).

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*) 28 données
2 dans les gorges du Deoulas/Laniscat
(22) le 17 mars.

Reproduction.- Chants en forêt du Vioreau (44) le 4 avril, à St Rivoal (29N) le 13, en forêt de Boquen/Plénée Jugon (22) le 12 mai, ..., au Vioreau le 8 juin. Transports de matériaux aux rochers du Cragou/le Cloître-St-Thégonnec (29N) le 19 avril. Un nid en forêt du Duc/Locronan (29S) le 31 mai. Juvéniles volants à St-Jean/Mendon (56) le 26 mai. *

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) 9 données

Ille-et-Vilaine.- 3 en forêt de Villecartier le 16 mars et un chant aux Gayeulles/Rennes le 20.

Côtes-du-Nord.- 3 chants en forêt de Lorges le 20 mars, 1 couple nichant dans un nichoir à St-Brandan, chant et transport de nourriture à la pointe d'Erquy.

Finistère.- 1 chant à Menez-Meur/Hanvec le 23 mars, 1 chant au Relecq/Plounéour-Ménez le 10 juin.

Morbihan.- 2 nichées à l'étang de la Grée le 13 avril et un nid au bois de Keronic/Pluvigner le 25 juin.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) 14 données
Une famille au bois du Palais/Belle-Ile le 13 juillet.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) 63 données

Localités nouvelles .-

Côtes-du-Nord.- L'espèce est à nouveau notée à l'intérieur du département sur les landes de Lanfains : 1 le 24 avril (chant) et 1 chanteur le 1er juillet.

Finistère.- 1 chant à la Digue/Kerlouan le 28 mars, chant à Kerenna le 13 avril, 1 chant à Kergleuz/Landéda le 22, 1 chant à Kergarant/Plovan et 1 chant à Stang Gourined/Pouldreuzic le 24 ; 2 chants au Stang/Tréguennec et 3 à 4 chants à l'étang de Kernoc/Ile-Tudy le 2 mai, 2 chants à Loc'h Nizeleg/Plovan le 4, 1 chant à Ty Sanquer/Quimper le 26, 3 chants à Penntrez/St-Nic et 1 aux Tas-de-Pois/Canaret le 31 ; 1 chant à l'Ile Chevalier/Pont-l'Abbé le 25 juin ; 1 chant à Ménéham/

Kerlouan et à Bertheaume/Plougonvelin le 5 juillet, 3 chants à Goulven le 10, plusieurs chants à l'embouchure du Guillec le 11, 1 chant à Camaret le 14.

Morbihan.- 2 chants à Kerouarc'h/Locmariaquer le 24 mars, 1 chant à Kervoyal/Dangan le 31 ; 1 chant à Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys le 1 avril, 1 chant à St-Colombier le 15 et au marais de L'égenès le 22 à Carnac ; 2 chants à Kerouac/Ploemeur et 1 chant à Arzon le 4 mai, 1 chant à la pointe de Kerbihan/la Trinité-sur-Mer.

Loire-Atlantique.- 4 à Sainte-Marie-sur-Mer et nombreux chants à St-Etienne-de-Montluc le 25 avril, 1 chant sur une île de la Loire à Ancenis le 6 mai. Deux chants au marais du Petit-Mars le 28 juin.

La donnée de Ty Sanquer, dans l'intérieur du Sud-Finistère, est très intéressante ; mais peut-être s'agit-il d'un oiseau en erratisme. Un recensement a été effectué sur quelques communes du Cap Sizun (29S) : il donne 5 chanteurs pour Plogoff, 7 chanteurs pour Primelin, 16 chanteurs et 1 nourrissage à Cléden, 25 chanteurs et 1 isolé à Goulien, enfin 22 chanteurs et 3 nourrissements pour le tiers occidental de la commune de Beuzec ; en outre, ces décomptes ont montré que la répartition des couples n'est pas uniforme : il y a des vides assez importants et des taches de densité variable ; des chanteurs ont été observés jusqu'en plein centre du Cap, dans la région de Beuzec.

BRUANT ZIZI (*Emberiza citrulus*) 58 données

Quatre données léonardes : chants à Brest (St-Pierre, Faculté des Sciences), Porsmilin/Locmaria-Plouzané et Plougourvest entre le 21 mars et le 14 juin.

Signalé comme seul Bruant avec le Proyer à Groix (56).

1 BRUANT A TÊTE ROUSSE (*Emberiza hortulana*) 1 donnée

1 ♂ en plumage nuptial du 11 au 14 juin à Quessant (29N) (il peut s'agir de l'oiseau déjà noté l'automne précédent).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) Un migrateur certain : 1 à Lampaul/Quessant (29N) le 17 mars.

Reproduction.- Premiers nids dans les marais de Guérande (44) le 22 avril (2 fois 4 oeufs), au marais d'Ambon (56) le 2 mai (4 oeufs). Premiers poussins à Dolan/Séné (56) le 26 avril (3 pulli). Nourrissements à Kerloc'h/Crozon (29S) le 31 mai. Juvéniles au marais de Penn-en-Toul/Larmor-Baden (56) le 10 juin, au lac de Murin/Massérac (44) le 16 ; au Loc'h/Primelin (29S) le 5 juillet.

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) 1 donnée

1 à Lampaul/Quessant (29N)

le 25 mars.

VERDIER (*Carduelis chloris*) 42 données

Encore quelques bandes jusqu'à la fin avril en particulier : 30 à Kerpenhir/Lochmariaquer le 25 mars, 20 à Noyal-Pontivy (56) le 31, 150 à Kerledan et 100 au Pouldon/Belle-Ile (56) le 15 avril, 90 à Ti-Bleiz/Brasparts (29N) le 24. Plus tardivement, 40 sur les dunes de Montero/Plouhinec (56) le 26 mai et 19 à Carnac (56) le 19 juin.

CHARDONNERET (*Carduelis carduelis*) 29 données

Migration observée à l'île de Sein (29S) dans la seconde semaine de mai. Les oiseaux se dirigent vers l'ouest ou stationnent momentanément sur l'île, isolément ou en petits groupes (5-8) les 9, 10, 11 et 12 mai ; 1 seul vers le nord le 12.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) 4 données

3 ind au Treulin/Auray (56) et quelques ind. à l'île Arrouix/Mauves (44) le 16 mars. 4 au jardin des plantes/St-Nazaire (44) le 17. Enfin, 4 en forêt de Lorges (22) le 4 avril.

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) Mouvements notés à Batz (44)

(11 + 150 + 5 le 7 avril) et à la pointe d'Arradon (56) le même jour ; à l'île de Sein (29S) (petits vols vers l'ouest) les 9 et 10 mai.

Alors que les observations de chanteurs se généralisent dans la deuxième décade de mars, de nombreuses bandes sont encore notées en avril : 80 au Grand Morin/Questembert (56) le 1er, 150 à la plaine de Baud/Rennes (35) le 7, 30 aux salines de Kervilen/la Trinité (56) le 8, 90 à Ti-Bleiz/Brasparts (29N) le 11 et 50 le 27, 100 au Vougo/Guissény (29N) le 18, 50-60 à Houat (56) et 5 à 600 à Hoëdic (56) le 17, 30 à Ker-gloannec/Ambon (56) le 18, 23 à Noyal-Pontivy (56) le 23, 40 à Kerloc'h/Crozon (29S) le 31.

SERIN CINI (*Serinus serinus*) 139 données.

50 à 70 individus à la Brientais/Bausseais (22) le 18 avril.

Nouvelles localités.-

Ille et Vilaine.- 1 couple à St-Méen le 12 mai.

Côtes-du-Nord.- 2 chanteurs à la pointe et au bourg d'Erquy le 10 mai,

2 à Broons le 12, 1 chant à Plouguivel le 1er juin, 2 à Perros-Guirec le 4, 1 chant à la Roche du Taill (bord de l'Ouest) le 16, plusieurs chanteurs à Bréhat le 23 avril.

Finistère.- 1 chant sur les bords de l'Elorn (secteur maritime) le 3 avril, 1 chant à l'étang du Pont/Kerlouan le 10, à Kernébel

(Dourduff)/Plouezoch le 17 et au Suler/Loctudy le 28 , 2 chants à Kerjean/Trébabu le 16 mai , 1 chant à Plougasnou le 8 juin, 3 chants à Locquirec le 9, une alarme à Trévignon/Trégunc le 16, 1 chant à Plounévez-Lochrist le 23, et à Plougoum le 30 , 1 chant à Audierne le 4 juillet et 2 chants à Kerguerrien-Gante/Esquibien le 13.

Morbihan.- 2 chants à Quéven le 21 mars, 1 chant à l'étang de Noyal le 8 avril et au Pont-Fol/Plougoumelen le 14 , 1 chant à Kersigalais/Colpo le 11 juillet.

Loire-Atlantique.- 6 chants à Sainte-Marie-sur-Mer le 18 mars , 1 chant en Forêt de la Poitevinière (44) le 3 avril.

Reproduction.- Nid vide à Brallac'h/Pouesnant (29S) le 5 mai. Quatre oeufs à Sainte-Marie-sur-Mer le 18 avril et à Kervoyal/Dangan (56) le 26 mai. Nourrissage de juvéniles à Kerguerrien-Gante/Esquibien le 13 juillet.

BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) 2 données
3 le 7 juin à St-Arnel (56) et
3 le 8 juin à Paimpont (35).

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) 18 données
1 ♀ (nigatrice ?) à Hoëdic (56) le
19 avril.

GROS BEC (*Coccothraustes coccothraustes*) 12 au Chêne-Ferron/Dinan (22)
le 18 mars, 5 à St-Brandan (22)
le 29 mars, 5 le 13 avril et un couple le 12 mars au même endroit. 2 à la Fontaine-des-Eaux/Dinan et à Vieille-Rivière/Dinan le 2 avril.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) Nombreuses colonies rupestres sur la côte sauvage et côte nord de Belle-Ile (56).
1 couple nichant dans un nid de Grand Corbeau à Plérin (22) le 3 mai.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) 34 données
Une observation difficilement interprétable : 1 ind sur l'île de Sein (29S) le 12 mai.

Nouvelles localités.-

Côtes-du-Nord.- 2 à Mur-de-Bretagne le 17 mars ; 1 à Guingamp le 11 juillet.

Finistère.- 1 à Quimper le 13 mai.

Morbihan.- 60 à Kervégant/Quéven le 3 avril ; signalé nicheur en mai sur la commune de Quéven ainsi qu'au Temple/Pont-Scorff et à Lorient.

Loire-Atlantique.- 1 à la Faculté de droit/Nantes le 7 mai ; 3 à Piriac le 20 ; nicheur à Bellevue/Thouaré en juin ; 1 à Ancenis le 23 juin.

LORIOT JAUNE (*Oriolus oriolus*) 17 données

Migrateurs notés sur plusieurs îles bretonnes ; à Sein (295) le 7 mai ; à Groix (56) : 1 le 17, 4 le 20, 1 autre aux environs de Locqueltas le 24 ; à Ouessant (29N) : 1 au Korz les 1 et 3 juin, 2 (♂ vraisemblablement) à Pount-ar-Rodez le 6 et 1 le 24 à Prat-Meur le 7.

Ille-et-Vilaine.- 1 ♂ dans les marais de Sougéal le 24 mai et 2 le 24 juin.

Morbihan.- 1 chanteur à la Tour d'Elven/Elven le 23 mai ; 3 couples cantonnés aux marais de Trémézan/Larré le 2 juin.

Loire-Atlantique.- 1 ♂ et un chanteur à la Jugrande (bord de Loire) le 6 mai, 2 à 3 entre Mauves et Thouaré en mai et juin, 1 chanteur au Burou/Sautron le 15 mai. 1 à St-Aignan-Grand-Lieu le 8 juin, 1 ♂ et plusieurs juvéniles en forêt de Donnai-che/Lusanger.

PIE BAUARDE (*Pica pica*) 8 données

9 à Donnant/Belle-Ile (56) le 13 avril. Peu fréquente sur les cartes de Broons (22) et de St-Méen (35) les 12 et 13 mai.

Un nid en voie d'achèvement à Moedic (56) le 19 avril.

GRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) 16 données

Un nid contenant 3 pulli au Corsen/Plouharzel (29N) le 13 avril. Le 6 juin, un poussin nourri au nid à Plouharnel. Un nid avec pulli à Pornoguer (29N) le 7 juin.

Durant la première quinzaine de juin, l'effectif d'Ouessant (29N) est évalué à dix couples.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) 19 données

La répartition de l'espèce s'avérant finalement mal connue en Bretagne, nous entreprenons de publier les localités signalées.

Ille-et-Vilaine.- L'espèce semble absente le 12 mai sur la carte de St-Méen.

Côtes-du-Nord.- Le 12 mai, un seul oiseau est noté sur la carte de Broons (Plénée-Jugon). 4 à St-Brieuc en juin ainsi qu'une petite colonie signalée à l'abbaye de l'Etang-neuf aux environs de Corlay.

Finistère.- 15 couples au Grand-Minou/Plouzané le 22 mars, transports de matériaux à Pendreff/Plogoff le 23, 11 au Ralecq/Plounéour-Ménéx le 11 avril, 60 à 70 couples à la réserve Michel-Hervé Julien/

Goulien en mai, alarmes à Sizun le 10 mai, 2 dans un clocher à Carhaix le 19, 4 oiseaux et nid dans les falaises de Pornmoguer le 7 juin, 6 au cap de la Chèvre/Crozon le 11. Précisons que l'espèce niche communément dans tout le département.

Morbihan.- Transport de matériaux à Belle-Ile le 13 avril ; 1 nid et 2 pulli à St-Sébastien/le Faouët le 8 juin ; 90 à Vannes le 3 juillet.

Loire-Atlantique.- 10 nids aux rochers de Mauves le 8 juin ; 55 à Bellevue/Thouaré en juin.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) 24 données

Nouvelles colonies : 17 nids à la Brousse/Sarzeau (56) le 20 mars ; 15 nids à l'île Monty/Thouaré (44) en juin et une colonie non dénombrée vers Ancenis (44).

Notons, par ailleurs, 22 à Plouzané (29N) le 22 avril ; 15 sur les dunes de Sarzeau le 31 mai et plusieurs bandes fréquentant la baie d'Audierne (29S) : 25 à Trenvel/Tréogat le 20 mai, 30 à Tréguennec le 9 juin, 15 le 24 et 50 le 28 à St-Vio/Tréguennec.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) 17 données

Retenons les observations insulaires : 1 sur Balaneg/Molène (29N) le 23 avril, 2 à l'île de Sein (29S), notées du 7 au 12 mai, 1 ind à l'île Dumet/Piriac (44) le 20, 2 à Ouessant (29N) entre le 2 et 17 juin, entendue sur Molène le 13 et 1 sur Hoëdic (56) le 23 juin. 1 nid contient 3 pulli à Beniget/le Conquet (29N) le 11 juin.

CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone cornix*) 1 à Ouessant (29N) le 17 avril.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) Observations hors des lieux habituels de nidification. Dans le Léon (29N) : 1 sur les bords de l'Elorn (secteur maritime) le 3 avril, 18 à Landivisiau le 14 ; 1 ind à Goulven le 1er juillet. Dans les monts d'Arrée : 2 à St-Rivoal le 29 avril, 12 à Menez-Meur/Hanvec le 11 mai. En baie d'Audierne (29S) : 3 à Tréguennec le 9 juin.

An Vran, 1973, 6 (2)

PREMIERES NIDIFICATIONS
DU FULIGULE MORILLON (AYTHYA FULIGULA)
EN BRETAGNE
par Fañch PUSTOC'H et Roland PERON

De fortes présomptions nées d'observations de 1972 nous ont incité à surveiller étroitement le stationnement des Morillons aux étangs de Trévignon/Trégunc (Finistère-Sud) au cours du printemps 1973. Ceci nous a permis d'apporter la première preuve de reproduction de cet oiseau en Bretagne.

Les observations de 1973

11 avril : 10 oiseaux
25 avril : 3 couples
30 avril : 1 couple
06 mai : 1 couple
13 mai : 1 couple
23 mai : 1 couple
03 juin : 1 femelle alarmant
28 juin : 2 femelles accompagnant respectivement 9 et 11 poussins
04 juillet : 1 femelle accompagnant 9 poussins
18 juillet : 1 femelle accompagnant 10 poussins

Nos observations de 1973 nous permettent même d'avancer a posteriori que le Fuligule morillon s'était déjà reproduit au même endroit l'année précédente : le 23 juillet 1972, nous notions une cane accompagnée de 7 poussins entièrement sombres. Notre manque d'expérience nous avait empêché à l'époque d'identifier avec certitude cette nichée, d'autant que la cane s'était très vite dissimulée dans la végétation. L'identité d'aspect entre les poussins de 1973 et ceux de 1972 ne nous permet plus de douter que, dès la première année, il se soit agi de ca-



netons de Fuligule morillon.

Pour ce qui est de la reproduction en 1973, l'installation remonte probablement à la fin du mois d'avril (entre le 25 et le 30), époque à laquelle les effectifs se sont stabilisés et à laquelle les couples se sont isolés.

Au 4 juillet, les poussins paraissent âgés d'environ trois semaines, ce qui fait remonter l'éclosion à la seconde décade de juin et le début de la couvaison vers le 20 mai si nous nous basons sur une durée d'incubation de 23 à 26 jours (GEROUDET, 1946). Cette date est confirmée par le comportement des mâles : selon BAUER & GLUTZ (1969), ceux-ci quittent les femelles et se retirent pour muer dès la ponte effectuée ; or, nos dernières observations de mâles se situent à la fin du mois de mai.

Le 28 juin, nous observons 2 femelles accompagnées respectivement de 9 et 11 poussins, toutes deux sur le Loc'h Koziou. Le 4 juillet, nous n'observons plus qu'une seule famille sur ce plan d'eau, et le 18 juillet, c'est sur Loc'h Louargar que nous notons une femelle accompagnant 10 poussins. Mais ce dernier étang n'est guère favorable à la reproduction, ses rives étant très pauvres en végétation palustre ; d'ailleurs, nous n'y avons pas vu de Morillons jusqu'alors, ni en mai, ni en juin. Ceci nous a amenés à penser qu'il ne s'agissait pas d'une troisième niche, mais que la famille comportant 11 canetons le 28 juin s'était déplacée de Loc'h Koziou à Loc'h Louargar ; cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que plusieurs petits étangs de mer jalonnent le parcours d'un kilomètre environ entre ces deux plans d'eau. Le cas n'est d'ailleurs pas unique puisque BAUER & GLUTZ (1969) citent pour des îlots de la Baltique, des déplacements de nichées pouvant atteindre 4 kilomètres.

Situation en Europe : historique

[Comme le Fuligule milouin, le Morillon est aujourd'hui en pleine expansion. Dans la première moitié du 19ème siècle, son aire de reproduction occupait, des rivages de la Baltique à ceux du Pacifique, une large bande prenant en écharpe toute l'Eurasie entre le 50ème et le 70ème parallèles (VOOUS, 1960). En Scandinavie, la limite sud coïncidait avec le 65ème parallèle. Plus près de nous, en Europe Centrale, les choses sont plus difficiles à préciser : il semble qu'il y ait eu alors nidification plus ou moins régulière en Poméranie et en Mecklenbourg, avec des cas isolés en Hollande (1835) et au Danemark (BAUER & GLUTZ, 1969).

Les premiers indices certains d'expansion proviennent de Scandinavie et des îles dans la seconde moitié du 19ème siècle : extension vers le sud en Suède à partir des années 1850 ; première nidification

en Ecosse en 1892, en Islande en 1895 ; dès 1904-1908, les nicheurs sont nombreux en Islande (BAUER, 1969). La progression vers le sud se poursuit toujours en Norvège (HAFTORN, 1958).

Le phénomène est plus tardif et plus lent au sud. A partir de la Pologne, la progression s'effectue selon deux axes. Le premier longe les côtes de la Baltique et de la Mer du Nord : le Danemark est conquis au début du 20ème siècle (première preuve en 1904) (BAUER, 1969), la Basse-Saxe à partir de 1936-1938, la Hollande surtout après 1941 (cas isolés de 1905 à cette date) (BAUER, 1969), la Belgique depuis 1956 (un cas isolé en 1947) (LIPPENS, 1972). Le deuxième axe s'oriente vers le sud et la sud-ouest, en contournant l'Allemagne par le sud : il est jalonné par l'occupation de la Silésie en 1906 (VOOVS, 1960), de la Bohême dans les années 1930 (première preuve en 1914), du sud de la Bavière en 1930, du Bade-Wurtemberg au début des années 1950 (BAUER, 1969), de la Suisse après 1958 (GLUTZ, 1962), du nord de l'Autriche en 1960 (BAUER, 1969), de la Slovaquie en 1964 (premier cas en 1957) (BAUER, 1969).

C'est aux publications de Noël MAYAUD que nous ferons appel pour connaître le statut du Morillon en France avant 1950. Dans son "Inventaire des oiseaux de France" (1936), il écrit : "*Nidificateur ? à rechercher en Corse, et en Picardie ; occasionnel en Vendée.*" ; plus tard, il précise dans les "Commentaires sur l'ornithologie française" (1938) : "*Certains observateurs ont dit à Louis BUREAU que cet oiseau nichait sur le lac de Grand-lieu ; et d'après ROGERON, il aurait niché près d'Angers... Les sûretés désirables manquent...*" ; enfin, dans la "Liste des oiseaux de France" (1953), il lui attribue le statut suivant : "*Nidificateur : cité occasionnellement en France*". Comme on voit, rien de très précis, ni de très convaincant. Si vraiment le Fuligule morillon a niché en France avant la seconde moitié du 20ème siècle, cela n'a pu être que très occasionnel.

La première preuve est fournie par la découverte d'une nichée en 1952 dans les Dombes (VAUCHER, 1954). Notons que cette localité se trouve tout à fait dans le prolongement du deuxième axe de progression en Europe continentale (cf. plus haut). Cependant, ce n'est qu'à partir de 1963 que la nidification deviendra régulière en Dombes : 1 nichée en 1963 et 1964, 4 couples au moins en 1967... (LEBRETON, 1964 ; MAYAUD, 1964, 1965, 1967). En 1965, un couple niche sur un étang du Perche (MOREAU, 1966). Lorsqu'en 1966 THIOLLAY & al. trouvent 8 nichées sur 8 étangs de Lorraine, ils ne pensent pas que l'implantation y soit récente (THIOLLAY, 1968). L'Alsace est occupée la même année : 1 couple en 1966, 4 en 1967... (KEMPF, *in litt.*). L'espèce s'installe en Brenne à partir de 1968 et en Sologne en 1970 (GILLET & LUNAIS, 1974). En 1972, une famille est notée à Hergnies dans le Nord (CHRISTIN, 1973). Selon KERAUTRET (1973) cette localité n'est qu'à 10km des sites de reproduction belges les plus proches. L'assertion de YEATMAN (1971) selon qui les premiers nids français auraient été trouvés en Lorraine en 1962 et en Dombes en 1964 est erronée, puisque la première nichée a été

notée en Dombes en 1952, et que l'article qu'il cite en référence (G. J.O., 1964) ne mentionne que la deuxième ponte en Dombes (découverte en 1963) et l'observation par ISENMANN de 7 individus présents en permanence sur un étang de Moselle, et ~~semblant~~ former une famille de nicheurs.

L'installation sur un nouveau plan d'eau est presque inmanquablement précédée par des observations d'oiseaux y séjournant une bonne partie, voire la totalité de la saison de reproduction. Ainsi, dans les Dombes, des "estivants" sont notés dès juin 1941 (MAYAUD, 1946) ; dans le Perche où la première nidification est établie en 1965, des oiseaux sont observés jusqu'au 2 juin 1963 et jusqu'au 8 mai 1964 (MORCAU, 1966) ; en Alsace, un couple estivant en 1963 et 1964, un couple nicheur probable en 1965, nidification prouvée en 1966 (KEMPF, *in litt.*).

Après installation des premiers couples, l'accroissement des effectifs nicheurs peut être rapide et considérable si les conditions le permettent : en Islande, premier nid en 1895, nicheurs très nombreux en 1904-1908 (BAUER, 1969) ; en Bavière (région de Munich), premier cas en 1930, 10 couples en 1934, 280 couples en 1967 (BAUER, 1969) ; à Texel (Hollande), premier nid en 1953, 44 couples en 1960 (BAUER, 1969) ; en Autriche, première preuve en 1960, une cinquantaine de couples en 1967 (BAUER, 1969) ; en Alsace, première nichée en 1966, au moins 150 couples en 1973 (KEMPF, *in litt.*) ; en Sologne, installation en 1970, minimum de 15 couvées en 1973 (GILLET & LUNAIS, 1974)...

Situation en Bretagne


En Bretagne, l'installation a également été précédée de nombreuses observations printanières et estivales. Mais il ne semble pas que "l'estivage" ait été abondant ni même régulier avant 1968 (mais Ar Vreiz n'a commencé à fonctionner qu'en 1967).

En 1964, KERAUTRET note un mâle à Goulven (Finistère) le 13 juillet (G.J.O., 1964).

En 1968, neuf observations de mai aux premiers jours d'août, en sept localités du Morbihan (étangs de Roc'h-Du/Crac'h et du Cranic/Brac'h) et du Finistère (Loc'h Trenvel/Tréogat, Yeun-Elez/Botmeur, étangs du Conquet, du Curnic/Guissény et de Goulven).

En 1969, sept cas sont notés de mai à juillet en quatre localités d'Ille-et-Vilaine (étang du Boulet/Feins) et du Finistère (Trenvel, Yeun-Elez et Goulven). Les séjours sont plus suivis.

En 1970, quatre observations de mai à juillet en trois localités



de Loire-Atlantique (lac de Grand-Lieu) et du Finistère (étangs de Trévignon/Trégunc et Trenvel). En mai, un mâle effectue des "manoeuvres de diversion" à Grand-Lieu, premier indice de reproduction pour la Bretagne.


En 1971, onze observations de mai à début-août en sept localités de Loire-Atlantique (Grand-Lieu), du Morbihan (étang de St-Jean/Mendon) et du Finistère (Trévignon, Trenvel, Yeun-Elez, Goulven et étang du Pont/Kerlouan). La nidification est soupçonnée à St-Jean où les observations sont très régulières et où une femelle alarme le 6 juin.

En 1972, quinze observations de mai aux premiers jours d'août, en sept localités de Loire-Atlantique (la Poitevinière) et du Finistère (Trévignon, Trenvel, Yeun-Elez, St-Renan, le Pont, et Goulven). La reproduction est observée à Trévignon (voir plus haut) et en baie d'Audierne où Paul CANEVET note : 2 femelles accompagnant 4 poussins de moins d'une semaine à St-Vio/St-Jean-Trolimon le 20 juin.

Conclusions

Le Fuligule morillon a niché sur deux plans d'eau du Finistère en 1972, et dans l'une de ces localités en 1973. Ces cas de reproduction sont la suite attendue des nombreux cas d'estivage notés en divers points de Bretagne depuis les années 1960. Remarquons que les premières observations printanières et estivales en Bretagne coïncident avec l'installation des premiers nicheurs en France : 1963 en Dombes, 1965 dans le Perche, 1966 en Alsace, 1968 en Brenne. Il y a aussi concordance entre les premiers cas de reproduction en Bretagne et les fortes augmentations d'effectifs nicheurs enregistrées en Alsace (27 couples en 1970, 62 en 1971, 65 en 1972, 150 en 1973) (KEMPF *in litt.*) et en Sologne notamment (1 couple en 1970, 2 en 1971, 3 ou 4 en 1972, 15 en 1973 à l'étang de Marcilly) (GILLET & LUNAIS, 1974). Il est d'ailleurs possible que ce brusque accroissement ait été favorisé par les hivers doux que nous connaissons depuis plusieurs années (BAUER & GLUTZ (1969) font état de corrélations entre les hivers froids et la stagnation ou le déclin des effectifs nicheurs en Scandinavie).

Sur les quelque 50 données printanières et estivales de Bretagne, toutes ne présentent pas le même intérêt. Nous pouvons éliminer les plans d'eau peu ou pas propices à la reproduction, ainsi que ceux qui n'ont fait l'objet que d'observations sans lendemain : la Poitevinière, le Boulet, la Roc'h-Du, le Cranic, le Conquet, le Curnic. La nidification ayant été prouvée en trois points (Trévignon, baie d'Audierne et Grand-Lieu en 1974), il reste cinq localités pour lesquelles les données d'estivage sont assez nombreuses et suivies pour que nous



REPARTITION ACTUELLE DU FULIGULE MORILLON (*AYTHYA FULIGULA*) EN EUROPE

Le grisé correspond à l'aire de reproduction continue ; les points représentent les localités de nidification disjointes.

puissions y espérer une reproduction prochaine : nous pensons en particulier à Goulven et au Yeum-Elez où des Morillons sont régulièrement notés en bonne période depuis 1968.

Notons enfin que c'est dans le Finistère, département breton le plus pauvre en plans d'eau propices à la nidification du Morillon, que les premières nichées ont été notées et que les cas d'estivage sont, de loin, les plus fréquents. Cette véritable "lacune" en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, départements beaucoup mieux pourvus en étangs favorables et plus proches des zones de reproduction continentales, ne peut pas être ramenée à un manque d'observation, et paraît difficilement explicable. A moins que les nicheurs finistériens ne viennent des populations britanniques, elles aussi en expansion (PARSLOW, 1973) ?

Bibliographie

- BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLITZHEIM, 1969.- Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Frankfurt, vol. 3 : 503pp.
- CHRISTIN, J.-D., 1973.- Un cas de nidification du Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) à Hergnies (Nord) au printemps 1972. *M&AON*, 1973 (2) : 23.
- GEROUDET, P., 1946.- Les Palmipèdes. Neuchâtel : 291 pp.
- GILLET P. & B. LUNAI, 1974.- A propos de la nidification du Chipeau *Anas strepera* et de l'extension du Morillon *Aythya fuligula* dans le centre de la France. *Alauda*, 42 : 233-234.
- G.J.O., 1964.- Nouveautés sur la répartition des oiseaux nicheurs de France. *Ols. Fa.*, 14 (3) : 27-32.
- GLUTZ VON BLITZHEIM, U. N., 1962.- Die Brutvögel der Schweiz. Aarau : 648 pp.
- HAPTORN, S., 1958.- Populasjonsendringer, spesielt geografiske forskyninger, i den Norske avifauna de siste 100 ar. *Stetna*, 3 : 105-137.
- ISENMANN, P. & H. JEHL, 1967.- Nidification du Fuligule morillon en Alsace. *Lien ornith. Alsace*, 2 (9) : 17.
- KERAUTRET, L., 1973.- Coup d'oeil sur le statut du Fuligule morillon en France et dans le nord de la France. *M&AON*, 1973 (2) : 23-27.
- LEBRETON, P., 1964.- La nidification en Dombes du Fuligule morillon. *Bull. Soc. Nat. Archéologues Ain*, 78 : 99-106.
- LIPPENS, L. & H. WILLE, 1972.- Atlas des oiseaux de Belgique et d'Europe occidentale. *Tielt* : 847 pp.
- LUNAI, B. & P. GILLET, 1971.- Première preuve de nidification du Morillon (*Aythya fuligula*) en Sologne. *Alauda*, 39 : 73.

- MAYAUD, N., 1936.- Inventaire des oiseaux de France. Soc. Et. ornith. : 198 pp.
- MAYAUD, N., 1938.- Commentaires sur l'ornithologie française. *Alauda*, 10 : 332-350.
- MAYAUD, N., 1946.- Commentaires sur l'ornithologie française. *Alauda*, 14 : 124-148.
- MAYAUD, N., 1953.- Liste des oiseaux de France. *Alauda*, 21 : 1-63.
- MAYAUD, N., 1964.- Notes d'ornithologie française. *Alauda*, 32 : 56-71.
- MAYAUD, N., 1965.- Notes d'ornithologie française. *Alauda*, 33 : 131-147.
- MAYAUD, N., 1967.- Notes d'ornithologie française. *Alauda*, 35 : 125-139.
- MOREAU, G., 1966.- Le Fuligule morillon *Aythya fuligula* nicheur sur un étang du Perche ornaïs en 1965 (2e point de nidification en France. *Ois. Rev. fr. Ornith.*, 36 : 158-160.
- PARSLOW, J., 1973.- Breeding birds of Britain and Ireland. *Berkhamsted* : 272 pp.
- THIOLLAY, J. M., 1968.- Quelques nidifications intéressantes en Lorraine. *Alauda*, 36 : 210-211.
- VAUCHER, C., 1954.- Contribution à l'étude ornithologique de la Dombes. *Alauda*, 22 : 81-114.
- VOOUS, K. H., 1960.- Atlas of european birds. *Amsterdam* : 284 pp.
- YEATMAN, L., 1971.- Histoire des oiseaux d'Europe. *Paris* : 363 pp.

Nous adressons nos remerciements à Christian KEMPF qui nous a transmis les données alsaciennes inédites, à Paul CANEVET à qui nous devons les observations sur la reproduction en baie d'Audierne et à Laurent YEATMAN qui nous a communiqué la carte Inventaire-Atlas du Morillon. Nous remercions aussi Mesdames Sybille BARON et Anne LE BIHAN qui nous ont aimablement traduit quelques pages du "Handbuch der Vögel Mitteleuropas".

Fañch PUSTOC'H
Kernevel
29140 ROSPORDEN

Roland PERON
Beg Postillon
29128 TREGUNC

