


Rp 98

V14



AR VRAN

PUBLICATION ORNITHOLOGIQUE DU
LABORATOIRE DE ZOOLOGIE DE LA
FACULTE DES SCIENCES DE BREST



1985 - TOME XI, fascicule 2

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES
DU 18 MARS 1984 AU 15 JUILLET 1984.

BIBLIOGRAPHIE ORNITHOLOGIQUE BRETONNE.

CHRONIQUE DE DETERMINATION.

Parcours de l'Environnement

SOMMAIRE

Avant propos : la transmission des données	1
--	---

Actualités ornithologiques du 16 mars 1984 au 15 juillet 1984

par : J.P. ANNEZO, M. COSSEC, L. GAGER, G. GELINAUD, J.C. LINARD, J. MAOUT et F. PUSTOCH	2
--	---

Bibliographie ornithologique bretonne : LE GOLA	90
---	----

Chronique de détermination : deux goélands à bec cerclé L. DELAWARENSIS en Baie d'Audierne par P. YESOU	92
--	----

AVANT PROPOS : LA TRANSMISSION DES DONNEES

Depuis la parution de notre dernier bulletin, quelques modifications ont été apportées au fonctionnement d'AR VRAN.

Tout d'abord, un objecteur de conscience a été nommé auprès de la SEPNE et d'AR VRAN. Son entrée en fonction date de la fin-novembre. Son rôle est celui d'un secrétaire : courrier, frappe, élaboration de documents, organisation des réunions, sorties, etc... Pascal LE GUEN, c'est de lui qu'il s'agit peut être joint au (98) 49.07.18

Afin de faciliter le travail de rédaction et d'éviter un retard dans la publication, nous vous rappelons que les données doivent être transmises dans le délai d'un mois de la fin de période, soit :

- le 15/4 : pour la période allant du 16/11 au 15/3
- le 15/8 : pour la période allant du 16/3 au 15/7
- le 15/12 : pour la période allant du 16/7 au 15/11

Ces notes doivent être expédiées aux groupes locaux dont les adresses suivent :

35 : Fanch PUSTOCH - Le Bas Berger - Miniac-sous-Bécherel
35190 TINTENIAC

22 : Jacques GAROCHÉ - Le Prétanné - MORIEUX
22400 LAMBALLE

29 et coordination régionale : Jacques MAOUT - B, rue Villeneuve
29210 MORLAIX

56 : Guillaume GELINAUD - Le Crelin - BRECH
56400 MURAY

44 : GOLA - C/O Claude JOANNIS - 49, avenue Camus
44000 NANTES

Vos données doivent être transmises sur des fiches séparées pour chaque groupe, dont la composition est donnée en fin de fascicule.

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

du 16 mars 1984 au 15 juillet 1984

par Laurent GAGER : du Plongeon isbrin à la Bernache cravant, Michel COSSEC : du Tadorne de Belon au Harle huppé, Jacques MAOUT : de la Bondrée apivore au Foulque macroule, les limicoles nicheurs, le Crave et le Grand Corbeau, Jean-Pierre ANNEZO : du Pluvier doré au Chevalier combattant, Jean-Claude LINARD : du Grand Labbe au Macareux moine, Guillaume GELINAUD : du Pigeon biset à la Grive draine, Fanch PUSTOCH : de la Bouscarle de Cetti au Bruant proyer, Jacques HENRY a collaboré à la réalisation de l'article sur le Grand Corbeau.

Ces actualités ornithologiques ont été rédigées à partir des notes de :

J.P. ANNEZO, J.P. AUCHER, Y. AUTRET, B. BARGAIN, R. BASQUE, J.F. BECHAUD, P. BECHET, D. BELLIER, M.P. BENOIT, P. BERTRAND, F. BIRET, R.P. BOLAN, M. BONO, J. BOSSARD, J. BOUEDO, Y. BOURGAUT, R. BOZEC, Y. BRIEN, J.Y. CALVEZ, G. CAMBERLEIN, R. CAMUS, P. CANEVET, J. CITOLEUX, J.P. COCO, L. COLLOBERT, H. CORRE, M. COSSEC, H. DAHM, A. DALMOLIN, D. DASKE, F. DE BEAULIEU, E. DE KERGARIOU, J. DELAMAINE, C. DELASTRE, B. DEWINTER, A. DREZEN, P. DUBOIS, F. FENECH, J.P. FERRAND, A. FORLOT, A. FOUQUET, J. GAROCHER, R. GAUTRON, G. GELINAUD, L. GOHIER, E. GRANDSENNER, X. GREMILLET, Y. GUERMEUR, C. GUICHEN, A. GUILLAS, B. GUILLEMOT, C. GUILLOU, J. HAMON, C. HILY, G. HOFF, L. et X. HUX, L. LAMBERT, P. LAMOUR, P. LE FLOCH, R. LEFUR, Y. LE GARS, P. et C. LE GUEN, J. LE LANNIC, Y. LE SACOT, C. LEVER, J.C. et D. LINARD, J.Y. LOUIS, M.C. LOZACH, R. MAHEO, J. MAOUT, A. MAUXION, P. MIGOT, G. MOAL, J.Y. MONNAT, A. MEVEL, E. PASQUET, P. PENICHAUD, J. PETIT, P. PHILIPPON, P. POMMIER, P. PRIGENT, F. PUSTOCH, L. QUENO, B. QUIDEAU, J.M. RAOUL, C. REALLAN, J.M. RIOULEN, T. ROUZO, C. THEBAUD, A. THOMAS, E. THOUMELIN, L. VAN SCHOOR, J. HENRY

et les observateurs du GOLA : R. BALEJ, Y. BERTAUD, P. BERTHELOT, P. BOHET, D. BREDIN, J.P. CHARRIER, P. CISTAC, D. DESMOTS, M. DUC, J.L. DUPONT, J.Y. FREMOND, A. GERNIGNON, L. GRILLET, F. GROSSOARD, P. GURLIAT, R. DE HARGUES, J.P. JARNOUX, C. JOANNIS, J. LE BAIL, B. LEBASCLE, M. LEBASCLE, G. LESLAIS, M. LECORSE, M. LECORRE, G. LERAY, P. LEROUX, J.P. MEROT, P. MONNIER, O. NOEL, P. NOEL, J.P. OHEIX, N. OLLIVIER, B. RECORSET, C. ROZE, Y. TREVOUX.

et le Groupe Ornithologique Normand (GON).

Erratum : nous avons oublié de citer dans notre dernier fascicule les observateurs P. CRENN et A. GOURMELEN.

Les illustrations sont de Jacques HAMON.

Nous remercions particulièrement la SEPNE pour nous avoir autorisé à utiliser les résultats en provenance de ses réserves.

Le fait marquant du printemps 1984 est la première preuve de nidification du Pic Noir en Bretagne : cette nouvelle était attendue et laisse présager une colonisation de notre région.

D'autres événements importants concernant la nidification ont eu lieu : les premières pontes de Fulmar à Belle-Ile, la découverte du Puffin des Anglais dans l'archipel d'Hoat, le Fou de Bassan s'est posé à Doessant, la tentative de reproduction du Grand Cormoran sur un deuxième site continental, l'apparition d'un deuxième secteur de nidification de l'Oedicnème, une ponte de Sterne Arctique, une preuve de reproduction concernant le Gros Bec, de sérieux indices concernant le Bec Croisé des Sapins.

Quelques espèces progressent, citons : l'Aigrette Garzette, le Héron Cendré, le Grand Gravelot, le Busard des Roseaux, l'Epervier, la Bouscarle de Cetti, le Bruant Proyer et le Grand Corbeau...

A l'opposé, le Vanneau et le Courlis ont vu leurs effectifs nicheurs décroître globalement, la modification des milieux étant à incriminer.

En dehors du cycle de reproduction, quelques observations intéressantes ont été faites et concernent : deux Bécasseaux de Temminck, un Bécasseau Falcinelle, une arrivée de Goélands à Bec Cerclé dans le Finistère, une Mouette de Ross, un coucou Geai, un serle de Roche et des Fauvettes Rabillardes.



PLONGEON SP. (*Gavia sp*) 3 données

1 individu à Porh Gwenn/Le Palais (56) le 30 mars ; 1 individu à Beg er Goalenec/Quiberon (56) le 14 avril ; 5 individus en 2 heures à la pointe de Feunteun Aod/Plogoff (298) le 25 avril.

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) 3 données

1 individu au Froot/Carantec (29N) et 1 individu à Lespoul/Pont-Croix (29S) le 5 avril ; 3 individus en 2 heures à la pointe de Feunteun Aod/Plogoff le 24 avril.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) 14 données

12 des 14 données viennent du Finistère, les départs se déroulant jusqu'à la seconde quinzaine d'avril.

Rivière de Daoulas : 2 le 17 mars, 3 le 3 avril ; le Veryac'h/Camaret : 5 le 28 mars, 13 le 3 avril, 10 le 5 avril ; à Pen Hat/Camaret : 2 le 1er avril ; pointe de Tréfeuntec/Plonevez-Porzay : 6 le 6 avril, 11 le 22 avril ; Kervel/Plonevez-Porzay : 6 le 12 avril ; plage du Ris/Kerlaz : 1 le 15 avril ; Trezsalacoen/Kerlaz : 3 le 19 avril ; pointe de Feunteun Aod/Plogoff : 1 en 2 heures le 24 avril.

Côtes-du-Nord

Baie de Lannion (22) : 5 le 8 avril.

Loire-Atlantique

Port du Croisic (44) : 2 le 1er avril.

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) 3 données

1 individu en baie de Lannion (22) le 8 avril ; 1 individu à Nérizélec/Plovan (29S) le 8 avril ; 1 individu à Ste-Anne/Plonevez-Porzay (22) le 12 avril.

GREBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*) 45 données

Les dernières observations maritimes s'étalent jusqu'à la deuxième semaine de mai.

Le 22 mars, 2 sur les grèves de Langueux (22) ; le 26 mars, 1 à Kersoulard/Crac'h (56) ; le 29 mars, 3 en Penzé (29N), le 6 mai, 1 individu au Magouer/Plouhinec (56) ; le 14 mai, 1 individu sur le Jaudy maritime/La Roche Derrien (22).

Nidification (présumée) :

L'oiseau est observé sur de nombreux sites potentiels de nidification sans qu'aucune preuve en soit fournie :

Ille-et-Vilaine

2 individus à la ZAC de Longchamp/Rennes le 7 avril ; 1 individu à l'Etang de Caunouet/Lcheac le 24 avril ; 2 individus à la gravière de la Vigne/Chavagne le 1er mai ; des chanteurs sont entendus à Paintourteau/Erbrée, les 29 avril et 1er juillet.

Côtes-du-Nord

5 ou 6 individus à l'Etang du Beffou/Loguivy-Plougras le 18 mars ; 3 individus à l'Etang de la Ville Gaudu/Lamballe le 28 mars ; 2 individus à l'Etang du Bufflet/Plœuc-sur-Lie le 2 juin ; 2 individus à la Villejean/Le Bodéo le 9 juin.

Finistère

2 individus en avril dans une carrière de Gaipavas ; 2 individus à l'Etang de Poulguidou/Plouhinec le 17 avril.

Morbihan

Au Cranic'h/Brech, 1-2 couples du 23 mars au 21 avril, 4 oiseaux le 7 juillet. Des chanteurs sont entendus à Kerguennec/Mignan le 28 juin.

Loire-Atlantique

3 couples chantent et parodent fin mars au Marais de Grée/Ancenis.

Nidification (certaine) :

Elle a été prouvée dans les sites suivants :

Ille-et-Vilaine

Etang du Boulet/Feins, 2 couples.
Bois de Chinsève/St Aubin d'Aubigné, 1 couple.
Mare des Maffey's/St Jacques de la Lande, 2 couples.

Finistère

Mesqueau/Plougasnou, 1 couple.
Barrages/Quessant, 2 couples.
Etang de Laoual/Plougoff, 1 couple.

Morbihan

Kerquelen/Larmor-Plage, 1 couple.
La Rue des Roseaux/Larmor-Plage, 1 couple.
Ecluse 59/Gueltas, 1 couple.

Loire-Atlantique

Marais/Guérande, 1 couple.
Vioreau/Joué-sur-Erdre, 1 couple.
La Boire de Mauves/Thouare, 1 couple.

GREBE RUPPE (*Podiceps cristatus*) 34 données

Les dernières observations maritimes se font à la fin d'avril :

- le 18 mars, 3 individus à la Plage du Ris/Kerlaz (29).
- le 22 mars, 48 individus sur la Rance à St Suliac (35).
- le 26 mars, 2 individus au Men Du/La Trinité (56).
- le 8 avril, 1 individu en Baie de Lannion (22).
- le 24 avril, 1 individu en 2 heures à Feunteun Aod/Plogoff (29).
- le 25 avril, 4 individus en 2 heures au même endroit.

La présence de plusieurs individus sur certains étangs jusqu'à une époque avancée laisse présager une nidification : 2 individus le 15 juin à l'Etang de La Ville Gaudu/Lamballe (22) ; 4 individus le 20 juin au Moulin d'Apigné/Rennes (35) ; 2 individus le 2 juin à l'Etang de la Forêt/Brandivy (56) ; 2 individus le 27 juin à l'Etang du Val/Carentoir (56).

Nidification :

Ille-et-Vilaine

1 couple au Pré Nazet/Rennes ; 2 couples à La Piblais/St Jacques de la Lande et près de 10 couples à Paintourteau/Erbrée.

Côtes-du-Nord

2 couples à l'Etang de La Hardouinais/Merdignac et 1 couple à La Villejean/Le Bodeo.

Finistère

Au moins 2 familles sur le Yeun Elez.

Loire-Atlantique

A l'étang de Cleureuc et au Vioreau/Joue-sur-Erdre.

1 individu estivant à l'Etang du Bourg/St Renan (29N), présent depuis le 30 mars.

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) 2 données

- 1 individu sur La Rance à St Suliac (35) le 22 mars.
- 1 individu en plumage nuptial à Porh Yeh/Le Palais (56) le 3 avril.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) 13 données

Ce sont principalement des données littorales dont les plus marquantes sont :

- le 22 mars, 34 individus sur La Rance à St Suliac (35).
 - le 3 avril, 9 individus en Rivière de Dacolas (29N).
 - le 5 avril, 8 individus à Pen Bron/La Turballe (44).
- Dans le seul site non-littoral, à l'Etang de Cranic'h/Brech (56), jusqu'à 10 oiseaux en avril dont 3 resteront jusqu'à la mi-juillet.

PETREL FULMAR (*Fulmarus glacialis*) 28 données

Sur les sites connus en 1975, l'espèce a progressé :

Cap Fréhel (22) : 45 pontes, 7 juvéniles à l'envol (1 ponte certaine en 1974).

Réserve/Goulien (295) : 6 pontes, 5 éclosions, 4 envois certains (4 couples en 1974). Nidification probable à Milinou Bras pour la première fois.

Sept Iles (22) et Tas de Pois (298), pas de nouvelles.

Sur les sites simplement fréquentés en 1975, l'espèce s'est installée :

Falaise de Plouha (22) : 7 couples Plage Bonaparte et 2 couples à la Pointe de La Tour.

Ouessant (298) : 16 dont 12 posés sur la face sud de Keller Vraz le 30 avril, 2 couples minimum.

4 posés sur la face sud de Keller Vihan le 30 avril. Rappelons qu'un poussin y avait été découvert en 1983. 1 couple à Roch 'n'ell.

Pointe de Castelmeur/Clédén Cap Sizun (298) : 2 poussins.

D'autres sites ont été colonisés :

Le Guern/Crozon (295) : 3 couples minimum.

Belle-Ile (56) : 2 pontes d'1 oeuf chacune ont été découvertes pour la première fois sur ce site : 1 à la Réserve de Koh Kastell/Sauzon et 1 à Pen March/Bangor.

L'espèce a fréquenté d'autres zones :

2 au Cap de La Chèvre/Crozon (298) le 21 avril ; 2 posés à Groix (56) le 22 avril, pas de reproduction ; 1 à Castel Bihan/Carantec (298) le 20 mai et 1 à l'île des Landes/Cancal (35) le 2 juillet.

PUFFIN CENDRE (*Calonectris diomedea*)

1 individu à Port Dour/Ouessant (298), le 26 juin.

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*) 30 données

Passage sur tout le littoral, pendant toute la période.

Nidification :

1 chanteur à Taveag/Perros-Guirec (22), sans précision de date ;

2 terriers occupés à Banneg/Molène (298) ;

2 terriers occupés dans l'Archipel d'Houat (56).

La reproduction du Puffin des anglais est maintenant certaine ou probable sur quatre sites en Bretagne, avec un minimum de 55 couples : Sept Iles, Taveag (île Téné), Banneg, Archipel d'Houat.

PETREL TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*) 3 données

Chanteurs à Banseg/Archipel de Molène (29N), les 27 et 30 avril ;
1 individu à Quessant (29N), le 13 juillet.

FOU DE BASSAN (*Sula bassana*) 13 données

Les concentrations en pêche les plus importantes sont observées :
le 6 mai au Phare de La Vieille/Pointe du Raz (29S), 100 individus
dont les 2/3 sont des immatures ; le 20 mai, 35 dans le Frouveur/
Quessant (29N).

Quelques données de passage sont aussi remarquables :

150 individus vers l'ouest en 1 heure le 2 avril à la Pointe du Talut/
Belle-Ile (56) ;
85 individus en 2 heures le 24 avril à Feunteun Aod/Plogoff (29S) ;
213 individus en 2 heures le 25 avril à Feunteun Aod/Plogoff.

A Roch Moll/Quessant, 2 adultes sont restés posés pendant une semaine.
Prémices d'une installation ?

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) 35 données

Lors du printemps des oiseaux sont observés sur les plans d'eau inté-
rieurs :

A l'Etang Neuf/Guipel (35), 2 le 16 mars ; à St Renan (29N), 8 le
20 mars, 2 le 7 mai ; à Lannéon/Lanrivouaré (29N), 4 le 27 mars ; le
26 mai, 1 individu en vol au-dessus de la Forêt de La Hardouinais/
Merdrignac (22).

Nidification :

La nidification à l'Île des Landes/Cancalle (35) a été perturbée par
l'introduction d'un renard. Le 15 avril, les oiseaux étaient installés
sur l'île, lors de la seconde visite le 6 mai les nids étaient vides.
Les Cormorans se sont repliés sur des îlots proches : Le Herpin et le
Châtelier, qui constituent par la même occasion, de nouveaux sites :
le 6 mai, 15 nids sur Le Herpin et 20-25 nids sur le Châtelier.

27 couples au Verdelet/Pléneuf (22), le 25 mai.

1 couple présent à la Poitevineière/Riaillé (44) de mars à début-mai
avec un nid sommaire, la ponte n'ayant pas été prouvée.
Doit-on y voir une nouvelle colonisation à la suite d'une nidification
à Grandlieu en 1981 ?

L'estivage d'immatures a lieu en Baie de Morlaix (29N) et sur la Loire
entre Nantes et Oudon (44).

Signalons enfin la présence d'un immature à Porz Doun/Quessant (29N)
du 11 au 13 juillet.

S I T E S	1969 * ou 1970	1984	S I T E S	1969 ou 1970	1984
<u>Falaises de PLUHA (22)</u>			<u>Iles du Morbihan (56)</u>		
Beg C'Hastell	15	50	Rhellan	0	7
Plage Bonaparte	0	7	Méaban	0	24
Pointe de la Tour	0	2			
	15	59		0	31
<u>Baie de MOPLAIX (29A)</u>			<u>Archipel d'BOUAT (56)</u>		
Réserve	15 *	95	Glazig	12	60
Roch Velenn	1	16	Er Valueg	8	62-64
	16	111	Beg Durig	40-50	110-112
			La Vieille	4-5	14
<u>Presqu'île de Crozon (29N)</u>			Er Yoh	0	7
Ar Gest	37 *	66	Beg Pel	8	43
Le Lion	35 *	32	Er Velant	34	160
An Daoué Vihan	70-90 *	105	Grinaud Tost	35	45-47
Ar Ben C'Hias	90-100	44			
Cap de la Chèvre	11 *	57-60			
Le Guern	55 *	43			
	298-328	347-350		141-152	501-507
<u>Réserve du Cap Sizun (29N)</u>	122-127 *	128	<u>TOTAL</u>	592-638	1177-1186

EFFECTIFS NICHEURS 1984 DU CORMORAN RUPPE

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) 38 données

Les effectifs nicheurs recensés nous permettent d'établir une comparaison entre 1964 et la dernière opération que nous avons publiée en 1970, et cela sur un certain nombre de sites.

L'augmentation moyenne est de 87 à 99 %, mais les disparités sont constituées entre les secteurs en stagnation (Tas de Pois, Toulinguet, Cap Sizun) et les autres secteurs en pleine expansion : Plouha (10 % de croissance annuelle), Morlaix (14 %) et Bouat (9 %).

Nous avons reçu quelques autres données de nidification :

Ille-et-Vilaine

Ilôts de Cancale, 15 couples au Châtelier, 99 aux Rimains ; échec total à l'île des Landes (cf Grand Cormoran).

Finistère

Une nidification présumée à Beg Lédan/Batz ;
1 nid à l'île de Trébéron/Roscanvel.

Morbihan

A Groix, 42 nids sont trouvés sur la Réserve et 8 à l'est de celle-ci.

BUTOR ETOILE (*Botaurus stellaris*) 6 données

1 chanteur tout le printemps à Trenvel/Tréogat (298), également 1 chanteur à Kergalan/Plovan (298).
Le 22 avril, 2 chanteurs au Port Laroche/Bourgneuf en Retz (22).

HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*) 4 données

1 individu le 12 avril à Trenvel/Tréogat (298) ;
2 individus alarment violement autour d'un saule où un nid pouvant appartenir à l'espèce est découvert le 6 mai à Kervan/Ploubinec (29), ils disparaîtront plus-tard ;
2 observations dans les Marais de Ste Luce-sur-Loire (44).

HERON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*) 4 données

Les données viennent de la région de Grandlieu (44) où l'espèce niche ;
3 données à St Lumine de Coutais : 1 individu le 1er mai, 4 individus le 3 juin et 4 individus le 12 juin ;
1 individu à St Mars de Coutais, le 1er mai.

AIGRETTE SP. (*Égretta sp.*) 1 donnée

(Aigrette des récifs, dimorphe *Égretta gularis* ou Aigrette garzette mélanique *Égretta garzetta*)

Cette observation réalisée au Vioreau/Joue-sur-Erdre (44), pose le problème des introductions. En effet, de nombreuses Aigrettes des récifs sont importées en RFA pour l'animation des bassins d'eau. L'observation du Vioreau concerne-t-elle un individu de cette espèce et s'inscrit-elle dans une liste d'observations françaises qui s'allonge ?

AIGRETTE GARZETTE (*Égretta garzetta*) 40 données

L'espèce, présente sur tout le littoral, est de plus en plus fréquente :

14 données à Falguérec/Séné (56) avec un maximum de 20 oiseaux début avril.

6 données à Kerdudal/La Trinité-sur-Mer (56) avec un maximum de 9, le 7 avril.

1 individu le 16 mars à St Sulliac (35) ; 1 individu le 17 mars dans l'anse du Moulin Neuf/Plougastel-Daoulas (29N) ; 1 individu le 25 mars dans l'anse de Keroulé/Hanvec (29N) ; 5 individus le 3 avril, 2 le 29 avril et 3 le 14 juillet sur la rivière de Daoulas (29N) ; 24 individus le 12 avril au Marais de Pont d'Arn/Asserac (44) ; 30-40 individus le 14 avril au Marais de Pen An Toul/Larmor Baden (56).

Nidification :

L'Aigrette poursuit sa colonisation vers le nord :

44 nids minimum à la héroinière du Haut Villeneuve/Guérande (44) dont plus de 30 ont donné des jeunes ;

5 nids à l'île du Riec/Belz (56), où les jeunes sont élevés normalement. On assiste parfois à des transports de matériaux comme à Falguérec/Séné (56) ainsi que sur la rivière de Pont-l'Abbé (29S) où 1 couple parade.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) 39 données

La présence est constatée sur tout le territoire durant toute la période :

14 individus le 16 mars au Port Physique/Audierne (29S) ; 20 individus le 3 avril à Lityr et Quéménéx/Archipel de Volène (29N) ; 9 individus le 6 avril à l'Etang du Moulin Neuf/Plounerin (22) ; 7 individus le 21 avril à l'Etang de Poulquidou/Plouchinec (29S) ; 9 individus le 11 mai sur l'Elorn (29N) ; 9 sur la rivière de Daoulas et 11 à Ste Marguerite/Landéda (29N) le 14 juillet.

Nidification :

Dans les colonies traditionnelles : 109 nids au Haut Villeneuve/Guérande (44) ; 52 nids sur 2 sites à la Pierre Rouge/Paimboeuf (44) et 46 nids à Bodilio/Pont-l'Abbé (29S).

De nouvelles héronnières apparaissent en Loire-Atlantique : une dans les Marais de Prinquiau et une à Trescallan/La Turballe. La seconde serait due à un éclatement de la colonie du Haut-Villeneuve. Des couples isolés même à terre leur nichée : 1 couple en rivière du Vincin/Vannes (56) ; 1 couple sur l'île de Chacors/Bruz (35). D'autres ne dépassent pas le stade de la tentative : 1 couple construisant un nid dans des lavatères au beau milieu des Goélands sur l'île aux Dames/Baie de Morlaix (29N) ; 2 couples construisent le 16 mars au Port Physique/Audierne ; le 21 mars il ne restait plus qu'un couple. Il disparaît par la suite. Signalons enfin que la présence de quelques nids a été signalée (depuis 2 à 3 ans) dans les gravières de Bruz (35).

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*) 6 données

Présence sur le site de nidification de Grandlieu (44).
3 observations d'individus isolés en Loire-Atlantique : le 21 avril à la Poitevinère/Riaillé, le 25 avril à la Poterie/Châteaubleud et le 19 mai à Heric.
2 observations éloignées des sites de nidification connus : 1 le 20 avril à l'Etang Neuf/Guipel (35) et 1 le 25 avril à St Vio/Tréguennec (29S).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) 3 données

1 individu le 5 avril à Dol de Bretagne (35) ;
1 les 12 et 25 avril à Rennes (35).

IBIS SACRÉ (*Threskiornis aethiopicus*) 7 données

Ces oiseaux proviennent du zoo de Branféré/Le Guerno (56) où ils se reproduisent d'où l'observation d'effectifs de plus en plus importants. 57 dans la région de Séné (56) dont 50 sur les Marais de Billiers le 1er avril.

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) 21 données

17 données viennent de Falguérec/Séné (56) avec 2 à 4 individus, les maxima observés étant de 9 individus le 13 avril et 10 individus le 14 avril.
Le reste des observations provient du Finistère : 2 individus le 3 avril à Litiry et Quémenez/Molène, 1 individu le 7 mai à Trenvel/Tréogat et 1 individu le 16 mai sur la zone industrielle portuaire de St Marc/Brest.

OIE RIEUSE (*Anser albifrons*) 2 données

Les 2 données viennent du Marais de Sougeal (35) : 2 individus le 23 avril et 11 individus le 28 avril.

OIE CENDREE (*Anser anser*) 5 données

Toutes les observations datent de la période du 16 au 22 mars à l'exception d'un oiseau tardif vu le 21 avril à Trenvel/Tréogat (298) :
4 individus le 15 mars, le Jaudy Maritime/La Roche Derrien (22) ;
1 individu le 16 mars à l'Etang du Cranic/Brech (56) ;
5 individus aux Marais de Grée/Ancenis (44) les 16 et 17 mars ;
21 individus en vol à Ancenis (44) le 17 mars.

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*) 3 données

Les 3 données proviennent du Marais de Sougeal (35) où les oiseaux étaient déjà présents en septembre 1983 et sont probablement échappés de captivité.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernica*) 24 données

Les départs ont lieu à la charnière des mois de mars et d'avril :
dans l'Anse d'Yffiniac (22) : 1200 le 17 mars, 4 le 7 avril ;
dans l'Anse de Beauport/Paispol (22) : 615 le 17 mars, 4 le 15 avril ;
en Baie de Morlaix (29N) : 243 le 24 mars, 22 le 5 avril, 3 le 7 avril ;
sur la Penzé (29N) : 600 le 25 mars, 200 le 8 avril, 45 le 11 avril et 2 du 22 avril au 12 mai ;
à l'Etier de Noyal (56) : 15-20 individus le 2 avril.

Par ailleurs :

20-30 individus le 22 mars en Baie de Quiberon (56) ; 12 individus le 22 mars à St Suliac (35) ; 57 individus le 30 mars sur la grève des Courses/St Brieuc (22) ; 6 individus les 5 et 6 avril en Baie de Lancieux (22) ; 13 individus le 15 avril sur l'île aux Poules sur le Jaudy (22).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) 103 données

Des bandes regroupant jusqu'à une centaine d'individus sont observés fort tardivement, jusqu'au début du mois de mai.

Le suivi régulier de quelques sites au cours de l'hiver laisse apparaître des pics d'abondance situés en règle générale en février (cf n° d'Ar Vran précédent). Il est probable que, passé la mi-mars, les rassemblements soient le fait d'oiseaux en migration pré-nuptiale. Retenons le suivi de Falguérec/Séné (56) qui voit régulièrement s'élever ses effectifs du début de la période jusqu'au mois de mai où 1 maximum de 105 individus est observé.

80 le 16 mars à l'Etang de St Jean/Loceal-Mendon (56) ; 32 le 17 mars Plage de Ledgno/Estuaire du Trieux (22) ; 81 le 22 mars aux Grèves de Lanqueux (22) ; 98 le 24 mars en Baie de Morlaix (29N) ; 88 le 30 mars aux Grèves des Courses/St-Brieuc (22) ; 46 le 4 avril en Rivière d'Étel (56) ; 105 le 5 avril dans le Petit Traict du Croisic (44) ; 86 en

Baie de Morlaix (29N) et 60 en Penzé (29N) le 7 avril ; 105 le 8 avril dans l'Anse d'Yffiniac (22) ; 55-60 le 14 avril dans l'Etier de Noyal (56) ; 60 le 14 avril au Marais de Pen en Toul/Larmor Baden (56) ; 30-40 posés sur des îlots et en mer le 15 avril au Châtelier/Cancale (35) ; 52 le 18 avril en Baie de Morlaix (29N) ; 105 le 4 mai à Palguérec/Séné (56).

Nidification :

Ille-et-Vilaine

5 couples nicheurs sur La Rance, à la hauteur de St Suliac le 30 avril ; 1 couple noté à l'île des Landes/Cancale le 2 juillet.

Côtes-du-Nord

1 couple à Bon Abri/Billion le 14 avril ; 1 couple à Port Héli/Estuaire du Jaudy le 15 avril ; 4 adultes et 14 jeunes sur le Jaudy maritime/La Roche Derrien le 21 mai ; 10 couples en Baie de Lancieux le 1er juin ; 1 couple à Pont Rolland/Morieux le 9 juin ; 2 adultes et 2 jeunes en Baie de La Fresnaye le 1er juillet.

Finistère

1 couple à Yoc'h/Porspoder le 25 avril ; 1 couple avec 9 poussins à l'île Chevalier/Rivière de Pont-l'Abbé le 20 mai ; 1 couple à Ouessant le 15 mai ; 1 couple avec 8 juvéniles à Nérizélec/Plovan le 27 mai ; 1 couple avec 5 poussins à Penzornou/Carantec le 29 mai ; 4 couples notés à Yoc'h/Porspoder le 31 mai ; 4 couples avec poussins dans l'Anse de Keroallé/Banvec le 1er juin ; 1 couple avec 12 poussins au Dourdaff/Plouézoc'h le 1er juin ; reproduction constatée en Rivière du Faou le 3 juin ; 1 couple à Ouessant le 7 juin ; 1 groupe de 12 adultes et 28 pulli à Trielen/Molène le 9 juin et un autre de 28 adultes et 27 pulli le 10 juin ; également 1 groupe de 6 adultes et 34 poussins en Rivière du Faou le 10 juin ; 2 couples avec respectivement 7 et 4 pulli sur les paluds de la Penzé le 15 juin ; 1 couple avec 10 pulli à Locquénolé le 18 juin ; 1 groupe de 13 adultes et 7 pulli en Rivière de Daoulas le 23 juin ; 2 couples avec 20 à 22 pulli dans l'Aulne/Argol le 24 juin ; 1 groupe de 20 adultes et 12 pulli en Rivière du Faou le 24 juin ; 2 couples avec respectivement 2 et 6 pulli sur les Paluds de La Penzé le 29 juin ; 1 couple probablement reproducteur à l'Etang du Loc'h/Archipel des Glénans le 4 juillet ; 1 couple et 9 pulli en Rivière de Daoulas le 8 juillet ; 1 groupe de 33 adultes et 17 pulli en Rivière du Faou le 8 juillet ; 1 couple et 7 pulli à Penzornou/Carantec le 11 juillet ; 1 adulte et 5 pulli en Rivière de Daoulas le 14 juillet ; autrement en juillet : 1 couple avec 3 pulli à Locquénolé ; 1 groupe de 45 jeunes en Baie de Goulven ; 1 minimum de 2 nichées à Trielen/Molène ; de 2 à 4 couples à Balaneg/Molène ; 1 nid détruit lors de travaux à Trébéron/Roscanvel ; après 2 années de présence et de tentatives de reproduction sur le Goyen/Pont-Croix, le Tadorne n'a pas été revu cette année.

Morbihan

Alors qu'un couple seulement avait été recensé en 1983, c'est 3 qui sont comptés à Kerdual/la Trinité le 21 avril ; 2 couples cantonnés à St Jean/Locoal-Mendon le 6 mai ; 1 couple à Kersahu/Gavres le 13 mai ; 1 couple avec 10 poussins en Rivière d'Etel le 14 mai ; 50 à 60 juvéniles se regroupent à partir du 5 juin à Falguérec/Séné ; 18 juvéniles à St Jean/Locoal-Mendon le 7 juillet.

Loire-Atlantique

Des parades sont notées au Marais de la Giguennais/St Brévin le 1er mai ; 1 nid avec 13 oeufs est trouvé sur l'îlot St Nicolas/Corsept en juillet.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) 11 données

La fin de l'hivernage et le passage : les données recueillies concernent l'étang de St Jean/Locoal-Mendon (56) : 100 le 16 mars et 30 le 23 mars ; par ailleurs, 5 en Rivière de Daoulas (29N) le 17 mars ; 6 au Marais de Sougeal (35) le 21 mars ; 23 dans l'Anse d'Yffiniac (22) le 22 mars ; 20 au Marais de Grée/Ancenis (44) le 24 mars ; 16 en Penzé (29N) le 25 mars et 9 le 29 ; 12 dans l'Anse d'Yffiniac le 9 avril et encore 1 ♂ en Rivière de Daoulas le 29 avril ; enfin, une donnée plus étonnante : 1 ♂ au rezblai de Lavan (44) le 7 juin.

CANARD SIFFLEUR AMERICAIN (*Anas americanus*) 2 données

Les 2 observations se rapportent à un couple : 1 ♂ et 1 ♀, les 28 mai et 3 juin à Mézanostis/Lanrivoaré (29N). Des parades sont notées. Il semble s'agir d'individus échappés de captivité.

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) 5 données

3 individus le 8 avril dans l'Anse d'Yffiniac (22) ; 2 ♂ + 1 ♀ le 24 avril à l'Etang de Nérizélec/Plovan (29S) ; 1 individu le 27 mai à l'Etang de Nérizélec/Plovan et 2 au même endroit le 11 juin.

Nidification :

Elle a été prouvée à Grandlieu (44).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) 27 données

L'observation de petites bandes d'oiseaux jalonne la période jusqu'à la mi-avril, signant ainsi la fin de l'hivernage : 20 en Rivière de Daoulas (29N) le 17 mars (...) ; 22 dans le Marais de Sougeal (35) le 21 mars ; (...) 10 en Rivière du Faou (29N) et 30 en Rivière de Daoulas le 25 mars (...).

2 observations sont certainement à mettre en relation avec des passages : 1 centaine d'individus sur l'Etang de La Poitevinère/Riaillé (44) le 25 mars et 100 à 150 sur l'Etier de Noyalo (56) le 14 avril.

Viennent ensuite des observations opérées en période de nidification : 1 à Prat Ar Mel/Lescouët-Gouarec (22) le 21 avril ; 3 individus dans le Marais de Sougeal (35) le 28 avril ; 5-6 dans le Yeun Elez (298) le 1er mai ; 1 femelle dans le Marais de Grée/Ancenis (44) le 12 mai ; 1 mâle sur la Loire au niveau de Thouaré (44) le 15 mai. Plus tard : 1 à l'Etang du Cranic/Brech (56) le 30 juin ; 1 à l'Etang de St Jean/Locoal-Mendon (56) le 7 juillet ; 2 à l'Etang du Cranic (56) le 15 juillet.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) 63 données

Les données disponibles ne permettent pas de tracer un schéma pré-nuptial.

Notons seulement 56 individus au Marais de Sougeal (35) le 20 mars, puis 90 le 21 ; 50 aux Grèves de Langueux (22) le 21 mars et 80 à St Jean/Locoal-Mendon (56) le 23 mars.

Pour la suite nous ne retenons que les données de groupes (regroupement de familles, oiseaux en mue et passages) : 60 (comportant 3 nichées d'une dizaine de poussins chacune) à la Poitevinère/Riaillé (44) le 28 avril ; 60 à l'Etang de St Jean/Locoal-Mendon (56) le 6 mai ; 40 sur l'Elorn/Landerneau (29N) le 31 mai ; 150 sur l'Etang de Kerhuon (29N) le 31 mai ; 69 à Trielen/Molène (29N) le 9 juin ; 100 en Baie de Goulven (29N) le 11 juin ; 120 sur l'Etang du Cranic/Brech (56) le 18 juin ; 160 à St Jean/Locoal-Mendon le 7 juillet ; 70 à l'Etang du Cranic le 7 juillet ; 100 à St Jean le 15 juillet.

CANARD PILET (*Anas acuta*) 10 données

6 (2 ♂ et 4 ♀) à l'Etang de St Jean/Locoal-Mendon (56) le 16 mars ; 1 ♂ et 1 ♀ à Ménéham/Kerlouan (29N) le 17 mars ; 1 ♂ à l'Etang de Lamballe (22) le 18 mars ; 48 dans le Marais de Sougeal (35) le 21 mars ; 1 ♂ et 1 ♀ à l'Etang de St Jean/Locoal-Mendon le 23 mars ; 2 ♂ et 2 ♀ à l'Etang de Nérizélec/Plovan (298) le 23 mars ; 120 dans le Marais de Grée/Ancenis (44) le 24 mars, dernière observation de l'espèce en ce lieu pour la période ; 5 ♂ et 5 ♀ à Falguérec/Séné (56) le 25 mars ; 1 mâle et 1 femelle dans le Marais de Séné (56) le 14 avril et 4 à La Poitevinère/Riaillé (44) le 29 avril.

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) 22 données

Les données de mars et d'avril concernent le passage et l'installation des nicheurs ;

Au Cranic/Brech (56) : 1 couple du 16 mars au 15 avril, 1 ♂ le 21 avril ; à St Jean/Lochal-Mendon (56) : 1 ♂ le 16 mars ; au Guic/Guerlesquin (29N) : 1 ♀ le 18 mars ; à Sougeal (35) : 14 le 20 mars, 16 le 21 ; Kerguelen/Larmor-Plage (56) : 2 ♂ et 1 ♀ le 20 mars, 1 couple les 26 mars et 1er avril ; aux Marais de Séné (44) : 15 le 24 mars ; à La Poitevinière/Riaillé (44) : 10 le 25 mars ; à Trenvel/Treogat (29S) : 6 ♂ et 1 ♀ le 28 mars ; au Ferello/Ploeseur (56) : 1 couple le 1er avril ; à Nérizélec/Plovan (29S) : 10 le 8 avril.

Les données suivantes semblent concerner des nicheurs :

5 ♂ 1 ♀ à Trenvel/Treogat (29S) le 22 avril ; 6 en vol à Montrou La Chapelle/Meulin (44) le 11 mai ; 1 ♂ à Falguérec/Séné (56) le 16 mai ; 1 couple dans les Marais de Brag/Montrelais (44) le 19 mai ; 2 ♂ 1 ♀ à St Vio/Treguennec (29S) le 27 mai ; 2 ♂ 1 ♀ dans les Marais de Grée/Ancenis (44) le 28 mai.

Enfin 1 couple a été observé en mai et juin dans la Mare des Maffey/Sennes (35).

CANARD SOUCHET (*Anas platyrhynchos*) 25 données

Le passage est sensible jusqu'à la mi-avril, avec parfois des bandes importantes pour ce canard : 93 (dont 68 ♂) à l'Etang du Cranic/Brech (56) le 16 mars ; 8 dans les Marais de Sougeal (35) le 20 mars, puis 16 le 21 ; 7 (2 ♀, 5 ♂) à l'Etang de Nérizélec/Plovan (29S) le 23 mars ; 62 (dont 42 ♂) à l'Etang du Cranic le 23 mars ; 60 dans les Marais de Grée/Ancenis (44) le 24 mars ; 8 à Falguérec/Séné (56) le 29 mars ; 10-15 au Cranic le 4 avril ; 16 à Falguérec le 5 avril ; 50 à Nérizélec le 8 avril ; 20 à Paintourteau/Erbrée (35) le 9 avril ; 20 à La Poitevinière/Riaillé (44) le 10 avril ; 7 (dont 4 ♂) au Cranic le 13 avril, puis 4 le 14 et 5 (dont 2 ♂) le 21 avril ; 2 à Falguérec/Séné le 17 avril ; 17 à l'île Verdon/Marais de Goulaine (44) le 21 avril.

Quelques données en période de reproduction : à Falguérec/Séné 1 couple le 6 mai, 1 ♂ les 25 et 31 mai et enfin 1 couple le 3 juin ; également 1 ♂ à l'Etang du Cranic le 11 juin ; 10 au resblai de Lavau (44) le 21 juin et 1 couple à St Luce (44) le 23 juin.

FULIGULE MILLOUIN (*Aythya ferina*) 12 données

De belles bandes sont le signe des mouvements pré-nuptiaux qui ne semblent pas se prolonger au-delà de la mi-avril : 235 à l'Etang du Cranic/Brech (56) le 16 mars ; 4 (3 ♀ et 1 ♂) à l'Etang Neuf/Guipel (35) le 16 mars ; 9 à l'Etang de Beffou/Loguivy-Ploegras (22) le 18 mars ; 400 à l'Etang de La Poitevinière/Riaillé (44) le 18 mars ; 112 à l'Etang du Cranic le 23 mars puis 110 le 4 avril, 8 le 13 avril, 10-15 le 14 avril et 5 le 22 avril. Notons encore 3 observations se rapportant à des oiseaux attardés ou estivants : 1 ♂ à l'Etang de Lorballe (22) jusqu'au 9 mai ; 1 ♂ en mue à Mesqueau/Ploegrasnou (29N)

le 17 juin ; 4 individus à Paintourteau/Vitré (35) le 1er juillet et ♂ à l'Etang du Cranic jusqu'au 15 juillet.

Quelques données de nidification : 1 couple à l'Etang de Clégreuc/Vay (44) le 15 avril ; 3 couples à l'Etang de La Poitevineière (44) le 28 avril ; 1 couple dans le Yeun Elez (298) le 1er mai.

L'espèce est donnée nicheuse certaine : en Brière (44) ; à l'Etang du Pin (44) où un poussin de 10 jours est observé, à Trenvel/Tréogat (298) et nicheur probable à l'Etang de La Poitevineière.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) 20 données

Les données qui nous sont parvenues mettent en évidence la superposition d'un mouvement de passage avec la fin d'hivernage. Notons simplement :

au Cranic/Brech (56) : 20-30 le 16 mars, 36 le 23, 5-10 le 4 avril, 12 le 13, 2 le 14 ; à Beffou/Loquivy-Plougras (22) : 16 le 18 mars ; à La Poitevineière/Riaillé (44) : 150 le 18 mars, 10 le 28 avril ; à Lespaul/Pont-Croix (298) : 1 ♂ le 26 mars ; à Kerhuon (298) : 1 ♂ le 31 mars ; à l'Etang du Fourneau/Ste Brigitte (22) : 10 le 2 avril ; à l'Etang de la Hardouinais/Merdrignac (22) : 1 ♂ 2 ♀ le 2 avril ; à Mesqueau/Plougassou (298) : 2 ♂ 1 ♀ le 5 avril ; à la Blisière/Juigné (44) : 18 le 7 avril ; à Clégreuc/Vay : 1 ♂ 2 ♀ le 15 avril.

En période de nidification :

2 couples le 21 avril au Cranic/Brech (56) ; 1 couple le 1er mai dans le Yeun Elez (298) ; 1 ♂ sur le Lac de Morin/Massérac (44) le 1er juin ; 2-3 couples à Paintourteau/Erbrée (35) le 1er juillet, 3 jeunes sont observés.

FULIGULE MILOUINNA (*Aythya marila*) 2 données

2 ♀ à l'Etang de Kerhuon (298) le 31 mars ; 1 ♂ à l'Etang de Trenvel/Tréogat (298) le 10 mai.

EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*) 19 données

Après quelques données provenant des lieux traditionnels d'hivernage de l'espèce le long de nos côtes, c'est finalement de nombreuses observations d'Eiders qui sont faites durant la période normalement réservée à la reproduction. Si l'ensemble des observations ne permet que des espoirs, un cas de nidification - bien que n'ayant pas abouti - est tout de même enregistré aux Evens/La Baule (44).

En Baie de Douarnenez (298) : 60-70 sur la totalité du site le 25 mars, 37 à Tréfontec le 6 avril, 35 à Kervel le 12 avril ; en Baie de Morlaix (298) : en Penzé, 17 le 15 avril et 4 le 10 juin, au Vezoul, 9 le 9 mai ; au Verdelet/Pléneuf (22) : 1 ♂ subadulte le 25 mai ; aux Evens/La Baule : 1 nid de 4 oeufs le 30 mai (détruit le 2 juin) ; au Sillon du Talbert (22) : 1 couple le 3 juin ; à Trielen/Archipel de Molène (298) : 1 ♀ du 9 au 11 juin.
Retenons encore l'estivage de 200 individus en Baie de la Baule (44).

HABELE DE MIQUELON (*Clangula hyemalis*) 4 données

En Baie de Douarnenez entre le Ris/Kerlaz et Kervel/Plonévez-Porzay (29S) : 6 le 18 mars, 7-8 le 25, 5 le 30 et 5 enfin le 6 avril.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) 23 données

L'hivernage se poursuit jusqu'à la mi-avril : 2-300 en Baie de Douarnenez (29S) le 25 mars ; 200 en Baie de Lannion (22) le 8 avril ; 300 en Baie de Douarnenez le 10 avril et 150 le 12.

Le passage est également ressenti jusqu'à la fin mai : 75 à la Pointe de Merquel/Mesquer (44) les 21 et 29 mars ; 3 à Ste Luce (44) sur la Loire le 1er avril ; 18-21 à Banneg/Molène (29N) le 3 avril ; 400 à Nérizelec/Plovan (29S) le 8 avril ; 1 ♂ dans le Marais de Grée/Ancenis (44) les 8 et 10 avril ; 3 dans l'Etier de Noyal (56) le 14 avril ; 1 ♂ dans le Goulet de Brest (29N) le 17 avril ; 1 ♂ à l'Etang de Poulguidou/Plouhinec (29S) le 22 avril ; 7 dans le Goulet/Brest le 24 avril ; 40 vers le nord en 1 heure à la Pointe de Feunteun Aod/Plogoff (29S) le 24 avril et 22 vers le nord le lendemain au même endroit ; 20 à la Pointe du Croisic (44) le 6 mai ; 5 vers le nord en 35 mn à l'île de Batz (29N) et 1 ♂ mazonnée dans le Port de Douarnenez le 31 mai.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) 3 données

Toutes les observations proviennent du Sud-Finistère :

5 minimum à Kervel/Plonévez-Porzay le 6 avril, 4 à Nérizelec/Plovan le 8 avril, 15 à Kervel le 12 avril.

GARROT À OÏL D'OR (*Bucephala clangula*) 3 données

1 ♂ le 16 mars et 1 ♂ le 13 avril au Cranic/Brech (56). A La Blisière/Juigné (44), 2 du 7 au 13 avril.

HABLE HUPPE (*Merus serrator*) 13 données

La plupart des données sont groupées de manière classique, avant le 15 avril :

10-15 le 17 mars en Rivière de Baoulas (29N) ; 45 le 22 mars en Penzé (29N) ; 1 en Baie de Morlaix (29N) le 24 mars ; 9 le 26 mars à Sissables/Guérande (44) ; 12 le 28 mars au Rostu/Mesquer (44) ; 1 ♂ le 31 mars à Canaret (29S) ; 20-25 le 3 avril en Rivière de Baoulas ; 2 le 7 avril en Penzé ; 1 ♂ le 11 avril au Verdelet/Pléneuf (22) ; le 14 avril 2 ♂ dans l'Etier de Noyal (56) et 1 ♂ 5 ♀ dans le Trait de Mesquer (44).

Ensuite : 1 le 1er mai en Baie de Lancieux (22) et 1 ♂ le 2 juillet à l'île des Landes/Cancal (35).

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*) 1 donnée

1 ♂ dans le Goulet de Brest (29N) le 19 avril.

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*) 26 données

Ille-et-Vilaine

Quelques couples nous sont signalés du nord du département : 1 individu cantonné dans le Marais de Dol le 7 mai, 2 couples nicheurs à l'Etang du Boulet/Feins dont 1 avec 1 oeuf le 15 juin.

Ailleurs : 2 à Haute Forêt/Paispont le 10 juin et 1 en Forêt de la Guerche le 29 juin.

Côtes-du-Nord

1 le 20 mai à St Alban, 1 le 24 mai en Forêt de Loudéac et parades dans la première quinzaine de juin à Tréglazac.

Finistère

1 en vol vers le nord-ouest le 9 avril à Trenvel/Tréogat. Il s'agit de la date la plus précoce qui nous soit parvenue à ce jour.

Signalons également : 1 le 31 mai en Forêt d'Huelgoat et 1 le 18 juin en vol au-dessus de St Renan.

Des parades sont notées à Kerprigent/St Jean du Doigt, sans précision de date.

Morbihan

1 le 31 mai à Coet Per/Inzinac Lochrist ; 1 à Trécesson/Campeneac le 9 juin ; le même jour, 1 couple à Lambel/Camors où 1 individu est revu le 17 juin.

Loire-Atlantique

Les premiers sont notés le 1er mai à Ste Reine de Bretagne et à St-Brevin.

Une famille est découverte le 5 juillet au Vioreau/Joué-sur-Erdre.

MILAN NOIR (*Milvus nigra*) 82 données

Première observation : 1 le 23 mars au Cranic/Brech (56), 6 le 24 mars à La Poitevinière/Riaillé (44).

Par ailleurs : 1 le 18 avril à Pern/Duessant (29N), 1 le 19 avril à St Maurice/Guidel (56), 1 immature le 23 avril dans les Marais de Sougeal (35), 1 le 24 avril à la Pointe de Feunteun Aod/Plogoff (29S), 3 en vol vers le sud le 26 avril à Troncen/St Jean Trolimon (29S), 1 vers l'est le même jour à Plouzané (29N), 1 le 29 avril au Boulet/Feins (35), 1 le 1er mai à la Vigne/Chavagne (35), 3 les 1er et 7 mai dans le Marais de Dol (35), 30 le 10 mai sur la décharge de St Nazaire (44), 1 le 2 juin à Locmaria Berrien (29N).

Nidification :

Finistère

L'espèce a estivé dans la région de Quimperlé.

Morbihan

2 jeunes sont élevés à l'étang du Cranic/Brech, le site étant abandonné dès le 15 juillet. Il s'agit de la limite occidentale de l'espèce.

A Plouhinec : des observations sont faites dans le secteur de Kerzine/Kervran.

A Séné : 1 le 8 mai à Gornévez.

Loire-Atlantique

La nidification est établie à : Assérac, Carquefou, Guérande, Forêt de Machecoul, Pierre Rouge/Paimboeuf, Poitevinière/Riaillé et Forêt du Vieureau.

Le Milan noir est une espèce dont la répartition en Bretagne s'est étendue depuis la fin de l'Atlas nicheurs précédent (1975). Toutefois rien ne dit que cette expansion va se poursuivre, puisque dans de nombreuses régions on a récemment noté une stagnation voire une réduction des effectifs, comme c'est le cas dans le proche Maine et Loire. Nous devons donc être attentif et signaler toute acquisition ou abandon de site les années prochaines. Remarquons enfin que nous n'avons reçu aucune observation des Côtes-du-Nord.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) 1 donnée

1 le 13 avril au Collet/Bourgneuf (44).

Les observations printanières de cette espèce ne sont pas fréquentes.

PERCHOPTÈSE D'EGYPTE (*Neophron percnopterus*) 1 donnée

1 le 28 avril à Herbignac (44), en vol vers le sud est.

Il s'agit d'une première pour la Bretagne si tant est qu'il s'agisse d'un oiseau d'origine sauvage.

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) 2 données

1 le 15 avril à Kervéatous/Plouarzel (29N) et une observation non datée mais sans doute de la même époque au Roc Trédudon/Plounéour-Ménez (29N).

BUSARD SP. (*Circus sp.*) 2 données

1 le 3 avril à Belle-Ile (56) et 1 le 27 juin dans la Forêt de la Bourdonnaye/Carentoir (56).

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) 71 données

Ille-et-Vilaine

Quelques données intéressantes pour ce département où l'espèce ne niche que dans les Marais de Redon.

1 ♀ à Hirel le 18 mars ; 1 ♂ immature dans le Marais de Dol le 1er mai ; 1 ♀ en Baie du Mont les 13 et 27 juin ainsi que le 5 juillet. A l'intérieur : 1 au Boulet/Feins le 21 juin.

Finistère-Nord

Quelques données d'erratismes ou de passage : le 19 mars, 1 ♀ à Pont Corff/Guilers et 2 ♀ ou immatures à St Renan ; le 20 mars, 1 ♀ à St Renan ; le 3 avril, 1 ♀ à Litré/Archipel de Molène ; le 29 avril, 1 ♀ en vol vers le nord-est au Créach/Ouessant ; le 1er mai, 1 immature vers le nord-est, toujours au Créach.

Par ailleurs, le Busard des roseaux s'est reproduit dans deux petits marais côtiers à Guissény et à Kerlouan, continuant sa progression le long de nos rivages.

Finistère-Sud

1 immature à Kerloch/Crozon le 10 juin (site de nidification).

Morbihan

Kerquelen/Larmor-Plage : 1 le 25 mars et 1 ♂ ♀ le 1er avril ; Kerpine/Plouhinec : 2 couples (transport de proies le 6 mai) ; Erdeven : 2 ♀ le 17 mars, 1 les 4 juin et 1er juillet ; St Jean/Lochal-Mendon : 1-2 couples ; Cranic/Brech : erratique tout au long de la période ; Pluneret : 1 ♂ le 30 mai ; Marais de Séné : 2-3 le 14 avril ; Marais de Noyal : 2 le 14 avril ; Belle-Ile : 5 individus du 3 au 5 avril, 3 ♀ dont 1 avec un comportement territorial le 8 avril à Ty Seveno/Locmaria.

Loire-Atlantique

Des nids ont été découverts à Assérac, Bourgneuf et St Nazaire.

BUSARD ST-MARTIN (*Circus cyaneus*) 54 données

Ille-et-Vilaine

1 le 16 mars à l'Etang Neuf/Guipel ; 1 ♀ le 18 mars en Forêt d'Araize ; 1 ♂ le 29 mars à la Madeleine/Combourg ; 1 ♀ le 6 avril en Forêt de Tanouarn ; 1 ♂ le 14 mai en Forêt de Paispont et 1 immature le 14 juillet au Mont-St-Michel.

Côtes-du-Nord

1 ♀ trouvée morte le 7 avril dans les landes de Lanfains.

Finistère

1 ♀ le 17 mars à Commana ; 1 ♀ le 18 mars à Scrignac ; 1 ♂ le 8 mai à la Roche St Barnabé/Le Cloître St Thégonnec ; 1 couple le 3 juin aux Cragou/Plougonven ; 1 ♂ le 10 juin à Roch an Feunteun/Ploumécour-Ménez ; 4 pulli le 24 juin aux Cragou/Plougonven (3 s'envolent fin

juillet) ; le 30 juin, 1 nid avec pulli à Pen ar Prajou/Plouédour-Ménez.

Morbihan

3-4 couples parquent en Forêt de Lanouée le 28 mars, 1 q au moins sur Belle-Ile dans la première quinzaine d'avril ; 1 o^e alarme dans la Lande de Cornévec/Pluvigner le 2 juin ; 1 o^e au Burco/Grandchamp le 3 juin ; 1 o^e à Lanbel/Casors le 9 juin, 2 à Cospénéc le même jour ; 1 q alarme à St Servant-Sur-Oust le 25 juin et 1 o^e à Grangoet/St Gonnelly le 11 juillet.

Loire-Atlantique

La nidification est établie à Erbray et en Forêt du Vioreau (2 nids détruits à cause d'opérations de débroussaillage). Elle est probable à Machecoul, Moisdon La Rivière, St Mars La Jaille et Vay. Il est à noter que les contacts proviennent pour la plupart des massifs boisés du nord-est du département.

Le Busard St-Martin, à l'inverse du Cendré, est actuellement en progression dans notre région, sa nidification étant maintenant prouvée en Loire-Atlantique. Il faut le rechercher dans les coupes forestières et les landes en toute région.

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*) 24 données

Première observation le 4 avril à Belle-Ile (1 o^e).

Ille-et-Vilaine

Baie du Mont et Marais annexes : 1 o^e adulte le 1er mai dans le Marais de Dol, 1 q en Baie le 7 mai et une autre dans le Marais de Lillener le 10 mai.

Paispont : 3 (2 o^e et 1 immature) le 14 mai.

Vitré : 1 au château des Rochers le 3 juin.

Côtes-du-Nord

2 couples à St Nicodème et 2 autres à Plévin.

Finistère-Nord

La population des Monts d'Arrée n'a pas été suivie. Citons seulement : 1 couple cantonné entre le Cragou et la Roche St Barnabé/le Cloître St Thégonnec.

Quelques observations autour du Yeun Elez et des crêtes environnantes (1 couple au moins s'y est reproduit certainement).

Finistère-Sud

1 o^e le 18 juin entre Cast et Plonévez-Forzay. S'agit-il d'un individu provenant du Ménez Hon ou de Ménez Querque ?

Morbihan

2 couples seulement à Belle-Ile dont 1 oiseau mélanique.
1 à Campénéac le 9 juin, 1 couple au Menez Du/Langonnet.

Loire-Atlantique

Aucune donnée exploitable.

Le Busard cendré mériterait une attention soutenue et précautionneuse afin qu'il soit possible de fixer un état des effectifs nicheurs.
C'est incontestablement le rapace qui a connu le déclin le plus net ces dernières années dans notre région.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) 3 données

1 les 16 et 17 mars dans la Forêt du Gâvre (44). Par ailleurs l'espèce est signalée de la Basse Vallée de l'Aulne (298) et de la Forêt de la Hardouinais (22).

Des preuves de reproduction manquent pour cet oiseau au contact duquel il convient de se montrer prudent.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) 169 données

Un hivernant stationne à la Pointe de Primel/Plogassou (298) jusqu'au 17 mars où trois plumées fraîches sont identifiées : un accenteur sourcil, une grive draine et un bruant des neiges.

Nidification :

Ille-et-Vilaine

Parades : 1 couple au Boulet/Feins le 3 avril ; 3 couples en Forêt de Tancouarn le 6 avril.

Nourrissage : 1 le 23 mai à Rennes.

Par ailleurs, au moins deux couples en Forêt de Villecartier le 21 mai.

Côtes-du-Nord

4 nids occupés : à Plémy le 13 juin ; à Cousté le 1er juillet ; à Plémet, avec pulli, le 2 juillet et en Forêt de Lorge le 15 juillet.

Finistère-Nord

Léon

Couvaison : le 14 mai à Trénacouézan (site n° 1) ; le 21 mai à Landivisiau ; le 30 mai à Brest et à Bodilis, le 2 juin à Taulé ; le 9 juin à Trénacouézan (site n° 2).

Poussins : 3-4 le 19 juin à Brélès ; 2 au moins le 21 juin à Tréflacouézan, 2 au moins le 27 juin à Plouénan ; 3-4 le 4 juillet à Lanervily ; 1 le 4 juillet à Tréflex.

Par ailleurs l'espèce s'est reproduite dans les sites suivants : Plouvern, St Méné, St Pol-de-Léon, Santec, Pleyber-Christ et sans aucun doute à Plounevestre et Tréouergat.

Autres secteurs :

Parades : 3 (0[♂] 0[♀]) en Forêt d'Huelgoat le 18 mars.

Construction : le nid de l'année est achevé le 15 avril à Scrignac.

Couvaison : le 31 mai en Forêt d'Huelgoat.

Jeunes : 1 près de l'envol le 5 juillet à St Jean du Doigt.

L'espèce s'est également reproduite à Berrien, à Plourin les Morlaix et probablement à Plougasnou.

Finistère-Sud

Parades : 1 0[♂] le 30 mars dans la Forêt au Duc.

Construction : l'aire semble achevée extérieurement dès le 28 mars à Douarnenez.

Couvaison : 5 oeufs à Beuzec Cap Sizun le 8 mai ; 3 oeufs à Plouhinec

le 17 mai ; 5 oeufs le 28 mai à Pont-Croix ; 4 oeufs le 28 mai à

Clédén Cap Sizun ; ponte détruite le 29 mai à Douarnenez ; ponte pas

encore déposée le 29 mai à Poullan-Sur-Mer ; 6 oeufs le 30 mai à

Plovan ; 4 oeufs dont 1 détruit le 31 mai à Beuzec Cap Sizun ; 3 oeufs le 31 mai à Poullan-Sur-Mer.

Poussins : 5 de 1 à 3 jours le 13 juin à Douarnenez ; 5 de 3 à 5 jours

le 19 juin à Mahalon ; 4 de 5 à 8 jours plus un oeuf clair le 25 juin

à Mahalon ; 2 de 7 à 10 jours le 3 juillet à Guiler-Sur-Goyen.

Jeunes : 5 (3 0[♂] 2 0[♀]) de 3 semaines le 7 juillet à Esquibien ;

2 jeunes au moins plus un poussin mort et un oeuf clair le 8 juillet à

Beuzec Cap Sizun ; 3 au moins à l'envol en juillet à Pouldergat et Douarnenez.

La nidification apparaît également probable à Trégarvan et possible à Crozon.

Morbihan

2 nids ont été trouvés ce printemps dans la région du Palais (Belle-Ile).

Par ailleurs l'espèce a été signalée dans plusieurs zones où elle est

mal connue : 1 le 29 mars en Forêt de Lanouée, 1 le 24 juin à Bubry,

1 0[♂] transporte le 27 juin à Carentoir et 3 couples sont repérés dans

la région de Quéven et Ploemeur où une famille est observée le

15 juillet.

Loire-Atlantique

Quelques indices de reproduction dans la vallée de la Loire entre Nantes et Varades.

La progression de la population bretonne d'Eperviers est un des phénomènes marquants de l'évolution de l'avifaune bretonne durant ces 10 dernières années. Qu'en juge plutôt :

- Actualités du printemps 1972 (AR VRAN V.2) : 18 données

- Actualités du printemps 1973 (AR VRAN VI.2) : 21 données

- Actualités du printemps 1984 (AR VRAN XI.2) : 169 données

Cet essor est incontestablement dû à l'arrêt des destructions tant l'espèce peut s'accommoder de conditions de nidifications difficiles grâce à son extrême discrétion : le nid peut être installé dans des boisements minuscules, fussent-ils construits, dans des parcs suburbains fréquentés (Brest, Douarnenez, ...) ou au milieu de zones remembrées.

BOSE VARIABLE (*Buteo buteo*) 194 données

Ille-et-Vilaine

Quelques recensements : essentiellement au nord du département.

Marais de Dol : 5 couples ; Marais de Sougeal : 3 couples ; Etang du Rouvre/St Pierre de Plesquen : 3 couples ; Forêt de Villecartier : 4 couples ; Forêt de Tanouarn : 3 couples ; Etang du Boulet/Feins : 5 couples minimum ; Forêt de Palspont : 4 couples minimum (total 27 couples).

Côtes-du-Nord

5-6 couples ont été repérés : Forêt de la Perche, Forêt de La Hardouinais/Merdignac, Forêt de Loudéac et Plounérin (1-2 sites). Quelques dates : 1 couvée le 9 avril, 1-2 pulli le 19 mai, 1 jeune volant le 10 juillet.

Finistère-Nord

Léon : Quelques données d'un secteur où l'espèce est rare : 1 le 3 avril à Coat-Méal ; 1 le 25 avril à Plouneventer ; 1 le 6 juin en Forêt de Lannuzoarn/Plouénan ; 2 le 12 juin à Brélès ; 1 pullus le 19 juin à Milizac ; 1-2 pulli le 27 juin à Taulé et 1 jeune envolé le 27 juin à St Martin des Champs.

Par ailleurs, 1 couple cantonné à St Méen, 1 autre à Trémaouézan et enfin 1 jeune à l'envoi à Pleyber-Christ, sans précision de date.

Autres secteurs :

1 couple parade le 26 mars en Forêt de St Ambroise/Loznaria Berrien ; 2 couples paraissent le 5 avril sur l'ouest de la commune de Plougassnou ; le 15 avril, 2 nids sont occupés à Scrignac à 1 km de distance ; 1 alarme le 22 avril à Ploudiry ; 1 couple le 27 avril à Plouézoch ; 1 pullus le 7 juin à Plougenven ; 2 pulli le 8 juin à Plougassnou ; 1 pullus le 17 juin à Plourin des Morlaix ; 1 pullus le même jour à Plougenven ; jeune(s) envolé(s) le 22 juin à St Jean du Doigt ; 1 alarme le 30 juin à Plouéour-Ménez. D'autres données sans dates nous sont parvenues : 1 pullus à Irillac ; 1 pullus à Plougassnou ; 1 pullus à Lannéanou et 3 oeufs à Plougenven.

Finistère-Sud

3 données, relatives à des nids occupés fin mai, seulement : à Plogastel St Germain le 26, à Plouguffan le 27 et à Poullan-Sur-Mer le 31.

Cette dernière information est intéressante car elle constitue la première preuve de reproduction pour la Buse dans le Cap Sizun depuis longtemps.

Morbihan

Rien à signaler.

Loire-Atlantique

Quelques groupes : 6 à Machecoul le 7 avril, 6 à Riaillé le 10 avril et 8 au Vioreau le 2 juin.

Dans la région d'Ancenis, 6 couples ont été découverts dans un milieu de bocage ouvert.

Les informations de ce printemps illustrent la remontée de l'espèce en Bretagne. Deux secteurs sont, en effet, réoccupés : le Bas Léon et le Cap Sizun, avec il est vrai, des effectifs minimum.

Autre renseignement intéressant, la Buse niche en forêt, en bois, en bouquet, ou même sur des arbres isolés (Scrignac). Elle peut se trouver très proche d'habitations humaines (Ploumérin), mais elle réclame de la tranquillité, étant beaucoup plus sensible au dérangement que ne l'est d'Epervier, par exemple.

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*) 3 données

1 le 27 avril au Créach/Ouessant (29N) ; 1 le 3 mai sur la Loire à Mauves (44) et 1 au Vioreau (44) du 5 au 8 mai.

Trois observations constituent un bon chiffre pour une espèce assez rare en passage pré-nuptial.

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) 62 données

Pratiquement pas de données pour cette espèce jugée, à tort, comme trop commune. Il nous apparaît que les effectifs de la Crécerelle doivent, au contraire, être suivis devant la remontée de la Buse et de l'Epervier.

La quasi totalité des données exploitables nous parvient du Finistère :

La Gasc/Scrignac : parades dans une carrière le 26 mars ; St Herbot/Loqueffret : 1 parade dans une carrière le 6 avril ; le Guern/Crozon : 1 couple dans la falaise le 15 mai ; Térénez/Plouzanou : 1 alarme au-dessus d'un bouquet de pin le 24 mai ; Landgazel/Trénaouézan : 1 couple au-dessus d'une pinède le 9 juin ; Le Clos/Ploumécour-Ménez : 1 alarme dans une ardoisière le 17 juin ; Le Ris/Kerlaz : 1 couple est installé dans la falaise ; Pen ar Quinquis/Bodilis : 1 alarme le 8 juillet au-dessus d'un bois ; Lesquiffieu/Pleyber-Christ : transport de proie noté de la part d'un couple dont le nid n'a pas été repéré ; Kérouzéré/Sibiril : pulli dans un pigeonnier ; Meinfacoutet/Plouescat : pulli dans un pigeonnier ; Le Lingoz/Carantec : 3-4 pulli dans une falaise ;

Kernabon/St Jean du Boigt : 5 oeufs sur un arbre ; Réserve de Goulven : 3 pulli dans la falaise ; Ouessant : 1 couple niche à Port Ligouden, 2 autres sont possibles dans l'île.

Par ailleurs :

1 couple le 2 avril dans les gorges de Daoulas ; 1 couple le 9 mai au Prétanné/Morieux ; 1 couple le 22 mai à La Chapelle St Pierre/Trévé (22) ; 1 couple le 10 juin en carrière du Tertre Brandefert/Plancoët (22) ; 2 nids sans précision de date sur Carnoët (22) ; 1 à Kersainig et 1 à St Gildas.

Enfin 2 jeunes à l'envol à Groix (56).

La "rareté" relative des données sur le Faucon Crécerelle peut avoir deux origines :

1°) la difficulté à trouver son nid en dehors des falaises, carrières et bâtiments.

2°) une véritable diminution.

En tout état de cause, il en existe une troisième, indéniable : le manque d'intérêt des observateurs !

FAUCON ROBEZ (*Falco vespertinus*) 1 donnée

Le 1er mai, 1 ♀ est observée dans le Marais de la Guiguennais/St Brévin (44).

Les dernières observations de cette espèce remontent à 1977 (1 dans les Monts-d'Arrée et 1 en Loire-Atlantique) : elles avaient été effectuées au début de juin.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) 4 données

Le 16 mars, 1 ♀ entre Plonévez-Porzay et Cast (29S) , le 18 mars, 1 ♂ à Botmeur (29S) , 1 le 29 mars en Rivière de Pont-l'Abbé (29S) et le 4 avril, 1 ♀ à Koh Kastell/Sauzon (3elle-île -56-).

Ces données sont à rattacher au passage pré-nuptial et à la fin de l'hivernage, l'estivage n'ayant pas été constaté cette année comme ce fut notamment le cas en 1981 et 1982.

FAUCON ROBEREAU (*Falco subbuteo*) 52 données

Ille-et-Vilaine

Paléopont : 1 le 26 avril et 2 le 24 mai ; St/Chantepie : 1 les 1er mai et 3 juin ; Marais de Dol : 1 ♂ chasse les insectes le 1er mai, 1 le 7 mai, 1 couple cantonné le 27 mai ; Rennes : 1 le 10 mai et 1 le 11 juin ; La Roche de Bretagne : 1 le 15 mai ; Le Boulet/Feins : 1 nid avec 2 jeunes à l'envol le 27 mai, 1 couple le 21 juin ; Saie

du Mont-St-Michel : 1 nid avec 2 jeunes à l'envol le 27 mai et 1 le 9 juillet ; Forêt de La Guêrche : 1 alarme le 10 juillet.

Finistère

1 le 29 avril au Stang Korz/Ouessant ; 1 à Plomodiern les 9 et 30 juin et 1 le 17 juin à l'Etang de Lacual/Plogoff où il chasse hirondelles et insectes.

Morbihan

1 à Locmariaquer le 30 avril ; 1 couple en chasse à Falguérec/Sené les 28 et 31 mai.

Loire-Atlantique

La première observation est du 13 avril en Brière.

Deux indices de passage : 10 dans le Marais de Goulaine les 8 mai et 1er juin.

Un seul indice certain de nidification non localisée pour ce département.

Le nombre de données sur cette espèce est en forte augmentation si l'on se réfère aux années 1967-1975. La population bretonne est incontestablement en progression, mais elle ne fait guère évoluer son aire de répartition.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) 4 données

1 le 25 mars en Penzé (29N) ; 2 contacts avec 2 individus différents le 3 avril et 1 ♀ le 4 avril sur Belle-Ile (56) ; 1 à Trébéron/Rade de Brest (29N) le 11 avril.

Des données bien groupées à une date classique de passage.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) 5 données

Uniquement notée en Loire-Atlantique.

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) 7 données

Les manipulations exercées sur cette espèce par les chasseurs entraînent un désintérêt total de la part des ornithologues :

1 chanteur à l'Hioval/St Alban (22) le 5 juillet ; 1 couple au Cragou/Plougonven (29N) sans précision de date ; 2 compagnies en Loire-Atlantique : 12 à St Herblon et 10 à La Mercerie/Joué-sur-Erdre.

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) 4 données

1984 ne semble pas avoir été une année à Cailles, c'est le moins que l'on puisse dire :

1 chanteur le 21 mai au Grand Pré de Varades (44) ; 1 chanteur le 27 mai dans le Marais de Dol (35) ; 2 chanteurs le 21 juin à Lavau (44) et 2 chanteurs les 4 et 7 juillet à La Boisse de Bretagne (35).

FAISON DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) 27 données

Des chants ont été notés dans la région morlaisienne (29N) et en Loire-Atlantique (44) tout au long de la période.

Quelques données de reproduction : 2 nichées à Clairefontaine/Serent (56) et 1 le 11 juin au Loroux Bottereau.

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) 7 données

1 chanteur à Carquefou (44) le 11 avril ; 1 à la Mare des Maffeyas/St Jacques de la Lande (35) le 19 mai et 1 le 25 mai à Bindre/Séné (56).

Un gros effort est à faire pour cette espèce. Rappelons qu'en 1973 nous avons reçu 38 données pour cette période ! Diminution réelle ou moindre intérêt des observateurs ?

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*) 3 données

Observée uniquement en Loire-Atlantique :

2 à Ste Luce-sur-Loire le 27 mars ; 6 chanteurs au Bois de St Aignan de Grandlieu le 29 mars ; 1 à Machecoul le 12 avril.

Les dates des observations peuvent évoquer des migrateurs comme des nicheurs.

Nous n'avons pas reçu de donnée des Marais de Redon (35).

RALE DE GENETS (*Crex crex*) 4 données

Une seule donnée en dehors de la Loire-Atlantique : 1 le 23 avril à Lannéon/Lanrivoaré (29N).

En Loire-Atlantique les recensements effectués par le GOLA dans le cadre de l'enquête nationale sur le Rale de genêts donnent les résultats suivants :

400-650 couples dans la Vallée de la Loire en aval de Nantes ;

80-100 couples dans la même Vallée, en amont de Nantes ;

35-75 couples dans le reste du département ;

Soit au TOTAL : 515-825 couples.

Les estimations ont été établies à partir d'un échantillon de 1760 hectares situé en aval de Nantes : 161 chanteurs y ont été dénombrés soit : 9/ha. Considérant ensuite les 5850 hectares de prairies favorables situés dans la même zone, la GOL a estimé : 400 - 650 couples (6,8 à 11,1/ha).

Signalons qu'en Maine-et-Loire ont été trouvées 6 couples à l'hectare.

De tels chiffres, s'ils doivent être affinés, constituent un progrès important dans la connaissance du Râle. Il apparaît en effet que la Basse Vallée de la Loire est, à l'échelon européen, un site d'intérêt majeur ; ils démontrent ensuite que le Râle étant sujet à des fluctuations annuelles, 1984 est incontestablement à considérer comme une bonne année.

Signalons enfin, que la première observation date du 15 avril (Ile Monty/Thouaré (44)).

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) 13 données

Quelques données sur la fin d'hivernage au Vallon du Stangalard/Brest (29N) :

70-80 les 24 et 27 mars ; 60 le 3 avril.

Nidification :

Pontes : 1 de 7 oeufs le 23 avril à Couëron (44) et 1 le 12 mai à Boisséon/Lanmeur (29N).

Familles : notées le 16 juin à Mesqueau/Plougastou (29N) ; le 17 juin à Laoual/Plogoff (29S) et le 21 juin à Kérigou/St Pol de Léon (29N).

Signalons encore la présence d'un immature sur l'Etang du Loch/Glénans (29S) le 4 juillet et la reproduction de l'espèce sur l'île de Trébéron/Rade de Brest (29N).

POULE MACROULE (*Fulica atra*) 36 données

L'Etang du Cranich/Brech (56), très bien suivi, nous donne des indications sur les mouvements de l'espèce :

220 le 16 mars, 165 le 23 mars, 80-100 le 4 avril, 20-30 les 14 et 21 avril, 55 le 1er juin, 40 le 7 juin, 160 le 30 juin, 235 le 7 juillet et 255 le 15 juillet.

Ailleurs : 60 au Drennec/Sizun (29N) le 18 mars, 20-25 au Beffoa/Loquivy-Plougras (22) le 18 mars, 20 à l'Etang de Kerhuon (29N) le 31 mars, 12 en rivière de Daoulas (29N) le 3 avril et 23 dans l'étier de Noyal (56) le 14 avril.

De manière très classique, le départ des hivernants s'achève à la mi-avril, alors que dès fin-juin l'Etang du Cranich (56) voit sa population augmenter.

Identification :

Ile-et-Vilaine

4-5 à La Piblais/St Jacques de la Lande le 20 juin ; 1 famille et 2 couples au Boulet/Feins le 21 juin et 4 au Bois de Chinsève/St Aubin d'Aubigné le 21 juin.

Côtes-du-Nord

2 au Baffou/Loguivy-Plougras le 13 mai ; 1 adulte plus 1 juvénile à Trébeurden le 14 mai ; 3 couples nicheurs à Villejean/Le Boëdo le 9 juin.

Finistère-Nord

1 à Huelgoat le 18 mars ; 1 couvreur au Stangalard/Brest le 24 mars ; 2 au Cornic/Guissény le 9 mai ; 1 à Traon ar Stang/Plougasmou le 22 juin.

Finistère-Sud

4 à l'Etang de Laoual/Plogoff le 17 juin.

Morbihan

A Kerguelen/Larmor-Plage : 1 adulte avec 5 pulli le 2 mai ; au Cranic : 1 couple le 7 juin, 3-4 familles sont repérées le 7 juillet, à St Jean/Locoal Mendon : 1 adulte avec 6 poussins le 7 juillet.

Loire-Atlantique

L'espèce niche à l'Etang du Pin, à Montrelais et dans le Marais de Grée/Ancenis (10 couples).

HUITRIER PIE (*Naematopus ostralegus*) 55 données

Les recensements d'avril font apparaître des populations encore importantes sur les sites d'hivernage :

En Baie de Morlaix (29th) : 6-700 le 7 avril et 427 le 18 avril ; 100 en Baie de Lannion (22) le 8 avril ; dans l'Anse de Bon Abri/Hillion (22) : 1000 le 14 avril et 300 à Yffiniac (22) le même jour ; 420 dans les Traicts du Croisic (44) et 360 en Baie de Vilaine (56) vers le 15 avril ; 190 en Penzé (29th) le 23 avril.

Par la suite, quelques belles bandes sont encore observées : 127 en Baie de Lannion (22) le 15 mai ; 200 dans le Petit Traict du Croisic (44) le 6 juin ; 74 à Kérigou/St Pol de Léon (29th) le 21 juin.

Aucune donnée de dispersion postnuptiale.

Ile-et-Vilaine

Le Châtelier/Cancalle : 1 couple ; Ile des Landes/Cancalle : 1 couple ; Îlot de Bénéti/Rotheneuf : 2 couples.

Côtes-du-Nord

La Colosbière/St Jacut de la Mer : 1 couple ; Losquet/Pleumeur Bodou (partiel) : 2 couples.

Finistère-Nord

Archipel de Molène : Banneg, 15 couples ; Baie de Morlaix : 23 couples ; Enez ar Prad/Batz : 1 couple ; Trévoch/St Pabu : 13 couples ; Ile Dubeg/Laspaul-Ploudalmezeau : 1 couple ; Pourn Cros/Ploudalmezeau : 1 couple ; Ile Trébéron/Roscanvel : 2 couples ; Enez Kreiz, 1 couple ; Roch Hir, 4 couples ; An Stann Vraz, 1 couple ; Balaneg, 15 couples ; Trielen, 20 couples ; Banneg : 15 couples.

Finistère-Sud

Ile du Loch/Glénan : 1 couple ; dépendances de Moëlez/Glénan : 3 couples.

Morbihan

Rechellan : 1 couple ; Belle-Ile (partiel) : 3 couples ; Archipel d'Houat (partiel) : 6 couples (1 à Glazig, 3 à Valhuc, 1 à Gurig, 1 à Er Yeh).

Premiers nids à Trévoch le 12 mai, premiers poussins à Gurig le 6 juin.

Même si aucune donnée sérieuse ne nous est parvenue du secteur des Sept Iles, il paraît probable que la population bretonne soit en expansion.

SCAPSE BLANCHE (Nimantopus himantopus) 13 données

Les arrivées s'effectuent plus tôt cette année : 1 au tout début d'avril à Falguérec/Séné (56), 2 le 8 avril dans les Marais Salants de Guérande (44), 11 le 14 avril à Pont d'Arn/Assérac (44). Le maximum du passage est noté fin-avril à Falguérec : 27 individus.

Les installations s'effectuent le 25 avril au Petit Falguérec et le 15 mai au Grand Falguérec. Dans ce secteur les premiers poussins sont observés le 10 juin.

Les effectifs nicheurs sont de 8-9 couples pour Falguérec et de 15 couples pour les Marais Salants de Guérande ; soit 23-24 couples pour 2 sites, alors qu'en 1983 la Bretagne comptait 116 couples répartis sur 7 sites.

Il est vrai que la sécheresse qui a frappé les lieux de reproduction méridionaux de l'espèce en 1983 avait repoussé vers le nord l'aire de nidification.

AVOCETTE ELEGANTE (Recurvirostra avosetta) 20 données

2 à l'Etang de Loudéac (22) le 17 mars ; 2 dans l'Etier de Noyal (56) et 18 dans les Marais de Séné (56) le 14 avril ; 140 en Vilaine (56) et 85 dans les Traicts du Croisic (44) à la mi-avril ; 4 à Nérizelec/Plovan (295) le 23 avril ; 6 au Cornic/Guissény (298) le 9 mai ; 1 à St Sullac (35) le 12 mai ; 1 à Trescaou-Trégunc (295) le 24 mai et 1 à la ZIP de Brest (298) le 29 mai.

Nidification

Les arrivées sur les sites se font les 3 et 15 mai à Falguérec/Séné (56). Le premier pullus y est noté le 29 mai.

Petit Falguérec	5 couples
Grand Falguérec	3 "
reste Marais de Séné	2 "
Morbihan	10 couples
Grand Bal/Guérande ...	36 couples
reste Marais Guérandais	2 "
Estuaire Loire	8 "
	46 couples
TOTAL BRETAGNE	56 couples

Une baisse des effectifs est constatée en Loire-Atlantique (57 couples en 1983).

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*) 8 données

Morbihan

L'espèce ne se reproduit plus à Erdeven. Par contre il reste 4 couples sur Plouhinec. La première éclosion a lieu le 5 mai. Deux couples au moins ont fait une deuxième ponte : 1 nid le 26 juin et 2ème ponte le 30 juin.

Loire-Atlantique

L'un des événements de ce printemps a été la découverte d'une deuxième zone de nidification en Bretagne pour l'espèce.

La Chapelle St Sauveur : 1 chanteur le 27 avril, puis en mai et juin ;
Rochementru/Le Pin : 1 couple cantonné ; La Gueslerie/St Herblon :
1 chanteur le 26 juin.

Une autre donnée de la mi-mai eu remblai de Lavau semble concerner un migrateur pré-nuptial ou un individu erratique.

Rappelons que jusqu'en 1969 les dunes de La Turballe et du Croisic avaient été occupées. Il faut remarquer que les nouvelles localités sont en fait les plus avancées de l'aire principale de nidification en France. Le milieu occupé est lui aussi nouveau : il s'agit de zones cultivées et non de dunes.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) 28 données

Seules deux données ne semblent pas concerner des nicheurs : 1 sur la Loire à Nantes (44) le 1er avril et 1 couple qui disparaîtra ensuite, à l'Etang de Beaulieu/La Motte (22) le 15 mai.

Arrivée des nicheurs le 31 mars à Brest (298) et à la mi-avril en Loire-Atlantique (44).

Nidification

Ille-et-Vilaine

Quatre Salines/Roz-sur-Coesson : 1 couple ; Chaillou/Montauban : 2 couples ; Les Bentinais/Bennes : 1 couple ; La Vigne/Chavaigne : 1-2 couples ; Pont Péan/St Erblon : 1 couple.
TOTAL : 6-7 couples.

Finistère-Nord

ZIP/Brest : 4 couples ; Pont Corff/Guilers : 1 couple.
TOTAL : 5 couples
1 oiseau est observé à Lopézhel le 16 juin.

Finistère-Sud

L'Aber/Crozon : 1 couple ; Baie d'Audierne : 8-10 couples.
TOTAL : 9-11 couples.

Morbihan

Loccal/Mendon : 2 couples ; Pénestin : 1 couple.
TOTAL : 3 couples

Loire-Atlantique

La Bosse de la Giguélais/St Etienne de Montluc : 1 couple ; Grèves de La Chapelle Basse Mer : 3-4 couples ; Remblai Prairie de Varades : 1-2 couples ; Grèves de Varades et Anetz : 10-15 couples ; estuaire Loire : 2 couples.
TOTAL : 17-24 couples
La nidification n'a pas été notée à Mesquer et à Guérande.
TOTAL BRETAGNE : 40-50 couples
Les recensements sont très partiels mais confirment la bonne santé actuelle du Petit Gravelot.

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) 50 données

Faute de données il y a peu à dire sur le passage pré-nuptial : en mars, 6 à l'Etang de Loudéac (22) le 18 ; 2 à Sougéal (35) et 7 à l'Etang de Pin (44) le 20 ; en avril, 15 à Litiry/Archipel de Molène (298) le 3 ; 31 à Bon Abri/Hillion (22) et 45 dans l'anse d'Yffiniac (22) le 14 ; 41 sur le Sillon du Noir du Trieux (22) , 35 sur le Sillon du Talbert (22) et 1 aux Bentinais/Bennes (35) le 15 ; 50 dans les Prairies du Croinic (44) , 65 à Plouharnel (56) et 180 en Baie de Vilaine (56) à la mi-avril ; 150 sur le remblai de Lavau (44) le 21 ; 24 en Penzé (298) le 23.
En mai, un passage est noté du 12 au 20 : 12 à St Suliac (35) le 12 ; 30 à Locquénolé (298) le 15 ; 20 à l'île de Batz (298) et 50-60 à la ZIP/Brest (298) le 16 ; 82 entre Varades et Montrelais (44) le 19.

Pas de données ensuite.

Nidification

Côtes-du-Nord

Sillon du Talbert : 15 couples ; Losquet/Pleumeur Bodou : 1 couple.
TOTAL : 16 couples.

Finistère-Nord

Porlaix-Penzé : 10 couples ; Batz : 2 couples ; Quessant : 13 couples ;
Trielen/Molène : 4 couples ; Balaneg/Molène : 6-10 couples ; Banneg/
Molène : 2 couples.
TOTAL : 37-41 couples.

Finistère-Sud

Baie d'Audierne : 4-6 couples.

Morbihan

Boédic : 1-2 couples.
TOTAL BRETAGNE : 58-64 couples.

Il s'agit bien entendu d'un total très en deçà de la réalité, l'espèce nichant maintenant sur la côte entre l'Aber-Ildut (29N) et Palapol (22). Signalons que la progression a encore été très sensible cette année avec la colonisation des paluds de Locquénoilé (29N) pourtant surfréquentées par les pêcheurs et les plaisanciers.

Envois : se sont produits dès avril pour un couple d'Quessant (29N) : il convient de rechercher l'espèce assez tôt parfois assez en retrait du littoral (nidification dans des champs de légumes en 1982 et 1983 à St Pol de Léon -29N-).

Pontes notées : le 28 avril à Quessant (1 + 4 oeufs), le 12 mai à Banneg/Polène (29N) et Locquénoilé (3 + 4 oeufs), le 24 mai à Térénez/Plougasnou (29N) (3 oeufs), le 2 juin à Locquénoilé (3 oeufs) et le 18 juin à Banneg.

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) 33 données

Aucune donnée sur l'installation des nicheurs.

Quelques indices de passage : 85 en Baie de Vilaine (56) à la mi-avril et 9 à Bon Abri/Million (22) le 14 avril.

Nidification :

Baie du Mont-St-Michel (35) : 12 couples ; Sillon du Talbert (22) : 25-30 couples ; Trévoch/St Pabu (29N) : 2 couples minimum ; ZIP/Brest (29N) : 1 couple probable ; Goulven (29N) : 20 individus le 11 juin ; Baie d'Audierne (29S) : 60-80 couples ; Ile du Loch/Glénan (29S) : 4 individus le 7 juillet ; Steir/Pennmarch (29S) : 3 couples minimum ; Plouhinec (56) : 4 couples sur 1 ha le 6 juin ; Keravel/Erdeven (56) : 4 couples ; La Poche Sèche/Erdeven : 4 couples ; Suscinio/Sarzeau (56) : 1 couple minimum ; Beublai/Lavau (44) : 5 couples ; Marais salants/Guérande (44) : 5 couples.

TOTAL RECFENSE : 126-151 couples

De nombreux sites manquent (Léon, Baie du Mont-St-Michel ...), pour le Morbihan une estimation donne 75 à 85 couples.
Ceci donne à penser que le Gravelot à collier interrompu est en bonne santé dans notre région.

Alarques : les premières sont notées le 3 mai à Brest (298).

Pontes : 2 (1 + 1 oeuf) le 27 mai à Trenvel/Tréogat (298) et 1 (3 oeufs) le 11 juin au Steir/Pennmarch (298).

Poussins : 3 le 27 mai, une dizaine le 11 juin à Trenvel et 2 à Suscinio le 14 juin.

Juveniles : Une bande d'une trentaine à Trenvel le 11 juin.

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) 14 données

Grand Pré de Varades (44) : 160 le 18 mars ; Marais de Grée/Ancenis (44) : 50 le 18 mars ; Ploufragan (22) : 25 le 21 mars ; St Etienne de Montluc (44) : 20 le 1er avril ; Litré et Quémenez (298) : 100 le 3 avril ; Baie de La Fresnaye (22) : 1 en plumage nuptial le 4 mai ; Ouessant (298) : 2 le 16 mai ; rivière de Pont-l'Abbé (298) : 1 en plumage nuptial le 20 mai ; Sillon du Talbert (22) : 1 en plumage nuptial le 3 juin ; Marais de Séné (56) : 1 du 10 au 16 juin.

En début de période (2ème quinzaine de mars), les observations proviennent principalement des quartiers d'hivernage de Loire-Atlantique. En dehors des dates tardives en provenance des Marais de Séné, la donnée la plus remarquable concerne 100 individus notés le 3 avril dans l'Archipel de Molène.

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*) 37 données

Ile-et-Vilaine

Baie du Mont St-Michel : 5 en plumage nuptial le 28 avril.

Côtes-du-Nord

Anse de Beauport/Paimpol : 150 le 17 mars ; anse d'Yffiniac : 250 le 8 avril ; estuaire de Jaudy : 35 le 15 avril ; Trédrez : 4 le 6 avril.

Finistère

Penzance : 50 le 23 avril ; Ile de Batz : 1 le 16 mai, 15 le 6 juin et 5 le 7 juin ; Baie de Soulven : 60-70 le 11 juin ; Archipel de Molène : 20 (minimum) le 3 avril, 1 les 21 et 27 avril, 1 les 4, 12 et 13 mai, 2 les 18 et 20 mai ; Ouessant : 2 le 27 avril, 1 le 1er mai, 3 le 15 mai, 2 le 23 mai, 1 les 19 et 25 juin ; Baie d'Audierne : 2 en plumage nuptial le 19 mai.

Morbihan

Baie de Ploùharnel : 16 à la mi-avril ; estuaire de la Vilaine : 126 à la mi-avril ; Golfe du Morbihan : 210 à la mi-avril ; Erdeven : 8 le 29 avril ; Ploùhinec : 2 le 6 mai ; rivière d'Étel : 10 le 14 mai ; Marais de Séné : 2 le 16 mai.

Loire-Atlantique

Traicts du Croisic : 130 à la mi-avril ; Loire/Varades : 16 le 12 mai ; Prairies de Mauves/Nantes : 20 le 20 mai ; Lac de Grandlieu : 20 le 20 mai.

Encore d'importants stationnements jusqu'à la mi-avril sur les sites traditionnels d'hivernage et un passage sensible en mai décelable sur 3 sites continentaux de Loire-Atlantique.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) 55 données

Quelques concentrations à la mi-mars témoignent de la fin d'hivernage : 200 à Caulnes (22) le 16 mars ; 150 à Sizun (29N) le 17 mars ; 60 à Plourach (22) et Commana (29N) ; 50 à Sizun ; 100 à Guerlesquin (29N) ; 250-300 à Plounérin (22), le 18 mars ; 300 à Loudéac (22) le 19 mars.

1 indice de passage : 6 vers le sud, le long de la côte à Plouha (22) le 24 mars.

Nidification :

Comme à l'habitude, elle débute dans la deuxième quinzaine de mars : 8-10 nids dès le 20 à Sougeal (35).
3 parades à Kerbol/Mostang (56) le 24.

Les premières pontes ne sont signalées que du 11 avril dans les Marais de Dol (35) alors que de nombreux couples construisent encore.

Ille-et-Vilaine

Marais de Sougeal : 8-10 couples ; Marais de Dol : 6-15 couples ; Marais de Roz-Landrieux : 10-15 couples ; Marais de Lillemer : 8-10 couples ; Marais de St-Guinoux : 6 couples ; Marais de Châteauneuf : 1-2 couples.
TOTAL : 39-48 couples.

Côtes-du-Nord

Prat ar Mel/Lescoout-Couarec : 5 couples ; St Nicodème : 2-3 couples ; Etang du Moulin Neuf/Plounérin : 3-5 couples.
TOTAL : 10-13 couples.

Finistère-Nord

Le Quëff/Botsorhel : 1 couple ; Landgazel/Trémacouzan : 5-10 couples ; Les 7 Menhirs/Ploegonven : 1 couple.
TOTAL : 7-12 couples.

Finistère-Sud

Baie d'Audierne : 50 couples.

Morbihan

Kerbol/Montang : 2-3 couples ; Loccal-Mendon : 2 couples ; Kervian/
Plouhinec : 5 couples ; Le Magouer/Plouhinec : 10 couples ; Keravel/
Erdeven : 4-5 couples ; Kerminihy/Erdeven : 5-10 couples ; Baie de
Plouharnel : 1 couple ; St Pierre/Locmariaquer : 1 couple ; Kerdual/
La Trinité : 1 couple ; Belle-Ile : 16-19 couples ; Falguérec/Séné :
6 couples ; Marais de Séné : 3 couples minimum.

TOTAL : 56-66 couples.

Loire-Atlantique

Mesquer : 1 couple ; Marais/Guérande : 4 couples ; Brière : 201 cou-
ples (estimation totale : 250-300 couples) ; Marais de la Boissvre/
St Brévin : 21 couples ; Basse Loire et Grandlieu : 214 couples ; Marais/
Petit Mars : 6 couples.

TOTAL : 455 couples.

TOTAL BRETAGNE / 615-644 couples.

Il manque de nombreuses données et en particulier celle des Marais de la
Baie de Bourgneuf. Cependant, il apparaît que certains sites ont connu
une forte récession ; c'est le cas notamment de la Brière :
1100-1300 couples en 1975 - 250-300 couples en 1984

R. MAHEO (com. orale) impute cette situation aux modifications apportées
au niveau d'eau dans ce secteur. Il est probable que des sites de res-
placement soient utilisés, rendant moins aisé le recensement de l'es-
pèce, qui semble ainsi avoir une distribution plus "éclatée". De fait
quelques nouvelles localités ont été découvertes.

BECASSEAU MAURECHE (*Calidris canutus*) 17 données

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 5 le 14 avril.

Finistère

Penzé : 12 le 23 avril ; Locquénolé : 30 le 7 mai, 3 les 19 et 20 mai ;
Le Curnic/Guissény : 1 en plumage nuptial le 9 mai ; rivière de Pont-l'Abbé :
12 (1 en plumage nuptial) le 20 mai ; Porz Doun/Guessant : 1 en plumage
nuptial le 9 juin ; Pont-Croix : 1 le 10 juin ; ZIP/Brest : 1 le
21 juin.

Morbihan

Marais de Duer/Sarzeau : 3 le 23 avril ; Falguérec/Séné : 1 du 29 avril
au 5 mai.

Loire-Atlantique

Marais de Guérande : 24 le 5 mai ; La Chapelle-Basse-Mer : 12 le 22 mai.

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) 29 données

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 1 le 14 avril ; Jaudy : 1 le 15 avril ; Baie de St Eflan : 15 le 15 mai.

Finistère

Nérizélec/Plovan : 100 le 8 avril ; Trenvel/Tréogat : 50 le 22 avril et 6 le 27 mai ; Korz/Ouessant : 4 le 28 avril, 6 le 29 avril, 1 le 10 mai, 5 le 15 mai, 4 le 16 mai, 6 le 23 mai et 3 le 25 mai ; Banneg/Molène : 1 du 11 au 13 mai ; Plougasnou : 15 le 14 mai et 4 (3 en plumage nuptial) le 20 mai ; Ile de Batz : 30 le 16 mai ; Aber/Crozon : 4 le 27 mai ; Cléder : 12 le 28 mai ; Baie de Goulven : 60 le 11 juin ; ZIP/Brest : 1 le 6 juillet.

Morbihan

Erdeven (2 sites) : 70 le 29 avril ; Plouhinec : 1 le 6 mai.

Loire-Atlantique

St Brévin : 28 le 1er mai, 37 le 7 mai.

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) 8 données

Marais de Sougeal (35) : 1 les 20 et 21 mars ; Marais de Séné (56) : 2 le 29 mars, 1 les 6, 20 et 26 mai ; Marais de Guérande (44) : 12 le 29 avril.
Etang de Nérizélec/Plovan (298) : 4 le 15 juin.

BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*) 2 données

Varenne/Loire (44) : 1 en plumage nuptial le 22 mai ; ZIP/Brest (290) : 1 le 9 juillet.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) 1 donnée

2 le 13 mai à Varades (44).

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) 28 données

Côtes-du-Nord

Ilot du Verdelet/Pléneuf-Val-André : 3 le 25 mai.

Finistère

Port/Douarnenez : 5 le 28 mars, 3 le 19 avril ; Litsy/Molène : 4 le 3 avril ; Toulouquet/Canaret : 2 le 5 avril ; Banneg/Molène : 50 du 21 au 23 avril, 20 du 4 au 6 mai, 20 (minimum) le 16 mai ; Ile d'Yeu/Porspoder : 5 le 25 avril ; Ar Lann/Ouessant : 3 le 29 avril et 4 le 14 mai ; Baie de Goulven : 12 le 1er mai ; Créac'h/Ouessant : 6 le 2 mai ; Pern/Ouessant : 3 le 8 mai ; Vézoul/Baie de Morlaix : 1 le 9 mai ; Balaneg/Molène : 25 les 12 et 13 mai ; Pors Doun/Ouessant : 8 le 13 mai et 12 le 23 mai ; Beg Lann/Baie de Morlaix : 2 le 21 mai.

Morbihan

Beg er Goallennec/Quiberon : 75 le 18 mars, 30 le 13 avril ; Pointe des Poulains/Pelle-Ile : 3 le 3 avril.

Loire-Atlantique

Port/La Turballe : 2 le 8 avril.

Les deux plus importantes populations sont notées dans l'Archipel de Molène (50 à Banneg du 21 au 23 avril) ainsi qu'en Presqu'île de Quiberon (75 à Beg er Goallennec le 18 mars). Le dernier contact (3 le 25 mai au Val-André) coïncide avec les dates habituelles de disparition de l'espèce.

BECASSIN VARIABLE (*Calidris alpina*) 76 données

Ile-et-Vilaine

Marnis de Sougeal : 1 (minimum) le 21 mars.

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 360 le 14 avril ; Estuaire du Jaudy : 85 le 15 avril, 25 le 3 juin ; Baie de St Eflam : 23 le 15 mai.

Finistère

Baie de Morlaix : 100 le 24 mars ; Rivière de Douglas : 150-200 le 25 mars ; ZIP/Brest : 15-20 le 21 avril, 22 le 28 avril, 16 le 3 mai, 50-60 le 16 mai, 25 le 21 mai et 120 le 1er juin ; Penzé : 600 le 23 avril ; Ile d'Yeu/Landunvez : 10 (minimum) le 25 avril ; Ouessant : migration nocturne les 27 et 28 avril ainsi que le 21 mai ; Baie du Kernic : 2-300 le 1er mai ; Locquéholé : 125 le 7 mai, 400 le 15 mai, 90 le 19 mai et 27 le 2 juin ; Le Curnic/Quissény : 400 le 9 mai ; Banneg/Molène : 4 du 11 au 13 mai ; Rivière du Faou : 100 le 13 mai, 150-200 le 27 mai ; Ile de Batz : 30 le 16 mai, 2 en plumage nuptial le 7 juin ; Pors Doun/Ouessant : 18 le 23 mai (maximum de l'année), 2 en plumage nuptial les 6 et 18 juin, 1 en plumage nuptial le 26 juin et 1 le 5 juillet ; Mézitélec/Plovan : 26 le 27 mai ; Trielen/Molène : 12 le 9 juin ; Baie de Goulven : 40-50 (1 chanteur) le 11 juin.

Morbihan

Falquérec/Séné : 500 le 22 mars, 250 les 1er et 7 avril, 100 du 8 au 14 avril, 200 du 13 au 21 avril, 180 du 22 au 28 avril, 170 le 29 avril, 170 du 1er au 5 mai, 36 du 6 au 12 mai, 200 le 13 mai, 200

du 16 au 19 mai, 60 le 21 mai, 15 le 30 mai ; Les Saisies/Larmor-Plage : 50 (minimum) le 22 mars, 100-120 le 25 mars, 30-40 le 1er avril, 6 le 25 avril ; St Philibert : 200 le 14 avril ; Golfe du Morbihan : 2110 à la mi-avril ; Etier de Noyal : 7-800 le 14 avril ; Estuaire de la Vilaine : 1460 à la mi-avril.

Loire-Atlantique

Traits de Mesquer : 380 à la mi-avril ; Traits du Croisic : 1200 à la mi-avril ; Lavan : 1500 le 21 avril, 20 le 7 juin ; Varades et Montrelais : 11 le 19 mai ; Oudon : 12 le 20 mai.

BECASSEAU FALCINELLE (*Limicola falcinellus*) 1 donnée

1 en plumage hivernal du 26 au 29 avril au Polder de St Marc/Brest.

COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) 35 données

Ille-et-Vilaine

Marais de Sougeal : 14 le 20 mars, 9 le 21 mars ; Parais de Dol : 6 le 11 avril ; Chaillou/Montauban : 2 le 24 avril ; St Suliac : 6 le 30 avril, 5 le 12 mai.

Finistère

Nérizélec/Plovan : 2 le 16 mars et 15 le 22 avril ; Gouzoul/Ouessant : 1 les 12, 23, 24 et 26 avril ; ZIP/Brest : 1 le 29 avril ; Baie de Goulven : 7 le 1er mai.

Morbihan

Palguérec/Séné : 2 du 18 au 24 mars, 3 le 13 avril, 12 le 14 avril, 10 le 19 avril, 34 le 23 avril, 3 les 29 avril et 5 mai, 2 du 13 au 19 mai, 1 ♂ le 30 mai, 2 le 27 juin, 1 ♂ le 10 juillet ; La Poche Sèche/Erdeven : 2 le 29 avril ; Etang de St Jean/Mendon : 3 le 15 juillet.

Loire-Atlantique

Marais de Grée/Ancenis : 145 le 18 mars et 186 le 21 avril ; Grande Brière : 64 le 30 avril (2 ♂ en plumage nuptial) ; St Lumine de Coutais : 150 le 1er mai.

Un important mouvement se dessine durant la 3ème décade d'avril ; c'est durant cette période que sont en effet enregistrés des pics de stationnement dans les sites bien suivis du sud-est de la Bretagne. La présence presque permanente de 1 à 2 individus dans les Marais de Séné pourrait se concrétiser, dans les années à venir, par la reproduction dans cette localité du Combattant.

BECASSINE DES MARAIS (*Callinago gallinago*) 19 données

Le passage se poursuit jusqu'au 12 mai :

20 à l'Etang Villegaudu/Lamballe (22) le 16 mars ; 10 dans les Marais de Séné (56) le 2 avril ; 2 à Banneg/Molène (29N) les 3 et 21 avril ; 3 au même endroit le 27 avril ; 35 en Grande Brière (44) les 29 et 30 avril ; 1 à Porquoen/Quessant (29N) le 1er mai ; 1 à Banneg le 11 mai et 1 à Falguérec/Séné le 12 mai.

Nidification :

Les premiers chevrottements sont entendus dans les Marais de Sougeal (35) dès le 21 mars.

Quelques localités nous sont parvenues : Marais de Sougeal (35), Marais de Dol (35), Stang ar Mel/Lescouet Gouarec (22), Landes de Locarn (22), Plougonven (29N), Batz (29N), Ile Berthou/Trémouézan (29N), le Magouër/Plouhinec (56), Lavau (44).

La Bécassine est une espèce négligée dont nous avons des difficultés à saisir les effectifs. A rechercher.

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) 3 données

1 en Forêt de Villecartier (35) les 20 et 21 mars ; 1 à la mi-avril dans le Bois Trochu (Belle-Ile (56).

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) 21 données

Le passage s'effectue jusqu'au 26 mai avec une pointe du 16 au 22 mars : 1 à Nérizélec/Plovan (29S) le 16 mars ; 2 à Goulven (29N) le 17 mars ; 35 dans les Marais de Sougeal (35) le 20 mars et 76 le lendemain ; 11 dans les Marais de Guérande (44) le 21 mars ; 180 dans les Marais de Grée/Ancenis (44) le 22 mars. Ensuite, 20 à Falguérec/Séné (56) du 1er au 7 avril ; 11 dans les Marais de Séné le 14 avril ; 2 en Penzé (29N) le 17 avril ; 19 à Falguérec du 15 au 21 avril, 21 sur ce lieu du 6 au 12 mai et enfin, toujours à Falguérec, 11 du 20 au 26 mai.

A Falguérec encore : 28 du 17 au 23 juin et 20 du 1er au 7 juillet. La première donnée correspond peut être à des estivants non nicheurs, la seconde à des migrateurs postnuptiaux.

Nidification :

9 le 19 avril à Trenvel/Tréogat (29S) ; 6-7 à St Vio/Tréguennec (29S) le 25 avril ; 10 à St Vio le 27 mai ; 3 couples découverts en Brière (44) et 1 en Rasse Loire (44).

	Morbihan (56)	1 couple
	Baie d'Audierne (29S)	7-9 couples
Estimations	Brière (44)	5-9 couples
	Estuaire de La Loire (44)	1 couple.

TOTAL BRETAGNE14-20 couples

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) 33 données

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 300 le 8 avril et 115 le 15 avril ; Trieux : 3 le 15 avril ; Ile Grande : 8 le 14 mai ; St Efflam : 4 le 15 mai.

Finistère

Plougassou : 7 le 14 mai et 1 le 20 mai ; Locquéholé : 20 le 7 mai et 1 le 19 mai ; Ile de Batz : 2 le 16 mai ; Baie de Goulven : 30-40 le 11 juin ; Embouchure du Frot : 50 le 30 avril ; Quénenez/Molène : 1 le 3 avril ; Trielen/Molène : 6 le 9 juin ; Balaneg/Molène : 8 les 12 et 13 mai ; Banneg/Molène : 1 les 21 et 22 avril, 5 le 27 avril ; Quessant : 6 le 28 avril, 21 le 27 avril, 7 le 30 avril, 4 le 1er mai ; Goulet/Rade : 17 le 26 avril ; Rivière du Faou : 30-40 le 29 avril ; Ile des Moutons/Concarneau : 1 le 12 mai.

Morbihan

Plouhinec : 3 le 6 mai ; Erdeven : 23 le 29 avril ; Golfe du Morbihan : 5 à la mi-avril ; Estuaire de la Vilaine : 17 à la mi-avril.

Loire-Atlantique

Traicts du Croisic : 70 à la mi-avril et 121 le 6 mai ; Lavau : 30 le 21 avril.

CORLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) 64 données

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 5 le 14 avril ; Anse de Beauport : 24 le 15 avril ; Jaudy : 3 le 15 avril ; Ile Grande : 2 le 14 mai.

Finistère

Langazel/Trénaouézan : 1 le 14 mai ; Le Dourduff : 8 le 27 avril, 1 le 14 mai, 1 le 1er juin ; Térénez/Plougassou : 14 le 27 avril ; Locquéholé : 4 le 18 avril, 3 le 7 mai ; Penzé : 8 le 7 avril, 13 le 17 avril, 2 le 15 juin ; Batz : 4 le 16 mai ; Baie de Goulven : 40 le 1er mai ; Le Curnic/Guissény : 4 le 9 mai ; Landuvez : 1 le 22 mai ; Ile d'Yock/Porspoder : 3 le 25 avril, 3 le 31 juin ; Molène : 5 le 30 avril ; Banneg/Molène : 3 du 11 au 23 avril, 3 le 21 avril, 2 le 31 mai, 1 le 9 juin, 1 le 2 juillet et 2 le 10 juillet ; Balaneg/Molène : 10 (minimum) les 12 et 13 mai ; Trielen/Molène : 40 le 9 juin et 10 le 11 ; Quessant : 16 le 28 avril, 2 le 30 avril, 8 le 1er mai, 1 les 19 et 25 juin, 1 le 5 juillet et 2 le 9 juillet ; St Marc/Brest : 78 le 28 avril ; Elorn : 30 le 30 avril ; Roscanvel : 1 le 10 juin ; Rivière du Faou : 25-30 le 29 avril, 15-20 le 13 mai, 3-4 le 8 juillet ; Pont-Croix : 1 le 18 avril ; Ile de Sein : 3 le 6 mai ; Etang de Poulguidou : 10 le 17 mai et 1 le 9 juillet.

Morbihan

Rivière d'Etel : 25-30 le 6 mai ; Erdeven (3 sites) : 37 le 29 avril ; La Trinité/Mer : 3 le 29 avril ; Golfe du Morbihan : 120 à la mi-avril ; Etier de Noyal : 40-50 le 14 avril ; Marais de Séné : 2 le 19 avril ; Estuaire de la Vilaine : 53 à la mi-avril.

Loire-Atlantique

Traict de Mesquer : 110 le 22 avril ; Traict du Croisic : 55 à la mi-avril ; Brière : 87 le 29 avril, 62 le 30 avril.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) 75 données

Un gros passage est noté fin mars - début avril : 300 à la Grève des Courses/Baie de St Brieuc (22) le 30 mars ; 670 dans l'anse d'Yffiniac (22) le 8 avril ; 115 dans l'Anse de Kervigen/Plonévez-Portzay (295) le 10 avril.

A la mi-avril les effectifs ont fondu : le 14, 161 à Yffiniac et 13 dans les Traicts de Mesquer (44) ; le 15, 15 à Plouharnel (56) ; 50 dans le Golfe du Morbihan (56) ; 20 en Baie de Vilaine (56) et 3 dans les Traicts du Croisic (44).

Les données sont ensuite rares : 1 à Panneg/Molène (298) du 21 au 23 avril ; 2 à Balaneg les 12 et 13 mai ; 4 à l'Île de Batz (298) le 16 mai ; 10 au Dourduff/Plouézach (298) le 24 mai ; 5 en Penzé (298) le 1er juin ; 1 à Porz Doun/Ouessant (298) les 6 et 9 juin ; 9 à Lavau (44) le 7 juin.

Les retours s'effectuent probablement à partir du 20 juin : 2 au Créach/Ouessant le 20 juin ; 18 dans la basse vallée de l'Aulne (298) le 24 juin ; Porz Doun/Ouessant : 1 le 25 juin et 2 le 5 juillet ; 38 au Loch/Glénan (298) le 5 juillet ; 25 en Rivière du Faou (298) et 25 en Rivière de Daoulas (298) le 8 juillet ; 93 en Rivière du Faou le 14 juillet.

Nidification :

Un travail important a été effectué cette année par P. BORET notamment.

Côtes-du-Nord

Landes de Lanfains : 1 couple le 7 avril ; Landes du Méné : 3 couples parurent à Pléay le 8 avril ; Landes de Locarn : 1 chanteur à St Nicodème le 13 mai ; Landes de Ilescouet-Gouarec : 2 couples le 21 avril ; Landes de Plourach : 2 dont 1 chanteur à Kerhin le 23 avril.

Finistère-Nord

Monts d'Arrée : Menez Riévara/Rotshoret : 1 chanteur le 6 avril ; Yeun/Lannéanou : 1 chanteur, le 6 avril ; Vergam/Scrignac : 2 chanteurs le 15 avril ; Lannouédic/Scrignac : 1 couple ; Kernazin/Scrignac : 2 couples ; Kerseac'h/Scrignac : 1 couple ; Nochers du Cragou/Le Cloître St Thégonnec : 4 couples, alarmes les 3 et 24 juin ; Nergoat/Le Cloître St Thégonnec : 1 couple ; Pennergues/Le Cloître St Thégonnec : 1 couple ; Roche St Barnabé/Le Cloître St Thégonnec : 3 couples, alarmes le 8 mai, 1 albinos le 10 juin ; Kernon/Herrien : 2 couples ; Trédudon de Moine/Herrien : 1 couple ; Trédudon/La Feuillée : 1 couple ; Kerbruc/La Feuillée : 2 couples ; Pen ar Prajou/Plounéour-Ménez : 2 couples ; Quillou-Ménez/Plounéour-Ménez : 1 couple ; Keradalan/Plounéour-Ménez : 1 couple ; Les Ardoisières/Commana : 1 couple ; Rosdu/Rotmear : 1 couple ; Ty-ar-Yun/Rotmear : 1 alarme le 23 juin ; Boudouerc'h/Sizun : 1 couple ; Linquez/St Rivoal : 1 couple ; Pennagoaradic/St Rivoal : 1 couple ; Le Cosquer/Braspart : 2 couples ; Tourbières de St Michel/Braspart : 1 couple ; Léon : 1 couple à Landgazel/Trénaouézan.

Finistère-Sud

Scaër : 1 couple alarme à Prat Lédan le 13 mai.

Morbihan

Guiscriff : 1 couple alarme à Buralou le 13 mai ; Camors : 1 oiseau en vol avec manifestations vocales le 21 avril. S'agit-il d'un nouveau site ?

Les observations effectuées cette année prouvent que le Courlis a vu ses effectifs se réduire dans bien des secteurs et en particulier dans la cuvette du Yeun Elez. Il semble que le nombre total de couples soit inférieur à 150. Il manque toutefois des données sur des zones comme les Montagnes Noires (298) et le Marais de Flouray (56) qui doivent abriter des populations encore importantes.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) 35 données

Ille-et-Vilaine

Marais de Sougeal : 3 le 20 mars ; Chaillou/Montauban : 1 le 24 avril.

Finistère

Baie de Goulven : 1 le 17 mars ; Le Curnic/Guissény : 1 en plumage nuptial le 9 mai.

Morbihan

Etang de St Jean/Locoal-Mendon : 16 le 7 juillet et 14 le 15 juillet ; Falgouérec/Séné : 10 le 25 mars, 16 le 9 avril, 40 le 13 avril, 46 les 15 avril et 21 avril, 20 du 22 au 28 avril, 9 le 29 avril, 9 du 1er au 5 mai, 5 du 6 au 12 mai, 2 du 13 au 15 mai, 2 du 16 au 19 mai, 12 du 10 au 23 juin, 16 du 24 du 29 juin, 1 le 1er juillet, 8 du 8 juillet au 14 juillet.

Loire-Atlantique

Traits du Croisic : 10 à la mi-avril ; Marais de Grée : 2 le 10 avril, 21 le 21 avril et 12 le 28 avril ; Marais de Machecoul : 20 le 24 juin ; Bourgneuf/Le Collet : 80-100 le 24 juin.

Le suivi régulier du stationnement de l'espèce dans les Marais de Séné permet de dégager 2 pics nettement individualisés : mi-avril, 2ème et 3ème décade de juin. Ce schéma est confirmé par les quelques données en provenance de Loire-Atlantique.

Les observations de juillet réalisées à l'Etang de St Jean préfigurent déjà la première vague estivale.

CHEVALIER GABINETTE (*Tringa totanus*) 37 données

Aucune donnée de fin d'hivernage.

Le passage pré-nuptial est ressenti comme à l'habitude sur les plans d'eau intérieur : 30 à St Lumin de Coutais (44) le 30 mars ; 6 à l'Etang de Villegaudu/Lanballe (22) le 1er avril ; 22 dans le Marais de Grée/Ancenis (44) le 8 avril ; 1 à Poulquidu/Ploshinec (298) le 23 avril ;

2 à Chaillou/Montauban (35) le 24 avril ; 26 sur La Loire à La Chapelle Basse Mer (44) le 8 mai ; 38 sur La Loire entre Varades et Montrelais (44) le 19 mai. La dernière observation est faite le 11 juin à Trielen/Molène (29N).

Les premiers retours sont notés le 25 juin à Ouessant (29N) : 2 oiseaux sont vus à Porz Doun ; le 26 ils sont 9 ; le 1er juillet : 200 minimum en Penzé (29N) ; 1 à l'île du Loch/Glénan le 4 juillet ; 1 à Banneg/Molène du 7 au 10 juillet ; 70 en Rivière de Daoulas (29N) le 8 juillet ; 10 à Porz Doun et 5 à Porz Koret/Ouessant le 12 juillet ; 120 en Rivière de Daoulas le 14 juillet et 53 à St Jean/Locoal-Mendon (56) le 15 juillet.

Nidification :

Les arrivées se font le 14 mai sur le site de Falguérec/Séné (56).

Loire-Atlantique

Marais de Guérande : 3 couples ; Grande Brière : 4 couples ; estuaire de la Loire : 2 couples ; Marais de Boisvre/St Brévin : 1 couple.

TOTAL : 10 couples

Ce total est très partiel en l'absence d'informations sur le Marais de Bourgneuf et la région de Mesquer.

Morbihan

12 à 14 couples minimum ont niché dans le Marais de Séné.

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) 51 données

Ille-et-Vilaine

Chaillou/Montauban : 1 le 24 avril ; La Vigne/Chavagne : 1 le 1er mai.

Côtes-du-Nord

Baie de la Fresnaye : 3 le 6 mai ; Les Ponts Neufs/Billion : 2 le 9 mai ; Anse d'Yffiniac : 3 le 29 avril.

Finistère

Térénez/Plougannou : 1 le 27 avril ; Le Cornic/Guissény : 1 le 9 mai ; Baie de Goulven : 1 le 11 juin ; Créac'h/Ouessant : 2 les 30 avril et 1er mai ; Gouzoul/Ouessant : 1 les 23 et 24 avril, 2 le 25 avril, 2 les 26, 27 et 30 avril, 1 le 1er mai, 2 les 2 et 8 mai, 1 les 9 et 14 mai ; Porz Koret/Ouessant : 1 le 25 avril ; Le Stiff/Ouessant : 1 le 27 avril ; Porz Doun/Ouessant : 1 le 13 mai ; ZIP/Brest : 4 le 28 avril ; Ile de Sein : 1 le 6 mai ; Etang de Poulduigou : 13 le 22 avril.

Morbihan

Erdeven : 2 le 29 avril ; La Trinité/Mer : 12 le 29 avril ; Falguérec/Séné : 6 le 16 avril, 15 le 23 avril, 6 les 29 avril et 5 mai, 2 les 6 et 12 mai, 1 les 13 et 19 mai, 1 du 17 au 23 juin, 3 du 24 au 29 juin, 6 du 1er au 7 juillet, 5 du 8 au 14 juillet ; Etang de St Jean/Locoal-Mendon : 1 le 7 juillet, 43 le 15 juillet.

Loire-Atlantique

Grande Brière : 60 le 29 avril ; St Lumin de Coutais : 30 le 1er mai ; St Luce et Thouaré : 20 le 13 mai ; Ancenis : 55 le 28 avril.

2 phénomènes marquants peuvent être isolés :

Importants stationnements en Loire-Atlantique du 28 avril au 13 mai :
165 individus répartis en 4 sites.

Comme pour le Chevalier Arlequin, arrivée importante d'oiseaux en Rivière
d'Etel à la mi-juillet : 43 à l'Etang de St Jean/Lochal-Mendon.

CHEVALIER CULBLANC (*Fringa ochropus*) 31 données

Ile-et-Vilaine

Chaillou/Montauban : 1 le 24 avril ; Etang du Boulet/Feins : 5 le 21 juin ;
Sesson/La Boisse de Bretagne : 1 le 10 juillet.

Côtes-du-Nord

Etang de Loudéac : 3 le 27 mars ; Le Bodéo/Rosméléac : 10 le 23 avril.

Finistère

Plougasnou : 1 le 5 juillet ; Etang de St Renan : 1 le 10 mars ; Lampaul/
Ouessant : 1 le 28 avril ; Pratseur/Ouessant : 1 le 27 avril ; Créac'h/
Ouessant : 1 le 8 mai ; Etang de Poulquideu : 1 le 30 juin.

Morbihan

Kerroc'h/Ploemeur : 1 le 8 avril ; Etang du Cranic/Brec'h : 5 le
22 avril, 1 le 18 juin, 1 le 15 juillet ; Falguérec/Séné : 4 du 25 au
31 mars, 2 du 1er au 14 avril, 1 du 15 au 21 avril, 7 les 1er et 7 juillet,
5 les 8 et 14 juillet.

Loire-Atlantique

Marais de Goulaine : 8 le 21 avril.

CHEVALIER SYLVAIN (*Fringa glareola*) 7 données

Finistère

Créac'h/Ouessant : 1 les 27 et 30 avril, 1 le 2 mai ; Eroué Gahéric : 10 le
15 juillet.

Morbihan

Etang du Cranic/Brec'h : 2 le 22 avril ; Etang de St Jean/Mendon : 2 le
7 juillet.

Loire-Atlantique

Grande-Brière : 1 le 30 avril (bribes de chant) ; Marais de Grée/Ancenis :
1 le 2 mai.

Schéma de séjour bien structuré comportant 2 phases distinctes : bref
séjour printanier (du 22 avril au 2 mai) ainsi qu'une apparition classique
de l'espèce durant la première décade de juillet.

CHEVALIER GUIGNETTE (*Fringa hypoleucos*) 27 données

Ile-et-Vilaine

Chaillou/Montauban : 6 le 24 avril ; La Vigne/Chavagne : 1 le 1er mai.

Côtes-du-Nord

Morieux : 5 le 9 mai ; Lamballe : 2 le 7 mai ; Jaudy : 4 le 11 avril.

Finistère

Le Dourduff/Plouézoc'h : 3 le 14 mai ; Penzé : 5 le 7 avril, 60 le 17 avril, 12 le 29 juin ; Le Curnic/Guissény : 2 le 9 mai ; Triélen/Molène : 1 le 9 juin ; Banneg/Molène : 1 les 2, 4, 7 et 10 juillet ; ZIP/Brest : 1 le 25 juin, 2 le 2 juillet, 4-5 le 4 juillet ; Larpaul/Ouessant : 3 le 28 avril ; Ar Lan/Ouessant : 2 le 28 avril ; Etang de Poulguidou : 4 le 21 avril, 6 le 26 avril.

Morbihan

Les Roseaux/Larnor-Plage : 1 le 24 avril ; Kerquelen/Larnor-Plage : 2 le 28 avril ; Trénorin/Baud : 1 le 31 mai.

Loire-Atlantique

Ste Luce et Thouaré : 22 le 22 avril ; La Varenne : 21 le 10 mai ; Varades : 32 le 12 mai.

TOURNEPIERRE A COLLIER (Arenaria interpres) 56 données

Côtes-du-Nord

Anse d'Yffiniac : 40 le 8 avril ; Paispol : 16 le 15 avril ; Trieux : 12 le 15 avril ; Sillon du Talbert : 61 le 15 avril ; Jaudy : 43 le 15 avril ; Trédrez : 40 le 8 avril.

Finistère


Plougasnou : 7 le 14 mai ; Baie de Morlaix : 23 le 24 mars, 80 le 7 avril, 25 le 18 avril ; Locquénolé : 50 les 6 avril et 7 mai, 100 le 15 mai, 5 le 19 mai, 2 le 20 mai et 16 le 2 juin ; Penzé : 450 le 23 avril ; Ile de Batz : 10 le 16 mai ; Baie de Goulven : 150 le 1er mai et 90 le 11 juin ; Le Curnic/Guissény : 2 le 9 mai ; Ile d'Yoc'h/Porspoder : 35 le 25 avril ; Banneg/Molène : 3 le 21 avril, 20 les 27 avril et 4 mai, 2 le 11 mai, 5 le 31 mai, 10 le 4 juillet ; Triélen/Molène : 6 (min.) le 9 juin et 23 le 10 juin ; de Larpaul au Koz/Ouessant : 150 le 28 avril, 30 le 13 mai et 7 le 12 juin ; Ar Lann/Ouessant : 6 le 29 avril ; Ouessant (Côte nord Ouest) : 40 le 30 avril ; Pors Dour/Ouessant : 100 le 13 mai, 9 le 9 juin, 12 le 18 juin et 14 le 25 juin ; Brest et Plouzané : 10 le 16 mars ; Douarnenez : 9 le 16 avril et 12 le 18 avril ; Ile de Sein : 180 (2 sites) le 6 mai ; Ile du Loc'h/Archipel des Glénans : 19 le 4 juillet.

Morbihan

Plouezec : 10 (min.) le 22 mars et 5-10 le 25 mars ; Erdeven : 18 le 29 avril ; Presqu'île de Quiberon : 29 (2 sites) le 18 mars, 29 à la mi-avril ; Pointe des Poulains/Belle-Ile : 10 le 3 avril ; St Philibert : 150-200 le 14 avril ; Estuaire de la Vilaine : 196 à la mi-avril.

Loire-Atlantique

La Turballe : 35 le 29 mars ; Oudon (sur la Loire) : 5 le 20 mai.



Quelques constations :

- Grande disparité dans l'évolution des populations de sites particulièrement bien suivis : Locquénoilé, Quessant et Archipel de Molène.
- Réduction sensible des observations à partir de début juin.
- Majorité des observations en provenance du Finistère.
- La Baie de Morlaix (site au sens large) abrite la plus forte concentration de la période.

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) 1 donnée

1 individu vers le nord, le 22 mai à Pern/Quessant (29N).

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasitus*) 2 données

1 individu - phase sombre - dans l'Anse d'Yffiniac (22) le 14 avril ;
un immature le 5 juillet à la ZIP/Brest (29N).

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) 1 donnée

1 individu se dirigeant vers le nord le 4 juin à l'île de Batz (29N).

MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*) 21 données

La plage du Ris à Douarnenez (29S) a été le lieu de très nombreuses observations jusqu'au 2 mai (au moins) : le 16 mars 3 oiseaux de 1ère année, 2 de 2ème année et 2 adultes en plumage nuptial ; le 17 mars, 31 individus minimum dont 6 adultes et 6 de 2ème année ; le 18 mars, 21 individus ; 5-6 oiseaux, dont 2-3 en plumage nuptial, le 25 mars. En avril, 10 individus le 3, 10 le 10, 27 (dont 10 à 15 adultes) le 15, 9 le 19, 15 adultes le 21, 6 (2 adultes et 4 immatures) le 22 et enfin 1 immature le 2 mai.

D'autres oiseaux ont été vus ponctuellement : le 26 mars, un 1er hiver à Le Bréno/Carnac (56) et 1 à Nérizélec/Plovan (29S) ; le 1er avril, 1 1er hiver dans le Marais de Guérande (44) ; le 28 avril, à la Pointe du Raz/Plogoff (29S) un oiseau est posé sur un club à Mouette Tridactyle.

Du 2 mai jusqu'au 18 juin, pas d'observation ; ensuite des immatures sont vus à la ZIP/Brest (29N) : 2 premiers étés le 18 juin, 1 immature le 27 juin, 1 immature le 2 juillet, 2-3 immatures le 5 juillet, 1 immature les 11 et 12 juillet.

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) 47 données

Un passage important d'oiseaux a été observé sur les côtes sud de la Bretagne, suite à une série de dépressions de secteur ouest au début de la troisième décade de mars :

Dans les Marais de Guérande (44) : 150 à 200 individus entre Congor et Bats le 23 mars ; 700 individus les 29 et 30 mars le long du coteau de Guérande (90 % sont des adultes, 8 % des 2ème hiver et 2 % des premiers hiver) ; 110 individus (dont 95 % d'adultes) vus à Congor le 14 avril. Les derniers adultes sont vus vers le 30 avril au Kernandès ensuite ne restent que quelques immatures jusqu'au 7 juin.

A Falguérec/Séné (56) : 30 oiseaux le 24 mars, 100 le 26 et 250 le 29. A noter 2 individus du 27 mai au 2 juin.

A l'étang de Nérizelec/Plovan (298) : 17 oiseaux le 31 mars ; 100 le 22 avril et 56 le 24 avril.

En Baie de Douarnenez (298) : 50-60 individus le 25 mars à Kerlaz et Douarnenez.

MOUETTE DE SABINE (*Xema sabini*) 3 données

Toutes les observations sont faites à l'île d'Ouessant (298) en mai : 2 adultes au Créach le 15, 1 immature à Pern le 22 et 1 immature à Pern le 23.

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) 19 données

Aucune donnée concernant la reproduction.

Signalons que les premiers juvéniles sont notés fin juin - début juillet (1-2 parmi les 100 oiseaux observés le 3 juillet à la ZIP/Brest (298) et que le retour des adultes débute à la mi-juin (45-50 en rivièr de Douglas (298) le 16 juin ; 4 à Koz/Ouessant (298) le 26 juin).

GOELAND A BEC CERCLE (*Larus delawarensis*) 29 données

" Erratique en Europe. En Grande Bretagne et en Irlande, un petit nombre d'observations d'oiseaux de cette espèce est maintenant enregistré annuellement depuis la première observation en 1973". (Grant P.J. Gulls)

En France, Boulva a pour la première fois observé un oiseau de cette espèce à la Pointe du Croisic en décembre 1974 (Boulva in Alauda 43 (1975) p. 195). Depuis quelques observations sur le littoral breton et atlantique ont été faites (cf article de P. Yesou dans ce fascicule). Pour ce printemps, deux lieux privilégiés d'observations :

La ZIP et le Vallon du Stangalard/Brest (298) : 19 données

Un immature de 1er hiver a été vu dès le 16 mars à la ZIP puis suivi régulièrement. Cet oiseau se trouve toujours à Brest au moment où nous écrivons ces lignes.

La plage du Ris (9 données) et l'îlot St Michel (1 donnée)/Douarnenez (298) :

4 oiseaux (trois 1er hiver et un 2ème hiver) au maximum ont séjourné à Douarnenez : dès le 17 mars, un 2ème hiver et un 1er hiver sont observés,

s'y adjoignent le lendemain deux oiseaux en plumage de 1er hiver. Ces 4 oiseaux sont encore vus le 24 mars. Ensuite :

Dates	1er hiver	2ème hiver
4 avril	1	1
9 avril	1	
10 avril	1	
15 avril	1	1
21 avril	2	1
22 avril	1	

Les oiseaux ne sont pas revus ensuite.

Remarquons la simultanéité de la découverte de l'espèce à Brest (le 16 mars) et à Douarnenez (le 17 mars).

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) 8 données

A signaler : dernier adulte observé en Loire-Atlantique le 3 avril à Mauves (44) et dernier immature le 20 mai toujours à Mauves. Les retours des adultes s'effectuent dès la mi-juillet : 1 le 11 et 4 le 14 en Penzé (29N).

Pas de données concernant une éventuelle reproduction en Loire-Atlantique.


GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) 24 données

Elles concernent surtout les effectifs d'oiseaux nicheurs. Il faut remarquer cette année l'absence de reproduction sur l'île des Landes/Cancale (35) (présence d'un renard). Nous n'avons pas reçu cette année de données sur les Goélands bruns se reproduisant en ville. Il serait intéressant en 1985 de pouvoir en estimer les effectifs et de connaître les nouveaux lieux d'implantations.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) 42 données

Ile-et-Vilaine

Le 15 avril nombreux cadavres sur l'île des Landes/Cancale (voir goéland brun) ; une famille est cependant observée le 2 juillet.



Goélands à bec cerclé (Photos Alain THOMAS)

Côtes-du-Nord

Le 23 mai des adultes transportent des matériaux au-dessus de la Préfecture de St Brieuc.
Le 2 juillet, 2 juvéniles en duvet sur le toit de l'Hôtel des Postes de St Brieuc.
Le 15 juillet, un juvénile non volant - tombé - est trouvé Rue des Capucines/St Brieuc.

Finistère

21 avril, une ponte (1 oeuf) à Morgat/Crozon.
Le 5 juin, 1 nid avec 3 poussins sur le toit de la criée de Douarnenez (au moins trois nids ce printemps).
Le 16 juin, 1 couple parade sur un toit de Trébeul/Douarnenez.
Le 4 juillet sur l'île du Loch/Les Glénans, au moins 60 cadavres de poussins.
Juillet : reproduction (1 nid avec 2 poussins) sur une usine à Douarnenez.
Enfin, preuve de la reproduction du Goéland argenté à Brest, rue Brande (nouveau-né).

Loire-Atlantique

Les Marais de Guérande sont pour la première fois le lieu de reproduction de cette espèce : au moins 5 couples.
Nous n'avons signalé ici que les faits marquants dans la nidification.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus cachinnans/michaellii*) 3 données

1 oiseau sur la décharge de Kerloc'h/Camaret (298) le 11 avril ;
1 adulte à la ZIP/Brest (298) le 19 juin ; 1 couple cantonné au printemps sur un des îlots du Golfe du Morbihan (56) - reproduction ? -

GOÉLAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucoïdes*) 26 données

Deux lieux ont permis des observations suivies :

- Plage du Ris/Douarnenez (298) : les oiseaux observés début mars ont prolongé leur séjour ; 3 du 16 au 22 mars puis 1 immature le 25 et de nouveau 3 le 29 mars ; 2 le 4 avril, 2 oiseaux - 1er hiver - le 10 avril et 1 de 2ème hiver le 15 avril.
- A la ZIP/Brest (298) : un oiseau immature a été observé régulièrement le 31 mars puis les 18, 20, 24, 26 et 30 avril et 10 mai avant d'être trouvé mort le 17 mai.

D'autres secteurs d'observations ponctuelles :

18 mars, un 2ème hiver au Gouic/Guerlesquin (298) et un 1er hiver au Croisic (44) ; 24 mars, un 1er hiver à Pouldavid/Douarnenez (298) ; 3 avril, un immature au Port de St Goënné/Fennarc'h (298) ; 5 avril, un 1er hiver à La Turballe (44) ; 9 et 10 avril, un 2ème hiver est vu posé sur un champ labouré, à Pont Croes/Pouldergat (298), parmi une centaine de Goélands argentés ; 2 juin, un adulte et un 1er hiver à Concarneau (298).

GOËLAND BOURGEMESTRE (*Larus hyperboreus*) 13 données

Finistère

25 mars, un immature à la Plage du Ris/Douarnenez ; 3 avril, un oiseau en plumage de 1ère année au même endroit et un immature de 1ère année à St Guénolé/Pennarch ; 7 mai, un immature à Plouzané ; 29 mai puis les 4 et 10 juillet, un immature à la ZIP/Brest.

Un oiseau de 3ème année a estivé au Port de Molène ; observé les 30 avril, 6 mai, 12 juin et 4 juillet, cet oiseau avait choisi un canot de sauvetage comme reposoir.

Loire-Atlantique

22 avril, un immature de 1er hiver au Croisic, ce qui constitue la date la plus tardive d'observation en Loire-Atlantique.

A noter qu'un oiseau bague poussin à Ayrar/Islande le 26 juin 1983 a été trouvé mort le 17 juin 1984 à l'île Dumet (44) par J. Roussay & Coll (SSNOF) ; ce qui constitue la première reprise d'un Goéland bourgmestre en Bretagne sud.

GOËLAND MARIN (*Larus marinus*) 20 données

Cette espèce poursuit doucement son expansion : elle occupe de nouveaux sites (Enez Ar Prad/Batz (29N) : un nid, 1 oeuf) ou voit les effectifs de certaines colonies augmentés (Cap Sizun (29S) : 15 couples reproducteurs contre 9 en 1983 ; Ile de Trébrion/Roscanvel (29S) : 4 couples reproducteurs contre 2 en 1983).

MOUETTE DE ROSES (*Rhodostethia rosea*) 1 donnée

Un adulte en plumage hivernal le 12 mai entre Concarnau et l'île aux Moutons/Archipel des Glénans (29S).

Cet oiseau se reproduit l'été dans la toundra marécageuse au nord-est de la Sibérie et depuis quelques années au Groenland, dans la partie "arctique" du Canada et dans la région du Manitoba/Canada.

En Grande-Bretagne et en Irlande, il est fait une observation annuelle en moyenne. Pour la Bretagne, c'est une nouveauté.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) 18 données

Cette espèce qui a connu une forte mortalité durant l'hiver 83-84 voit les effectifs de certaines colonies bretonnes diminués : à Goulien (29S), 1044 couples se sont reproduits cette année contre 1164 en 1983. A l'inverse, l'effectif de la colonie du Cap Fréhel/Plévenon (22) a augmenté (+ 21 %) passant de 217 couples reproducteurs en 1983 à 263 en 1984, mais il n'a cependant pas atteint les valeurs des années 80-82.

A signaler aussi les 15 nids minimum sur la face sud de Keller Vihan/Ouessant (29N).

STERNE CAUGER (*Sterna sandvicensis*) 46 données

... en avril, signalons 2 en Baie de Lannion (22) le 8, 120 à St Philibert (56) le 14...

Notons le suivi de Lespoul/Pont Croix (298) où les couples utilisaient le nichoir artificiel à Sternes comme reposoir : 2 le 8 avril, 6 le 18, 3 le 20, 5 le 21, 1 le 22, 1 le 24 et 1 le 4 mai, 3 le 6, 2 le 7.

Nidification :

1000 couples minimum répartis ainsi :

Côtes-du-Nord

50-60 couples le 13 mai et 164 au moins le 4 juin sur La Colombière/St Jacut ; 2-3 couples à Losquet/Pleumeur Bodou.

Finistère

300 couples en Baie de Morlaix ; sur Trévach/St Pabu : 0 couple ; 116 sur Fourn Cros/Ploudalmézeau le 6 juin ; 6 pontes à Balaneg/Molène et au moins 110 couples à Trielen/Molène le 9 juin ; 30-35 couples sur Moëlez/les Glénans.

Morbihan

250 couples en Rivière d'Etel.

Loire-Atlantique

13 couples sur La Pierre Percée/Pornichet (au lieu de 160 en 1983) et 7 couples en Marais de Guérande.

La présence humaine a provoqué l'échec partiel ou total des pontes sur Moëlez, Balaneg, Trielen. En Rivière d'Etel, l'abandon des sites s'est produit début juillet.

STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougallii*) 16 données

Premières arrivées sur les sites de nidification vers la fin avril : les 21 et 22 avril, 5-10 oiseaux à Fourn Cros/Ploudalmézeau (298) ... A noter en juillet, le 6, un transport de nourriture par un oiseau se dirigeant vers le nord, à Plouzané (298).

Nidification :

Minimum de 77-83 couples

La Colombière/St Jacut (22) : 2 nids, Losquet/Pleumeur Bodou (22) : 1 couple ; 25 couples en Baie de Morlaix (298) ; 4-10 couples à Trévach/St Pabu et 45 nids à Fourn Cros.

En l'absence de preuves de reproduction pour l'Archipel des Moutons/Glénans (298) et La Pierre Percée/Pornichet (44), on peut parler de stabilité pour cette espèce sur les îlots mentionnés ci-dessus.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) 55 données

Le 26 mars, à Kérispert/La Trinité sur Mer (56) première observation de l'année d'un oiseau et de 3 le lendemain...
10 individus le 7 mai à l'Etang de Ville Gaudu/Lamballe (22).

Reproduction :

Sur deux sites, la reproduction a été bien suivie :

- A Laspoul/Pont Croix (298) dès le 22 avril, 2 oiseaux présentent un comportement territorial (le 1^{er} est le même que l'an passé) ; le 27 avril, le couple s'installe et le 11 mai, les oeufs sont pondus ; le 4 juin, présence de 3 poussins jusqu'au 15 juillet.
- A Falguérec/Séné (56) : le 26 mai, les nicheurs sont installés et le 1^{er} poussin apparaît le 23 juin.

535 couples nicheurs répartis ainsi sur les îlots (cf tableau).



- Répartition des STERNE PIERREGARIN nicheuses -

(c = couples)

L I E U X			1984	1983
		DATE	EFFECTIF	EFFECTIF
35	Îlot Bénétin/St Malo	16/6	1 nid	1 c
22	La Colombière/St Jacut	09/6	75 nids	110 c
	Pt îlot des Mébihens/St Jacut	02/6	10 c	
	Sillon du Talbert/Pleubian	03/6	20 c	
29	Baie de Morlaix	06/6	100 c	120 c
	Trévoch/St Pabu		38 nids	38 c
	Fourn Cros/Ploudalmézeau		15 nids	90-110 c
	Archipel de Molène (partiel)	10/6		24-25 c
	Trélen		1 c	
	Balaneg	-	12 c	
	Banneg	02/7	1 c	80 c
	Lespoul/Pont Croix	-	1 c	
	Archipel des Moutons/Glénans		1 ponte	
56	Falguérec/Séné	23/6	3 c	3 c
	Îlots de la Rivière d'Etal		104 c	154 c
	Er Lannic/Larnor Baden		0	0
	Locmariaquer		(niche)	
44	Marais de Guérande	"	106 c	43 c
	dont Grand Sal		(32 c)	
	Pierre Percée/Pornichet		8 c	30-40 c
	Iles Moquard et du Bois Vert/Varadès		24 c	

Les effectifs pour cette espèce ont, cette année, diminué sur pratiquement tous les sites de reproduction et ce de façon parfois catastrophique comme pour l'Archipel des Moutons.

A noter aussi qu'en Rivière d'Etal, les nids ont été abandonnés début-juillet - dérangement ? -

Enfin, un transport de nourriture par un oiseau ressemblant à la Rance (35) a été remarqué le 1er juillet.

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*) 4 données

1 individu le 22 avril à Trenvel/Tréogat (295) ; à la Pointe de Feunteun Aod/Plogoff (298), 2 individus le 24 avril de 9 h 30 à 10 h 30 et 2 le 25 avril de 9 h à 10 h.

Nidification :

Un couple a niché à Banneg/Molène (298) (1 œuf vu le 2 juillet) sans succès ? La dernière reproduction sur l'île date de 1974 (Ar Vran Tome X). En 1982, un couple s'est reproduit sur l'îlot voisin de Balaneg (Grandserre E., Travaux des Réserves de la SEPNE, Tome I 1982).

STERNE COMIC (*Sterna hirundo/Paradisaea*) 2 données

Le 29 avril à Erdeven (56) plus de 100 oiseaux se dirigeant vers l'ouest ; le 25 mai à Feunteun Aod/Plogoff (295) : 8 oiseaux.

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) 16 données

65 oiseaux sont en groupe serré sur l'étang de Trenvel/Tréogat (295), au niveau de la brèche, le 24 avril ; 10 en Baie de La Baule (44) le 25 avril, 6 à Erdeven (56) le 29 avril ; 4 en Baie de Lancieux (22) le 1er mai...

Nidification :

- au Vougot/Guissény (298) une tentative de reproduction a échoué ;
- au Sillon du Talbert/Pleubian (22), 2-3 couples nicheurs le 3 juin (au lieu de 17 en 1983) ;
- sur les îles Moquart et du Bois Vert/Varades (44) : 22 couples min. (14 en 1983).

A noter l'absence de reproduction pour la 28^{ème} année consécutive sur Trévoch/St Pabu (298).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) 15 données

Le 14 avril, 5 individus dans les Marais Salants de Guérande (44) ; un individu du 22 au 28 avril à Falguérec/Séné (56) ; 18 à Nérizélec/Plovan (298) le 24 avril ; 1 adulte en plumage nuptial au Moulin Neuf/Ploumérin (22) le 27 avril ; le 29 avril, un adulte en plumage nuptial en Rivière du Faou (298) et 3 individus à l'Etang du Boulet/Feins (35) ; un adulte en plumage nuptial à Plouhinec (56) le 6 mai ; 4 individus à Falguérec/Séné du 6 au 12 mai ; 10 individus à l'Etang de La Ville Gaudu/Lamballe (22) le 7 mai puis 12 le 14 et 1 le 16 ; au Curnic/Guissény (298) un adulte en plumage nuptial le 9 mai ; sur la Loire à Ste Luce, environ 160 oiseaux le 20 mai ; le 24 mai, 3 individus à Trévignon/Trégunc (298) et 5 à Lespoul/Pont Croix (298) ; ensuite, aucune donnée jusqu'au 2 juillet : un individu à l'île des Landes/Cancalle (35).

Remarquons qu'aucune donnée précise sur la reproduction ne nous est parvenue.

GUILFETTE LEUCOPTERE (*Chlidonias leucopterus*) 1 donnée

1 adulte le 24 mai à Lespoul/Pont Croix (298).

GUILLEHOT DE TROIL (*Uria aalge*) 10 données

1 individu à La Pierre Percée/Pornichet (44) le 30 mai.

Nidification :

- Au Cap Fréhel (22), 179-190 couples se sont reproduits cette année. L'effectif de cette colonie augmente (170 couples en 1983).
- Au Cap Sizun (298), 66 couples au moins (69-70 en 1983) répartis ainsi :
 - Kastell Ar Roc'h/Goulien : 25 couples (production moyenne en jeune à l'envol = 0,84).
 - Milinou Kernaden/Goulien : 21 couples.
 - Milinou Brax/Goulien : 20 couples.
- Roches de Camaret (298) : 25-30 couples minimum.

PINGUIN TORDA (*Alca torda*) 19 données

Au Cap Fréhel (22), l'effectif poursuit son augmentation en 1984 : 22-24 couples le 30 mai contre 17-18 couples en 1983.

Au Cap Sizun (298), un couple a niché dans une fissure du Milinou Kernaden/Goulien ; à noter que n'ont jamais été vus plus de 3 oiseaux ensemble à la réserve durant la saison.

Des va-et-vient sont notés auprès de Keller/Ouessant (298), l'espèce doit probablement encore y nicher.


MACAREUX MOINE (*Fratercula arctica*) 4 données

Nidification :

- Baie de Morlaix (298) : 13-15 nids
- Keller/Ouessant (298) : présence et transport de nourriture
- Ar Youch/Ouessant (298) : 6 couples
- Banneg/Molène (298) : 1 couple

PIGEON BISET (*Columba livia*) 2 données

De tout le littoral, seule Belle-Ile (56) abrite une population sauvage importante. Après y avoir fortement diminué dans les années 60 à 70, les effectifs augmentent à nouveau. Ainsi, cette année 3-4 couples ont-ils niché à la réserve de Koh Kastell/Sauzon et la recolonisation de la côte nord de l'île s'amorce-t-elle.



Goélands à ailes blanches (Photo Alain THOMAS)

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) 35 données

Un indice de passage début avril : 1 le 4 à Bodin/Loudéac (22) où l'espèce ne niche pas. Toutes les autres données concernent des reproducteurs et proviennent surtout des Côtes-du-Nord et de Nord-Finistère où le Colombin est assez répandu et en augmentation. Ailleurs il semble être un nicheur très sporadique.

Côtes-du-Nord

Noté pendant toute la période dans des parcs : Les Chatelets/Ploufragan, le Château des Marais/Hillion, la Ville Servé/Morieux, le Parc de Graffeur/St Julien, l'étang de Quintin, le Parc de la Touche/Tréby, dans les forêts : Gorges de Daoulas/St Gelven, les Salles/Ste Brigitte, mais aussi sur le littoral, dans des falaises : Le Palus/Plouha et Beg Hastell/Plouha.

Finistère-Nord

Noté à Kérascot/Coatmeil, Ste Anne du Portzic/Brest, Lesquiffiou/Pleyber-Christ, Créachquereguen/Plougasnou, Kérucoret/Plouvorn, Kerfaven/Ploudiry, St Julien/Taulø, Landgazel/Trémacoëzan, Keriéan/Bréles, Brest, Kerprigent/St Jean du Doigt, Mohars et Guerdavid/Lannéanou.

Morbihan

2 le 30 juin à Locméren des Prés/Grand Champ.

Loire-Atlantique

1 chanteur le 6 avril à St Sébastien/Loire ; 4 chanteurs le 11 à Carquefou ; 1 couple à l'île Lorient/Basse Goulaine le 25 et 4 chanteurs sur 2 km le 6 mai à Jossé-sur-Erdre.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) 7 données

35 le 9 juin à Banneg/Molène (29N).

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) 10 données

Irrégulièrement notée. A Banneg/Molène (29N) : 1 les 21 et 27 avril puis 2 le 18 mai : 5-6 couples le 16 mai dans le bourg de Caulnes (22) ; 1 le 1er juillet en forêt du Neffou/Loquivy-Plougras (22).

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) 38 données

Premières observations : à Quessant (29N) 1 le 12 avril, 2 le 13 ; à Erce en Lanée (35), 1 le 17. Mais les arrivées ne se généralisent qu'à partir du 20 : 2 à cette date à Quessant ; le 21, 1 à Ascenis (44) et 2 à Crozon (29S) ; 2 le 22 à Brec'h (56) ; 7 puis 2 le 24 à Quessant ; 1 le 25 à Loudéac (22) ; 1 à Pennes (35) et à Banneg/Molène (29N) le 27...

Des migrateurs sont notés jusqu'à la fin de la période dans les îles... 1 les 5 et 9 juillet à Quessant.

COUCOU GEAI (*Clamator glandarius*) 1 donnée

1 immature à l'Apothicaire/Sauzon (56) les 3 et 4 avril.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) 37 données

Arrivée tardive cette année : 1ers à Belle-Ile (56) le 29 mars et à Kerhuon (29N) le 31.

Du 6 au 10 avril, l'espèce n'est observée que dans le Sud de l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan : le 3 à Larmor-Plage (56); le 6 à Brec'h (56), la Trinité (56) et Poligné (35); le 7 à Sel-de-Bretagne (35); le 8 à Baden (56).

A partir du 10, les données deviennent nombreuses et touchent tous les départements.

Femelles rousses : 1 le 15 avril à Sel-de-Bretagne (35); 1 le 1er mai à Falguerec/Séné (56); 1 le 1er mai dans les Marais de Dol (35); 1 le 21 mai à la Croix Bonne/St Maudan (22) et 1 à Plouharnel (56) le 16 juin.

Les derniers chanteurs sont notés le 2 juillet à Morieux (22) et le 5 à Ouessant (29N) où un départ massif est constaté le 25 juin avec des isolés les 6, 9 et 13 juillet.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*) 18 données

1 cantonnée le 14 avril à Mauperthuis/Loudéac (22); 1 couple le 17 à le Diffaut/Loudéac; 1 le 28 à La Villeneuve/Forêt de Chevré (35); le 30, à St Suliac (35), 3 sites occupés : 1 nid contient 3 œufs, 1 q couve et 1 individu; 1 couple à L'Bern d'en Bas/Morieux (22); le 27 mai, 1 à Bois Bide/Pocé Les Bois (35) et 1 à Kernorvan/Plouzévédé (29N); 1 le 8 juin au Tombeau de Merlin/Saint-Malon-Sur-Mel (35); 1 en zone légumière le 20 à Tréflacouenan (29N); 3 juvéniles hors du nid à Tresboeuf (35) le 6 juillet. Par ailleurs, 3 sites maintenus à la Bosse de Bretagne (35), 2 cantonnées à Guerlizin/Lannéanou (29N) et 2 données d'oiseaux écrasés en Morbihan.

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) 4 données

Aucun indice de reproduction cette année, toutes les observations pouvant concerner des migrateurs ou des attardés.

Dernière observation des hivernants, le 28 mars à l'aérodrome de St Jacques de La Lande (35). Dans l'Archipel de Molène (29N), 1 à Litiry-Quénérés le 3 avril et à Banneg du 21 avril au 23 mai; 1 fin avril à Belle-Ile (56).

HIBOU MOYEN-DOC (*Asio otus*) 13 données

En Bretagne, l'espèce occupe préférentiellement les régions de marais, les tourbières, les landes boisées, mais aussi les zones remembrées où subsistent des bosquets isolés et même les plantations de résineux en forêt : 2 le 29 mars en Forêt de Lanouée (56).

On peut donc s'attendre à le trouver sur la majorité des cartes 10 X 10, mais sa répartition et son abondance varient beaucoup d'une année à l'autre, sans doute en relation avec les fluctuations des populations de rongeurs. Ainsi, cette année, la tendance est-elle à la baisse : à Landgazel/Trémacouézan (298), 3 nids en 82, 1 nid probable en 83 et 1 individu cantonné ce printemps ; en région d'Auray (56) sur 8 sites occupés en 83, une seule famille cette année ; 2 adultes plus 2 pulli les 4 et 18 juin à La Villeneuve/Lochal-Mendon.

Jusqu'à la mi-mai, les autres observations ne concernent que des isolés ; les 17 mars et 6 avril à Crac'h (56), le 22 mars à St Suliac (35), le 26 avril à la Chapelle St Sauveur (44) et le 17 mai à Ménez Guen/Plozévet (298).

Les familles sont notées à partir de fin mai : 3 juvéniles le 27 à St Lyphard (44) ; le 6 juin à la Digue/Pont-Croix (298) ; 1-2 juvénile (s) ; le 16 à Ménez Guen/Plozévet (298) ; 3-4 juvéniles et le 25 au Collet/Bourgneuf (44) ; 2 juvéniles.

Enfin 1 adulte le 8 juillet à Montreuil sous Pérouse (35).

ENGOLEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) 35 données

Le nombre record de données est la conséquence du récent intérêt des observateurs pour cette espèce. L'effort de prospection demeure cependant trop inégal pour parfaire notre connaissance de sa répartition.

La première observation très précoce (le 18 mars) précède les autres d'un mois et demi.

Ille-et-Vilaine

Bien que localisé, l'Engoulevent présente souvent de fortes densités dans les sites occupés. 1 chanteur à partir du 18 mars à La Teillay ; dans le massif de Paimpont, les 8 et 9 juin, plus de 12 chanteurs et 1 couple en 7 sites ; 1 chanteur en Forêt de Chevré le 20, 9-11 chanteurs (dont 4-5 en 1 km) au bois de Chinsève/St Aubin d'Aubigné le 21 juin ; 1 chanteur noté à la Rosse de Bretagne.

Côtes-du-Nord

1 à la Berthière/Plédeliac le 30 avril ; 1 chanteur au bois de Coron/St Alban le 20 juin.

Finistère

Des chanteurs sont notés au Cragou/Plougonven, au bois du Gars/L'Hopital-Camfrout et à Pen Ar Roch/Pont de Ruis.

Morbihan

L'abondance des milieux favorables confère à l'espèce le statut de nicheur assez commun. Retenons : 3 chanteurs à Coet Fourns/Haud et 1 nicheur à Trélécan/Pluvigner le 30 mai ; 9-10 chanteurs en 6 sites sur la carte du Cranic les 4 et 18 juin ; 1 individu sur les dunes de Plouhinec le 10 ; 5 chanteurs à Cornévez/Pluvigner le 22 ; 1 chanteur à 18 h 30 en Forêt de Lanouée, 7 chanteurs à St Servant-sur-Oust le 25 et 5 chanteurs à Monterblanc le 3 juillet.

A l'ouest du département : 1 chanteur noté à Ilescréan/Lanvéneq.

Loire-Atlantique

1 chanteur à Herbignac le 16 mai. Par ailleurs, noté en Forêt du Cèdre et du Vioreau, ainsi qu'à Pen-Broc/Le Turballe.

MARTINET NOIR (Apus apus) 26 données

Cette année encore, les faits suivants se dégagent des données.

Les premières observations, faites dans le sud de la Bretagne, se situent entre le 1er et le 16 avril, mais les effectifs restent faibles jusqu'à la fin du mois.

Dans le Nord-Finistère et les Côtes-du-Nord, les arrivées se produisent en moyenne avec un décalage d'une semaine par rapport au Sud-Est. Une arrivée massive a lieu début mai.

Des migrateurs sont notés jusqu'à la mi-juin sur les sites. La migration de retour débute dans les premiers jours de juillet.

Premières arrivées :

Le 14 avril à Séné (56), le 16 à Tréogat (298), les 20 et 21 à St-Brieuc (22), le 22 à Quimper (298) et à Pennes (35) ... mais seulement le 27 à Plouénérin (22) et à Quessant (298) ... Gros arrivage à Miniac Sous Béchereil (35) et à Erbréu (35) le 9 mai. Le passage est encore observé dans les îles finistériennes en juin : 8 à Tréguier le 11, 150 à Quessant le 12. Début juillet, le mouvement s'inverse : 50 vers le sud au Créach/Quessant le 5.

GUEPIER D'EUROPE (Merops apiaster) 2 données

Peu de données et aucun indice de reproduction pour cette espèce dont le nombre d'observations a augmenté ces dernières années et qui a niché dans le Finistère en 83.

1 à l'Isle/Royal (56) le 2 juin et 2 à Penn Ar Lan/Quessant (298) le 7 juin.

RIPIPE FASCIEE (Upupa epops) 16 données

5 données d'oiseaux de passage : à Elliant (298) : 1 le 19 avril ; à Quessant (298) : 1 les 19 et 30 avril ; 1 le 19 à la Pointe du Meinga/St Coulob (35) et 1 le 20 à Planqueneau (22) ; 1 à Molène (298) le 30 avril et 1 le 5 mai à St Pabu (298).

Les autres observations se rapportent à des reproducteurs et s'inscrivent essentiellement dans l'aire régulière de nidification. Première le 30 mars à Bourgneuf (44) puis 1 chanteur à la Trinité (56) les 6 et 22 avril ; 1 le 20 à Erce en Lée (35) ; 1 le 22 à Trénewel/Tréogat (298) ; 1 le 23 à Brunant/Guidel ; 2 chanteurs à Erdeven (56) le 29 ; 1 à Crac'h (56) le 10 mai ; 2 chanteurs à Plouhinec (56) le 13 ; 1 le 3 juin à St Goustan/Theix (56) ; 1 le 11 au Steir/Pennarch (298) et 1 le 27 à Trézel/La Gacilly (56).

Une donnée intéressant l'intérieur du Finistère-Sud : de mai à juillet, 1 couple cantonné à Kergariou/St Thuriën.

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) 8 données

Les données récentes montrent une répartition de l'espèce en Bretagne peu modifiée depuis 1974. Elle occupe toujours le sud de l'Ille-et-Vilaine, l'intérieur de la Loire-Atlantique, et les Landes de Lanvaux (56), mais avec des effectifs plus faibles.

A Nantes (44), 1 chanteur les 11 et 29 avril ; au Pré Nazet/Rennes (35), 1 chanteur à partir du 27 avril ; 1 le 10 juillet à Ancenis (44).

Donnée négative : nichoir non utilisé pour la première fois depuis 5 ans à la Bosse de Bretagne (35).

PIC CENDRÉ (*Picus caesus*) 13 données

Lors de la sortie concertée Pics du Gola le 17 mars, 5 couples plus 2 chanteurs isolés ont été recensés en Forêt du Gâvre (44) soit 1 couple pour 180 ha. Autour de St Brieuc (22), l'espèce fréquente des parcs pourvus de vieux chênes : 1 alarme le 8 avril au Parc des Marais/Hillion, chanteurs isolés au parc des Chatelets/Ploufragan le 18, à Bon Abri/Hillion le 19 et à Pissosson/Hillion le 13 juin.

En Ille-et-Vilaine, le Pic cendré est présent dans les forêts de feuillus du centre du département mais aussi dans le bocage. Nouvelles localités : 2 chanteurs le 14 avril à Painroux/Guignen, 1 chanteur le 21 à Vieux-Vy et le 25 à Bourgharré ; noté à plusieurs reprises à Les Nétunières/Erbrée et 1 chanteur assidu dans un bois de pins, le 31 mai à Port Mer/Cancale. D'autre part, 1 ♀ + 1 chanteur en Forêt de Carnoët/Quimperlé (298) le 5 mai, qui demeure le site de nidification le plus occidental de l'espèce.

PIC VERT (*Picus viridis*) 13 données

Noté sur des îles proches de la côte le 15 avril : 1 à l'île à Bois/Lezardrieux (22) et 1 à l'île à Poules/Estuaire du Jaudy (22).

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) 4 données

Sa nidification, suspectée depuis plusieurs années, est enfin prouvée, en Loire-Atlantique : 1 nid trouvé, 2 juvéniles à l'envol en Forêt du Vioreau. D'autres observations ont été faites dans les massifs voisins : 1 près de l'abbaye de la Meilleraye le 19 mai et 1 individu chante et crie en vol en Forêt d'Ancenis le 10 juillet.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) 29 données

Dernier tambourinage le 2 juin à Pleyber-Christ (29N).

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) 6 données

30 couples plus 28 individus isolés le 17 mars en Forêt du Gâvre (44) soit 1 individu pour 20 ha 50. Les plus fortes densités sont observées en futaie de feuillus.

Par ailleurs, 1 chanteur le 18 mars en Forêt de Casors (56), 1 en Forêt du Vioreau (44) le 18 mars, 3 couples à Bodvarec/Locmaria-Berrien (29N) le 6 avril et 1 chanteur le 25 mai en Forêt de Carnoët (29S).

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) 21 données

Signalé à : La Coudraie/Plonéour Lanvern (29S), Costaner/Douarnenez (29S), Bodvarec/Locmaria-Berrien (29N), St Nihy (22), Guervénan/Plougouven (29N), les Hairies/Etrelles (35), Trésorin/Baud (56), Kerléan/Brélès (29N), La Bourdonnaye/Carentoir (56), Trébabu (29N), des Forêts de Lancoée (56) et Lanvaux (56), de Pluméret (56) et Crac'h (56).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) 4 données

Depuis 1974, la régression s'est accentuée ; le Cochevis ne niche plus sur la côte nord et ne subsiste qu'en de rares localités méridionales. Cette année la nidification est notée à Erdeven (56) (1 transport de nourriture le 4 juin), à Nantes (44), à Clisson (44) et à St Brévin l'Océan (44).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) 27 données

Répandue et parfois abondante dans le Sud de l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Sud et l'Est du Morbihan, l'Alouette lulu est ailleurs un nicheur localisé et fait toujours défaut dans la majeure partie du Finistère et de l'ouest des Côtes-du-Nord.

Ille-et-Vilaine

2 chanteurs à l'Est de Pont Dom Jean/Paimpont le 9 juin, 3 chanteurs à Pléchatel le 10, 2-3 chanteurs à Sâtières le 11.

Côtes-du-Nord

1 chanteur le 26 mai à St Lambert/St Vran et 1 couple le 1er juillet à St Meleuc/Plénée Jugo.

Morbihan

1 nid contient 3 pulli le 13 avril à Pluherlin, 1 chanteur au même endroit le 9 mai... 1 chanteur à St Arzel/Bubry et 2 à Penvern/Persquen le 24 juin ; 2 chanteurs à Guillac le 26 ; 2 chanteurs à Carentoir le 27 et 1 à Bourgerelle/Arzel le 2 juillet ; cantonnée à Lescréan/Lanvéneon.

Loire-Atlantique

5 chanteurs le 6 avril autour de la Forêt du Gâvre.

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) 23 données

Premières le 21 mars à St Renan (29K), le 23 à Douarnenez (29S).
Puis 10 à St Aignan de Grandlieu (44) le 24 ; St Renan : 1 le 30, 35-40 le 31 et 40-50 le 3 avril... ; 200 près d'une colonie importante le 15 mai à Barac'h/Piélau (22) ; 40-60 cavités à Mandandil/Mubry (56) le 24 juin ; petites colonies sur la côte ouest de Batz (29N)... 4 nids à un carrefour du bourg de St Caradec (22) le 22 mai ; 1 nid occupé dans un talus récent à Raulois/Piémont (22) le 7 juillet. Ces dernières données témoignent de l'opportunisme de l'espèce quant au choix de ses sites de nidification.

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) 33 données

2 observations précèdent les autres d'une semaine ; 2 le 18 mars au Petit Vioreau/Joué sur Erdre (44) et 1 le 21 à Trenvel/Tréogat (29S).

Du 27 mars au 10 avril, l'espèce est observée dans tous les départements mais en petit nombre. Le temps froid qui règne alors sur la région est sans doute responsable du retard des migrants puis de leur arrivée regroupée.

1 le 27 à la Chèze (22) ; le 29, 3 à Séné (56) et 2 à Vannes (56) ; le 30 : 1 à Hillicon (22) ; 1 à la Trinité (56) ; 30 à Tréogat et 1 à St Renan (29N) ; 3 le 31 à St Renan ; le 2 avril, 1 à Belle-Ile (56) , 1 à Erbrée (35) et 1 à Tresboeuf (35)... Puis le 11, arrivée massive à Rennes (35) et Miniac-Sous-Bécherel (35).
Le passage est noté jusqu'à fin mai dans les îles du Finistère.
4 nids à Trielen/Molène (29N) le 9 juin ; 1 nid dans une étable le 21 juin à Bas Caingsap/Loudéac (22) et le 8 juillet à Larian/St Gonnery (56), fait rare dans cette région.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*) 25 données

Arrivée tardive dans les premiers jours d'avril : 3 le 1er à Ste Lucie (44) ; 1 le 7 à Orvault (44) ; 1 le 11 à Lanrivouaré (29N). Les observations ne deviennent régulières qu'à la fin du mois : 3 entre le 21 et le 23 à Banneg/Molène (29N) ; le 22, 3 à Quimper (29S) et 1 à Douarnenez (29S) ; 2-3 le 23 à Auray (56) ; le 25, 2 à Loudéac (22) et 3 cantonnées à Rennes (35) ; fort passage à Loudéac le 28... Les colonies ne sont occupées que progressivement en mai, alors que le passage se poursuit dans les îles.
Plus de 4 nids à Trielen/Molène (29N) ; 2 sites de nidification rupestre, dans les falaises de Plouha (22) le 9 juillet.

PIBIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) 19 données

Après la donnée précoce du 28 février (AR VRAN XI.1), 2 à St Suliac (35) le 22 mars ; 6 chanteurs le 6 avril en Forêt du Gâvre (44) ; 6 chanteurs le 7 à Basse Goulaine (44) ; 2 migrants à Ouessant (29N) les 20 avril et 2 mai et 1 à Brest (29N) le 21 avril.

Répartition :

Nous ne retiendrons que les données littorales et Nord-Finistère où les nicheurs sont rares.
Commun dans les Marais de Dol (35) le 1er mai ; 1 chanteur à Roch Ar Red/Plufur (22) le 19 mai ; 2 chanteurs en Forêt de Huelgoat (29N) le 31 mai ; 1 chanteur à Traon An Choat/St Jean du Boigt (29N) du 17 juin au 5 juillet et 1 chanteur à Scrignac (29N) le 30 juin.

PIBIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) 13 données

Reproduction : 2 nids contenant 4 oeufs chacun le 29 avril à Ouessant (29N) et le 14 mai à Carantec (29N). Transports de nourriture le 1er mai à Ouessant, le 2 juin à Taulé (29N) ; le 3 à Plougonven (29N) ; les 8 mai et 24 juin au Cloître St Thégonnec (29N) et à Ploumécour-Ménez (29N) le 30 juin.
4 pulli à Trenvel/Tréogat (29S), le 11 juin.
1 famille à Plounérin (22) le 7 juin.

PIBIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) 2 données

Derniers, 10-15 le 18 mars à l'étang du Beffou/Loguivy-Plougras (22) et 2 le 6 avril à l'étang du Moulin Neuf/Plounérin (22).

BERGONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*) 19 données

Sous-espèce flava : premières le 30 mars dans les Marais de Machecoul (44) ; le 1er avril à St-Etienne de Montluc (44)... mais le passage ne débute que le 28 à Ouessant (29N) et des isolés y sont encore notés en juin : 1 les 14, 15 et 20.
Sous-espèce flavissima : est notée plus tardivement sur la côte nord, le 14 avril, 4 à Plancoët (22), fort passage au Sillon du Talbert (22) et 1 à Lanrivocaré (29N) ; 1 le 26 à Poulquidou/Plouhinec (29S) ; 2 le 30 à Ouessant (29N)... 1 migratrice au même endroit le 12 juin.

Reproduction :

Sous-espèce flavissima : 3-4 couples dans les Marais de Dol (35) le 1er mai ; 5 à la ZIP/Brest (29N) le 21... 1 couple au Sillon du Talbert (22) le 3 juin.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) 13 données

Dernières Yarelli : 12 dont 2 couples formés le 18 mars à Loudéac (22).

Seul indice de passage, 1 le 3 avril à Litiry-Quéméné/Molène (29N).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) 7 données

Dans l'Archipel de Molène (29N) : 1 chanteur à Trielen le 9 juin, chant noté à Lédénez-Balaneg, 2 individus à Balaneg et transport de nourriture à Banneg.

Premières familles le 8 juin à St Jean du Doigt (29N).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) 5 données

Premières familles le 14 avril à Plougasnou (29N).

Nidification possible à Banneg, certaine à Lédénez-Balaneg et Trielen (Archipel de Molène -29N-).

BOUGEORCE (*Erithacus rubecula*) 3 données

1 juvénile à La Hardouinais/Merdignac (22) le 2 avril.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) 14 données

Toutes les données provenant de Loire-Atlantique, du Morbihan et surtout d'Ille-et-Vilaine. Dans ce dernier département, l'espèce est répandue dans une large bande allant du sud-est au nord-ouest.

Premier chanteur le 11 avril à Nantes (44), puis 1 le 19 à la Bosse de Bretagne (35) ; le 21 avril, 1 à l'aérodrome de St Jacques (35) ; le 27, 1 autre chanteur au site précédent et 1 au Pré Nasset/Rennes (35) ; 1 chanteur le 4 mai à Quéhellec/Ploumenez (56) ; 1 chanteur nocturne assidu sous la pluie le 15 mai, sur la ZI de Chantepie/Rennes ; 2 couples à St Suliac (35) le 19 et 4-5 chanteurs assidus à St-Saturnin/Pléchatel (35) le 10 juin. Toujours en Ille-et-Vilaine, 1 site à l'Epinay/Bourg-Barré, 2 à Fauchard/La Bosse de Bretagne, 1 au moulin de Rochereuil/Pancé, 1 à Les Epinettes et 1 au Gai Soleil/Fréc en Landée.

GORGEBLEUE A MIROIR (*Luscinia svecica*) 4 données

Notée uniquement en Loire-Atlantique.

Dans les Marais salants de Guérande, 1 chanteur le 21 mars, 4 o' le 15 avril. A Coëron, 1 o' le 15 avril et 1 p le 2 mai.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus phoenicurus*) 41 données

Passage important sur le littoral début avril, quelques oiseaux s'attardant jusqu'à la fin du mois.

1 à Douarnenez (298) le 25 mars ; à Belle-Ile (56), 16 (1 ♂) le 1er avril, 7 (1 ♂) le 2, 10 le 3 et 1 le 4 ; 1 le 4 à L'Île-Quénédès/Molène (298) ; 1 ♀ les 21 et 22 à Banneg/Molène ; 2 le 25 à Yoch/Porspoder (298) et 1 ♂ à Quessant (298) les 30 avril et 2 mai.

Ile-et-Vilaine

Premiers chanteurs le 2 avril à Vitré et St Laurent/Vannes.

Côtes-du-Nord

Premier chanteur le 10 avril à Loudéac ; 1 couple avec juvéniles à St-Brieuc le 5 juin ; 2 observations dans les falaises de Fréhel : 1 chanteur au Port du sud-est le 9 juin et 1 couple près de la sirène le 1er juillet.

Finistère

1 chanteur à Brest les 18 avril et 1er mai ; 2 chanteurs à Pont-Croix le 18 avril et 1 jeune ♂ chanteur à la réserve M.H Julien/Goulven le 21 avril ; 1 chanteur dans la carrière de Kerfaven/Ploudiry (298) le 22 avril. Ces trois dernières données sont restées sans lendemain et concernent peut-être des migrants.

Morbihan

1 chanteur à Pluvigner les 5 mai et 17 juin ; noté abondant à Vannes ;

Loire-Atlantique

9 données de chanteurs à Nantes.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) 16 données

Premières données : 1 le 14 avril à Eroë en Lanée (35) et 1 ♂ migrant le 15 au Prétanné/Morieux (22).

Ile-et-Vilaine

1 ♂ à Vitré le 26 mai et 2 sites de nidification à La Bosse de Bretagne ; l'un dans une cavité naturelle, l'autre dans un nichoir.

Côtes-du-Nord

Migrants isolés le 19 avril à St Méleuc, le 28 au Prétanné/Morieux (1 ♀).
La hétraie de la Forêt de Lorge semble abandonnée.

Finistère

Oiseaux de passage : 1 ♂ le 25 avril et 1 ♀ le 24 mai à Quessant.

Morbihan

3 chanteurs le 21 avril puis 1 couple le 30 mai en Forêt de Camors ; 1 chanteur le 21 avril en Forêt de Floranges.

Loire-Atlantique

1 chanteur les 5 et 29 mai à l'île de la Chênaie/St Julien de Concelles,
2 chanteurs à Nantes, l'un du 21 au 23, l'autre le 29 mai.

TRAQUET TARIEN (Saxicola rubetra) 16 données

Premier le 11 avril à La Prairie de Mauves/Nantes (44).
Des migrateurs sont notés jusqu'à la fin de mai : à Ouessant (29N)
3 le 10 mai, 1 le 17 et 1 le 24 ; 1 ♂ non cantonné dans les Landes de
Plouquennast(22) le 27.

Par ailleurs, les données proviennent de zones traditionnelles de
nidification à l'exception du Marais de Vilaine : prairies humides de
Loire-Atlantique et du nord de l'Ille-et-Vilaine, tourbières des
Monts d'Arrée (29N).

Le 5 mai, 10-15 couples à La Prairie de la Sauterelle/Thouaré (44) et
à La Prairie de Mauves/Nantes ; 1 couple le 8 à la Roche St-Barnabé/
Le Cloître St Thégonnec (29N) ; 1 le 9 aux Sources de l'Elorn/Sizun
(29N) ; 4 ♂ plus 3 ♀ le 10 dans les Marais de Dol (35) où 1 couple
alarme le 7 juin ; 2 familles le 23 juin dans le Yeux Elez/Brasparts
(29N) ; 1 transport de nourriture à la Roche St-Barnabé et 1 chanteur
au Cragou/Le Cloître St Thégonnec (29N) le 24 juin.

TRAQUET MOTTEUX (Oenanthe oenanthe) 38 données

Arrivée tardive : seulement 3 observations en mars, 3 le 20 à Lézé (44) ;
1 le 24 au Diben/Plougasmou (29N) et 1 le 31 à Brest (29N).

Passage important à la mi-avril, plus sensible dans l'intérieur, s'ache-
vant fin mai : 2 à Méleuse (35) le 9 ; 18 à La Prairie de Mauves/Nantes
(44) le 11 ; 2 à Rennes (35) le 12... 6 dont 2 de la sous-espèce
groënlandaise *Oenanthe oenanthe leucorhoa* aux Sources de l'Elorn/
St Cadou (29N) le 9 mai... 1-2 à la ZIP/Brest (29N) du 16 au 21.

Le suivi de certains sites montre que les migrateurs présentent souvent
un comportement de reproducteurs (chants, parades...) ; seules les ob-
servations faites en juin concernent sûrement des nicheurs locaux.
Dans les Monts d'Arrée : 1 couple à Roch Ar Feunteun/Le Feuillée (29N)
le 10 juin et 1 couple nourrissant au Tachenn Gador/Sizun, le 23 juin.

MERLE DE ROCHE (Monticola saxatilis) 1 donnée

1 ♂ le 27 avril au Roc'h Trévezel/Monts d'Arrée (29N) : il chante,
effectue le vol nuptial et alarme. Il sera recherché vainement le
10 juin.

C'est à notre connaissance la première observation en Bretagne de
cette espèce.

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*) 7 données

Début du passage le 10 avril : 1 ♂ à la pointe du Meinga/St Couloub (35) ; puis 4 le 14 à Créachquereguen/Plougasnou (29N) ; 1 ♂ et 1 ♀ à Belle-Ile (56) à la mi-avril ; 1 le 22 au Petit Chantilly/Orvault (44) ; 1 aux Fours à Chaux/Erbray (44) et à Bourg Chevreuil/Riaillé (44) le 23 et 7 à Quessant (29N) le 30.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) 5 données

1 nourrissage le 9 juin à Trielen/Molène (29N) et 3 couples à Banneg/Molène (29N).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) 3 données

Dernières observations : 70-80 le 18 mars à Plourac'h (22) ; 15 le 19 à Bodin/Loudéac (22) et 1 le 25 avril à la Bintinais/Rennes (35).

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) 7 données

Première famille le 8 mai à la Roche St Barnabé/Le Cloître St Thégonnec (29N).

Dans l'Archipel de Molène (29N), 1 chanteur le 9 juin à Trielen, 1 ponte à Nalaneg et 1 individu les 18 et 20 mai à Banneg.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) 6 données

20 en Forêt de Huelgoat (29N) et 110 à la Lande aux Eaux/Loudéac (22) le 18 mars ; 150 le 19 à Bodin/Loudéac ; 2 chanteurs le 21 à Costaner/Douarnenez (29S) ; 50 en dortoir le 24 à St Brandan (22) et derniers passages nocturnes le 31 à Loudéac.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) 25 données

Les données proviennent principalement du Nord-Finistère où l'espèce est localisée et par conséquent mieux notée.

Nourrissage des 2èmes nichées observé à partir du 18 juin.

BOUSCARLE DE CETTE (*Cettia cettia*) 34 données

La plupart des données proviennent de l'aire de répartition de l'espèce telle qu'elle était définie à l'issue de l'inventaire atlas de 1975 (cf Histoire et Géographie des oiseaux de Bretagne - Ar Van Tome VIII. J.Y. Monnat et Y. Guermeur P. 152). Sept données proviennent néanmoins de cartes non notées dans l'inventaire :

Au Vergas/Scrignac (29N) (carte de Morlaix), 1 chanteur est entendu les 21 avril, 26 mai et 23 juin, à l'Etang des Forges et à Timadec/Bréhan

(56) (carte de Loudéac), 2 chanteur sont notés le 25 juin. Une famille à l'Etang du Band/Bennvic (29N) (carte de Plentin) le 27 juin. A la Villée/Loudéac (22) (carte de Loudéac), un individu transportant de la nourriture est noté le 4 juillet.

Le vide que la carte de répartition montre en 1975 n'est donc que très lentement comblé sur ses franges.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) 22 données

Le premier chanteur est entendu le 3 avril à St Fabu (29N).

A l'exception d'un individu noté à Thouaré Sur Loire (44) dans les cultures et un autre à Versha/Le Gâvre (44), toutes les données sont littorales et se répartissent comme suit : 1 d'Ille-et-Vilaine, 1 des Côtes-du-Nord, 11 du Finistère, 6 du Morbihan.

Sur le littoral Léonard, où l'espèce semble avoir régressé (Jacques Macout, Comm. or.), 4 sites ont cependant été notés ce printemps : St Fabu, Landéda, Carnic/Guissény et Pont Christ/Plouescat.

LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*) 13 données

Les premiers chanteurs sont notés le 21 avril au remblai de Lavan (44) et à Kerdual/La Trinité (56) - en 7 ans d'actualités les arrivées sont toujours notées dans la 1ère moitié d'avril -.

Les données proviennent de trois principaux types de milieux :

- Zones marécageuses (Remblai de Lavan (44), Kerdual/La Trinité (56), Marais de Dol (35), St Lumine de Coutais -44-).
- Couples dans les massifs forestiers (Forêt du Gâvre (44), Forêt de Rennes (35), Forêt de Chevré -35-).
- Landes (Aérodrome/St Jacques (35), Yeun Elez/Notre-Dame (29N), Roc'h Ar Feunteun/Ploumécour-Ménez -29N-).

Cette espèce, comme de nombreux autres passereaux, pose un problème. Les preuves de nidification sont rares et l'on peut se demander si ces observations concernent toutes des nicheurs ou si au contraire, certains migrants ne chanteraient pas dans certains sites pendant une période plus ou moins longue avant de disparaître.

LOCUSTELLE LUSCINOIDE (*Locustella luscinioides*) 8 données

Le premier chanteur n'est noté que le 20 avril à Kerzo/Brech (56) (les actualités ornithologiques de 1967 à 1974 donnent généralement les premières observations dans la 1ère décade d'avril).

A Kerdual/La Trinité (56), où l'espèce ne niche pas, des chanteurs sont notés les 21 et 28 avril. Toutes les données proviennent du Sud Morbihan où de Loire-Atlantique où l'espèce est assez commune.

LOCUSTELLE SP (*Locustella sp*) 1 donnée

Un individu à l'île de Lavau (44), le 7 juin.

PHRAGITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) 14 données

Le premier chant est noté le 26 mars à Lannéon/Lanrivouré (29N), date tout à fait normale.

Comme pour l'espèce précédente certains chants sont à attribuer à des migrateurs : le 16 mai, un individu chante dans la lande à Noc'h Hir/Ouessant (29N), de même le lendemain à Pen Ar Noc'h/Ouessant.

A Kerdual/La Trinité (56), 10 à 12 chanteurs sont notés le 21 avril alors que le 30 juin seulement 4 chanteurs se manifestent.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) 25 données

Le premier chanteur est noté à une date classique le 12 avril à Trével/Tréogat (29S).

D'autre part toutes les données coïncident avec ce que l'on connaissait de la répartition de l'espèce à l'issue de l'Atlas de 1975.

Un nouveau site à remarquer : l'Etang du Band/Henvic (29N) où un couple a niché dans des saules, comme c'est le cas également dans la région de Rennes (35) où les phragmitaies sont rares.

ROUSSEROLLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*) 2 données

Au remblai de Lavau (44), 1 chanteur le 21 avril et 8 chanteurs le 7 juin.

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*) 17 données

Le premier chanteur est noté à Nantes (44) le 20 avril, ce qui n'est pas une date des plus hâtives.

Il n'y a aucune nouveauté par rapport à l'Atlas de 1975. Les observations les plus occidentales sont les suivantes : 1 chanteur le 31 mai à Kernec/Languidic (56) ; 1 chanteur à Garland/Loudéac (22) le 17 juin ; 1 chanteur dans les Falaises de Plouha (22) le 9 juillet (aucune donnée n'était parvenue de cette région depuis 1975).

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 21 données

L'espèce est notée sur toute la période. Le premier chant est entendu à Conveau/Gourin (56) le 6 avril. Le premier nourrissage est noté en Baie de St Aubin (22) le 12 juin.

On peut également retenir le fait qu'en Haute Bretagne, où les landes d'ajonc sont plus rares, l'espèce colonise les "coupes" en forêt : Forêt de Pennes (35), bois de Chinsève/St Aubin d'Aubigné (35), Forêt du Gâvre (44).

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) 9 données

Jusqu'en 1973 elle est toujours notée, et ce assez rarement, pendant les mouvements postnuptiaux, de trois sites : Ouessant (29N), Cap Fréhel (22) et Hoëdic (56). Le 12 mai 1973 un individu, très certainement migrateur, est observé à l'île de Sein (29S). Le 7 juin 1975 un chanteur est entendu dans une friche littorale sur la commune de Trédrez (22).

Depuis les observations printanières se sont multipliées dans différentes zones littorales (Crozon (29S), Baie de St Brieuc (22), Pointe du Meinga -35-) ; des chanteurs cantonnés ont été entendus à 15 jours d'intervalle (20 mai - 3 juin 1981 à la Pointe du Meinga/St Coulomb -35-) et des alarmes ont été notées (8 juillet 1981 à Pordic -22-). Ceci nous permet raisonnablement de soupçonner la reproduction de l'espèce sur le littoral breton.

Le fort contingent de données de 1984 confirme cette augmentation du nombre des observations mais n'apporte pas de preuve de reproduction. Le problème posé est de savoir si ce sont les observateurs qui détectent mieux l'espèce depuis quelques années, ou si c'est l'espèce qui devient plus fréquente en migration, voire en reproduction ?

A Ouessant (29N), un individu est observé à An Rhu le 16 mai, un chanteur est cantonné pendant une semaine à Stang Koz à partir du 17 mai et enfin un autre chanteur est entendu à Stang Porz Guen le 24 mai. A Ste Anne/Plouzané (29N), 1 chanteur est entendu les 16 et 18 mai. A la Pointe des Guettes/Willion (22), 2 chanteurs entendus le 27 mai et sont réentendus 8 jours plus tard. A la Cavale Blanche/Brest (29N), 1 chanteur est noté le 29 mai. Enfin, un chanteur est entendu à Notre Dame de l'Espérance/Etales Sur Mer (22) le 30 juin.

Il va sans dire qu'il serait opportun qu'en 1985 (dernière année de l'Atlas 10 X 10), les observateurs fassent un effort particulier sur cette espèce afin d'en préciser le statut.

FAUVETTE GRISÈTE (*Sylvia communis*) 29 données

Les premiers chanteurs sont entendus en Loire-Atlantique : 1 le 13 avril en Forêt du Gâvre ; 1 le 14 avril à Ancenis et 1 le 15 avril à Thouaré. Les autres départements ne fournissant leurs premières données qu'une semaine plus tard. Ce phénomène semble assez constant à travers les actualités d'Ar Vran : les arrivées sont assez échelonnées du sud vers le nord. D'autre part, ces premières dates sont tout à fait normales pour l'espèce.

Quant à l'abondance de l'espèce, deux données semblent contradictoires : le 3 juin, 15 à 20 chanteurs sont notés au Burgo/Granchamp (56) et un haqueur opérant à Penmryn/Raden (56) "toujours pas abondante" ce printemps.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) 20 données

Le premier chanteur est entendu le 14 avril à Guignen (35), ce qui n'est pas particulièrement précoce.

La première famille est notée en Forêt d'Huelgoat (29N) le 5 juin.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) 15 données

Le premier chant est noté le 21 mars à Brest (29N).

A Quessant (29N), des ♂ migrants sont notés les 1er et 11 mai et l'espèce y est trouvée nicheuse pour la première fois à Parc Oulenn.

La première famille est signalée le 7 juillet à Pleyber-Christ (29N), ce qui est plutôt tardif pour une première date et qui concerne vraisemblablement une seconde nichée.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) 2 données

Les premiers chanteurs sont entendus en Forêt du Cêvre (44) le 20 avril et à la Bosse de Bretagne (35) le 23 avril.

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) 24 données

Une donnée exceptionnellement précoce : un chanteur est entendu en Forêt du Vioreau/Joué Sur Erdre (44) le 18 mars, précédant d'un mois les arrivées normales :

un chanteur en Forêt de Juigné (44) le 18 avril ; un chanteur en Forêt de Florange/Camors (56) le 21 avril ; nombreux chanteurs dans le Bois du Périoux/Guignen (35) le 22 avril ; un chanteur dans le Bois du Belec/Plouénecour-Ménez (29N) le 23 avril...

Quelques données indiquent des densités qui peuvent être importantes : le 28 avril dans le Bois de Champaufour/Thorigné (35) (50 ha), 8-9 chanteurs ; le 1er mai en Forêt de Lorge (22), 5 chanteurs sur 1 km de hêtraie ; le 16 mai en Forêt de Loudéac (22), 4 chanteurs pour 300 m de futaie ; le 2 juin en Forêt de Lanvaux/Pluvigner (56), 20-40 chanteurs.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) 14 données

Des mouvements migratoires ont été nettement décelés : au Prétanné/Morieux (22), 15 individus de passage sont capturés au filet le 15 avril ; à Quessant (29N), des migrants sont notés les 10, 11 et 14 mai.

Pour ce qui concerne la reproduction, des constructions sont notées en avril : 1 individu construit au Launay/Scrignac (29N) le 15 et un autre à Quélisoye/Larmor Plage (56) le 25.

La première famille est observée le 16 juin à Mesqueau/Plouzanou (29N).

Enfin, un couple a résidé sur Banneg/Molène (29N) ce printemps.

Un individu au chant mixte (début fitis - fin vélocé) a été entendu à l'Étang du Bourg/St Nanan (29N).

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) 34 données

Les premiers sont notés en Loire-Atlantique : 1 le 30 mars à Port La Roche/Fresnaye en Retz et 10 à 20 dans les prairies de Mauves Sur Loire le 1er avril.

17 données sont du mois d'avril, contre 16 en mai et 8 en juin. Quand on sait que le Pouillot fitis est typiquement l'espèce qui chante en migration, on peut penser qu'une certaine proportion des oiseaux notés en avril sont des migrateurs. Par exemple, il est assez difficile de noter l'espèce dans le sud-est de l'Île-et-Vilaine en mai et juin. Il serait donc souhaitable que les observateurs notent systématiquement l'espèce et essayent de surcroît, d'obtenir des indices de nidification de manière à préciser son statut en Bretagne.

A Ouessant (29N), des migrateurs sont notés régulièrement jusqu'au 24 mai. Le premier nourrissage est noté à Ploumérin (22) le 7 juin.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) 8 données

Par rapport à l'Atlas de 1975, une nouveauté est à signaler : un chanteur est entendu le 16 juin à Ramonette/Le Palais (56), ce qui constitue à ce jour la seule donnée printanière pour les îles de la côte sud. En outre, une ♀ est observée à Banneg/Molène (29N) les 21, 22 et 23 avril.

ROITELET TRIPE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) 14 données

Une ♀ a également séjourné à Banneg/Molène (29N) du 21 avril au 1er mai. Les autres données proviennent d'un peu partout en Bretagne.

La densité de l'espèce semblerait plus importante dans le Finistère qu'ailleurs. Signalons :

3 chanteurs sur 3 km de futaie en Forêt de Lorge (22) le 1er mai ; au moins 5 chanteurs à La Coudraie/Ploumécour Lanvern (29S) le 26 mai ; 2 à 3 chanteurs à Ménez Neur/Ranvec (29N) le 3 juin et 1 chanteur à Locoal/Canors (56) le 5 juin.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) 28 données

Nous sommes en présence d'une donnée exceptionnellement précoce : un individu est observé au Stangalard/Brest (29N) le 17 mars.

Une seconde observation est également précoce : un individu à Ster Vraz/Sauzon (Belle-Ile -56-) le 4 avril.

Ensuite le gros des arrivées se fait à partir du 1er mai.

Habituellement, chez cette espèce, les arrivées commencent aux alentours du 15 avril pour s'intensifier fin-avril, début-mai.

A Ouessant (29N), l'espèce est notée 4 fois du 1er mai au 8 juin. Il s'agit très certainement de migrateurs puisqu'aucun indice de nidification n'a été rapporté.

Par ailleurs, un adulte nourrissant un juvénile est observé le 14 juin à l'Ecluse de Gueltas (22) ainsi que 2 adultes nourrissant à Pleyber-Christ (29N) le 30 juin.

GOËMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) 11 données

C'est le record absolu des données printanières !

Les 14 et 15 avril, 1 ♂ est observé au Haldras/Vallet (44) ainsi qu'une ♀ le 23 avril à Kervan/Ploemeur (56). Toutes les autres données, concernant chaque fois un individu, proviennent de Ouessant (29N) : le 25 avril à Kerhuel, le 27 au Stiff, le 29 à Kernoeas et Kadoran, le 30 au Pern et le 1er mai à Gouzoul, Croix-Rouge et Lampaul.

MESANGE A MOUSTACHES (*Parus biarmicus*) 3 données

2 à 3 couples à l'Etang de La Roche Sèche/Erdeven (56) le 17 mars ;
1 couple sur les bords de la Loire à Thouaré (44) le 1er avril ;
2 individus à Kervran/Plouhinec (56) le 6 mai.

Qu'est devenue la population finistérienne ?

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) 10 données

Le premier nid est trouvé au Tertre Brandfort/Plancoët (22) le 22 avril et la première famille est observée à Landgazel/Trémaouézan (29N) le 14 mai. D'autres familles seront ensuite notées régulièrement pendant toute la période.

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*) 8 données

Un indice d'abondance : 3 chanteurs sur 3 km de futaie en Forêt de Lorge (22) le 1er mai.
Le premier nourrissage est noté le 31 mai à Huelgoat (29N) et la première famille est vue le 2 juin à Lesquiffiou/Pleyber-Christ (29N).

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*) 11 données

Des familles sont observées pendant toute la période à partir du 21 mai, à Coatmeur/Landivisiau (29N).

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) 24 données

Il semble que les observateurs s'intéressent particulièrement à cette espèce.

Le problème réside dans le fait que 8 données sont de mars et 7 d'avril. Cette espèce ayant l'habitude de chanter en hivernage, il est difficile de faire la part des hivernants et des nicheurs lorsqu'ils ne sont pas réobservés par la suite.

Voici les lieux où l'espèce niche probablement ou certainement :

Pleyber-Christ (29N) : 1 famille le 7 juillet ; Forêt de Huelgoat (29N) : chanteurs notés les 21 avril, 18 mai, 31 mai et 2 juillet ; Forêt du Beffou (22) : 2 chanteurs le 1er juillet ; Douarnenez (29S) : 1 individu les 17 et 31 mai ; Plouneour-Ménez (29N) : des chanteurs sont notés les 5 mai et 30 juin.

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) 5 données

Le premier nid est noté le 3 avril à Trévron (22) et les premiers jeunes à Roc'h Ar Red/Plufur (29N) le 19 mai.

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*) 6 données

Un chanteur est entendu à Kernigou/Ouessant (29N) le 1er mai.

Une ponte est en cours au Prétanné/Morieux (22) le 25 avril et les premiers pulli sont notés à l'île Werthou/Trénacouézán (29N) le 9 juin dans une épave d'auto !

SITELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) 19 données

Des chants sont notés pendant les mois de mars, avril et mai.

Un nid en cours de maçonnerie est observé à Bodin/Loudéac (22) le 17 avril.

Un individu transportant de la nourriture est noté le 31 mai en Forêt de Huelgoat (29N).

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) 3 données

Une famille est observée à Ste Anne di Portzic/Brest (29N) le 5 juin et une autre à Morlaix (29N) le 6 juillet.

MESANGE REMIZ (*Remiz pendulinus*) 1 donnée

Un mâle est observé dans le Marais de Machecoul (44) le 30 mars. Il s'agit de la prolongation du phénomène d'hivernage exceptionnel que l'espèce a connu au cours de la période précédente.

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) 18 données

Une observation est particulièrement précoce : 1 individu au Bois de St-Aignan-Grand-Lieu (44) le 7 avril.

Le passage s'est fait très fortement sentir à Quessant (29N) du 24 avril au 11 juin. Les observations de 1 à 2 individus concernent toujours des σ^7 , souvent chanteurs. C'est un total de 9 données qui nous parvient de l'île. Toujours concernant la migration, un chant est très probablement entendu à Ste Anne du Portzic/Brest (29N), le 25 avril.

Les autres observations, qui concernent toutes vraisemblablement des nicheurs, proviennent d'Ille-et-Vilaine où l'espèce semble toujours assez bien établie et peut même être localement abondante : dans l'ensemble des Polders de la Baie du Mont St-Michel et des marais annexes (Dol, Lilleder et Châteauneuf), 10 à 15 chanteurs ont été notés de mai à juillet, avec un jour une observation de 7 individus ensemble. On peut estimer à 10-15 couples la population de cette zone qui, il faut le souligner, est très riche en grandes peupleraies que l'espèce affectionne particulièrement.

GEAI DES CHENES (*Garolus glandarius*) 4 données

Le premier nid est trouvé à St-Ilan/Languèux (22) le 29 mars et la 1ère famille à Kerfaven/Ploudiry (29N) le 22 avril.

À l'île Chevalier/Pont l'Abbé (29S), un individu aux yeux malades ou crevés est vu le 20 mai.

À Ancenis (44), une prédation sur un Moineau domestique est notée le 18 juin.

PIE BAVARDE (*Pica pica*) 1 donnée

La 1ère famille est vue à Trédrez (22) le 27 avril.

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) 29 données

Léon (29N) : un couple parade en mars à Corsen/Plouarzel sur un site qui n'avait été apparemment fréquenté que par des oiseaux non reproducteurs ces dernières années. Une observation non datée nous parvient du secteur de la Pointe de St-Mathieu/Plougonvelin.

Quessant (29N) : le 29 avril, 2 oiseaux sortent d'une faille à Poull Yvern ; le 30 avril, une femelle couve à Kadoran ; un oiseau s'engouffre dans une faille près du Yusin et un individu alarme à Loc Gweltas. La production en jeunes semble avoir été très faible, la cause pouvant en être les conditions climatiques défavorables du mois de mai.

L'Archipel de Molène (29N) fait l'objet d'observations régulières : 2 à Banneg les 9 et 16 juin ainsi que le 2 juillet.

Presqu'île de Crozon (29S) : 2 couples sont vus sur la côte sud de la Pointe de Pen Hir/Camaret le 28 mars ; le même jour il y en a 3 à Goulien/Crozon. Le 31 mars et les jours suivants un couple est installé

sur un site à la Pointe de Pen Hir ; le 5 avril, un couple est vu au Toulinguet/Canaret ; le même jour, 6 oiseaux se nourrissent sur la dune de Pen Hat/Canaret.

Cap Sizun (298) : peu de données sur ce secteur, signalons seulement : 3 dont 1 couple le 25 avril à la Pointe du Paz/Ploqoff et surtout 8 dont 3 juvéniles le 1er juillet à Kastell ar Roc'h/Goulien. René Bozec note des "contacts plus fréquents qu'en 1983".

Pelle-Ile (56) : le 1er avril, 1 à la Pointe St Marc ; le 2 avril, 1-2 sur un site de nidification à la Pointe du Talut alors qu'un couple construit au Grand Guet ; le 3 avril, un couple construit à Ragen Hir ; un autre pénètre dans une grotte à Er Hastellie, alors qu'un oiseau se trouve à Raluden ; le 4 avril, 1 couple à Koh Kastell.

En 1975, la population bretonne de Craves était estimée à 30-45 couples, en 1982, la fourchette était tombée à 23-25 couples. Nous croyons pouvoir réévaluer cette estimation à 30-38 couples, au vu des données transmises cette année.

CHOCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) 25 données

La première construction est observée au Musée de St-Brieuc (22) le 17 mars et les premiers juvéniles sont notés à l'Eglise de Tonquédec (22) le 30 juin.

Dès début juillet la dispersion est sensible :

30 à Ste Marbe/Plouharnel (56) le 1er juillet ; 5-10 à l'Etang du Moulin/Québric (35) le 5 juillet ; 100 à Coaren Keraudy/Plougar (298) le 8 juillet ; 15 à Quémec'h Yacumk/Plouyé (298) le 15 juillet.

Dans le clocher de l'Eglise de Plouyé, un couple est noté plusieurs fois du 4 au 8 avril. L'espèce n'a pas été vue depuis 15 ans. Faut-il y voir une réinstallation ?

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) 16 données

6 données proviennent du Léon (298) et 7 de Loire-Atlantique, ce qui confirme ce que l'on connaissait de la répartition de l'espèce en Bretagne depuis 1975.

De plus, il faut remarquer que 6 des données de Loire-Atlantique concernent de nouvelles corbeautières, ou en tous cas de corbeautières nouvellement découvertes, certaines étant parfois importantes : 160 nids à l'île Hélet/Le Frêne Sur Loire. Ce fait démontrerait-il une tendance à l'expansion ou simplement une meilleure prospection sur le terrain ?

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corax corax*) 7 données

Première construction le 21 mars à Brest (298) et premiers oeufs le 25 avril à l'île d'Yoc'h/Landunvez (298).

Un rassemblement de 200 individus au Quillin (22) le 5 avril.

CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone cornix*) 1 donnée

Un individu est observé à Morgat/Crozon (29S) le 17 mars.

Pour cette espèce, il faut se méfier d'une confusion possible avec des cas d'albinisme partiel qui peuvent présenter un plumage très semblable, ce qui fut notamment le cas dans la région de Plonéis (29S) dans les années 1970-1972.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)

En dehors des sites connus de nidification : 1 à Banseg/Hanvec (29N) le 16 mars ; 1 à Guerlesquin (29N) le 18 mars ; 1 à Trédudon/Plounéour-Ménez (29N) le 4 avril ; 2 au Roc Trévélz/Cosmana (29N) et 2 posés en Forêt de Bodvarec/Lozmaria Berrien (29N) le 6 avril ; 1 à Ste Anne du Portzic/Brest (29N) le 17 avril ; 2 au Belecq/Plounéour-Ménez (29N) le 23 avril ; 1 à Rosnoën (29S) le 10 juin ; 2 en vol au-dessus de la Forêt d'Argol (29S) le 16 juin ; 2 à la Roche St Barnabé/Le Cloître St Thégonnec (29N) le 24 juin ; 1 à Roch ar Feunteun/Plounéour-Ménez (29N) le 30 juin.

Nidification :

39 sites ont été contrôlés en 1984, une douzaine d'autres, connus, sont probablement occupés, 1 est en voie de colonisation dans les Montagnes Noires, 2 localités intérieures ont vu se dérouler des parades.

6 localités intérieures sont maintenant connues. Les nids y sont situés : dans une carrière en exploitation (2 cas) ou hors exploitation (2 cas dont 1 en cours), dans une falaise (1 cas) ou sur un arbre (1 cas).

Il apparaît clairement que les 50 couples constitués la population estimée de 1975 sont maintenant dépassés. Compte-tenu de la sous estimation liée à la difficulté de repérer les couples continentaux, nous proposons une nouvelle estimation de 70 ± 5 couples.

Nous ne pouvons que convier nos correspondants à rechercher l'espèce dans les carrières et sur les falaises intérieures. De même, il convient de suivre les manifestations des bandes d'immatures, Gérard MOYSAN (Ar Vran IX - 1980) ayant prouvé qu'elles pouvaient porter en germe des couples nicheurs.

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) 1 donnée

Une ponte est trouvée à Balaneg/Molène (29N).

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) 1 donnée

Un couple construit dès le 16 mars à Caulnes (22).

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) 11 données

Les premiers nourrissages sont notés le 14 juin à la Ville Gleuhiel/Guégon (56) et le 20 juin au Pré Namet/Pennes (35).

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) 4 données

Le premier nid est trouvé le 7 avril à Coataner/Douarnenez (298) et la première famille est observée le 9 mai à Maser Al Lann/Guiclan (298). Le 1er mai en Forêt de Lorge (22), 8 chanteurs sont comptabilisés sur 3 km de futaie.

SERIN CINI (*Serinus serinus*) 6 données

Toutes les observations concernent des chanteurs dont 3 à Ramonette/Le Palais (56) les 15 et 16 juin.

VERDIE D'EUROPE (*Carduelis chloris*) 3 données

Un groupe de 80 est encore observé au port du Légué/St-Brieuc (22), à l'endroit où l'on décharge les céréales, le 22 mars. A Banseg/Molène (298), 2 individus sont notés du 21 avril au 1er mai. Le premier nourrissage est noté le 22 avril à Kerfaven/Ploudiry (298).

CHARDONNET ELEGANT (*Carduelis carduelis*) 4 données

A Banseg/Molène (298), 2 individus sont observés du 27 avril au 1er mai et à Lampaul/Ouessant (298), un individu construit le 1er mai. Par ailleurs, les premiers pulli sont observés le 10 juin à Plouhinec (298).

TAPIN DES AUNES (*Carduelis spinus*) 6 données

200 à 300 individus sont encore notés en Forêt du Câvre (44) le 16 mars. A Lambel/Camors (56), un couple dont le ♂ chante, est observé dans une plantation de résineux le 8 avril. La dernière observation en ce lieu sera faite le 21 avril.

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) 10 données

Le 16 mars, 500 individus sont observés dans des vignes à Carquefou (44). Le premier chant est noté à Lannuzouarn/Plouénan (298) le 18 avril. Une bande de quelques dizaines d'individus (entre 20 et 50) est notée régulièrement sur Banseg/Molène (298) du 21 avril au 13 mai et une d'au moins 20 individus est observée à Balaneg/Molène les 12 et 13 mai. Le premier nourrissage est enregistré à Ouessant (298) le 30 avril.

BECCOISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) 10 données

L'invasion de l'espèce qui s'est déjà manifestée en fin de période précédente se poursuit assez longuement au printemps.

En Forêt du Gâvre (44) du 24 février au 6 avril, plusieurs bandes de 2 à 10 individus sont observées ; à St Brandan (22), 4 individus sont observés dans des pins le 21 mars et 7 individus le 17 avril ; en Forêt de Lanouée (56), un couple dont le mâle chante est observé et plusieurs individus sont entendus le 28 mars, 4 individus dont 1 o' sont observés en deux points différents le 29 mars.

A Lambel/Camors (56), un couple construit le 8 avril et un mâle discret cherche de la nourriture le 21 avril.

En Forêt de Camors (56), 15 individus criant sont observés le 5 mai ; dans les Landes de Locarn (22) un o' et une q sont observés le 13 mai. Enfin, 23 individus sont encore signalés en Forêt de Lorge (22) le 17 mai.

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) 12 données

Première famille le 15 mai à Gommenec'h (22).

GROSBEK CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) 12 données

Au Parc des Bois/Rennes (35), un couple observé le 15 avril est réentendu le 6 mai.

A St Aignan-Grand-Lieu (44), un nouveau site est découvert les 14 et 23 avril dans le Bois de l'Halbrandière ; un individu est observé en avril à La Chapelle Sur Erdre (44).

A La Mothe/Quimperlé (29), un couple est observé à plusieurs reprises les 4, 5 et 6 mai.

A St Laurent/Rennes (35), un individu est aperçu en vol le 4 juin. Toujours à Rennes, 3 individus sont notés pendant toute la période Rue des Plantes.

Enfin, un couple nourrit 2 jeunes le 13 juillet à la Gobinière/Orvault (44) (1ère preuve de nidification depuis l'Atlas de 1975).

BRUNET LAPON (*Calcarius lapponicus*) 1 donnée

L'observation la plus tardive à ce jour en Bretagne est faite à la ZIP de Brest (29N) le 28 avril.

BRUNET JAUNE (*Emberiza citrinella*) 2 données

A Prat Ar Roué/Cuessant (29N), un chant incomplet est entendu le 20 juin. C'est la seule donnée pour l'espèce sur l'île.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirius*) 8 données

Deux données semblent concerner des migrateurs : 9 individus à Morieux (22) le 7 avril parmi des Linottes et un individu au Sillon du Talbert (22) le 15 avril.

La première famille est notée le 27 mai à Kerandraon/Plonéour-Lanvern (298).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) 3 données

Cette espèce d'apparition très rare en Bretagne s'est montrée 3 fois ce printemps :

- 1 ♂ aux Moutiers en Retz (44) le 21 avril ;

- 1 couple à Néganne (56) le 23 avril ;

- 1 ♂ à Molène (294) le 30 avril.

Remarquons la simultanéité des observations.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) 17 données

La fin de l'hivernage est encore perceptible en début de période : le 16 mars, un rassemblement de 100 individus est observé dans des vignes à Carquefou (44). Un mâle non nicheur est observé le 12 mai à Ouessant (298).

En ce qui concerne la reproduction, un nid avec 3 oeufs est trouvé à La Villejean/Le Modéo (22) le 9 juin et la première famille est observée au Band/Henvic (298) le 16 juin.

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*) 13 données

Sur ces 13 données, 7 proviennent de sites intérieurs.

Les 3 données de Loire-Atlantique (Mauves, Thouaré et Haute Goulaine) ne sont pas une nouveauté par rapport à l'Atlas de 1975.

La donnée du centre de l'Ille-et-Vilaine (Aérodrome de St-Jacques) montre, par rapport à cette référence, une progression vers l'ouest d'une vingtaine de km, dans une plaine remembrée, et ce depuis 1980. La donnée du Finistère (Roche St Barnabé/Cloître St Thégonnec) est révélatrice d'un autre phénomène : l'"escalade" des cultures jusqu'aux crêtes des Monts d'Arrée.

Quant aux données des Côtes-du-Nord (Trévé) et du Morbihan (St Gonnery), qui proviennent de deux sites très voisins de la grande "plaine" du centre Bretagne, elles sont le reflet d'un déplacement plus récent et surtout plus important.

Enfin, une donnée littorale est intéressante à rappeler : un chanteur est entendu le 22 avril à Pont Rouault/Planguenoual, sur le littoral de la Baie de St-Brieuc (22) où l'espèce était absente en 1975.

Tout ceci semble bien confirmer la progression de l'espèce telle qu'elle aurait été soupçonnée en 1975.

ERRATUM

Concernant le tome XI-1 :

- Mergule nain : lire au 16 janvier, Menez Hon/Plosodiern à la place de Menez Han/Kerlouan (page 80).
- Grive draine : à la place du 17 décembre à Cast, il faut lire 17 février (page 86).
- Pinson des arbres : le premier chant noté à Coené (35) est du 19 février et non du 19 janvier (page 90).





BIBLIOGRAPHIE ORNITHOLOGIQUE BRETONNE : LE GOLA ---

Nous avons décidé de relancer cette chronique fort prisée en son temps et d'un intérêt non négligeable : AR VRAN n'ayant, heureusement, pas le monopole de ce qui s'écrit sur l'avifaune bretonne, il nous est apparu important de mettre à la disposition de nos lecteurs un matériel bibliographique complet.

Il nous a semblé judicieux de présenter dans ce cadre, les publications internes à notre région et qui ont fleuri depuis quelques années. Aujourd'hui nous commençons par le bulletin du GOLA (Groupe ornithologique de Loire-Atlantique) qui est associé à AR VRAN (voir adresse page 1).

Bulletin n° 1 (juin 1983) *****

- Synthèse des fichiers d'observation
- Les Phalaropes en Loire-Atlantique
- Observation d'un Goéland à ailes blanches
- Le passage des Grues en Bretagne et en France
- Les comptages BIRCE Limicoles de janvier 1983
- Observation d'un comportement grégaire de Busards des roseaux au lac de Grand-Lieu
- Le Parc animalier de Brière

Bulletin n° 2 (février 1984) *****

- Synthèse des observations : Prénuptial, Nidification, Estivage
- Note sur le nourrissage du Pétrel taspète et réaction de ce Pétrel A... la taspète
- A propos d'une Aigrette noire
- Baguage au Migron (Frossay -44-) : premiers résultats
- Une enquête "nicheurs" en Loire-Atlantique, Pourquoi ? Comment ?
- Avifaune de la Vallée de La Loire en amont de Nantes ou le chaînon manquant : premiers résultats
- Note sur les observations de Mésanges réziz en erratisme postnuptial dans l'ouest de la France
- Chronique ornithologique, ou à l'ouest du nouveau... venu de l'est

Bulletin n° 3 (juin 1984) *****

- Synthèse des observations : Postnuptial et Hivernage
- Sortie concertée "Pics" en Forêt du Gâvre
- Opération concertée "Limicoles nicheurs" en Brière
- Mortalité d'oiseaux marins en janvier et février 1984
- Observation de Goélands nordiques pendant l'hiver 1983-1984 et notes sur leur identification
- Hivernage d'un Pygargue à queue blanche en Brière
- Fichier géographique : où en est-on ?

Bulletin n° 4 (janvier 1985)

- Synthèse des observations : Prénuptial, Nidification, Estivage
- Observation de Mouettes de Sabine en embouchure de Vilaine
- Vous avez dit Stern ? es ist ein skandal !
- L'opération Busards cendrés dans le Marais de Bourgneuf
- L'enquête Râles des genêts en Loire-Atlantique
- Le Pic noir à Vloreau : premières rencontres
- L'hirondelle de rivage en Loire-Atlantique
- E la Nave va
- Faits divers



CHRONIQUE DE DÉTERMINATION :

DEUX GOÉLANDS À BEC CERCLE (*Larus delawarensis*) EN BAIE D'AUDIERNE

L'observation récente de Goélands à bec cerclé dans notre région nous a amené à envisager la création d'une rubrique consacrée à la détermination d'espèces rares ou moins rares.

La première chronique est due à Pierre YESOU dont nous avons repris son article paru dans le Bulletin AR VRAN Sud-Finistère n° 5. D'autres suivront dans le but de créer un dossier pratique à l'intention des ornithologues n'ayant pas les moyens d'acquérir une bibliographie complète.


Le 15 avril 1982 en fin de matinée, le reposoir de Laridés de l'étang de Nérizélec regroupait quelque cent mouettes rieuses, une trentaine de mouettes pygmées, trois mouettes mélanocéphales, un goéland brun, et ce qu'au premier coup de jumelles je pris pour quatre goélands cendrés : un adulte et trois oiseaux de première année. Une observation plus précise à la longue-vue m'apporta une première surprise : l'oiseau que j'avais pris pour un adulte de goéland cendré était en fait un sub-adulte de goéland à bec cerclé. Une comparaison détaillée entre cet individu et les trois jeunes oiseaux qui l'accompagnaient créa une surprise encore plus grande : un de ceux-ci était un jeune goéland à bec cerclé ! J'ai pu observer ces oiseaux pendant plus de deux heures dans de très bonnes conditions.

Le goéland à bec cerclé niche dans le nord-est de l'Amérique du Nord, et est d'apparition rare mais régulière en Europe. En Grande-Bretagne, la première donnée date de 1973 ; depuis lors, plusieurs dizaines d'observations se sont accumulées. Jusque récemment, il n'y avait qu'une mention en France : en Loire-Atlantique au début des années 1970. Mais deux adultes ont été notés à La Baule en septembre 1981 (Ph. de Grissac), puis un adulte le 22 mars 1982 en Charente-Maritime (J. - J. Blanchon et Ph. Dubois).


Il est très vraisemblable que bien des goélands à bec cerclé passent inaperçus dans notre région, car ils ressemblent beaucoup au goéland cendré, surtout en plumage de première année. Aussi semble-t-il intéressant de rappeler ici les principaux points distinctifs de l'espèce :

- aspect général : fait plus "agressif" que le goéland cendré, car (1) le front est plus fuyant, (2) le tour de l'œil est souvent plus foncé, (3) le bec est un peu plus long, plus fort, avec un angle mentonnier bien marqué ("bec de grand goéland", et non "bec de mouette" comme chez le cendré), et (4) la poitrine est plus forte. On retrouve donc grosso-modo les différences d'allure qui existent entre mouette rieuse et mouette mélanocéphale.

- plumage de 1ère année : très ressemblant chez les deux espèces, mais chez le goéland cendré les liserés blancs très larges des rémiges tertiaires forment une sorte de croissant blanc toujours très net sur l'aile pliée (cf. dessin). Les liserés des tertiaires sont étroits chez le goéland à bec cerclé : pas de croissant blanc. De plus, la barre du bec commence à se dessiner dès avant l'âge d'un an chez certains goélands à bec cerclé (cas de l'oiseau de Nérizélec). Chez les goélands cendrés d'un an, la pointe du bec est toujours totalement noire.
- 2ème année (sub-adulte) : comme l'adulte, hormis quelques couvertures brunes près des rémiges externes, et parfois des traces de barre brune à la queue et à l'arrière de l'aile. Le bec et les pattes ont souvent acquis la couleur jaune vif caractéristique de l'espèce (cas de l'oiseau de Nérizélec).
- adulte : comme le cendré, mais dos d'un gris plus clair. Bec jaune très vif (plus vif que le goéland argenté) avec barre noire très bien délimitée au niveau de l'angle mentonnier. Pattes jaune vif en été (ce qui n'est jamais le cas chez le cendré), de teinte variable en hiver (hélas !). Iris très clair (difficile à voir), alors qu'il est brun chez le cendré.



GOÉLAND CENDRÉ



GOÉLAND À BEC CERCLE

Principaux critères d'identification des
oiseaux en plumage de première année :
tête et aile pliée

P. NISOU - 48, rue de la République - 92000 NANTY

- point délicat : de nombreux goélands cendrés de 2ème année, et certains adultes en hiver, ont une barre brun-noir parfois bien marquée au bec. Il faut donc faire attention aux autres points : forme de la tête et du bec, couleur du bec, des pattes et de l'iris...

Pour une description plus détaillée, on se reportera utilement à l'article de P.J. Grant (British Birds, avril 1979 : 142 - 182).

Pierre YESOU

